

รายงานการวิจัย

การใช้สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อเร่งการพัฒนาสีผิว  
ในปลาหมอนกแก้ว

Betalain extracts of dragon fruit as enhance the developing color  
in parrot cichlid



นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ  
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป  
นางสาวลำพิ่ง พุ่มจันทร์

RCH

OK  
495

ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2550

.C11

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๒๐๓๗๗


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน.....106006

วัน,เดือน,ปี.....- 5 ส.ค. 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง



## ชื่อโครงการวิจัย

การใช้สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อเร่งการพัฒนาสีผิวในปลาหมอนกแก้ว  
Betalain extracts of Dragon fruit as enhance the developing color in parrot cichlid

## ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550

## จำนวนเงิน

189,120 บาท

## ระยะเวลาที่ทำการวิจัย

เดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2550

## หน่วยงานและผู้ดำเนินการการวิจัย

รศ.ดร.นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ E-mail: klnongnu@kmitl.ac.th

นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป

นางสาวลำพิ่ง พุ่มจันทร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0-2326-4099 โทรสาร 0-2326-4099

## การใช้สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อเร่งการพัฒนาสีผิวในปลาหมอนกแก้ว

### บทคัดย่อ

การทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรมาใช้เร่งพัฒนาสีผิวปลาหมอนกแก้ว แบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร โดยเปรียบเทียบสารลดการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด ได้แก่ กรดแอสซิติค 1 %, บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1% และ กรดซิตริก 1% ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 ระดับได้แก่ -20, -10 และ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 35 และ 70 วัน ผลการทดลองพบว่าการใช้กรดแอสซิติค 1 % ช่วยลดการเสื่อมสภาพของสารเบตาเลนได้ดีที่สุด โดยอุณหภูมิไม่มีผลต่อการเสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) แต่ปริมาณเบตาเลนจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรต่อการเร่งสีผิวปลาหมอนกแก้ว โดยผสมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร ที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (มก./กก.) ในอาหารเม็ดให้ปลา กินเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยวัดสีผิวของปลาโดยใช้เครื่องวัดสีระบบ CIE L\*a\*b\* (CIE LAB) พบว่าหลังจากเลี้ยงปลาด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ค่าสีผิวของปลา ( $L^*$  - ค่าความสว่าง,  $a^*$  - ค่าสีแดง และ  $b^*$  - ค่าสีเหลือง) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ค่าสีแดงของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผิวหนังปลา (a\*) ของปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. เท่ากับ - 0.73±0.51, 10.04±0.79, 11.86±1.30, 14.81±1.81 และ 14.93±1.14 ตามลำดับ ค่าสีแดงของผิวหนังปลาเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดเบตาเลนที่ผสมในอาหาร (P<0.05) ส่วนอัตราการรอดของปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างชุดทดลอง รงควัตถุที่เกล็ดของปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลนมีมากกว่าปลาที่ไม่กินอาหารผสมเบตาเลน (P<0.05) แต่ปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลนระดับความเข้มข้นต่างกันพบรงควัตถุที่เกล็ดปลาไม่แตกต่างกัน หลังจาก 12 สัปดาห์เลี้ยงปลาด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลนอีก 4 สัปดาห์ พบว่า ค่าสีผิวของปลาที่วัดได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามค่าสีผิวของปลาที่วัดได้สูงสุดคือกลุ่มปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก. และความเข้มข้นของสารสกัดเบตาเลนที่เหมาะสมสำหรับเร่งสีปลาหมอนกแก้ว คือ 40 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์

คำสำคัญ: ปลาหมอนกแก้ว, สารสกัดเบตาเลน, ผลแก้วมังกร

### Betalain extracts of dragon fruit as enhance the developing color in parrot cichlid

#### ABSTRACT

The study on betalain extract from dragon fruit (*Hylocereus undatus*) peel for enhancing color of red blood parrot cichlid was conducted. Two experiments were designed. In the first experiment, 3 kinds of preservations (acetic acid 1%, buffer phosphate 1% and citric acid 1%) and 3 storage temperature (-20, -10 and 5 C°) were compared. The lowest deterioration rate of betalain of betalain extract was found by using 1 % acetic acid. The storage temperature did not caused the significant effect during 70-days storage. However, the concentration of betalain extract was significant decreased as the period of storage (P<0.05). In a second experiment, the optimal dosage of betalain extract for enhancing pigmentation in red parrot cichlid (*Cichlasoma citrinellum* x *Vieja synspilum*) was determined by supplementing a series of diets containing 0, 20, 30, 40 and 50 mg betalain kg<sup>-1</sup> for 12 weeks. The skin pigmentation of fish was measured by using chromameter with the system CIE L\*a\*b\* (CIE LAB) After 12 weeks, the skin color values (L\*-lightness, a\*-redness and b\*-yellowness) of fish was significantly differences when supplementing betalain in fish diet (P<0.05). The skin redness ( a\* values) of fish fed 0, 20, 30,

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

40 and 50 mg betalain kg<sup>-1</sup> were  $-0.73 \pm 0.51$ ,  $10.04 \pm 0.79$ ,  $11.86 \pm 1.30$ ,  $14.81 \pm 1.81$  and  $14.93 \pm 1.14$ , respectively. The skin redness was significantly increased as the concentration of betalain increased ( $P < 0.05$ ). The survival rate of fish fed diets with betalain was no significant differences among treatments ( $P > 0.05$ ). Fish was stimulated to produce more pigment on fish scale ( $P < 0.05$ ) when fed the diet containing betalain under the microscope, but did not differ from fish fed diets with betalain. After 12 weeks, all fish fed the basal diet (0 mg betalain/kg) for another 4 weeks, The skin color values was significantly lower than fish fed diet with betalain for 12 weeks ( $P < 0.05$ ). However, the skin color values of fish were highest ( $P < 0.05$ ) in fish fed 40 and 50 mg. betalain/kg. The optimal dosage of betalain for enhancing pigmentation in red blood parrot cichlid was 40 mg.betalain/kg for 4 weeks.

**Keyword:** red blood parrot cichlid, dragon fruit, *Hylocereus undatus*, betalain



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
สารบัญ	III
สารบัญตาราง	IV
สารบัญภาพ	VI
บทที่ 1 คำนำ	1
บทที่ 2 ตรวจเอกสาร	3
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	8
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์	12
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง	35 37



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบตาเลน(มิลลิกรัม/ลิตร)ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสในการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด	13
4.2	ปริมาณสารเบตาเลนที่เติมกรดแอสซิดิก 1 % และเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ต่างกันและระยะเวลาที่ต่างกัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	15
4.3	การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความสว่าง (L) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับเบตาเลน	19
4.4	การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าสีแดง (a) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับเบตาเลน	22
4.5	การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าสีเหลือง (b) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับเบตาเลน	26
4.6	การเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับอาหารผสมสารเบตาเลนที่สกัดจากเปลือกแก้วมังกร	29



## สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า	
2.1	โครงสร้างของ (a) betaxanthins, (b) betalamic และ (c) สารประกอบกรด betalamic เชื่อมกับ cyclo- DOPA (cyclo-3,4-dihydroxy – phenylalanine)	6
4.1	การเปลี่ยนรูปของเอทานอลเมื่อทำปฏิกิริยากับแอซิติค แอซิด	13
4.2	การเปลี่ยนรูปของสารประกอบเอมีน เมื่อถูกไฮโดรไลซ์	13
4.3	โครงสร้างของกรดซิตริก	14
4.4	ผลของการเติมกรดแอซิติค 1 %, สารละลายบัพเฟอร์ฟอสเฟต 1% และ กรดแอซิติค 1 % ในสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส	14
4.5	ผลของการเติมกรดแอซิติค 1 % ในสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร ที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เก็บรักษาต่างกัน	16
4.6	ระดับค่าความสว่าง (L) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)	18
4.7	ระดับค่าความเข้มของสีแดง (a) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)	22
4.8	ระดับค่าความเข้มของสีเหลือง (b) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)	25
4.9	การเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารสกัดเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในอัตรา (A) 0 มก./กก., (B) 20 มก./กก., (C) 30 มก./กก., (D) 40 มก./กก. และ (E) 50 มก./กก.	27
4.10	การเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารสกัดเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ และหยุดให้เบตาเลนเลี้ยงต่อ 4 สัปดาห์ด้วยอาหารไม่ผสมเบตาเลน ในอัตรา (A) 0 มก./กก., (B) 20 มก./กก., (C) 30 มก./กก., (D) 40 มก./กก. และ (E) 50 มก./กก.	28
4.11	เกล็ดแบบ ctenoid ในปลาหมอนกแก้ว ( formalin 10 % ; × 10)	31
4.12	รงควัตถุสีเหลือง (P) ที่พบในปลาที่ได้อาหารไม่ผสมเบตาเลน (formalin 10 % ; × 10)	31
4.13	เกล็ดที่ซ้อนทับกัน (Sc) บนชั้น epidermis ที่ปกคลุมไปด้วย squamous epithelium (S) บริเวณใกล้เคียงพบ goblet cells หรือ mucous cells (G) (formalin 10 % ; H&E ; X 40) (ชุดที่ไม่ให้อาหารผสมเบตาเลน)	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.14	ชั้น epidermis (E) ที่คลุมเกล็ดทั้งด้านบนและล่างของเกล็ด (Sc) และชั้น dermis (D) ที่เป็นต้นกำเนิดของเกล็ด (formalin 10 % ; H&E ; x 40) (ชุดที่ไม่ให้อาหารผสมเบตาเลน)	32
4.15	เกล็ดที่มีรงควัตถุติดอยู่ (P) (formalin 10 % ; x 10) (ชุดที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม)	33
4.16	เกล็ด (Sc) ที่มีชั้น epidermis (Ep) ปกคลุม (กลุ่มทดลองที่ 5) (formalin 10 % ; H&E ; x 40) (ชุดที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม)	33
4.17	เปรียบเทียบเกล็ดของปลาหมอนกแก้ว (A) กลุ่มที่ไม่ให้สารสกัดเบตาเลน กับ (B) กลุ่มที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มก./กก.พบรงควัตถุ (P) (formalin 10 % x 10)	34

## บทที่ 1 คำนำ

การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกเพื่อความเพลิดเพลิน เนื่องจากปลาสวยงามเหล่านี้มีรูปร่างและสีสันสวย เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านกลิ่นและเสียงเช่นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ ปัจจุบันการผลิตปลาสวยงามยังไม่เพียงพอับความต้องการของตลาดโลก เนื่องจากมีผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ทำให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2545 อ้างโดย กรมประมง, 2549 ได้รายงานมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มูลค่ารวมของโลกมีสูงถึง 234 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ส่งออกจากประเทศในแถบเอเชีย โดยมีสิงคโปร์เป็นประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามรายใหญ่ที่สุดในโลก รองลงมา คือ ฮองกง และไทย ตามลำดับ มูลค่าการค้าปลาสวยงามในตลาดโลกมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 9-10% ต่อปี (อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, 2542 ; บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด, 2550) ถึงแม้ว่าการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเป็นสินค้าส่งออกนารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าสูง แต่ยังมีปัญหาเรื่องสีส้มของปลาที่มีลักษณะซีดทำให้ปลาไม่มีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับปลาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มของปลาหมอนกแก้วที่จำเป็นต้องเร่งสีก่อนจำหน่าย เกษตรกรจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการนำฮอร์โมนเพศผู้ ซึ่งหาได้ง่ายในประเทศ มาใช้ในการเร่งสีผิวของปลาให้แดงขึ้น แต่การใช้ฮอร์โมนเพศไม่สามารถคงทนในตัวปลาได้นานจำเป็นต้องให้ฮอร์โมนเพศอย่างต่อเนื่อง 2-3 วันต่อครั้ง ยังส่งผลข้างเคียงต่อปลา ทำให้ปลามีความเครียดสูง ตับโต ท้องกึ่ง และส่งผลถึงพฤติกรรมความก้าวร้าวในเพศผู้ที่สูงขึ้น ซึ่งการใช้ฮอร์โมนเพศดังกล่าวทำให้ปลาอายุสั้น สุขภาพอ่อนแอและไม่สามารถใช้ในการผสมข้ามสายพันธุ์ต่อไปได้ เนื่องจากทำให้รังไข่ฝ่อเพราะผลจากฮอร์โมนเพศผู้ (พรรษา ศะศิสมิต, 2543) และการใช้ฮอร์โมนเพศเป็นเวลานาน ยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้อีกด้วย ต่อมาการทดลองใช้สารสีสังเคราะห์ เช่น ครอโรฟิลล์ฟังก์ (แอสตาแซนทินแบบสังเคราะห์) มาผสมในอาหารเพื่อเร่งสีพบว่าได้ผลดี แต่แอสตาแซนทินมีราคาสูงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ต้นทุนในการผลิตปลาสวยงามเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องหาสารสีชนิดอื่นมาทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปลาหมอนกแก้ว ดวงใจ พวงแก้ว (2548) ได้ทดลองสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกร (*Hylocercus undatus*) ที่มีโทนสีในช่วง ม่วง-แดง ผสมในอาหารสำเร็จรูปให้ปลากุหลาบแดงกินพบว่าสามารถทำให้ปลาที่มีสีแดงเข้มมากขึ้น แต่สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเป็นสารที่มีการสลายตัวง่ายระหว่างการเก็บรักษาหากเก็บในสภาวะไม่เหมาะสม (Cai *et al.*, 2005 ; Strack *et al.*, 2003 ; Stintzing *et al.*, 2006) ดังนั้นการศึกษาวិธีการเก็บรักษาสารสกัด ปริมาณสารสกัดเบตาเลนและระยะเวลาการให้อาหารผสมเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่เหมาะสมเพื่อเร่งสีผิวปลาหมอนกแก้ว รวมถึงผลของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แก้วมังกร ต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนังของปลาหมอนกแก้วจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคต

### วัตถุประสงค์

- 1.1 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร โดยใช้ สารเคมีและ อุณหภูมิ
- 1.2 ศึกษาปริมาณสารสกัดเบตาเลนและระยะเวลาการให้อาหารผสมเบตาเลนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสีผิวของปลาหมอนกแก้ว
- 1.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนังของปลาหมอนกแก้วหลังได้รับ สารเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2 ตรวจเอกสาร

### 2.1 ปลาหมอนกแก้ว

ปลาหมอนกแก้ว มีชื่อสามัญว่า red parrot cichlid หรือ love heart blood parrot cichlid, red blood parrot cichlid, purple blood parrot cichlid, red parrot, hybrid parrot cichlid (Gold-E, 2008) ชื่อที่นิยมเรียกกันมากที่สุด คือ blood parrot ปลาหมอนกแก้วเป็นปลาที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ของปลาหมอสีจากอเมริกาใต้สองสายพันธุ์ คือ *Cichlasoma citrinellum* X *Vieja synspilum* (Gold-E, 2005) ที่อยู่ในวงศ์ Cichlidae (Nelson, 1994 ; Bailey and Sandford, 1999) ซึ่งมีรายงานว่าพบครั้งแรกปี ค.ศ.1980 ในประเทศไต้หวัน (Yut1678, 2549)

### 2.2 การเร่งการพัฒนาสีผิวในปลา

กลุ่มปลาสวยงามที่นิยมทำการเร่งสีก่อนจำหน่ายคือกลุ่ม cichlids ได้แก่ ปลาหมอสี ปลาปอมปาดัวร์ และปลาหมอนกแก้ว เนื่องจากในอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่เกษตรกรเลือกใช้มักมีปริมาณสารสีในปริมาณน้อย การจะจำหน่ายต้องเลี้ยงเป็นเวลานาน เป็นการเพิ่มต้นทุนทั้งค่าอาหาร และแรงงาน จึงจำเป็นต้องมีการเร่งสีหรือที่เกษตรกรไทยนิยมเรียกวิธีนี้ว่าวิธีย้อมสีปลา เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้พร้อมกันทุกตัว และมีราคาที่สูงขึ้น (กรมประมง, 2540 ; พรรษา ศะศิสมิต, 2543)

การเร่งสีผิวในปลาเป็นการทำให้สีผิวปลาเปลี่ยนสีจากสีเทาดำไปเป็นสีขาวหรือเหลืองส้ม (ลอกสี) วิธีการเร่งสีผิวในปลาแบ่งได้ 5 วิธี

#### 2.2.1 การใช้อาหารธรรมชาติ

ในปลาปอมปาดัวร์ใช้ไข่กุ้งก้ามกรามเร่งสีลูกปลาขนาดความยาว 2 เซนติเมตร อายุประมาณ 30-45 วัน หรือใช้ตัวอ่อนรึ้นน้ำจืด (หนอนแดง) กุ้งสด เนื้อปลาสด และหัวใจวัวปั่นละเอียด ในบางฟาร์มอาจมีการใส่น้ำผสมผงขี้ผึ้งเพื่อให้มีการจับตัวกันดีขึ้น (กรมประมง, 2540)

#### 2.2.2 การใช้ฮอร์โมนเพศชาย

ปัจจุบันพบในรูปแบบของอาหารเม็ดเร่งสีสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศชาย หรือ อาจจะใช้ฮอร์โมนเพศมาคลุกกับอาหารสดให้ปลากิน เพื่อกระตุ้นให้ปลาเกิดสีได้เร็วกว่าปกติ (Gold-E, 2008) กรมประมง, 2540 ได้รายงานไว้ในปลาปอมปาดัวร์นิยมใช้ฮอร์โมน fluoxymesterone ที่มีชื่อทางการค้าว่า Halotestin โดยผสมกับไข่กุ้งหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน ให้กินเป็นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนจำหน่าย สำหรับในปลาหมอสีนิยมใช้ ฮอร์โมน testosterone ที่มีชื่อทางการค้าว่า mano ทำให้ปลาจะเกิดสีขึ้นเร็ว พรรษา ศะศิสมิต (2543) อธิบายว่า การใช้ฮอร์โมนเพศชายใช้ปริมาณ 5 แคลปซูล ต่ออาหาร 1 กิโลกรัมให้ปลากินทุกวันประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อควบคุมปลาทุกตัวในฝูงให้มีสีเข้มเท่ากัน

### 2.2.3 การใช้สารแอสตาแซนทิน

ในปลาหมอสีมี้อตราส่วนการผสมอาหารเม็ด 1 กิโลกรัม ต่อ คลอโรฟิลล์พิงค์ หรือ คลอโรฟิลล์เรด (chlorophyll pink and chlorophyll red ชื่อทางการค้าของแอสตาแซนทิน และ แคนธาแซนทิน) 1 ช้อนชา ให้กินติดต่อกันจนกว่าสีจะเข้มขึ้น โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ (อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, 2544 ; พรรษา ศะศิสมิต, 2543) หรือการใช้หนอนแดง (ตัวอ่อนรินน้ำจืด) แซ่ในแอสตาแซนทิน แล้วนำไปให้ปลากิน วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น (กรมประมง, 2540)

### 2.2.4 การฉีดสีเข้าร่างกายปลาโดยตรง

ใช้สีสังเคราะห์ทำการฉีดเข้าที่ร่างกายปลา บริเวณใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวของปลามีสี สดใส แต่เมื่อผู้เลี้ยงนำไปเลี้ยงชักระยะ สีจะซีดจางไปเรื่อยๆ ลักษณะของปลาที่ฉีดสี ที่บริเวณใต้ ครีบหลังจะเป็นแนวสีแดงเข้มยาว Chen and Pandora (2008) ได้เรียกปลาฉีดสีไว้ว่า painted fish เรียกเข็มที่ใช้ฉีดสีปลาว่า hypodermic syringe และเรียกสีย้อมว่า dye วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง หรือสีม่วง หลังจากการฉีดสี สีจะซีดลงในช่วงเวลาประมาณ 1-3 เดือน นอกจากนี้วิธีดังกล่าวสามารถพบได้ในปลาแก้ว (glass fish), ปลาแรด (giant gourami), ปลาหมอนกแก้ว (*Cichlasoma citrinellum x Vieja synspilum*) เป็นต้น (Anonymous, 2008a และ Gold-E, 2008)

### 2.3 สารเบตาเลน และการสกัดสารเบตาเลนจากพืช

สารเบตาเลนเป็นสารที่มีโครงสร้างหลักมาจากกรด เบตาแลมิก ที่มีชื่อสูตรโครงสร้างว่า 1, 2, 4, 7, 7-pentastitute 1,7-diazaheptamethin เดิมเบตาเลนถูกเรียกว่า caryophyllineroth, rubenroth และ chromoalkaloids การเรียกชื่อสารเบตาเลนจะเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มา เช่น betacyanins amaranthine- I มาจาก *Amaranthus tricolor* และ betanin มาจาก *Beta vulgaris* เป็นต้น

กลุ่มพืชที่สร้างสารเบตาเลน ได้แก่ อันดับ Caryophyllales และอันดับ Basidiomycetes บางชนิด (Cai et al., 2005 ; Stintzing and Carle, 2004) และพบมากในพืชวงศ์ Cactaceae ซึ่งเป็น กระบองเพชรประเภทเลื้อย (Cacti) ได้แก่สกุล Opuntia, Hylocereus และสกุล Mamillaria บางชนิด จะพบเบตาเลนบริเวณเนื้อเยื่อของดอกและผลปริมาณมาก (Mario, 1976 ; Stintzing and Carle, 2004) โดย Cai et al., (2005) กล่าวว่า สามารถใช้สารเบตาเลนในการจำแนกชนิดของพืช ชั้นสูงได้ เนื่องจากจะพบสารเบตาเลนเฉพาะในอันดับ Caryophyllales เท่านั้น

การสกัดเบตาเลนสามารถใช้น้ำ อะซีโตน คลอโรฟอร์ม หรือแอลกอฮอล์ในการสกัดสาร ได้โดยมากจะนิยมใช้ เอทานอลความเข้มข้น 96 และ 97% ในการสกัดเบตาเลนจากผลปืทุทและ ผล cacti (Strack et al., 2003 ; Mobhammer et al., 2005 ; Herbach et al., 2006 ; Whybraniec 2008)


แต่ Kobayashi et al. (2000) และ Thimmaraju et al. (2003) ได้ใช้เมธานอล 80 และ 96 % ในการ

สกัดผลบิทรูท และผล christmas cactus ในขณะที่ ดวงใจ พวงแก้ว (2548) ทดลองสกัดสารเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรด้วยเอทานอล 80% พบว่ามีปริมาณสารเบตาเลนสูงกว่าการใช้น้ำกลั่น สารที่สกัดก็คือ แอนโทไซยานินและเบตาเลน สารทั้งสองจะมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสีที่ได้แตกต่างกันเล็กน้อย แอนโทไซยานิน จะให้สีเหลือง ส้ม ไปจนถึงแดง และน้ำเงิน ในขณะที่เบตาเลนให้สี เหลือง ส้ม แดง ม่วง แต่ขาดสีน้ำเงิน เปลือกผลแก้วมังกรนอกจากตรวจพบสารเบตาเลนแล้วยังมี โพลีแซคคาไรด์ในรูปของเพคติน (pectin) เป็นองค์ประกอบในเปลือกผลแก้วมังกรเป็นจำนวน 30 - 35 % จากน้ำหนักเปลือก (ปาริฉัตร หยวกแพ่ง และคณะ, 2550) นอกจากนี้ ทรงศิลป์ พงษ์ชนะชัย และคณะ (2550) ศึกษาองค์ประกอบของเปลือกผลแก้วมังกรพบแคโรทีนอยด์ปริมาณ 0.02 มิลลิกรัม/น้ำหนักเปลือก(กรัม) และ วิตามินซี 8.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักเปลือก 100 กรัม และ วุฒิชัย จินเมือง และคณะ (2550) รายงานว่าเปลือกผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวมีสารประกอบฟีนอล และ สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันปริมาณมาก ส่วนในเนื้อผล สุรพงษ์ โกติยะจินดา (2545) และ Gunasa et al. (2008) รายงานถึงส่วนประกอบเนื้อผลแก้วมังกรว่ามี โปรตีน น้ำตาล ไขมัน วิตามินซี แคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบหลัก

#### 2.4 โครงสร้างทางเคมีของสารเบตาเลน

Gandia- Herrero et al. (2005a) และ Strack et al. (2003) รายงานว่าเบตาเลนมีโครงสร้างของไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สามารถละลายน้ำได้ดี โครงสร้างหลักสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ betacyanins และ betaxanthin ซึ่งให้สีม่วงแดง และ สีเหลือง เขียนสูตรโครงสร้างแบบง่ายคือ  $R_1-N-R_2$  โดย  $R_1$  และ  $R_2$  อาจเป็น  $H^+$  หรือ กลุ่มของ aromatic หรือสารอื่นๆ (ภาพที่ 2.2) โครงสร้างของ betacyanin นั้นมีหลายรูปแบบ ตาม acyl group และน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบ และบางโครงสร้างอาจมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบ (Stintzing and Carle, 2004) โดยมี betanidin เป็นสารประกอบพื้นฐาน

นอกจากนี้ Gandia-Herrero et al. (2005b) ยังได้กล่าวถึงเบตาเลนที่สกัดได้ว่ามีโทนสีตั้งแต่สีเหลืองอ่อน เหลืองเข้ม ส้ม แดง จนถึงม่วงแดง โดยสีที่เห็นนั้น เกิดจากคุณสมบัติการสลับไปมาระหว่างพันธะคู่ของไอออน (resonance) โดยมีโครงสร้างหลัก 2 โครงสร้างดังนี้ betaxanthins (สีเหลือง) และ betacyanin (สีน้ำเงิน) ที่มีองค์ประกอบกรด betalamic กับ cyclo-DOPA (cyclo-3,4-dihydroxy-phenylalanine) การมาเกาะของ cyclo- DOPA ส่งผลให้เกิดขั้วสองขั้วที่วงแหวนอะโรมาติก ซึ่งจะเปลี่ยนค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ประมาณ 480-540 nm (สีแดง-ม่วงของ betacyanins ตัวอย่างเช่น betanidine; สีเหลืองของ betaxanthins เช่น miraxanthin)



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของ (a) betaxanthins, (b) betalamic และ (c) สารประกอบกรด betalamic เชื่อมกับ cyclo- DOPA (cyclo-3,4-dihydroxy – phenylalanine)

ที่มา : Gandia-Herrero et al. 2005

## 2.5 การเก็บรักษาสารเบตาเลน

เบตาเลนมีความเสถียรต่ำจะเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงสว่าง ความร้อน ออกซิเจน ภาวะเป็นด่างที่สูง โลหะหนัก และ เอนไซม์บางชนิด Stintzing and Carle (2004) ได้อธิบายปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพดังนี้

2.5.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เบตาเลนจะคงสภาพที่ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ 3.5-7.0 หากค่าความเป็นกรด-ด่าง ลดลงต่ำกว่า 3.5 จะส่งผลให้ปริมาณสารเบตาแซนทิน และเบตาไซยานินที่ตรวจพบลดปริมาณลง เมื่อค่าความเป็นกรด-ด่าง สูงกว่า 7.0 ปริมาณสารที่ตรวจพบก็จะลดปริมาณลงเช่นกัน (Stintzing and Carle, 2004)

2.5.2 อุณหภูมิ ส่งผลโดยตรงกับปริมาณของสาร เบตาเลน โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้สีของสารละลายลดลง Stintzing and Carle (2004) รายงานว่าเมื่อลดอุณหภูมิลงสีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพิ่มขึ้น และเมื่อสารเบตาเลนถูกแสงแดด อัตราเสื่อมสภาพของสารจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 15.6% ที่ 15 องศาเซลเซียส และ Herbach et al. (2006) ได้ทำการศึกษา โครงสร้างและความเสถียรของสารเบตาไซยานินที่สกัดจากแก้วมังกร (*Hylocereus polyrhizus*) โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 และ 6 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าที่ 4 °C มีปริมาณสารเบตาไซยานินเหลือมากกว่าที่ 6 °C

2.5.3 ก๊าซออกซิเจน เมื่อสารเบตาเลนสัมผัสกับออกซิเจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของวง (cyclic) ที่เป็นโครงสร้างหลักทำให้วงแตกออกเพื่อเชื่อมพันธะคู่กับออกซิเจนแทน ทำให้คุณสมบัติของเบตาเลนเสื่อมไปประมาณ 25 % ภายใน 50 ชั่วโมง และอัตราเสื่อมสภาพของเบตาเลนเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน นั้นพบว่า ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.0 พบว่าเสื่อมสภาพมากถึง 15 % เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่เก็บในไนโตรเจน (Thimmaraju et al. 2003)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6 สารลดการเสื่อมสภาพ

เนื่องจากสารเบตาเลนมีโครงสร้างหลักเป็นวงและมีคุณสมบัติเป็นสารประกอบ arenas คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีส่วนประกอบแอมโรแมติกในโมเลกุลเดียวกัน ซึ่ง อุดม กักผล และ คณะ (2543) ได้อธิบายปฏิกิริยาของสารประกอบ arenas เอาไว้ว่า เมื่อมีแสงหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเกิดบนส่วนที่เป็น aliphatic แต่หากเกิดการทำปฏิกิริยากับพวกไฮโอฮาลิเด จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า free radical ได้แก่  $\text{Cl}_2$  และ  $\text{Br}_2$  ที่โดนแสงหรือความร้อนจะแตกตัวเป็นอะตอม เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์อย่างต่อเนื่อง โดยดึงไฮโดรเจนอะตอมออกไปแล้วเข้าเกาะแทนที่ทำให้โครงสร้างหลักเปลี่ยนไป การเติมสารที่มีคุณสมบัติถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายกว่าสารเบตาเลนลงไปจะช่วยลดการเสื่อมสภาพของเบตาเลนลงได้ เนื่องจากสารที่เติมลงไปจะถูกออกซิไดซ์แทนที่สารเบตาเลน ทำให้สารเบตาเลนคงตัวได้นานขึ้น สารลดการเสื่อมสภาพที่ใช้กับสารสกัดเบตาเลนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

### 2.6.1 สารประเภทกรด

Herbach et al. (2006) ทดสอบสารลดการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอบิก กรดไอโซแอสคอบิก และกรดซิตริก ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 และ 1 % นำไปให้ความร้อน  $85^{\circ}\text{C}$  นาน 1 ชั่วโมง และนำมาแช่เย็นที่  $10^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่า กรดแอสคอบิก 1 % มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกการทดลอง รองลงมาได้แก่ กรดแอสคอบิก 0.1 % และกรดไอโซแอสคอบิก 0.1 และ 1% ที่ให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติ และ Thimmaraju et al. (2003) สกัดสารเบตาเลนจากรากบีทรูท (*Beta vulgaris*) พบว่าเติมกรดไฮโดรคลอริก กรดแอสคอบิก หรือกรดฟอรั่มิกลงไปเพื่อควบคุม pH ให้อยู่ประมาณ 5.5-6.0 ช่วยให้สารเบตาเลนมีความคงตัวได้ดีขึ้น

### 2.6.2 สารประเภทน้ำตาล

Stintzing and Carle (2004) ได้เติมน้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตส ร่วมกับการปรับ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เป็นกรดอ่อนๆ พบว่าช่วยลดการเสื่อมสภาพของสารเบตาเลนได้

### 2.6.3 สารประกอบชนิดอื่นๆ

Mueller et al. (1996) ได้เติมกลีเซอรอล 10 % ลงในสาร tyrosinase ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเบตาเลน ก่อนเก็บรักษาในอุณหภูมิ  $-20^{\circ}\text{C}$  นาน 3 เดือน พบว่าช่วยยืดอายุของสารได้ เนื่องจากช่วยป้องกันการแข็งตัวของสาร นอกจากนี้ยังทดลองเติมคอปเปอร์ซัลเฟต ลงในการทดลองเก็บรักษาสาร tyrosinase ที่อุณหภูมิ  $4^{\circ}\text{C}$  เทียบกับชุดทดลองที่ไม่ได้เติมคอปเปอร์ซัลเฟต พบว่าชุดที่ไม่ได้เติมคอปเปอร์ซัลเฟตมีปริมาณ tyrosinase ลดลงครึ่งหนึ่งภายใน 72 ชั่วโมง

### บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

#### 3.1 การทดลองที่ 1 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร

แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย ได้แก่

3.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันการเสื่อมสภาพที่เหมาะสมสำหรับสารสกัดเบตาเลน

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design : CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ชุดการทดลอง (treatment) ที่ทดสอบ คือ สารป้องกันการเสื่อมสภาพของเบตาเลน 3 ชนิด ได้แก่ กรดแอซติก 1 % บัฟเฟอร์ฟอสเฟต (buffer phosphate) 1 % และ กรดซิตริก 1 %

3.1.1.1 นำผิวเปลือกผลแก้วมังกรสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ โดยวิธี Maceration แบบประยุกต์ แช่เปลือกแก้วมังกรในตัวทำละลายเอทานอล 80 % ในอัตราส่วน 250 กรัม:500 มิลลิลิตร นาน 30 นาที จากนั้นนำเปลือกแก้วมังกร ไปปั่นให้ละเอียด ด้วยเครื่องปั่นอาหาร (blender) กรองส่วนของสารละลายออกด้วยผ้าขาวบาง และนำเปลือกไปปั่นซ้ำและกรองจนกระทั่งเปลือกผลแก้วมังกรไม่มีสี นำสารละลายที่กรองได้ไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที แบ่งสารเบตาเลนที่สกัดได้ออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 500 มิลลิลิตร

3.1.1.2 เตรียมสารลดการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด ตามความเข้มข้นที่กำหนดปรับค่าความเป็นกรดของสารละลายเบตาเลนที่ได้จากข้อ (1) ทั้ง 3 ชุด ให้เท่ากับ 6 โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 10 % และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10 % จากนั้นแยกเติมสารลดการเสื่อมสภาพ ชุดละ 1 ชนิดผสมให้เข้ากัน โดยให้แต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

ชุดที่ 1 สารสกัดเบตาเลนที่มีกรดแอซติก 1 % เป็นองค์ประกอบ

ชุดที่ 2 สารสกัดเบตาเลนที่มีบัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1% เป็นองค์ประกอบ

ชุดที่ 3 สารสกัดเบตาเลนที่มีกรดซิตริก 1% เป็นองค์ประกอบ

แบ่งสารสกัดเบตาเลนที่มีสารลดการเสื่อมสภาพแต่ละชุดใส่ขวดไว้ออลจำนวน 15ชุดต่อชนิดสาร เก็บรักษาสารสกัดดังกล่าวไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 14, 21, 28 และ 35 วัน

3.1.1.3 ตรวจสอบปริมาณสารเบตาเลนที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาด้วยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 538 nm ครั้งละ 3 ชุด ต่อชนิดของสารลดการเสื่อมสภาพ บันทึกผลและนำไปคำนวณหาปริมาณสารเบตาเลนจากสูตร (Stingzing et al., 2006)

$$A = abc$$

เมื่อ A = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างที่ความยาวคลื่น 538 nm

a = ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของเบตาเลนที่ 538 nm มีค่าเท่ากับ 1,120

b = ความกว้างคิวเวต 1 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานวิจัยนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

c = ปริมาณเบตาเลนในสารสกัดตัวอย่าง (กรัม)

ทดสอบทางสถิติเพื่อหาชนิดสารลดการเสื่อมสภาพที่ให้ผลดีที่สุด 1 ชนิดมาทดสอบการเสื่อมสภาพในการทดลองต่อไป

### 3.1.2 การทดลองผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลน

จากข้อ 3.1.1 พบว่ากรดแอสซิติค 1 % ให้ผลดีที่สุดในการป้องกันการเสื่อมสภาพของสารสกัดเบตาเลน ในการทดลองครั้งนี้จึงใช้กรดแอสซิติค 1 % ผสมในสารสกัดเบตาเลน จัดชุดทดลองแบบ 3x3 factorial in randomized complete block design จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิ -20, -10 และ 5 องศาเซลเซียส และปัจจัยที่สองคือ ระยะเวลาที่ทำการเก็บรักษา ได้แก่ 0, 35 และ 70 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาในแต่ละอุณหภูมิ ตรวจวัดปริมาณสารเบตาเลนที่เปลี่ยนแปลงไป

การเตรียมสารสกัดเบตาเลนที่มีกรดแอสซิติค 1 % และการวัดปริมาณสารสกัดเบตาเลนเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

## 3.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาระดับของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่เหมาะสมต่อการเร่งสีผิวปลาหมอนกแก้ว

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design : CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ชุดการทดลอง (treatment) คือ ความเข้มข้นของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร 5 ระดับ ได้แก่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่ออาหารปลา 1 กิโลกรัม (มก./กก.) ใช้ปลา 8 ตัวต่อซ้ำ ได้แก่

ชุดทดลองที่ 1 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน (ชุดควบคุม)

ชุดทดลองที่ 2 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 20 มก./กก.

ชุดทดลองที่ 3 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 30 มก./กก.

ชุดทดลองที่ 4 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 40 มก./กก.

ชุดทดลองที่ 5 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 50 มก./กก.

3.2.1 เตรียมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกรตามวิธีการในข้อ 3.1.1 โดยใช้เปลือกผลแก้วมังกรในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้สารสกัดที่ได้เป็น 0, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่ออาหารปลา 1 กิโลกรัม ตามที่กำหนด (ใช้เปลือกแก้วมังกร 0, 100, 150, 200 และ 250 กรัมต่อเอชานอล 80% ปริมาตร 500 มิลลิลิตรตามลำดับ) ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารสกัดให้เท่ากับ 6 และปรับให้มีคุณสมบัติเป็นสารละลายกรดแอสซิติคให้มีความเข้มข้น 1 %

3.2.2 นำอาหารปลากินเนื้อชนิดเม็ด มาเกลี่ยบนถาดอะลูมิเนียม จำนวน 5 ถาด ถาดละ 500 กรัม ผสมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกรที่ได้จากการทดลองที่ 1 โดยการรินสารสกัดให้กระจาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออยู่ใต้เห็นใบเขียวจะขึ้นตามการคำนวณว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บนอาหาร และคลุกเคล้าให้เข้ากับอาหารเมื่อดจนทั่ว อาหารทุกสูตรจะถูกนำไปฝังลงในที่ร่ม เป็นเวลา 1 วันในห้องที่มีอากาศถ่ายเท เมื่ออาหารแห้งบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกเพื่อลดการสัมผัสอากาศและนำเข้าเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส

3.2.3 เลี้ยงปลาในตู้กระจกขนาด 230 ลิตร ให้อาหารแก่ปลาวันละ 3% ของน้ำหนักตัวปลา โดยให้วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) คูดตะกอนที่พื้นตู้ทุก 2 วัน เปลี่ยนถ่ายน้ำ 30 % ทุกสัปดาห์ สุ่มชั่งน้ำหนักปลาหมอนกแก้วทุก 2 สัปดาห์ครั้งละ 3 ตัว (37.5%) เพื่อคำนวณน้ำหนักอาหารให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่เปลี่ยนไปและชั่งน้ำหนักทุกตัวก่อนการเริ่มทดลอง และชั่งน้ำหนักอีกครั้ง เมื่อครบ 12 สัปดาห์

### 3.2.4 การบันทึกผล

3.2.4.1 วัดการเจริญเติบโตของปลาหมอนกแก้ว ด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักก่อนการทดลอง จากนั้นสุ่มตัวอย่างปลาหมอนกแก้วตู้ละ 3 ตัว นำมาชั่งน้ำหนัก ทุก 2 สัปดาห์ จนกระทั่งครบ 12 สัปดาห์ แล้วนำมาคำนวณหาอัตราการรอด และน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นดังนี้

3.2.4.2 วัดการเปลี่ยนแปลงของสีต่างๆ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง โดยสุ่มปลาซ้ำละ 3 ตัว มาสลับด้วยยาสลับ นำใส่ถุงพลาสติกและวัดสีบนลำตัวปลา โดยใช้เครื่องวัดสี (chromameter) วัดสีทั้งสองด้านของลำตัวปลา บริเวณกลางลำตัว ใต้ครีบหลัง ตลอดการเลี้ยง 16 สัปดาห์ เพื่อหาค่าของสีที่เปลี่ยนแปลงแบบ CIE L\*a\*b\* ( Van der Salm et al., 2004) วัดค่าของ “L\*”, “a\*” และ “b\*” ซึ่งมีความหมายดังนี้

L\* แสดงถึงความสว่างของสี มีค่าระหว่าง 0 – 100 (สีดำถึงสีขาว)

a\* แสดงถึงค่าความเข้มของสีแดง (+) และสีเขียว (-) มีค่าระหว่าง +60 ถึง - 60

b\* แสดงถึงค่าความเข้มของสีเหลือง (+) และ สีน้ำเงิน (-) มีค่าระหว่าง +60 ถึง -60

3.2.4.3 หลังจากสิ้นสุดการทดลอง สุ่มตัวอย่างปลาหมอนกแก้วชุดการทดลองละ 6 ตัว แบ่งไปศึกษาลักษณะเม็ดสีผิวหนังภายนอกจำนวน 3 ตัว และแบ่งไปทำสไลด์ถาวรจำนวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การศึกษาเซลล์เม็ดสีภายนอก นำปลาไปแช่ใน buffer formalin 10% นาน 24 ชั่วโมง นำมาดึงเกล็ดบริเวณข้างลำตัว วางบนแผ่นสไลด์ เพื่อศึกษาเซลล์เม็ดสี ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมบันทึกภาพ

(2) การศึกษาเนื้อเยื่อโดยการทำเป็นสไลด์ถาวร นำตัวอย่างปลามาทำให้สลายด้วยยาสลายเกินขนาด และตัดตัวอย่างผิวหนังพร้อมทั้งกล้ามเนื้อบริเวณข้างลำตัว ไปแช่ใน buffer formalin 10 % นาน 24 ชั่วโมง เปลี่ยนน้ำยาแล้วแช่ซ้ำ ต่อมาแช่น้ำยาลดแคลเซียม (decalcification solution) แล้วตัดชิ้นเนื้อแบ่งใส่ถาดในเนื้อเยื่อ ทำการล้างน้ำโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างช้าๆ นาน 2-4

ชั่วโมง จากนั้นนำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปทำการขจัดน้ำ (dehydration) โดยผ่านขั้นตอนตามวิธีมาตรฐานของ Humason (1979) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปลาหมอนกแก้วภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากสไลด์ที่ทำการย้อมสีแล้ว พร้อมบันทึกภาพ

### 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดทดลองด้วยวิธี Duncan's New Multiple's Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์

### 4.1 การทดลองที่ 1 วิธีการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร


4.1.1 การทดลองย่อยที่ 1 การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันการเสื่อมสภาพที่เหมาะสมสำหรับสารสกัดเบตาเลน

จากการเก็บรักษาของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร โดยการใช้สารช่วยลดการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายกรดซิตริก 1% บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1% และกรดแอสซิดิก 1% ที่สกัดเปลือกผลแก้วมังกรโดยใช้เอทานอลความเข้มข้น 80 % เป็นระยะเวลา 35 วัน ที่ 5 องศาเซลเซียส เพื่อหาชนิดสารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลน พบว่าการเสื่อมสภาพของสารเบตาเลนที่สกัดได้จะมีอัตราเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง 35 วัน เมื่อพิจารณาแบ่งตามชนิดสาร เมื่อครบ 35 วัน สารป้องกันการเสื่อมสภาพที่ได้ผลที่สุดคือ กรดแอสซิดิก 1 % มีค่าเฉลี่ยที่  $1.74 \pm 0.01$  มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่าเริ่มต้น  $1.92 \pm 0.00$  มิลลิกรัมต่อลิตร ชุดที่เสื่อมสภาพรองลงมาได้แก่ สารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1 % ที่ตรวจพบสารเบตาเลน มีค่าเฉลี่ยที่  $1.66 \pm 0.14$  มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่าเริ่มต้น  $1.92 \pm 0.00$  มิลลิกรัมต่อลิตร และ สารสกัดเบตาเลนที่เติมกรดซิตริก 1% ตรวจพบสารเบตาเลนน้อยที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย  $1.61 \pm 0.02$  มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่าเริ่มต้น  $1.92 \pm 0.00$  มิลลิกรัมต่อลิตร จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าสารทั้งสามชนิดให้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมากนัก แต่กรดซิตริก 1 % มีความสามารถลดการเสื่อมสภาพของสารสกัดเบตาเลนได้น้อยที่สุด สอดคล้องกับ Herbach et al. (2006) ที่ทดลองสารลดการเสื่อมสภาพของสารสกัดเบตาเลน โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง กรดแอสคอบิก กรดไอโซแอสคอบิก และ กรดซิตริก พบว่าสารสกัดเบตาเลนที่เติมกรดแอสคอบิก มีประสิทธิภาพลดการเสื่อมสภาพได้ดีที่สุด รองลงมาคือ การเติมกรดไอโซแอสคอบิก และ การเติมกรดซิตริก มีประสิทธิภาพต่ำสุด การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบเบตาเลนเมื่อเติมสารป้องกันการเสื่อมสภาพทั้ง 3 ชนิดลงไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางส่วนดังนี้ การเติมแอสซิดิก ลงไปในเอทานอล จะกลายเป็นเอสเทอร์ ในรูปของ เอทิลเอทานอโนเอต (เอมิลอะซิเตต) และในปฏิกิริยาจะเกิดน้ำเพียง 1 โมเลกุลจากปฏิกิริยาดังกล่าว (ภาพที่ 4.1) สาเหตุที่เบตาเลนที่ผสมกรดแอสซิดิกความเข้มข้น 1 % เหลือมากที่สุดเป็นเพราะเบตาเลนเป็นสารประกอบอะโรมาติก ที่แบ่งออกได้หลายรูป อาทิเช่น แอมีน ฟีนอล คาร์บอกซิลิก ส่งผลทำให้โครงสร้างมีความเสถียรน้อย สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นได้โดยง่าย ทำให้คุณสมบัติเสื่อมไปบางส่วน ส่งผลให้อัตราการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไป และยิ่งในโครงสร้างของสารในชุดแอมีน (ภาพที่ 4.2) เมื่อสัมผัสกับน้ำและแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวทำละลาย

**ตารางที่ 4.1** การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบตาเลน(มิลลิกรัม/ลิตร)ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสในการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด

อายุ (วัน)	กรดแอสติค 1 %	บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1 %	กรดซิตริก 1 %
0	1.92±0.00 <sup>a</sup>	1.92±0.00 <sup>a</sup>	1.92±0.00 <sup>a</sup>
1 ชั่วโมง	1.84±0.00 <sup>b</sup>	1.82±0.00 <sup>b</sup>	1.77±0.00 <sup>a</sup>
14	1.79±0.00 <sup>b</sup>	1.73±0.01 <sup>b</sup>	1.66±0.02 <sup>a</sup>
21	1.72±0.00 <sup>b</sup>	1.71±0.15 <sup>b</sup>	1.65±0.01 <sup>a</sup>
28	1.77±0.01 <sup>b</sup>	1.71±0.01 <sup>a</sup>	1.67±0.02 <sup>a</sup>
35	1.74±0.01 <sup>c</sup>	1.66±0.01 <sup>b</sup>	1.61±0.00 <sup>a</sup>

\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05)



**ภาพที่ 4.1** การเปลี่ยนรูปของเอธานอลเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดแอสติค

ที่มา : กฤษณา ชุตินา (2538)

จึงถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย ซึ่ง primary amine เมื่อถูกออกซิไดซ์แล้วจะได้ secondary-amine และถูกออกซิไดส์ต่อไปเป็น hydroxylamine ดังภาพที่ 4.2




**ภาพที่ 4.2** การเปลี่ยนรูปของสารประกอบแอมีน เมื่อถูกไฮโดรไลซ์

ที่มา : โสภณ เริงสำราญ และคณะ (2542)

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างกรดซิตริก (ภาพที่ 4.3) จะพบโครงสร้างหมู่ OH<sup>-</sup> จำนวนมาก เมื่อเติมลงในสารอินทรีย์จะเกิดการแตกตัว และทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์เบตาเลนได้ นอกจากนี้ด้วยโครงสร้างที่มีอะตอมคาร์บอนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่มาก เนื้อสารที่จะทำปฏิกิริยากับฟรีเรดคิคอล (ไอออนลบที่แตกตัวอย่างอิสระ) มีน้อยกว่ากรดแอสติค ทำให้สารเบตาเลนในกรดซิตริก 1 % เหลือปริมาณเบตาเลนน้อยกว่าการเติมกรดแอสติค แต่บัฟเฟอร์ฟอสเฟต มีส่วนผสมของน้ำกลั่นเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการไฮโดรไลซ์เบตาเลน ส่งผลให้มีปริมาณเบตาเลนลดลง เช่นเดียวกับการเติมกรดซิตริก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้น การเติมกรดแอสติก 1 % ในภาพที่ 4.4 เป็นสารช่วยลดการเสื่อมสภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการเสื่อมสภาพของสารเบตาเลนเหมาะสมกว่า บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1 % และ กรดซิตริก 1% ในการทดลองผลของอุณหภูมิต่อการเสื่อมสภาพของเบตาเลนในหัวข้อถัดไป



ภาพที่ 4.3 โครงสร้างของกรดซิตริก

ที่มา : Anonymous (2008)



ภาพที่ 4.4 ผลของการเติมกรดแอสติก 1 %, สารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1% และ กรดซิตริก 1 ในสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.1.2 การทดลองย่อยที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลน

ชนิดสารป้องกันการเสื่อมสภาพที่ให้ผลดีที่สุด คือกรดแอสซิติค 1 % จากนั้นศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการป้องกันการเสื่อมสภาพของสารสกัดเบตาเลน ในอุณหภูมิ 3 ระดับ คือ -20, -10 และ 5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 70 วัน ให้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.2


ตารางที่ 4.2 ปริมาณสารเบตาเลนที่เติมกรดแอสซิติค 1 % เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน และระยะเวลาที่ต่างกัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

วัน	อุณหภูมิ (°C)			Mean ± SE
	-20°C	-10°C	5°C	
0	2.17±0.00	2.17±0.00	2.17±0.00	2.17±0.00 <sup>b</sup>
35	2.03±0.01	1.92±0.06	1.93±0.04	1.96±0.01 <sup>a</sup>
70	1.96±0.00	1.95±0.05	1.85±0.01	1.92±0.01 <sup>a</sup>
Mean ± SE	2.05±0.01 <sup>a</sup>	2.01±0.01 <sup>ab</sup>	1.98±0.01 <sup>b</sup>	

\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

การเก็บรักษาสารเบตาเลนที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลองอยู่ที่  $2.17 \pm 0.00$  มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อครบ 35 วันปริมาณสารเบตาเลนอยู่ที่  $2.03 \pm 0.01$  มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 70 วันมีค่า  $1.96 \pm 0.00$  มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในชุดเก็บรักษาสารเบตาเลนที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 35 วันปริมาณสารเบตาเลนอยู่ที่  $1.92 \pm 0.06$  มิลลิกรัมต่อลิตร และสิ้นสุดการทดลอง 70 วันมีค่า  $1.95 \pm 0.05$  ชุดการเก็บรักษาสารเบตาเลนที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 35 วันปริมาณสารเบตาเลนอยู่ที่  $1.93 \pm 0.01$  มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 70 วันมีค่า  $1.85 \pm 0.01$  มิลลิกรัมต่อลิตร จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่าระยะเวลาในการเก็บรักษา กับปริมาณเบตาเลนที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) เช่นเดียวกับอุณหภูมิที่เก็บรักษาทั้งสามระดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) เช่นกัน โดยที่ -20 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  $2.05 \pm 0.01$  รองลงมาคือ -10 องศาเซลเซียสมีค่า  $2.01 \pm 0.01$  และที่ 5 องศาเซลเซียสอยู่ที่  $1.98 \pm 0.01$  สอดคล้องกับ ดวงใจ พวงแก้ว (2548), Cai et al. (2005) และ Gandia-Herrero et al. (2005b) ที่รายงานว่าเบตาเลนมีอัตราเสื่อมสภาพน้อยลงเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ ถึงแม้ผลการทดลองที่อุณหภูมิ -20 ให้ผลดีที่สุด แต่ในการนำเบตาเลนไปใช้จริงของเกษตรกร อุณหภูมิดังกล่าวเกษตรกรไม่สามารถจัดเตรียมได้ ดังนั้น การเก็บรักษาเบตาเลนเพื่อลดการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส จะมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอุณหภูมิที่สามารถเก็บรักษาในตู้เย็นทั่วไป และให้ประสิทธิภาพในการลดการเสื่อมสภาพไม่

แตกต่างกันมากนักสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.5 ผลของการเติมกรดแอสซิติค 1% ในสารสกัดเบตาแคโรทีนจากเปลือกแก้วมังกร ที่อุณหภูมิ และระยะเวลาที่เก็บรักษาต่างกัน

#### 4.2 การทดลองที่ 2 ระดับของสารสกัดเบตาแคโรทีนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่เหมาะสมการเร่งสีผิวปลาหมอนกแก้ว

จากการศึกษาค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มสีของปลาหมอนกแก้ว ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเบตาแคโรทีนที่ระดับความเข้มข้น 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. โดยวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของสีผิวบริเวณลำตัวด้วยเครื่องวัดสี (Chromameter) ซึ่งอ่านค่าในระบบ CIE L\* a\* b\* ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกระทั่งครบ 12 สัปดาห์ โดยค่า L คือ ค่าความสว่างของค่าสี ค่า a\* คือ ค่าความเข้มของสีแดง และค่า b\* คือ ค่าความเข้มสีเหลือง

##### 4.2.1 ค่าความสว่าง (L) บริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว

ผลของค่าความสว่างของผิวหนังบริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว พบว่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้ว มีแนวโน้มลดลงจากสัปดาห์ที่ 2 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ภาพที่ 4.8) เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ ค่าความสว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาแคโรทีน 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 จนสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 4.3) ให้ผลดังนี้

ในสัปดาห์ที่ 2 ค่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้ว ในแต่ละชุดการทดลองพบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาแคโรทีน 50 มก./กก. มีค่าความสว่างน้อยที่สุด คือ  $38.70 \pm 0.89$

โดยมีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0, 20, 30 และ 40 มก./กก.


ในสัปดาห์ที่ 4 ค่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้ว ในปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก. มีค่าความสว่างน้อยที่สุด คือ  $40.29 \pm 1.39$  ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0, 20, 30 มก./กก. แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัด 40 มก./กก. ( $P > 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 6 และ 8 ค่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้ว ในปลาที่เลี้ยงด้วยที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก. มีค่าความสว่างน้อยที่สุด คือ  $44.12 \pm 1.86$  และ  $43.82 \pm 1.74$  ตามลำดับ ซึ่งไม่มีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 20, 30 และ 40 มก./กก. ยกเว้นชุดทดลองที่ให้อาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน ( $P < 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 10 ค่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้ว ในปลาที่เลี้ยงด้วยที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 50 มก./กก. มีค่าความสว่างน้อยที่สุด คือ  $38.80 \pm 1.52$  และให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 20, 30 และ 40 มก./กก. ยกเว้นชุดทดลองที่ให้อาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน ( $P < 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 12 ค่าความสว่างของผิวปลาหมอนกแก้วของปลาที่เลี้ยงด้วยที่ผสมสารสกัดเบตาเลน 40 มก./กก. มีค่าความสว่างน้อยที่สุด คือ  $41.28 \pm 3.02$  แทนที่ชุดความเข้มข้น 50 มก./กก. แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 20, 30 และ 50 มก./กก. ยกเว้นชุดทดลองที่ให้อาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน ( $P < 0.05$ )

หลังจากครบ 12 สัปดาห์ เลี้ยงปลาหมอนกแก้วในทุกชุดการทดลองด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความสว่างของผิวหนังปลาหมอนกแก้วไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) ระหว่างชุดทดลอง



ภาพที่ 4.6 ระดับค่าความสว่าง (L) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับสารเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)

การเปลี่ยนแปลงค่าความสว่าง (L) ของผิวหนังปลาหมอนกแก้ว หลังจากให้ปลากินอาหารผสมสารสกัดจากเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ภาพที่ 4.6) พบว่า ค่าความสว่างของผิวหนังปลาหมอนกแก้วที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน ปลาหมอนกแก้วกินอาหารผสมสารเบตาเลนจะทำให้ให้สีผิวของปลาจะมีสีเข้มขึ้น ส่งผลให้ค่าความสว่าง (L) ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่กินอาหารผสมที่ให้ปริมาณเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก จะพบการลดลงของค่าความสว่าง (L) ได้อย่างชัดเจน และเมื่องดให้อาหารผสมสารเบตาเลนสีผิวของปลาจะปรับตัวให้สว่างขึ้นใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลอง เช่นเดียวกับธนากร แก้วละเอียด (2551) ที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร แก่ปลาหมอมาลาวิทอง (*Aulonacara* sp.) ในความเข้มข้น 0, 20, 40 และ 60% (เปลือกแก้วมังกร ต่อ ปริมาณเอธานอล) พบว่าระดับค่าความสว่างบนสีผิวของปลาหมอมาลาวิทอง เริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับอาหารผสมเบตาเลนในสัปดาห์ที่ 2 และแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลนที่นานขึ้น เมื่อครบ 10 สัปดาห์ พบว่าชุดการทดลองที่ไม่ได้รับอาหารผสมเบตาเลนให้ค่าความสว่างมากที่สุดคือ  $79.47 \pm 0.60$  ปลาที่ได้รับเบตาเลน 20, 40, และ 60 % ตามลำดับซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ระหว่างชุดการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความสว่าง (L) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารเบตาเลน

ระยะเวลา (สัปดาห์)	ชุดการทดลอง				
	T1	T2	T3	T4	T5
0	54.69±0.96 <sup>a</sup>	54.69±0.96 <sup>a</sup>	54.69±0.96 <sup>a</sup>	54.69±0.96 <sup>a</sup>	54.69±0.96 <sup>a</sup>
2	64.73±1.79 <sup>d</sup>	54.41±3.21 <sup>c</sup>	48.14±2.20 <sup>b</sup>	46.17±1.71 <sup>b</sup>	38.70±0.89 <sup>a</sup>
4	64.08±2.72 <sup>c</sup>	49.9±2.89 <sup>b</sup>	50.50±1.99 <sup>b</sup>	42.97±1.68 <sup>a</sup>	40.29±1.39 <sup>a</sup>
6	66.20±1.85 <sup>c</sup>	45.63±1.67 <sup>a</sup>	47.73±2.03 <sup>a</sup>	52.74±2.21 <sup>a</sup>	44.12±1.86 <sup>a</sup>
8	62.44±2.49 <sup>b</sup>	45.55±1.84 <sup>a</sup>	48.64±2.48 <sup>a</sup>	49.52±2.25 <sup>a</sup>	43.82±1.74 <sup>a</sup>
10	66.54±1.31 <sup>c</sup>	47.58±2.48 <sup>b</sup>	41.00±1.58 <sup>a</sup>	42.60±1.93 <sup>ab</sup>	38.80±1.52 <sup>a</sup>
12	66.57±2.70 <sup>b</sup>	36.00±0.59 <sup>a</sup>	38.94±1.28 <sup>a</sup>	41.28±3.02 <sup>a</sup>	41.92±1.89 <sup>a</sup>
*หลังทดลอง	58.51±1.16 <sup>a</sup>	57.03±1.67 <sup>a</sup>	53.33±1.68 <sup>a</sup>	54.57±2.24 <sup>a</sup>	54.21±0.40 <sup>a</sup>

\* หมายถึง เมื่อครบ 12 สัปดาห์เลี้ยงต่อด้วยอาหารเม็ดไม่ผสมสารเบตาเลน ต่อไปอีก 4 สัปดาห์

\*\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

และยังสอดคล้องกับ ไชยวัฒน์ ดั่งสูง (2550) ที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลนกับปลากุหลาบแดง ซึ่งค่าความสว่างจะมีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 % มีค่าความสว่าง  $52.56 \pm 0.54$ ,  $46.31 \pm 0.84$ ,  $45.62 \pm 0.60$ ,  $43.18 \pm 0.90$ ,  $39.46 \pm 1.05$  และ  $40.02 \pm 0.73$  ตามลำดับ ซึ่งให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับทุกชุดการทดลอง

#### 4.2.2 ค่าความเข้มสีแดง (a) บริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว

ผลของค่าความเข้มสีแดง (a) ของผิวหนังบริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว พบว่าความเข้มสีแดงของผิวปลาหมอนกแก้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 2 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ ค่าความเข้มสีแดงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 จนถึงสิ้นสุดการทดลอง ที่ความเข้มข้น 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. ดังนี้

ในสัปดาห์ที่ 2 ค่าค่าความเข้มของสีแดง พบว่าปลาหมอนกแก้วที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก. มีความเข้มของสีแดงมากที่สุด คือ  $12.79 \pm 0.46$  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0, 20, 30 และ 40 มก./กก.

ในสัปดาห์ที่ 4 ค่าความเข้มของสีแดง ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก. (ชุดการทดลองที่ 5) มีความเข้มของสีแดงมากที่สุด คือ  $16.17 \pm 0.56$  แตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0, 20, 30 ยกเว้นปลาที่เลี้ยงด้วยที่มีอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 มก./กก.(ชุดการทดลองที่ 4) ที่มีผลไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง

ในสัปดาห์ที่ 6 และ 8 ค่าความเข้มของสีแดงของผิวปลาหมอนกแก้วที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีแดงมากที่สุด คือ  $15.20 \pm 0.68$  และ  $14.54 \pm 0.85$  ตามลำดับ ซึ่งค่าความเข้มสีแดงทั้งสองนั้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 0, 20, 30 และ 40 มก./กก.

ในสัปดาห์ที่ 10 ค่าความเข้มของสีแดงของผิวปลาหมอนกแก้ว ในชุดการทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีแดงมากที่สุด คือ  $13.32 \pm 0.55$  และให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 30 และ 40 มก./กก.ยกเว้นชุดทดลองที่ผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 0 และ 20 มก./กก.ที่แตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 12 ค่าความเข้มของสีแดงของผิวปลาหมอนกแก้ว ในชุดการทดลองที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มข้น 50 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีแดงมากที่สุด คือ  $14.93 \pm 1.14$  ใกล้เคียงกับชุดความเข้มข้น 40 % ( $14.81 \pm 1.81$ ) แต่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับชุดทดลองที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความ 30 และ 40 มก./กก.แต่ให้ผลแตกต่างทางสถิติกับชุดทดลอง 0 และ 20 มก./กก.


หลังจาก 12 สัปดาห์ เลี้ยงปลาหมอนกแก้วในทุกชุดการทดลองด้วยอาหารไม่ผสมสารเบตาเลน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มของสีแดงในปลาหมอนกแก้วที่เคยให้อาหารผสมเบตาเลน 40 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีแดงของผิวหนังปลาหมอนกแก้ว มากที่สุด คือ  $6.38 \pm 1.6$  รองลงมาคือปลาที่เคยให้อาหารผสมเบตาเลน 50 มก./กก.คือ  $6.02 \pm 0.35$  ที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในชุดทดลองอื่นๆล้วนแต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

การเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสีแดง (a) ของผิวหนังปลาหมอนกแก้ว หลังจากให้ปลากินอาหารผสมสารสกัดจากเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ภาพที่ 4.7) พบว่า ค่าความเข้มสีแดงของผิวหนังปลาหมอนกแก้วที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน ปลาหมอนกแก้วกินอาหารผสมสารเบตาเลนจะทำให้สีผิวของปลาจะมีสีเข้มขึ้น ส่งผลให้ค่าความเข้มสีแดงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่กินอาหารผสมที่ให้มีปริมาณเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก จะพบการเพิ่มขึ้นของค่าความเข้มสีแดง (a) ได้อย่างชัดเจน และเมื่อเปลี่ยนอาหารเป็นไม่ผสมสารเบตาเลน พบว่าสีผิวของปลาจะปรับตัวให้สว่างขึ้นใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลอง

ปลาหมอนกแก้วที่ให้อาหารผสมเบตาเลนในอาหาร 40 และ 50 มก./กก.เริ่มพบการแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) กับชุดการทดลองอื่นๆตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป และในสัปดาห์ที่ 12 ปลาที่ได้รับเบตาเลน 50 มก./กก. ปลาจะมีค่าความเข้มของสีแดงสูงที่สุดของทุกชุดการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ได้สุ่มปลาขึ้นวัดการเปลี่ยนแปลงสีผิว พบว่าค่าความเข้มของสีแดง (a) ของชุดทดลองที่ให้อาหารผสมเบตาเลนในอาหาร 40 และ 50 มก./กก.ยังคงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) กับชุดการทดลองอื่นๆ และสามารถมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า สอดคล้องกับ ธนากร แก้วละเอียด (2551) ที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร แก่ปลาหมอนมาลาวิทอง (*Aulonacara* sp.) ในความเข้มข้น 0, 20, 40 และ 60% (เปลือกแก้วมังกร ต่อ ปริมาณเอทานอล) พบการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มสีแดง หลังจากได้รับอาหารผสมเบตาเลนในสัปดาห์ที่ 2 และแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลนที่นานขึ้น เมื่อครบ 10 สัปดาห์ ชุดที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลน 0, 20, 40 และ 60 % มีค่าความเข้มสีแดงเท่ากับ  $1.92\pm 0.2$ ,  $4.00\pm 0.19$ ,  $5.13\pm 0.2$ ,  $6.18\pm 0.3$ ,  $6.66\pm 0.27$  และ  $6.95\pm 0.29$  ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) เช่นเดียวกับ ไชยวัฒน์ ด้วงสุก (2550) ที่ศึกษาผลของสารเบตาเลนต่อสีผิวปลาหมอน้ำลายเผือกว่า พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) ของค่าความเข้มของสีแดงในชุดการทดลองที่ 5 เมื่อให้อาหารผสมเบตาเลน 50 % ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยพบความแตกต่างในสัปดาห์ที่ 6 – 8 ส่วนในปลากุหลาบแดง จะเริ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) ของค่าความเข้มของสีแดงในสัปดาห์ที่ 2 นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ 6 ชุดที่ให้อาหารผสมเบตาเลน 40 และ 50 % จะให้ค่าความเข้มของสีแดงสูงสุดมากกว่าชุดอื่นๆ จนสิ้นสุดการทดลอง ( $24.76\pm 0.89$  และ  $26.03\pm 1.14$ ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) กับชุดควบคุม (0%) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Phumjan and Laohavisuti (2007) ได้ให้อาหารที่ผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรแก่ปลา platy (*Xiphophorus maculatus*) ที่ระดับ 0, 15, 22.5, 30 และ 37.5 มก./กก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ปลา platy ที่ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร 37.5 มก./กก. มีค่ามุมของสี (HUE) สูงสุด คือ  $63.09\pm 0.92$  ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ ( $P<0.05$ ) กับปลาที่ให้อาหารที่ผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร 0, 15, 22.5 และ 30 มก./กก.

ปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารเบตาเลน จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ สีผิวของปลาจะมีสีแดง (a) เข้มขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณสารเบตาเลนที่ได้รับ สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดการทดลองที่ให้ปริมาณเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก.ทำให้ปลาหมอนกแก้วมีการเปลี่ยนสีไปในโทนสีแดงมากที่สุด ขณะเดียวกันค่าความสว่าง (L) จะลดลงได้อย่างชัดเจน เมื่อสีผิวมีค่าสีแดงเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการทดลองของชุดการทดลองที่ไม่เติมเบตาเลนลงในอาหาร พบว่า สีผิวปลามีค่าความสว่าง (L) สูงที่สุด ขณะเดียวกันสีผิวจะมีค่าความเข้มสีแดงต่ำสุด ดังภาพที่

4.6 และ 4.7



ภาพที่ 4.7 ระดับค่าความเข้มของสีแดง (a) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับสารเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)

ตารางที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าสีแดง (a) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารเบตาเลน

ระยะเวลา (สัปดาห์)	ชุดการทดลอง				
	T1	T2	T3	T4	T5
0	-0.82±0.17 <sup>a</sup>	-0.82±0.17 <sup>a</sup>	-0.82±0.17 <sup>a</sup>	-0.82±0.17 <sup>a</sup>	-0.82±0.17 <sup>a</sup>
2	3.34±0.91 <sup>a</sup>	7.68±1.52 <sup>b</sup>	9.61±0.86 <sup>bc</sup>	11.59±0.74 <sup>cd</sup>	12.79±0.46 <sup>d</sup>
4	2.43±1.28 <sup>a</sup>	10.19±1.42 <sup>b</sup>	10.34±0.93 <sup>b</sup>	13.16±1.01 <sup>bc</sup>	16.17±0.56 <sup>c</sup>
6	1.34±0.77 <sup>a</sup>	11.64±0.83 <sup>b</sup>	12.52±0.72 <sup>b</sup>	11.10±0.46 <sup>b</sup>	15.20±0.68 <sup>c</sup>
8	2.77±1.11 <sup>a</sup>	12.04±1.11 <sup>a</sup>	12.37±0.99 <sup>b</sup>	12.21±0.61 <sup>b</sup>	14.54±0.85 <sup>c</sup>
10	-0.63±0.51 <sup>a</sup>	10.11±0.93 <sup>b</sup>	12.42±0.67 <sup>bc</sup>	11.98±0.66 <sup>bc</sup>	13.32±0.55 <sup>c</sup>
12	-0.73±0.51 <sup>a</sup>	10.04±0.79 <sup>b</sup>	11.86±1.30 <sup>bc</sup>	14.81±1.81 <sup>c</sup>	14.93±1.14 <sup>c</sup>
*หลังทดลอง	-1.28±0.47 <sup>a</sup>	-0.34±0.21 <sup>a</sup>	-2.15±0.38 <sup>a</sup>	6.38±1.6 <sup>b</sup>	6.02±0.35 <sup>b</sup>

\* หมายถึง เมื่อครบ 12 สัปดาห์เลี้ยงต่อด้วยอาหารเม็ดไม่ผสมสารเบตาเลน ต่อไปอีก 4 สัปดาห์

\*\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าความสว่างและค่าความเข้มสีแดงของปลาหมอนกแก้ว เมื่อได้รับสารเบตาเลนนั้นเป็นส่วนผกผันกัน และปลาหมอนกแก้วสามารถสะสมสารเบตาเลนนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลนไว้ในร่างกายได้ เพราะค่าความเข้มสีแดงเพิ่มขึ้นตามปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารเบตาเลน และ แต่เมื่อเปลี่ยนอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเบตาเลน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสีผิวของปลาหมอนกแก้วมีค่าความเข้มสีแดงลดลง เนื่องจากเบตาเลนมีความเสถียรต่ำ สามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาวะไม่เหมาะสม

#### 4.2.3 ค่าความเข้มสีเหลือง (b) บริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว

ผลของค่าความเข้มสีเหลือง (b) ของผิวหนังบริเวณลำตัวของปลาหมอนกแก้ว พบว่าความเข้มสีเหลืองของผิวปลาหมอนกแก้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวเดียวกันตลอดการทดลอง เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จนถึงสิ้นสุดการทดลอง ดังนี้

ในสัปดาห์ที่ 2 ค่าความเข้มของสีเหลือง ในแต่ละชุดการทดลองยังไม่มี ความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด

ในสัปดาห์ที่ 4 ค่าความเข้มของสีเหลือง ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก.มีความเข้มของสีเหลืองมากที่สุด คือ  $14.99 \pm 1.22$  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0 และ 40 ยกเว้นปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 20, 30 และ 50 มก./กก.ที่ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง ( $P > 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 6 ค่าความเข้มของสีเหลืองของผิวปลาหมอนกแก้ว ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีเหลืองมากที่สุด คือ  $15.24 \pm 1.22$  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 0 และ 20 มก./กก.

ในสัปดาห์ที่ 8 ค่าความเข้มของสีเหลืองของผิวปลาหมอนกแก้ว ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 30 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีเหลืองมากที่สุด คือ  $14.43 \pm 0.98$  และทุกชุดการทดลอง (20, 40 และ 50 มก./กก.) ยังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน


ในสัปดาห์ที่ 10 ค่าความเข้มของสีเหลืองของผิวปลาหมอนกแก้ว ในปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน ความเข้มขึ้น 30 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีเหลืองมากที่สุด คือ  $11.78 \pm 0.90$  และให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 20, 40 และ 50 มก./กก.ยกเว้นปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลนที่ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ( $P < 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 12 ค่าความเข้มของสีเหลืองของผิวปลาหมอนกแก้ว ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 มก./กก.มีค่าความเข้มของสีเหลืองมากที่สุด คือ  $12.18 \pm 0.23$  แต่ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) กับชุดทดลองให้อาหารผสมเบตาเลนที่ความ

เข้มข้น 20, 30 และ 50 มก./กก.แต่ให้ผลแตกต่างทางสถิติกับชุดทดลอง 0 และ 20 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

หลังจาก 12 สัปดาห์ เลี้ยงปลาหมอนกแก้วในทุกชุดการทดลองด้วยอาหารไม่ผสมสารเบตาเลน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มข้นของสีเหลืองของผิวหนังปลาหมอนกแก้วในชุดทดลองที่เคยให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 40 มก./กก.มีค่าความเข้มข้นของสีเหลืองมากที่สุดคือ  $6.38 \pm 1.6$  รองลงมาคือชุดทดลองที่เคยให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มก./กก.คือ  $6.02 \pm 0.35$  ที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในชุดทดลองอื่นๆล้วนแต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมองภาพโดยรวมของผลการศึกษากการเปลี่ยนสีผิวของปลาหมอนกแก้วหลังจากได้อาหารผสมสารเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นสีเหลือง (b) ของผิวหนังปลาหมอนกแก้ว หลังจากให้ปลากินอาหารผสมสารสกัดจากเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ภาพที่ 4.10) พบว่า ค่าความเข้มข้นสีเหลืองของผิวหนังปลาหมอนกแก้วที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน โดยแตกต่างกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ปลาหมอนกแก้วกินอาหารผสมสารเบตาเลนจะทำให้สีผิวของปลาจะมีสีเหลืองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่กินอาหารผสมที่ให้ปริมาณเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก.



ภาพที่ 4.8 ระดับค่าความเข้มข้นของสีเหลือง (b) ของสีผิวปลาเมื่อได้รับเบตาเลนเข้มข้นแตกต่างกัน (0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สอดคล้องกับ ฆนากร แก้วละเอียด (2551) ที่ให้อาหารผสมสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร แก่ปลาหมอมอลาวิทง (*Aulonacara* sp.) ในความเข้มข้น 0, 20, 40 และ 60% (เปลือกแก้วมังกร ต่อ ปริมาณเอธานอล) พบการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มสีเหลืองหลังจากได้รับอาหารผสมเบตาเลนในสัปดาห์ที่ 2 และแตกต่างกันมากขึ้น ตามระยะเวลาที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลนที่นานขึ้น เมื่อครบ 10 สัปดาห์ ชุดที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลน 0, 20, 40 และ 60 % มีค่าความเข้มสีเหลืองเท่ากับ  $6.06 \pm 0.41$ ,  $3.27 \pm 1.01$ ,  $2.76 \pm 1.08$ ,  $3.55 \pm 0.65$ ,  $3.86 \pm 0.39$  และ  $4.32 \pm 0.35$  ตามลำดับ ซึ่งชุดการทดลองที่ได้รับเบตาเลน 0 กับ 20% แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดการทดลองที่ได้รับเบตาเลน 40 และ 60 % เช่นเดียวกับ ไชยวัฒน์ ดั่งสูง (2550) ที่ศึกษาผลของสารเบตาเลนต่อสีผิวปลาหมอม้าลายเผือก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) ของค่าความเข้มของสีเหลือง ในทุกชุดการทดลอง ตลอดการเลี้ยง 8 สัปดาห์ ส่วนในปลากุหลาบแดงจะเริ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ของค่าความเข้มของสีเหลืองในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป และในสัปดาห์ที่ 6 ชุดที่ให้อาหารผสมเบตาเลน 40 และ 50 % จะมีความเข้มของสีเหลืองน้อยกว่าชุดอื่นๆ จนถึงชุดการทดลอง ( $21.25 \pm 0.15$  และ  $15.74 \pm 1.61$ ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) กับชุดควบคุม (0 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) ( $25.56 \pm 0.49$ )

ตารางที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงของระดับค่าสีเหลือง (b) ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารเบตาเลน

ระยะเวลา (สัปดาห์)	ชุดการทดลอง				
	T1	T2	T3	T4	T5
0	$6.87 \pm 3.05^a$	$6.87 \pm 3.05^a$	$6.87 \pm 3.05^a$	$6.87 \pm 3.05^a$	$6.87 \pm 3.05^a$
2	$11.48 \pm 0.91^{ab}$	$13.00 \pm 0.84^b$	$11.07 \pm 1.77^{ab}$	$12.02 \pm 1.04^{ab}$	$9.67 \pm 0.86^a$
4	$11.69 \pm 1.01^a$	$13.16 \pm 0.70^{ab}$	$13.68 \pm 0.99^{ab}$	$11.19 \pm 1.34^a$	$14.99 \pm 1.22^b$
6	$10.83 \pm 1.23^a$	$11.20 \pm 0.91^a$	$14.65 \pm 1.32^b$	$15.24 \pm 1.22^b$	$14.46 \pm 0.99^b$
8	$8.00 \pm 1.13^a$	$11.73 \pm 0.98^b$	$14.43 \pm 0.98^b$	$12.70 \pm 1.17^b$	$13.20 \pm 1.16^b$
10	$8.84 \pm 1.05^a$	$11.32 \pm 1.17^b$	$11.78 \pm 0.90^b$	$10.82 \pm 0.76^b$	$11.02 \pm 1.33^b$
12	$6.69 \pm 0.577^a$	$10.58 \pm 0.48^b$	$11.47 \pm 0.51^b$	$12.18 \pm 0.23^b$	$10.42 \pm 0.99^b$
*หลังทดลอง	$17.91 \pm 1.92^a$	$14.73 \pm 4.30^a$	$16.60 \pm 1.90^a$	$17.02 \pm 1.41^a$	$20.83 \pm 2.38^a$


\* หมายถึง เมื่อครบ 12 สัปดาห์เลี้ยงต่อด้วยอาหารเม็ดไม่ผสมสารเบตาเลน ต่อไปอีก 4 สัปดาห์

\*\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

ผลจากการให้สารเบตาเลนต่อปลาหมอนกแก้วจะเห็นได้ว่าปลาหมอนกแก้วที่ได้รับเบตาเลนนั้นมีสีที่เข้มขึ้น โดยดูได้จากค่าความสว่างที่ลดลงในชุดที่ได้รับเบตาเลนเทียบกับชุดควบคุม โดยมีค่าสอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดง และค่าความเข้มสีเหลืองของปลาหมอนกแก้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จากภาพที่ 4.10 ปริมาณค่าความเข้มสีเหลือง (b) ของทุกชุดการทดลอง ทั้งที่ได้และไม่ได้รับสารเบตาเลน จะมีการเพิ่มและลดในทิศทางเดียวกันตลอดการทดลอง อาจเป็นได้ว่าเบตาเลนไม่ส่งผลต่อสีผิวใน โทนสีเหลืองเท่ากับ โทนสีแดงที่แสดงผลได้เด่นชัดกว่า และเมื่อหยุดให้อาหารที่ผสมเบตาเลนเปลี่ยนมาใช้อาหารที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์จะพบการเพิ่มขึ้นของค่าสีเหลืองในทุกชุดการทดลอง และมีค่าความเข้มสีเหลืองมากกว่าก่อนเริ่มการทดลองนั้น อาจเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์ เพราะในทุกชุดการทดลองจะเติมเอธานอล 80% ลงไปในอาหารทุกชุดการทดลอง แต่ในการทดลองภายหลังครบ 12 สัปดาห์ไม่ได้เติมเอธานอล 80% ลงไปส่งผลให้ค่าสีเหลืองจึงปรากฏเพิ่มขึ้นในทุกชุดการทดลอง(ภาพที่ 4.10)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.9 การเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารสกัดเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในอัตรา (A) 0 มก./กก., (B) 20 มก./กก., (C) 30 มก./กก., (D) 40 มก./กก. และ (E) 50 มก./กก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**ภาพที่ 4.10** การเปลี่ยนแปลงสีผิวของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารสกัดเบตาเลนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ และหยุดให้เบตาเลนเลี้ยงต่อ 4 สัปดาห์ด้วยอาหารไม่ผสมเบตาเลน ในอัตรา (A) 0 มก./กก., (B) 20 มก./กก., (C) 30 มก./กก., (D) 40 มก./กก. และ (E) 50 มก./กก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2.4 ผลของสารสกัดเบตาเลนต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอนกแก้ว

จากการทดลองศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดเบตาเลนต่ออัตราการรอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก และอัตราเจริญเติบโต ของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับสารสกัดเบตาเลนที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก.เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

##### 4.2.4.1 อัตราการรอด (survival rate) ของปลาหมอนกแก้ว

ปริมาณสารสกัดเบตาเลนที่ผสมลงในอาหารไม่ส่งผลต่ออัตราการรอดของปลาหมอนกแก้วอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P>0.05$ ) โดยอัตราการรอดของปลาหมอนกแก้วที่ได้รับสารสกัดเบตาเลน ที่ 0, 20, 30, 40 และ 50 มก./กก. มีอัตราการรอดเท่ากับ  $83.33\pm 0.67$ ,  $83.33\pm 0.88$ ,  $62.50 \pm 1.15$ ,  $58.33\pm 0.67$  และ  $83.33\pm 0.67$  (ตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 การเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาหมอนกแก้วเมื่อได้รับอาหารผสมสารเบตาเลนที่สกัดจากเปลือกแก้วมังกร

อาหารผสมเบตาเลน (%)	น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม/ตัว)	น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม/ตัว)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (กรัม/ตัว)	อัตราการรอด (%)
0	$6.70\pm 0.68^a$	$23.60\pm 6.10^{ab}$	$13.23\pm 1.25^{ab}$	$83.33\pm 0.67^a$
20	$7.47\pm 0.54^a$	$20.49\pm 5.58^a$	$8.11\pm 1.18^a$	$83.33\pm 0.88^a$
30	$7.72\pm 0.55^a$	$22.85\pm 7.12^{ab}$	$11.67\pm 2.68^{ab}$	$62.50\pm 1.15^a$
40	$8.59\pm 0.49^a$	$27.28\pm 5.79^b$	$18.16\pm 7.23^b$	$58.33\pm 0.67^a$
50	$7.92\pm 0.66^a$	$26.86\pm 7.17^{ab}$	$11.70\pm 4.34^{ab}$	$83.33\pm 0.67^a$

\* ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P< 0.05$ )

##### 4.2.4.2 การเจริญเติบโต (growth rate) ของปลาหมอนกแก้ว

เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาหมอนกแก้วมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 23.60, 20.49, 22.85, 27.28 และ 26.86 ตามลำดับ ซึ่งปริมาณสารสกัดเบตาเลนที่ผสมในอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอนกแก้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 มก. /กก. มีการเจริญเติบโตดีที่สุด แต่อาจด้วยอัตราการที่น้อย และมีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆอยู่บ้าง เมื่อมีจำนวนน้อยลงอาจส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดีกว่าชุดอื่นๆ และอัตราการรอดของปลานั้นพบว่าสารสกัดเบตาเลนไม่ส่งผลต่อปลาหมอนกแก้วแต่อย่างใด เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ทำให้มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ( $P<0.05$ ) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการทดลองก่อนหน้านี้ที่พบว่าปลาที่กินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลนไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา อาทิ เช่น ปลาหมอมาลาวิทอง (ธนากร แก้วละเหียด. 2551) ปลา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Platy (Phumjan and Laohavisuti. 2007) ปลาอุทลอบแดง และปลาหมอม้าลายเผือก (ไชยวัฒน์ ด้วง สุก. 2550) และการทดลองใช้สารสีกลุ่มแอสตาแซนทินที่ผสมลงในอาหารเลี้ยงปลาก็ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาเช่นกัน ได้แก่ ปลาเรนโบว์เทร้า (Sommer *et al.* 1991; Amar *et al.* 2004) ปลาทอง (Paripatananont *et al.* 1999) ปลานิลแดง (ชลธิชา โขติพิทธิพงษ์. 2541) ปลากระแห (คาราวรรณ ยุทธยงค์ และคณะ. 2546) ปลากระพงแดง (พิชญา ชัยนาค และคณะ. 2546)

#### 4.2.5 ผลของสารสกัดเบตาเลนจากแก้วมังกรต่อเนื้อเยื่อของปลาหมอนกแก้ว

เมื่อสิ้นสุดการทดลองการศึกษาผลของสารสกัดเบตาเลนต่อสีผิวปลาหมอนกแก้ว สุ่มตัวอย่างปลาทุกตู้ ตู้ละ 6 ตัว แบ่งมาศึกษาโดยการนำเกล็ดบริเวณกึ่งกลางตัวปลาบริเวณ เส้นข้าง ตัวออกมาดูการสะสมรงควัตถุได้เกล็ดจำนวน 3 ตัว และ แบ่งมาทำสไลด์ถาวร จำนวน 3 ตัว เพื่อตรวจเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนังที่มีผลจากการให้ปลากินอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน พบว่าผิวหนังของปลาหมอนกแก้วประกอบด้วยชั้นต่างๆ ได้แก่ epidermis, dermis ในชั้น dermis พบเกล็ดแทรกอยู่ในชั้นนี้ และเกล็ดปลาหมอนกแก้วเป็นแบบ ctenoid (ภาพที่ 4.12 และ 4.13) คือ โคนเกล็ดแทรกอยู่ในชั้น dermis และขอบเกล็ดจะเป็นหนามเล็กๆ แทรกอยู่ในชั้น dermis และโผล่ยื่นส่วนปลายเกล็ดเข้าไปในชั้น epidermis เช่นเดียวกับปลาที่มีเกล็ดชนิดอื่นๆ (ภาพที่ 4.14 และ ภาพที่ 4.15) ในส่วนของการนำเกล็ดมาดูการสะสมรงควัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดกำลังขยายต่ำ พบว่าเกล็ดของปลาหมอนกแก้วมีรงควัตถุสีเหลืองแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อระหว่างเกล็ด (ภาพที่ 4.16) ซึ่งปริมาณรงควัตถุในปลาหมอนกแก้ว จะกระจายตัวไม่แน่นอน บางส่วนมีปริมาณน้อยหรือไม่พบ และ บางส่วนพบปริมาณรงควัตถุหนาแน่น ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าส่วนใดพบรงควัตถุได้มากที่สุด ส่วนเกล็ดในภาพตัดขวางไม่พบเซลล์รงควัตถุแต่อย่างใด อาจจะเนื่องจากการทำสไลด์ถาวรต้องผ่านกระบวนการ dehydration โดยใช้แอลกอฮอล์ ทำให้รงควัตถุดังกล่าวนี้ละลายในแอลกอฮอล์ได้ (ภาพที่ 4.17) จากการสะสมรงควัตถุบนเกล็ดพบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเบตาเลน 50 มก./กก. พบรงควัตถุสีเข้มกระจายมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมสารเบตาเลน (ภาพที่ 4.18) แต่ไม่สามารถนับจำนวนรงควัตถุได้ ซึ่งแตกต่างจาก Paripatananont *et al.* (1999) ได้ให้อาหารผสมแอสตาแซนทินแก่ปลาทองความเข้มข้น 0, 25, 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมและได้ตัดเนื้อเยื่อตามขวางของปลาทองบริเวณเส้นข้างลำตัวพบ melanophore แทรกอยู่ในชั้น dermis เมื่อเลี้ยงไป 4 สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ให้แอสตาแซนทิน 100 มก./กก.จะพบ chromatophore ในปริมาณมากที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มทดลองอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ทั้งนี้เพราะปลาทองเป็นปลาที่มีการทำงานของเซลล์รงควัตถุที่เป็นปกติ แต่ปลาหมอนกแก้วชนิดนี้พบว่าการทำงานของเซลล์สร้างเมลานินลดการทำงานลง และในที่สุดจะหยุดการทำงาน ในช่วงอายุประมาณ 4-6 เดือนทำให้ปลาเปลี่ยนสีจากดำ-เทา เป็นสีขาวและเหลือง และไม่พบการสร้างเมลานินเพิ่มเติมได้แต่อย่างใด แต่พบการสะสมของรงควัตถุสีเหลืองที่บริเวณเกล็ดตามปริมาณความเข้มข้นของสารเบตาเลนที่ได้รับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.11 เกล็ดแบบ ctenoid ในปลาหมอนอกแก้ว ( formalin 10 % ; x10)




ภาพที่ 4.12 รังควัตถุสีเหลือง (P) ที่พบในปลาที่ได้อาหารไม่ผสมเบตาเลน (formalin 10 % ; x10)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.13 เกล็ดที่ซ้อนทับกัน (Sc) บนชั้น epidermis ที่ปกคลุมไปด้วย squamous epithelium (S) บริเวณใกล้เคียงพบ goblet cells หรือ mucous cells (G) (formalin 10 % ; H&E ; x40) (จุดที่ไม่ให้อาหารผสมเบตาเลน)




ภาพที่ 4.14 ชั้น epidermis (E) ที่คลุมเกล็ดทั้งด้านบนและล่างของเกล็ด (Sc) และชั้น dermis (D) ที่เป็นต้นกำเนิดของเกล็ด (formalin 10 % ; H&E ; x40) (จุดที่ไม่ให้อาหารผสมสารเบตาเลน)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.15 เกล็ดที่มีรงควัตถุติดอยู่ (P) (formalin 10 % ; x 10) (ชุดที่ให้อาหารผสมสารเบตาเลน ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม)



ภาพที่ 4.16 เกล็ด (Sc) ที่มีชั้น epidermis (Ep) ปกคลุม (กลุ่มทดลองที่ 5) (formalin 10 % ; H&E ; x 40) (ชุดที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.17 เปรียบเทียบเกล็ดของปลาหมอนกแก้ว (A) กลุ่มที่ไม่ให้สารสกัดเบตาเลน กับ (B) กลุ่มที่ให้อาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 50 มก./กก.พบรังควัตถุ (P) (formalin 10 % x 10)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันการเสื่อมสภาพ 3 ชนิด ได้แก่ กรดแอสซิติค 1 % บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1 % และ กรดซิตริก 1 % พบว่า การใช้กรดแอสซิติค 1 % ทำให้สารสกัดเบตาเลนเสื่อมสภาพน้อยที่สุด รองลงมาคือ บัฟเฟอร์ฟอสเฟต 1 % และกรดซิตริก 1 % ตามลำดับ ส่วนผลของอุณหภูมิเก็บรักษา ที่ -20, -10 และ 5 องศาเซลเซียส ร่วมกับระยะเวลาที่ทำการเก็บรักษาที่ 0, 35 และ 70 วัน ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาส่งผลต่อปริมาณเบตาเลนที่เก็บรักษาซึ่งแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) โดยระดับอุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียสจะเก็บรักษาสารสกัดเบตาเลนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ -10 และ 5 องศาเซลเซียสตามลำดับ

การศึกษาการเร่งพัฒนาสีผิวในปลาหมอนกแก้วด้วยสารสกัดเบตาเลน พบว่าปลาหมอนกแก้วมีการพัฒนาสีผิวหลังได้รับอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน โดยเฉพาะค่าความเข้มสีแดง (a) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ในกลุ่มความเข้มข้น 50 มก./กก. และให้ค่าสีแดง (a) สูงที่สุด เมื่อครบ 12 สัปดาห์เลี้ยงปลาหมอนกแก้วด้วยอาหารไม่ผสมสารสกัดเบตาเลน เลี้ยงต่อเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าสีแดงของปลาในชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 40 และ 50 มก./กก. ยังคงมีค่าความเข้มสีแดงสูงที่สุด เช่นเดียวกับค่าความสว่าง (L) ที่ในกลุ่ม 40 และ 50 มก./กก. มีปริมาณต่ำที่สุดในทุกการทดลอง แสดงให้เห็นว่าปลาหมอนกแก้วมีการพัฒนาสีผิวให้เข้มขึ้นออกไปทางโทนสีแดงเป็นหลัก ส่วนค่าความเข้มสีเหลือง (b) ของปลาหมอนกแก้วที่วัดได้หลังสิ้นสุดการทดลองคือกลุ่มที่ให้อาหารผสมเบตาเลน 40 มก./กก. จะให้ค่าความเข้มสีเหลืองมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ให้อาหารผสมเบตาเลน 50 มก./กก. เช่นเดียวกับเมื่อเปลี่ยนเป็นอาหารไม่ผสมเบตาเลน ค่าความเข้มสีเหลืองของปลาหมอนกแก้วทั้งสองกลุ่มข้างต้นยังคงมีมากกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ อาจกล่าวโดยสรุปการทดลองนี้ได้ว่า ปริมาณค่าความสว่าง (L) กับ ค่าความเข้มสีแดง (a) เป็นส่วนผกผันกัน

ส่วนการศึกษาทางเนื้อเยื่อของปลาหมอนกแก้ว โดยวิธีการนำเกล็ดมาตรวจสอบพบว่า ในปลาที่เลี้ยงด้วยผสมอาหารผสมสารสกัดเบตาเลน 50 มก./กก. สามารถพบรงควัตถุอยู่ใต้เกล็ด ในชั้น dermis โดยกระจายเป็นกลุ่มๆ และไม่สม่ำเสมอกัน ตั้งแต่ช่วงกลางลำตัวไปถึงบริเวณคอดหาง จะตรวจพบรงควัตถุได้มาก แต่บริเวณครีบออก และช่องท้องตรวจพบปริมาณที่น้อยหรือไม่พบรงควัตถุ

ในด้านการเจริญเติบโต ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเบตาเลน 40 มก./กก. มีอัตราเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องจากปลาในชุดการทดลองนี้มีอัตราการรอด 58.33 % ทำให้ความหนาแน่นของปลาลดลง ความเครียดจากผลของความหนาแน่นและปริมาณของเสียลดลง แต่อาจด้วยอัตราการรอดที่น้อย และมีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อยู่บ้าง เมื่อมีจำนวนน้อยลงอาจส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) และอัตราการรอดของปลา พบว่าสารสกัดเบตาเลนไม่ส่งผลต่อปลาหมอนกแก้วแต่อย่างใด

การเก็บรักษาสารเบตาเลน สามารถใช้กรดแอสซิติค ผสมลงในสารสกัดเบตาเลนให้เป็นสารเบตาเลนที่มีกรดแอสซิติค 1 % เป็นองค์ประกอบ ร่วมกับการเก็บในตู้เย็นที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ -10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเสื่อมสภาพของเบตาเลนได้ และในการเร่งสีผิวในปลานั้น สามารถใช้เบตาเลนที่สกัดด้วยเอทานอล 80 % ผสมลงในอาหารเม็ดที่ระดับ 40 มก. /กก. จะทำให้ปลาหมอนกแก้วจะให้ค่าความเข้มสีแดงสูงสุดที่ 4 สัปดาห์

### ข้อเสนอแนะ

1. ในการเตรียมอาหาร การใช้เอทานอล 80 % นั้น จะทำให้อาหารมีความชื้นมากกว่า 10 % จะส่งผลต่อคุณภาพอาหารเป็นอย่างมาก อาจเกิดเชื้อราในอาหารได้ การเปลี่ยนตัวทำละลายเป็นเอทานอล ความเข้มข้นสูงกว่าเช่น 95 % อาจช่วยให้อาหารมีความชื้นไม่สูงมาก เนื่องจากเอทานอลสามารถระเหยได้เร็ว ไม่ถูกอาหารดูดซับเอาไว้เหมือนน้ำ ซึ่งการเกิดไฮโดรไลซิสของน้ำตาลต่อสารเบตาเลนหากเกิดน้อยลงส่งผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้น

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้สารสกัดเบตาเลนจากแก้วมังกรสายพันธุ์อื่น เช่น สายพันธุ์เปลือกแดง-เนื้อแดง (*H. costaricensis*) เปรียบเทียบกับพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง (*H. undatus*) เพื่อดูปริมาณสารเบตาเลนที่สกัดได้ว่าชนิดใดสามารถเร่งสีปลาได้ดีกว่า โดยอาจใช้เนื้อแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง เปลือกแดงผสมลงในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าของอาหารปลาให้สูงขึ้นได้

3. ควรศึกษาการใช้เปลือกผลแก้วมังกรอบแห้งในลักษณะผง เพื่อความสะดวกในฤดูกาลที่ไม่มีผลสดออกจำหน่าย และสะดวกต่อการเก็บรักษา และสะดวกในการใช้เป็นส่วนผสมอาหารปลา

4. ควรหาวิธีการศึกษาอื่นๆ เช่น ใช้เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อในแบบต่างๆที่ไม่ส่งผลต่อปริมาณสารเบตาเลนที่สะสมในตัวปลา เพื่อศึกษาการสะสมเบตาเลนในกล้ามเนื้อ หรือบริเวณผิวหนังของตัวปลา ควบคู่ไปกับการวัดสีผิวของปลาโดยใช้เครื่องวัดสี (chromameter)

## เอกสารอ้างอิง

- กฤษณา ชูติมา. 2539. **หลักเคมีทั่วไป เล่ม 2**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กรมประมง. 2540. **การทำธุรกิจปลาสวยงาม**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- กรมประมง. 2549. **“โครงการสำรวจข้อมูลตลาดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ”**. กรุงเทพฯ. เอกสารอัดสำเนา.
- ชลธิชา โชติสิทธิพงษ์. 2541. “ผลของแอสตาแซนทินต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย *streptococcus* sp. ของปลานิลแดง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ไชยวัฒน์ คิ้วงสุก. 2550. “ผลของสารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในการเร่งสีปลาหมอสีลายเผือก (*Arcocentrus nigrofasciatus*) และ ปลากุหลาบแดง (*Xiphophorus maculatus*)” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง.
- ดวงใจ พวงแก้ว. 2548. “การสกัดสารเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในการเร่งสีปลากุหลาบแดง.” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง.
- คาราวรรณ ยุทธรงค์, จุอะดี พงศ์มณีรัตน์ และสนธิพันธ์ ผาสุกดี. 2546. “ผลของแอสตาแซนทินในอาหารต่อสีปลากระแห”. หน้า 45. ใน การสัมมนาวิชาการประมงประจำปี 2546. กรุงเทพฯ : กรมประมง.
- ทรงศิลป์ พงษ์ชนะชัย, ณีฎฐา เลหากุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ้มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปรากฏโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์. 2550. “อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา.” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 38(6) : 251-254.
- ธนากร แก้วละเอียด. 2551. “การใช้สารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรในการเร่งสีปลาหมอสีทอง (*Aulonacara* sp.)”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง.
- บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. 2550, 17 มกราคม. “ธุรกิจค้าปลาสวยงาม ตลาดในประเทศเติบโตดี ส่งออกยังแข่งขันรุนแรง”. กรุงเทพฯธุรกิจ. หน้า 18.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ปาริฉัตร หยวกแพง, นฤมล เพ็ญขาว และ อรนาถ สุนทรวัฒน์. 2550. “การหา degree of methyl esterification ของเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร.” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 38(5) : 55-58.
- พรรษา ศะศิสมิต. 2543. “สัมมนา การเพาะเลี้ยงปลาหมอสี.” วารสารการประมง 53(6) : 591-600.
- พิชญา ชัยนาค, ไวยพจน์ เครือเสนห์ และทวี จินดาภัยกุล. 2544. ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลากระพงแดง (*Lutjanus argentimaculatus* Forskal). เอกสารวิชาการฉบับที่ 19/2544. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- วุฒิชัย จีนเมือง, พัฒนิกา กิจกอบชัย, หิรัญรัตน์ สุวรรณที และ อรนาถ สุนทรวัฒน์. 2550. “เบตาเลนจากผลแก้วมังกรสองสายพันธุ์.” ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- โสภณ เรื่องสำราญ, อมร เพชรสม, ศุภสร พัฒนอักษร และ สุรชัย พรภคกุล. 2542. อินทรีย์เคมี II. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุรพงษ์ โกสิยะจินดา. 2545. แก้วมังกร พืชเศรษฐกิจ ผลไม้เพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ
- อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. 2542. สถานะการเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. 2544. สัมมนา “สายพันธุ์ปลาหมอสีในประเทศไทย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปลาหมอฟรอนโตซ่า”. วารสารการประมง 54(3) : 227-241.
- Amar, E. C., Kiron, V., Satoh, S. and Watanabe, T. 2004. “Enhancement of innate immunity in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum) associated with dietary intake of carotenoids from natural products.” *Fish & Shellfish Immunology*. 16 : 527 – 537.
- Anonymous. 2008. **Acetic acid**. [Online]. Available : <http://images.google.co.th/>
- Bailey, M. and Sandford, G. 1999. **Aquarium fish identifier encyclopedia** : London. Annes publishing limited.
- Cai, Y. Z., Sun, M. and Corke, H. 2005. “Characterization and application of betalain pigments form plants of the Amaranthaceae.” *Trends in food science & technology*. 16 : 370-376.
- Chen, C. and Pandora, A. K. A. 2008. **Painted glass fish and other questionable practices**. [Online]. Available : <http://badmanstripicalfish.com/artical.html>.
- Fujii, R. 1993. “Colouration and chromatophores.” In Edvard, D. H. editor. 1993. **The physiology of fishes**. Boca Raton : CRC Press.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Gandia-Herrero, F., Garcia-Camona, F. and Escribano, J. 2005a. "A novel method using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection for the determination of betaxanthins." **Journal of chromatography A**. 1078 : 83-89.
- Gandia-Herrero, F., Garcia-Camona, F. and Escribano, J. 2005b. "Fluorescent pigment: New perspectives in betalain research and applications." **Food research international**. 38 : 879-884.
- Gold-E. 2005, **CrossBreed...Corner**. [Online]. Available : <http://www.Fishroom.pantown.com> .
- Gold-E. 2008. **ครอสบริดอะไร มีชื่อย่อว่า B. P.** [Online]. Available : <http://www.fishroom.org/article/007.htm> .
- Gunasena, H. P. M., Pushpakumara , D. K. N. G. and Kariyawasam, M. 2008. **Dragon fruit *Hylocereus undatus* (Haw.) Britton and Rose**. [Online]. Available : [www.google.co.th](http://www.google.co.th).
- Herbach, K. M., Rohe, M., Stintzing, F. C. and Carle, R. 2006. "Structural and Chromatic stability of purple pitaya (*Hylocereus polyrhizus* [Weber] Britton & Rose) betacyanins are effected by the juice matrix and selected additives". **Food research international**. 39 : 667-677.
- Humason , G. L. 1979. "Animal tissue technique" อ้าง โดย ชลล อิมสุวรรณ, ปวีณา กิจสวัสดิ์ และ สุปราณี ชินบุตร. 2530. เนื้อเยื่อปลาอุกด้าน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Kirca, A., Ozkan , M. and Cemeroglu, B. 2007. " Effect of temperature, solid content and pH on the stability of black carrot anthocyanins." **Food chemistry**. 101 : 212-218.
- Kobayashi, N., Schmidt, J., Wray, V., Nimtz, M., Wray,V. and Schliemann, W. 2000. Betalains from Christmas cactus". **Phytochemistry**. 54 : 419-426.
- Mario, P. 1976. "Betalains." 560- 834. In Goodwin, T.W. 1979. **Chemistry and biochemistry of plant pigments** : London. Academic press.
- Mobhammer, M. R., Stintzing, F. C. and Carle, R. 2005. "Colour studies on fruit juice blends form *Opuntia* and *Hylocereus* cacti and betalain-containing medal solutions derived thereform". **Food research international**. 38 : 975-981.
- Mueller, L. A., Hinz, U. and Zryd, J. P. 1996."The formation of betalamic acid and muscaflavin by recombination DOPA dioxygenase form *Amatia*." **Phytochemistry**. 44 : 567-569.

- Paripatananont, T., Tangtrongpairoj, J., Sailasuta, A. and Chansue , N. 1999 “ Effect of astaxanthin on the pigmentation of goldfish *Carrassius auratus*.” **Journal of the world aquaculture society**. 30 : 454-460.
- Phumjan, L. and Laohavisuti, N. 2007. “ Betalain extraction from Peeled Dragon Fruit for enhancing color in red platy (*Xiphophorus maculatus*).” 490-493. in **International conference on integration of science & technology for sustainable development**. Bangkok.
- Sommer, T. R., D'Souza , F. M. L. and Morrissy, N. M. 1991. “Pigmentation of adult rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, using the green alga *Haematococcus pluvialis*.” **Aquaculture**. 106 : 63-74.
- Stintzing, F. C. and Carle, R. 2004. “Functional properties of anthocyanins in plants, food, and in human nutrition.” **Trends in food science & technology**. 15 : 19-38.
- Stintzing, F. C. and Carle, R. 2006. “Characterisation of anthocyanin-betalain mixtures for food colouring by chromatic and HPLC-DAD-MS analyses.” **Food chemistry**. 94 : 296-309.
- Strack, D., Vogt, T. and Schliemann, W. 2003. “Recent advance in betalain.” **Photochemistry**. 62 : 247-269.
- Thimmaraju, R., Bhagyalakshmi, N., Narayan, M. S. and Ravishankar, G. A. 2003. “Kinetics of pigment release from hairy root cultures of *Beta vulgaris* under the influences of pH, sonication, tempearature and oxygen sress.” **Process biochemistry**. 38 : 1069 – 1076.
- Van der salm A. L., Martinez, M., Flik, G. and Bonga, S. E. W. 2004. “Effect of husbandry conditions on the skin color and stress response of red porgy *Pagrus pagrus*.” **Aquaculture**. 241 : 371-386.
- Whybraniec, S. 2008. “Chromatographic investigation on acyl migration in betacyanins and their decarboxylated derivatives.” **Journal of chromatography B**. 861 : 40-47.
- Yut1678. 2549. “นกแก้ว...ครอสบริดคอมตะ.” **Thaicrossbreed**. 1(7) : 22-28
- Zryd, J. P. and Christinet , L. 2003. “**Betalain**.” Lausanne. : Dept. of Plant Molecular Biology University de Lausanne.