

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

Formulation and Process Development for Brownrice Gruel Soup



รายงานผลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของ
โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

RCH สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
TP
A35
R3
ประจำปีงบประมาณ 2545

เลขหมู่..... 617.2 ก

เลขทะเบียน 53938

วัน,เดือน,ปี 30 พ.ย. 2547

b.....
i.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

Formulation and Process Development for Brownrice Gruel Soup

ชื่อผู้วิจัย: อาจารย์ชมพูนุท สีห์โสภณ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย: จากเงินรายได้ของ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2545

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย: ตั้งแต่ ตุลาคม 2544 ถึงกันยายน 2545 เป็นเวลา 1 ปี

หน่วยงานที่สังกัด: โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทคัดย่อ

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป โดยการศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป พบว่า การอบปลายข้าวกล้องที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นำเข้าเครื่อง exhaust ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงนำมาแช่น้ำเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงนำปลายข้าวกล้องที่ได้มาอบแห้งโดยใช้เครื่อง Tray Dryer อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นนำมาบดร่อนโดยใช้ตะแกรงขนาด 28 เมช จะได้ปลายข้าวกล้องที่มีเนื้อสัมผัสเหมาะสมที่สุด โดยมีระดับการเกิดเจลลิตไนส์เท่ากับ 66.34% และเมื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อหมูอบแห้ง โดยศึกษาขนาดของชิ้นเนื้อและเวลาในการอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า ชิ้นเนื้อควรมีขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และใช้เวลาอบ 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ประกอบด้วย ปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป 64.67% เนื้อหมู 12.20% ผักอบแห้ง 1.78% เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 13.25% และแป้งข้าวเจ้า 8% โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ มีสี กลิ่น รสที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน และมีปริมาณความชื้น 3.19%.

Abstract

Formulation and Process development for brownrice gruel soup by studying process and the factors which influenced to dried brownrice process. The result showed that drying brownrice at 120 °c for 15 min, putting in exhaust at 110 °c for 10 min ,soaking brownrice with water for 1 hour,drying in tray dryer at 110 °c for 8 hours and then grinding with sieve sized 28 mesh. The product quality was good in texture and had 66.34% degree of gelatinization . Studied the suitable size of pork and the suitable time for drying pork which were the factors to prepare dried pork. The results showed that pork should have sized in 1 cm³ and should dry at 70 °c for 4 hours. The formulations of brownrice gruel soup were 64.67% dried brownrice, 12.20% dried pork,1.78% dried vegetables,13.25% seasonings and 8 %rice flour. The characterristics of brownrice gruel soup were good in color, odor ,flavor ,no rancid odor and 3.19% moisture.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วารสารปริทัศน์	2
2.1 ขั้วกลิ้ง	2
2.2 อุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิตขั้วหุงสุกเร็ว	6
2.3 เม็ดสตาร์ช	7
2.4 คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ต้องการของโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป	13
2.5 การทำแห้ง	14
บทที่ 3 วัตถุดิบ อุปกรณ์ และวิธีทดลอง	18
3.1 วัตถุดิบ	18
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	18
3.3 ขั้นตอนและวิธีทดลอง	19
บทที่ 4 ผลการทดลอง	25
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	35
เอกสารอ้างอิง	38
ภาคผนวก ก.	40
ภาคผนวก ข.	41
ภาคผนวก ค.	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสารอาหารในข้าวกล้องกับข้าวขาว	3
ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางเคมีของโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป	13
ตารางที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	20
ตารางที่ 4 ระดับการเกิดเจลลิตินในซ์ของปลายข้าวกล้องหลังผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	25
ตารางที่ 5 ปริมาณความชื้นและ % yield ของฝักรอบแห้ง	26
ตารางที่ 6 ลักษณะเนื้อสัมผัสและปริมาณความชื้นของเนื้อหมอบแห้ง	27
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ อัตราส่วนแป้งข้าวเจ้าต่างกัน	28
ตารางที่ 8 คุณภาพของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	29
ตารางที่ 9 คุณภาพในการเก็บรักษาของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	29
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 เดือน	30
ตารางที่ 11 ข้อมูลของผู้บริโภคในการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์	32
ตารางที่ 12 พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์	33

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	ข้าวกล้อง	2
ภาพที่ 2	สูตร โครงสร้างของอะไมโลส	8
ภาพที่ 3	สูตร โครงสร้างของอะไมโลเพคติน	8
ภาพที่ 4	กลูโคส 1 หน่วยอุ้มน้ำได้ 6 โมเลกุล	10
ภาพที่ 5	เม็ดสตาร์ชดิบ	11
ภาพที่ 6	เม็ดสตาร์ชที่พองตัวแล้ว	11
ภาพที่ 7	การพองตัวและการเกิดเจลของแป้ง	12
ภาพที่ 8	กระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	19
ภาพที่ 9	ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค	34
ภาพที่ 10	การนำข้าวเข้าเครื่อง exhaust	45
ภาพที่ 11	การนำข้าวเข้าเครื่อง tray dryer	45
ภาพที่ 12	ปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปอบแห้ง	46
ภาพที่ 13	ฝักอบแห้งในตู้อบลมร้อน	46
ภาพที่ 14	แครอทอบแห้ง	47
ภาพที่ 15	เห็ดหอมอบแห้ง	47
ภาพที่ 16	ต้นหอมอบแห้ง	48
ภาพที่ 17	ขิงผง	48
ภาพที่ 18	กระเทียมผง	49
ภาพที่ 19	หมูอบแห้ง	49
ภาพที่ 20	โฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	50
ภาพที่ 21	โฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปหลังคืนรูปในน้ำเดือด 1 นาที	50

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ


ในภาวะการณปัจจุบัน การส่งออกข้าวในรูปแบบข้าวสาร มักประสบปัญหาการแข่งขันราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะภาวะที่มีผลผลิตข้าวปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดโลกมีผลให้ราคาข้าวตกต่ำแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คือ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่เตรียมรับประทานได้สะดวกโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เหมาะกับการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเมืองใหญ่ หรือย่านธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีความรีบเร่งมากขึ้น เช่น ข้าวกึ่งสำเร็จรูป ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก กึ่งสำเร็จรูป อาหารว่างจากข้าว ข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ข้าว เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และประการสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์แปรรูปมีราคาค่อนข้างเสถียร ไม่ขึ้นลงตามภาวีสันตลาดเนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาได้นาน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
2. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากปลายข้าวกล้อง
3. เพื่อศึกษาคุณภาพของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

บทที่ 2 วารสารปริทัศน์

2.1 ข้าวกล้อง



ภาพที่ 1 : ข้าวกล้อง

ที่มา : <http://www.egat.or.th/thai/brownrice/rice5.html>

ข้าวกล้องมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Oryzasativa* Linn. วงศ์ Graminae คือ ข้าวที่สีเอาเปลือก (แกลบ) ออก โดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก(ณรงค์,2538)

สำหรับข้าวขาวที่เรากินกันอยู่นั้นเป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีหลายๆครั้ง จนเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไปหมด จนเหลือแต่เนื้อในของข้าว เมื่อเปรียบเทียบสารอาหารในข้าวกล้องกับข้าวขาว แสดงให้เห็นดังตารางที่ 1

ข้าวกล้องบางคนเรียกกันติดปากว่า ข้าวซ้อมมือ หรือข้าวแดง เนื่องจากในสมัยโบราณชาวบ้านใช้วิธีตำข้าวกินกันเอง จึงเรียกว่า ข้าวซ้อมมือ แต่ปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรสีข้าวแทนจึงเรียกข้าวที่สีเอาเปลือกออกนี้ว่า ข้าวกล้อง

ข้าวกล้องมีโปรตีนประมาณ 7-12% (แล้วแต่พันธุ์ข้าว) นักค้นคว้าชื่อ โรสเดล (Rosedale) ได้วิเคราะห์ว่าการขัดสีข้าวกล้องจนมีสีขาวจะทำให้โปรตีนสูญหายไปประมาณ 30% ถ้าดูอย่างผิวเผินการสูญเสียเพียงแค่นี้ไม่มากนัก แต่อย่าลืมว่าเราต้องกินข้าววันละ 3 มื้อ และข้าวเป็นอาหารที่เรากินมากที่สุด

2.1.1 คุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้อง

ถึงแม้ ข้าวกล้อง จะมีสีน้ำตาลไม่น่ารับประทาน เมื่อหุงแล้วไม่นุ่มเท่าข้าวขัดขาว แต่ข้าวกล้องกลับมีคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายต่อร่างกาย เนื่องจากข้าวกล้องเป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีเพียงครั้งเดียว จึงยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้าง และฟื้นฟูให้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคไตวาย เป็นต้น นอกจากนี้ข้าวกล้องยังมีเส้นใยอาหารซึ่งช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายและป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบสารอาหารในข้าวกล้องกับข้าวขาว

สารอาหาร	หน่วย	ข้าวกล้อง	ข้าวขาว	ดีกว่า (%)
วิตามินบีรวม	-	-	-	-
บี ๑ (B๑ Thiamine)	มิลลิกรัม	๐.๓๔	๐.๐๗	๓๘๕
บี ๒ (B๒ Riboflavin)	มิลลิกรัม	๐.๐๕	๐.๐๓	๖๖
ไนอาซิน (Niacin)	มิลลิกรัม	๐.๖๒	๐.๑๑	๔๖๓
กรดแพนโทเทนิค (Pantothenic acid)	มิลลิกรัม	๑.๕	๐.๒๒	๕๘๑
กรดโฟลิก (Folic acid)	มิลลิกรัม	๒๐	๓.๖	๔๕๕
เกลือแร่	-	-	-	-
เหล็ก	มิลลิกรัม	๑.๖	๐.๘	๑๐๐
แคลเซียม	มิลลิกรัม	๓๒	๒๔	๓๓
แมกนีเซียม	มิลลิกรัม	๕๒	๑๔	๒๗๑
แมงกานีส	มิลลิกรัม	๑.๕	๐.๕	๖๗
สังกะสี	มิลลิกรัม	๑.๕	๑.๕	๒๗
โคบอลต์	ไมโครกรัม	๔.๒	๐.๕	๓๖๗
ทองแดง	ไมโครกรัม	๓๖๐	๒๓๐	๕๗
ซิลิเนียม	ไมโครกรัม	๓๘.๘	๓๑.๘	๒๒
ไอโอดีน	ไมโครกรัม	๒.๒	๒	๑๐
โปรตีน	กรัม	๗.๖	๖.๔	๑๕

ที่มา : <http://www.kph.go.th/department/social/Hearb13.html>

2.1.2 องค์ประกอบของข้าวกล้อง (ณรงค์, 2538)

โดยปกติข้าวกล้องจะมีโปรตีนร้อยละ 8 ถ้ามีความชื้นร้อยละ 12 นอกจากนี้ยังพบไขมัน สารเยื่อใย วิตามิน และเกลือแร่ ปริมาณที่พบแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เทคนิคการวิเคราะห์ก็มีผลต่อปริมาณที่พบด้วย องค์ประกอบของข้าวกล้องได้แก่

คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตที่พบในข้าวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ แป้ง เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และน้ำตาลอิสระ แป้ง แป้งมีปริมาณสูงสุด ประมาณร้อยละ 90 ของน้ำหนักข้าว โดยมีอมัยโลสร้อยละ 7-33 ของน้ำหนักแห้ง หรือร้อยละ 8-37 ของน้ำหนักแป้ง ส่วนอมัยโลเป็คตินจะเป็นส่วนประกอบหลักของข้าวเหนียว ซึ่งส่วนใหญ่แป้งพวกนี้จะมีอมัยโลสร้อยละ 0.8-1.3 ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเม็ดแป้งจะมีขนาดใกล้เคียงกัน

อุณหภูมิแป้งตุงอยู่ระหว่าง 55-79^๐ซ. ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวและสิ่งแวดล้อม ข้าวพันธุ์เดียวกันแต่อาจมีอุณหภูมิ
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แป้งสูกต่างกันถึง 10°ซ ด้วยเหตุนี้ถ้าใช้อุณหภูมิแป้งสูกเป็นหลักอาจแบ่งข้าวเป็น 3 กลุ่ม คือข้าวหุงสุกง่าย ใช้ อุณหภูมิ 69°ซ หรือต่ำกว่า ข้าวหุงสุกได้ยากปานกลาง ใช้อุณหภูมิระหว่าง $70-74^{\circ}\text{ซ}$ และข้าวหุงสุกยาก ใช้ อุณหภูมิสูงกว่า 74°ซ ข้าวที่หุงสุกได้ง่ายส่วนใหญ่มาจากพันธุ์ Japonica ส่วนข้าว Indica มีทั้งหุงสุกได้ง่ายและ หุงสุกได้ยาก ทำให้ดูเหมือนว่าอุณหภูมิที่เมล็ดข้าวในนาสุกนั้นมีความสำคัญมาก นอกจากนี้อัตราส่วน ของอัมย โลส ต่ออัมยโลเป็คตินก็จะเป็นเครื่องชี้ความยากง่ายของการหุง ถ้าข้าวมีอัมยโลสสูงเมล็ดแป้งจะดูดน้ำได้ช้า ข้าวที่มี อุณหภูมิต่ำในขณะที่สุกในนาจะดูดน้ำและละลายได้ที่อุณหภูมิต่ำ ข้าวเจ้าดูดน้ำและละลายได้น้อยกว่าข้าว เหนียว และยังคงดูดน้ำได้อีกหลังจากแป้งสุกแล้ว ส่วนข้าวเหนียวการดูดน้ำจะถึงจุดสูงสุดเมื่อแป้งสุก จากราย ละเอียดที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการดูดน้ำของแป้ง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในเมล็ดแป้งแต่เมื่อเมล็ดแป้งแตกตัว ออกทั้งอัมยโลส และ อัมยโลเป็คตินจะหลุดออกมา ลักษณะของแป้งเปียกที่ได้จะขึ้นอยู่กับขนาดของอัมยโลส ความยากง่ายของการสุกนี้อาจตรวจสอบได้ด้วยวิธี alkali test โดยนำข้าว 6 เมล็ดแช่น้ำต่าง KOH เข้มข้นร้อยละ 1.7 ปริมาณ 10 มิลลิลิตร หลังจากแช่ไว้ 23 ชั่วโมง แล้วจึงตรวจสอบลักษณะการกระจายของเมล็ด ข้าวที่สุกได้ง่าย จะพองตัวมากจนกระทั่งแตกและกระจายตัวออก การที่แป้งจากข้าวชนิดต่างๆสุกที่อุณหภูมิต่างๆ กันทำให้การ หุงข้าวต้องใช้เวลาต่างกันด้วย ข้าวที่มีแป้งสุกยากจะใช้เวลามากกว่าข้าวที่มีแป้งหุงสุกง่าย ข้าวที่มีปริมาณอัมย โลสที่หลุดออกมาจะเป็นอัตราส่วน โดยตรงกันข้ามข้าวที่มีอัมยโลสต่ำจะดูดน้ำพองตัวได้น้อย ปริมาณอัมย โลสที่ หลุดออกมาจะเป็นอัตราส่วน โดยตรงกับปริมาณอัมยโลสที่มีอยู่ในเมล็ดแป้ง ถ้าเมล็ดแป้งมีอัมยโลสไม่เกินร้อยละ 30 แต่ถ้ามีปริมาณอัมยโลสสูงกว่านี้การละลายจะน้อยลง อาจเนื่องมาจากการจับตัวกันของอัมยโลสภายในเมล็ด แป้งหลังจากที่เมล็ดแป้งสุกแล้ว หรือหลังจากหลุดออกจากเมล็ดแป้งแล้ว

ถ้าหุง pasting oharaotteristic นั้นพบว่า ข้าวเหนียวให้ peak visosity ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้าวเจ้า และ flour จะให้ค่า peak visosity ต่ำกว่าสตาร์ชถ้าเป็นแป้งชนิดเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนประกอบอื่นๆ เช่น โปรตีนสามารถป้องกันมิให้แป้งดูดน้ำได้สะดวกนัก นอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดแป้งที่มีอัมยโลสสูงแตกตัวได้ยาก แต่ จะให้เจลที่มีความหนืดสูง

เฮมิเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสพบมากในรำละเอียด รำข้าวขาว และจมูกข้าว พบเล็กน้อยในข้าวขาว ข้าว กลี้อมีเฮมิเซลลูโลสร้อยละ 1.43-2.08 ข้าวขาวมีร้อยละ 0.61-1.09 รำละเอียดมีร้อยละ 8.59-10.90 และรำข้าว ขาวมีร้อยละ 3.15-6.01 นอกจากนี้ยังพบ pentosan ในจมูกข้าวร้อยละ 4.80-7.40 มีผู้ศึกษาเฮมิเซลลูโลสที่มีอยู่ เหล่านี้พบว่า รำละเอียดและรำข้าวขาวมีประมาณร้อยละ 0.1 ที่ละลายน้ำได้ และร้อยละ 1.0 ที่ละลายในสาร ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 นอร์มัล ส่วนข้าวขาวมีประมาณร้อยละ 0.02 ที่ละลายน้ำได้ และร้อยละ 0.1 ที่ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 นอร์มัล ส่วนใหญ่เป็นพวก arabinosan และ xylan

เซลลูโลส เซลลูโลสที่พบส่วนใหญ่อยู่ในชั้นรำ ปริมาณที่พบร้อยละ 62 อยู่ในชั้นรำละเอียดร้อยละ 4 อยู่ในจมูกข้าว ร้อยละ 7 อยู่ในรำข้าวขาว และร้อยละ 27 อยู่ในข้าวขาว

น้ำตาลอิสระ น้ำตาลอิสระพบมากในจมูกข้าวและเนื้อแป้ง ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครสและมิน้ำตาล raffinose กลูโคส และฟรุคโตสเล็กน้อย ข้าวกลี้อมีน้ำตาลอิสระร้อยละ 0.83-1.36 และข้าวขาวมีร้อยละ 0.09-0.13 ส่วนจมูกข้าวมี reducing sugar ร้อยละ 11.6 และน้ำตาล nonreducing sugar ร้อยละ 9.1

นอกจากนี้ยังพบไฟดินหรือเกลือ myo-inositol hexaphosphate เป็นสารประกอบที่พบมากในบริเวณผิว ของเมล็ด มีฟอสฟอรัสร้อยละ 80 ถ้าพบในข้าวกลี้อม หรือร้อยละ 40 ถ้าพบในข้าวขาวมาจากสารไฟดิน และ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟอสฟอรัสร้อยละ 90 ในรามาจากไฟติน ไฟตินที่พบในข้าวกล้องมีร้อยละ 0.2 ในข้าวขาวมีร้อยละ 0.04-0.06 และในจมูกข้าวมีร้อยละ 0.8

สารประกอบไนโตรเจน

สารประกอบไนโตรเจนที่พบในข้าวประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนอิสระ โปรตีนเป็นส่วนประกอบที่มีมากเป็นอันดับสองรองจากแป้ง ร้อยละ 14 อยู่ในรำข้าวขาว ร้อยละ 3 ในรำข้าวขาว และร้อยละ 83 ในข้าวขาว อย่างไรก็ตาม โปรตีนที่อยู่ตามส่วนต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการจัดรี และปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าว ถ้าข้าวมีโปรตีนสูงการกระจายของโปรตีนจะสม่ำเสมอมากขึ้น ความแตกต่างของปริมาณโปรตีนในส่วนต่างๆจะน้อยลง โดยปกติแล้วปริมาณโปรตีนอาจคำนวณได้จากปริมาณไนโตรเจนที่วิเคราะห์ได้ ปริมาณโปรตีนจะเท่ากับผลคูณของปริมาณไนโตรเจนกับ 5.95 โดยถือว่าโปรตีนจากข้าวมีไนโตรเจนร้อยละ 16.8 เนื่องจากมี oryzenin เป็นส่วนใหญ่

เนื่องจากโปรตีนจากส่วนต่างๆของเมล็ดข้าวมีอยู่ไม่เท่ากัน อัลบูมินและโกลบูลินจะพบมากในข้าวกล้อง กลูเตลินพบมากทั้งในข้าวกล้องและข้าวขาว แสดงว่าอัลบูมินและโกลบูลินมีอยู่สูงมากในเยื่อหุ้มเนื้อแป้ง และจมูกข้าว ส่วนกลูเตลินมีอยู่มากที่จุดศูนย์กลางของเนื้อแป้ง แป้งข้าวจึงมีโปรตีนกลูเตลินเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้เมื่อนำแป้งมาสกัดด้วยด่างเข้มข้น 0.1 นอร์มัล โดยใช้ด่าง 20 เท่าของปริมาตรแป้ง โปรตีนจะละลายออกมา ร้อยละ 97 ถ้าแป้งมีความละเอียดถึง 100 เมต

จากการศึกษาส่วนประกอบของโปรตีนพบว่าข้าวกล้องมี lysine สูง แต่มีกรด glutamic ต่ำกว่าข้าวขาว อย่างไรก็ตาม lysine ก็ยังคงเป็น limiting amino acid ติดตามด้วย threonine การที่ร่างกายนำเอา threonine ไปใช้ได้น้อยเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันดีนัก เพราะโดยปกติแล้วข้าวมีกรดอะมิโนชนิดนี้มากเกินไป มีผู้ทำการวิจัยพบว่า ร่างกายนำเอากรดอะมิโนไปใช้ในปริมาณต่างๆกัน คือ lysine ร้อยละ 70-100 threonine ร้อยละ 73-100 methionine ร้อยละ 62-76 isoleucine ร้อยละ 71-99 leucine ร้อยละ 75-80 phenylalanine ร้อยละ 74-76 และ valine ร้อยละ 71-100 การเสริม methionine threonine และ tryptophan ลงในข้าวพร้อมกับ lysine จะทำให้ร่างกายใช้ไนโตรเจนได้มากขึ้น โดยปกติจะใช้ค่า PER เพื่อแสดงปริมาณไนโตรเจนที่ร่างกายนำไปใช้ จากการศึกษพบว่า ค่า PER ของผลิตภัณฑ์จากข้าวมีดังนี้ ข้าวกล้อง 1.73-1.93 ข้าวขาว 1.38-2.56 รำละเอียด 1.61-1.92 รำข้าวขาว 1.84-1.88 และจมูกข้าว 2.59

ไขมัน

ในข้าวกล้องไขมันร้อยละ 80 อยู่ในรำละเอียดและรำข้าวขาว และประมาณ 1 ใน 3 อยู่ในจมูกข้าว ไขมันมีส่วนประกอบของกรด oleic acid, linoleic acid และ palmitic acid เป็นส่วนใหญ่ มีกรด lauric และกรด myristoleic เล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบ sterol แอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ferulic acid และ tocopherol อีก ในส่วนที่เรียกว่า unsaponifiable matter ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 5 พบซีฟิงร้อยละ 3-9 เป็นพวกเอสเทอร์ของ lignocric acid ($C_{22}H_{47}CO_2H$) และ myrisoyl alcohol ($C_{30}H_{61}OH$) เป็นส่วนใหญ่

วิตามิน

วิตามินส่วนใหญ่พบในส่วนที่เรียกว่า เยื่อหุ้มเนื้อเมล็ดและจมูกข้าว ไม่พบวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินดี ในข้าวสาร รำละเอียด และรำข้าวขาว พบวิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง และ niacin โดยพบวิตามินบีหนึ่งในรำละเอียดร้อยละ 65 รำข้าวขาวร้อยละ 13 และข้าวขาว ร้อยละ 22 วิตามินบีสองในรำละเอียดร้อยละ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

39 ไร่ข้าวขาวร้อยละ 8 และข้าวขาวร้อยละ 53 และ ไร่ละเย็บร้อยละ 54 ไร่ข้าวขาวร้อยละ 13 และข้าวขาวร้อยละ 33

เกลือแร่

เกลือแร่ของข้าวมีปริมาณไม่คงที่ แตกต่างกันไปตามลักษณะของดินที่ใช้ปลูก และวิธีวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เกลือแร่จากส่วนต่างๆ ของเมล็ดก็พบว่า เกลือแร่ร้อยละ 51 อยู่ในไร่ละเย็บ ร้อยละ 10 อยู่ในไร่ข้าวขาว และร้อยละ 28 อยู่ในข้าวขาว แร่ธาตุที่พบมี ฟอสฟอรัส โบแทสเซียม แคลเซียม คลอรีน ซิลิกอน โซเดียม และเหล็ก แร่ธาตุที่พบมากที่สุดคือ แมกนีเซียม โบแทสเซียม และซิลิกอน

2.2 อุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว(นรีเทพ,2544)

2.2.1 ข้าวหุงสุกเร็ว (Quick-cooking rice)

หมายถึง ข้าวที่ถูกทำให้สุกบางส่วนในน้ำหรือไอน้ำ ทำให้เกิดเจลลาตินในเซชันถึงระดับหนึ่ง อาจเกิดบางส่วนหรือเกิดอย่างสมบูรณ์ แล้วทำให้แห้งเกิดโครงสร้างที่พรุน เพื่อให้ดู่น้ำกลับได้ง่ายในระยะเวลาสั้น

มาตรฐานของข้าวสารมักขึ้นอยู่กับขนาด และลักษณะของเมล็ดข้าว เช่น เมล็ดยาวปานกลางหรือสั้น แต่ขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมีความยาวประมาณ 20-35 มิลลิเมตร ในการหุงต้มข้าวแต่ละครั้งต้องใช้เวลา มากเริ่มตั้งแต่กระบวนการแช่ต้มจึงได้มีการคิดค้น และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวที่ใช้เวลาในการหุงต้มน้อย เรียกว่า ข้าวหุงสุกเร็ว (Quick-cooking rice) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก การทำข้าวหุงสุกเร็ว เริ่มมีการผลิตครั้งแรกประมาณ 50 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีวิธีการผลิตมากกว่า 10 วิธี ตัวอย่างเช่น วิธีการแช่-ต้ม-ผ่านไอน้ำ-ทำแห้ง (Soak-boil-steam-dry method) วิธีการนี้คิดค้นโดย Ozai-Durrani ในปี ค.ศ. 1948 มีขั้นตอนดังนี้ นำข้าวสารมาแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้องปริมาณความชื้นจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 หลังจากนั้นนำข้าวไปต้มนาน 8-10 นาที ความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 65-70 เทน้ำออก ทิ้งให้เย็นและล้างด้วยน้ำเย็นประมาณ 1-2 นาที เกลี่ยข้าวใส่ในถาดเข้าอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส อัตราเร็วลม 61 เมตร/นาที และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความชื้นประมาณร้อยละ 8-14 วิธีนี้ควรระวังเรื่องอุณหภูมิการ อบเป็นสำคัญควรใช้อุณหภูมิสูงพอที่จะทำให้ไอน้ำระเหยออกจากเมล็ดข้าวได้ วิธีการนี้ทำให้เกิดรูพรุนในเมล็ดข้าว ส่วนวิธีการแช่เยือกแข็ง-คั้นรูป (Freeze-thaw process) มีหลักการดังนี้ นำข้าวแช่น้ำและให้ความร้อนโดยการต้มหรือนึ่งด้วยไอน้ำ เพื่อให้เป็งเกิดเจล และมีความชื้นประมาณร้อยละ 70 หลังจากนั้นนำข้าวไปแช่แข็งแล้วจึงทำให้แห้ง วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาโดย Ozai-Durrani ในปี 1965 นอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง วิธีการนี้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตวิธีอื่นๆที่ใช้ เครื่องอบลมร้อนซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Wayne ในปี 1963 วิธีนี้ไม่สามารถทำเป็นอุตสาหกรรมได้ เพราะการลงทุนเริ่มต้นสูงมากในการติดตั้งเครื่องมือ และมีอัตราการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

2.2.2 หลักการในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว (Bhat et al.,1972;Luh,1991 ; Roberts,1985)

คือ การทำให้ข้าวเกิดการเจลลาตินไนซ์ (gelatinize) ที่ระดับต่างๆกันหรือทำให้สุก แล้วนำไปทำแห้ง เพื่อที่จะทำให้เมล็ดข้าวมีโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ซึ่งรูพรุนเหล่านี้จะเป็นตัวดูดซับน้ำในขณะที่คั้นรูปข้าวหุงสุกเร็ว การคั้นรูปต้องอาศัยการเติมน้ำและการดูดซับน้ำของเมล็ดข้าว การเกิดเจลลาตินไนซ์ของเป็งในเมล็ดข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำข้าวหุงสุกเร็ว โดยพบว่าข้าวที่ทำให้เกิดการสุกเต็มที่หรือเกิดการเจลลาตินไนซ์อย่างสมบูรณ์จะใช้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เวลาในการคั้นรูปเพียง 5 นาที ในขณะที่ข้าวที่ทำให้เกิดการเจลาติไนซ์บางส่วนจะใช้เวลาในการคั้นรูป 10-15 นาที นอกจากนี้สภาวะในการทำแห้งก็เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ เพราะโครงสร้างที่มีรูพรุนจะเกิดในขณะที่ทำแห้ง ซึ่งกระบวนการผลิตก็จะมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ผู้ผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแต่ก็จะมีหลักการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน

2.2.3 วัตถุประสงค์ในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว (Weibye,1983)

ข้าวที่จะนำมาผลิตข้าวหุงสุกเร็วต้องเป็นข้าวที่ผ่านการเอาเปลือกออก (dehulled rice) หรือผ่านการสี เช่น ข้าวสาร (white rice) ข้าวกล้อง (brown rice) และข้าวึ่ง (parboiled rice) ของข้าวเมล็ดสั้น (short grain rice) ข้าวเมล็ดกลาง (medium grain rice) และข้าวเมล็ดยาว (long grain rice) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและสายพันธุ์ที่ต้องการ

2.2.4 ลักษณะของข้าวหุงสุกเร็วที่ดี (Bhat et al.,1972;Luh,1991 ; Roberts,1985)

เมื่อคั้นรูปแล้วได้ข้าวสวยที่มีลักษณะเนื้อสัมผัส สี กลิ่น รส กลิ่นเดียวกับข้าวสวยที่หุงด้วยวิธีการปกติ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ไม่มีลักษณะที่เป็นก้อนแข็งใจกลางของเมล็ดข้าวเนื่องจากแข็งไม่สุก ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะต้องการลักษณะของข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ในอเมริกาจะชอบเมล็ดยาวที่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนและนุ่ม ส่วนผู้บริโภคในญี่ปุ่นและจีนจะชอบข้าวเมล็ดสั้นที่เหนียวและเกาะตัวกันดี ใช้เวลาในการคั้นรูปสั้นไม่ควรเกิน 10-15 นาที วิธีการในการคั้นรูปไม่ยุ่งยากและสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ต้มในน้ำเดือด หรือการเติมน้ำร้อน หรือสามารถเติมน้ำปกติแล้วหุงด้วยไมโครเวฟได้เป็นต้น ควรมีคุณค่าทางโภชนาการหลงเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด


2.3 เม็ดสตาร์ช (สมศักดิ์และสุธี,2541)

2.3.1 โครงสร้างของเม็ดสตาร์ช

ภายในเม็ดสตาร์ชประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อะไมโลส และอะไมโลเพคติน แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 2 และ 3 อะไมโลสเป็นโพลีเมอร์ของกลูโคสที่อยู่ในรูปไพราโนส (pyranose) มาต่อกันเป็นโซ่ตรง ยาวประมาณ 500-2000 หน่วย โดยคาร์บอนตำแหน่งที่ 1 ของกลูโคสตัวที่ 1 จับกับคาร์บอนตำแหน่งที่ 4 ของกลูโคสตัวที่ 2 พันธะที่จับกันนี้เรียกว่า พันธะแอลฟา 1,4 กลูโคซิดิก โมเลกุลของอะไมโลสจะมีด้านหนึ่งที่ไม่สามารถดิซซัสสารอื่นได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งสามารถดิซซัสสารอื่นได้ ที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบเกลียวคู่ (double helix) ดังภาพที่2 ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 140,000 อะไมโลสไม่สามารถละลายในน้ำเย็น แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะละลายได้บ้าง และละลายได้ดีในสารละลายที่เป็นด่าง สารละลายอะไมโลสจะทำปฏิกิริยากับสารละลายเจือจางของสารละลายไอโอดีนแล้วให้สีน้ำเงิน สารละลายอะไมโลสที่มีความเข้มข้นพอเหมาะ เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจะได้เจลที่ใสไม่มีสี จากสมบัติของอะไมโลสที่สามารถละลายได้ดีในด่าง และการเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีน จึงใช้เป็นหลักการหาอะไมโลสในตัวอย่างแข่งต่างๆ โดยเอาตัวอย่างมาละลายในสารละลายด่างเจือจาง แล้วนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเจือจางจนได้สีที่คงที่แล้วจึงนำไปวัดค่าการดูดกลืน (absorbance) ที่ 62.5 มิลลิไมครอน จากนั้นจึงนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน


เอกสารนี้ฐาน เพื่อหาปริมาณของอะไมโลสใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อะไมโลเพคตินมีโครงสร้างเพิ่มเติมจากอะไมโลส คือ มีการแตกกิ่งก้านสาขา โดยจุดที่มีการแตกแขนงจะเกิดพันธะที่เรียกว่า พันธะแอลฟา 1,6 กลูโคซิดิก การเกิดแขนงจะเกิดเมื่อกลูโคสมาต่อกันเป็นเส้นตรงยาว 20-25 หน่วย โครงสร้างที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกลียวคู่ที่ต่อกันเป็นกิ่งก้าน ดังภาพที่ 3 ภายในโมเลกุลของอะไมโลเพคตินมักเกิดพันธะไฮโดรเจน เนื่องจากโมเลกุลของอะไมโลเพคติน มีกลุ่มไฮดรอกซิลชนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมิจำนวนมาก อะไมโลเพคตินมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 4 ล้าน และสามารถเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเป็นสีแดง เนื่องจากอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลใหญ่จึงทำให้สตาร์ชมีขนาดโมเลกุลใหญ่มาก



ภาพที่ 2 : สูตรโครงสร้างของอะไมโลส

ที่มา : Abraham and Bernard(1967)



ภาพที่ 3 : สูตรโครงสร้างของอะไมโลเพคติน

ที่มา : Abraham and Bernard(1967)

ภายในเม็ดสตาร์ชจะประกอบด้วยโมเลกุลของอะไมโลส และอะไมโลเพคตินจัดเรียงตัวกันเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ บริเวณหนึ่งมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบคล้ายผลึก โดยเริ่มจากอิลัมของเม็ดสตาร์ชแล้วกระจายออกโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยอะไมโลสเป็นส่วนใหญ่ อะไมโลสจะเข้าไปประกอบตามความยาวกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของอะไมโลเพคติน ทำให้ส่วนนี้มีความหนาแน่นมากกว่าส่วนอื่นจนสะท้อนแสงได้ และปรากฏเป็น ไบรฟรินเจนซ์ บริเวณนี้มีการพองตัวอย่างจำกัด และไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับสารอื่น เรียกว่าบริเวณผลึก (crystalline region) อีกบริเวณหนึ่งมีการเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ ควบคุมไม่ได้และไวต่อปฏิกิริยาเคมีเป็นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนที่อยู่รอบๆผลึก ซึ่งประกอบด้วยอะโมโลฟิคดินเป็นส่วนใหญ่ เรียกส่วนนี้ว่า ออสัญฐาน (amorphous region) บริเวณผลึกและบริเวณออสัญฐาน จะมีการยึดติดกันเป็นมัดๆ เรียกว่า ไมเซล

2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสตาร์ชเมื่อหุงต้ม (สมศักดิ์และสุธี,2541)

1. จากความร้อนชื้น (moist heat)

เมื่อเติมน้ำลงในสตาร์ชเกิดสารแขวนลอยลักษณะยังไม่หนืดข้น เม็ดสตาร์ชที่คงรูปอยู่จะจมลงที่แตกแล้วจะดูดซึมน้ำไว้ แล้วจะพองตัวถ้าเอาสารละลายแป้งในน้ำนี้ไปตั้งไฟ มันจะพองตัวมากขึ้นจะเกิดความหนืดข้นซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและระยะเวลา ในที่สุดสืขาวุ่นจะเปลี่ยนเป็นใส เรียกขบวนการนี้ว่า เจลลาคิไนส์เซชัน (gellatinization) ถ้าต้มต่อไปอีกจะมีอีกตอนหนึ่งความหนืดข้นจะลดลง เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นความหนืดข้นจะเพิ่มขึ้น ซึ่งแป้งแต่ละตัวจะพองตัวใสที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันเมื่อน้ำที่ใช้ในการผสมแป้งนั้นมีน้อยเกินไป หรือเมื่อเอาแป้งเทใส่ลงในของเหลวร้อนๆแป้งจะจับตัวเป็นก้อนๆ เม็ดแป้งที่อยู่นอกจะดูดซึมน้ำและพองตัว แต่เม็ดแป้งภายในก้อนจะแห้งหรืออาจพองตัวได้น้อยมาก ถ้าเราตัดแป้งที่จับเป็นก้อนดูจะเห็นแป้งคิข้างใน ในกรณีเราจะไม่ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการ เช่น ในการทำซอส หรือน้ำเกรวี่ เพื่อป้องกันการเกิดแป้งดังกล่าว จะต้องแยกเม็ดแป้งออกจากกัน โดยการผสมกับไขมันหรือของเหลวเย็นชนิดหนืด หรือน้ำตาล แล้วแต่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใด จึงค่อยใส่ของเหลวร้อนหรือเย็นก็ได้ แล้วจึงตั้งไฟ อย่าใส่แป้งแห้งลงในของเหลวร้อนโดยตรงเพราะแป้งจะจับกันเป็นก้อนได้

2. จากความร้อนแห้ง

เมื่อเอาแป้งไปตั้งไฟโดยไม่ต้องใช้น้ำ เช่น การคั่วแป้ง จะเกิดสีน้ำตาลขึ้น ต่อมาจะเป็นสีดำเพราะเกิดคาร์บอน ในการทำน้ำเกรวี่จะเอาแป้งใส่ถาดแล้วค่อยอบ หรือคั่วในกระทะ แม้ว่าแป้งคั่วนี้จะทำให้ความชื้นน้อยลง แต่มันช่วยในเรื่องสี และกลิ่น ขณะอบหรือคั่วแป้งโมเลกุลของแป้งจะแตกออก ให้ส่วนที่เล็กลง เรียกว่า เด็กซ์ทริน การเปลี่ยนแปลงของสีและขนาดของโมเลกุลของแป้งนี้เรียกว่า dextrinization ตัวอย่างของอาหารที่ขณะทำเกิดขบวนการนี้ขึ้น คือ ขนมปังปิ้ง กะโหลกขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ทงม้วน ขนมเบื้องไทย เด็กทรินมีโมเลกุลหลายขนาดแต่ก็เล็กกว่าสตาร์ชและใหญ่กว่าน้ำตาลในขบวนการย่อยอาหารของคนเรา สตาร์ชจะถูกย่อยให้เล็กลงเป็นเด็กซ์ทรินโดยการกระทำของเอนไซม์ในการทำน้ำเชื่อมข้าวโพด ก็เกิดเด็กซ์ทรินขึ้น แม้ว่าไม่ได้เป็นขบวนการทำที่ใช้ความร้อนแห้ง แต่ก็ยังเป็นผลมาจากการสลายตัวของแป้งด้วยกรดหรือเอนไซม์


2.3.3 การเปลี่ยนแปลงของเม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อน (สมศักดิ์และสุธี,2541)

เมื่อนำแป้งไปละลายน้ำ แป้งจะดูดน้ำเข้าไปและเกิดการพองตัว การพองตัวของแป้งแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ในน้ำเย็นการพองตัวจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น เม็ดแป้งสาลีมีการพองตัวประมาณ 10% เป็นต้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการพองตัวจะมากขึ้น ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส การพองตัวจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นอุณหภูมิที่แป้งเริ่มสุก (gellatinize) และเริ่มกระจายตัวในน้ำ การที่แป้งพองตัวในน้ำเย็นมีขีดจำกัดนั้น เนื่องจากแรงที่โมเลกุลของแป้งเกาะตัวกันมีค่าสูงมาก น้ำเย็นไม่สามารถทำให้โมเลกุลเหล่านั้นแยกตัวออกจากกัน ที่อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดที่เกิด gellatinize น้ำสามารถเข้าไปในแป้งได้มากขึ้น การพองตัวจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.4 การเกิดเจลาตินไนต์เซชัน (Gellatinization) ของเม็ดสตาร์ช (สมศักดิ์และสุชี, 2541)

เม็ดสตาร์ชมีความชื้นในสภาวะปกติ 12-14% ถ้าใส่แป้งหรือ สตาร์ชลงในน้ำเย็นความชื้นในเม็ดสตาร์ชอาจสูงถึง 30% โดยน้ำจะเข้าไปในส่วนที่เป็นออสติฐาน แต่ถ้าน้ำที่เติมลงไปไม่เพียงพอจะทำให้แป้งนั้นร้อนขึ้น ความร้อนจะทำลายพันธะระหว่างโมเลกุล intermolecular bond ในบริเวณผลึก ทำให้เม็ดสตาร์ชสามารถรับน้ำเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้อีกมาก จึงทำให้เม็ดสตาร์ชพองตัวขึ้นจนในที่สุดเม็ดสตาร์ชจะพองตัวเต็มที่ เรียกว่า แป้งสุก หรือเรียกว่า การเกิดเจลาตินไนต์เซชัน(Gellatinization) ของเม็ดสตาร์ช ซึ่งถ้ามองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเม็ดสตาร์ชมีลักษณะเหมือนถุงใสภายในเต็มไปด้วยสารละลายของเม็ดสตาร์ช ส่วนภายนอกเม็ดสตาร์ชจะประกอบด้วยร่างแหของอะไมโลส เป็นส่วนที่ไม่ละลายในน้ำเย็น แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น จะละลายได้บ้าง และสามารถละลายได้ดีในสารละลายต่าง สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเจือจางของสารละลายไอโอดีนแล้วก่อให้เกิดสีน้ำเงินแล้วนำสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ 62.5 มิลลิเมตรจากนั้นนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อหาปริมาณของอะไมโลส ในขณะที่เม็ดสตาร์ชพองตัว การดูดน้ำได้ปริมาณมากของเม็ดสตาร์ช และร่างแหอะไมโลสนั้นเนื่องจาก กลูโคส 1 โมเลกุล จะดูดน้ำได้ถึง 6 โมเลกุล ดังภาพที่ 4 เม็ดสตาร์ชที่มีขนาดใหญ่จะพองตัวได้ง่ายกว่าเม็ดสตาร์ชที่มีขนาดเล็ก เม็ดสตาร์ชที่มีขนาดใหญ่จึงเกิดการเจลาตินไนต์เซชันที่อุณหภูมิต่ำกว่าเม็ดสตาร์ชที่มีขนาดเล็ก การพองตัวของเม็ดสตาร์ชจะทำให้เกิดการสูญเสีย ไบพรีนเจนซ์ เม็ดสตาร์ชของพืชในแต่ละชนิดนั้นมีขนาดไม่เท่ากัน จึงพองตัวที่อุณหภูมิต่างกัน เรียกช่วงที่อุณหภูมิของการเกิดเจลาตินไนต์เซชัน (Gellatinization temperature range) พืชแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิดังกล่าวค่อนข้างคงที่



ภาพที่ 4 : กลูโคส 1 หน่วยอุ้มน้ำได้ 6 โมเลกุล
ที่มา : Furia (1986)

ในขณะที่เม็ดสตาร์ชพองตัวจะพบว่า น้ำแป้งที่มีลักษณะเหลวขาวขุ่นคล้ายน้ำนมจะใสขึ้นเป็นแป้งเปียก ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสังเกต ขบวนการเกิดเจลาตินไนต์เซชัน ซึ่งอาจวัดโดยการวัดค่าการยอมให้แสงผ่าน (light transmittance) ของแป้งเปียก สามารถกระทำได้ที่ความเข้มข้นที่ 5%

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่สังเกตพบเมื่อเม็ดสตาร์ชพองตัวคือ น้ำแป้งจะเพิ่มความหนืดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดสตาร์ชพองตัวขึ้น ทำให้เม็ดสตาร์ชอยู่ใกล้กันมากขึ้น จึงต่อต้านการเคลื่อนที่ของเม็ดสตาร์ช และของเหลวที่อยู่รอบเม็ดสตาร์ชมีความเข้มข้นขึ้น เนื่องจากร่างแหของอะไมโลสที่ละลายออกมาจากเม็ดสตาร์ช

ลักษณะทั้งสองประการคือ การพองตัว การใสขึ้น การหนืดมากขึ้น อาจเกิดในเวลาทีใกล้เคียงกัน หรือ พร้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น เมื่อผู้ใดที่เห็นประโยชน์ของเอกสารนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กัน เปรียบเทียบลักษณะเม็ดสตาร์ชดิบกับเม็ดสตาร์ชที่มีการพองตัว (ดังภาพที่ 5 และ 6) แล้วอาจจะหาคัดหรือแตกได้หากมีการบวมน เช่น การคน การกวน การเพิ่มอุณหภูมิ ดังนั้นจึงสังเกตพบว่า เมื่อต้มน้ำแป้งจนได้แป้งเปียกที่ข้นหนืดเต็มที่แล้ว ถ้าหากให้ความร้อนต่อไปอีกจะทำให้ความหนืดลดลง แต่เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็น แป้งเปียกนั้นจะมีความหนืดมากขึ้น และถ้ามีความเข้มข้นของแป้งที่เหมาะสมจะข้นหนืดจนคงรูปร่างได้ เรียกว่า การเกิดเจล (Gel) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิลดลงแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสตาร์ชและน้ำมีความแข็งแรงขึ้น น้ำจึงจับกับโมเลกุลของสตาร์ชซ้อนกันเป็นชั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าเม็ดสตาร์ชที่พองตัวแล้ว จะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสได้ดีขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเริ่มอบขนมในตู้อบจนถึงอุณหภูมิที่เอนไซม์ถูกทำลาย




ภาพที่ 5 : เม็ดสตาร์ชดิบ
ที่มา : ปราณี (2534)

ภาพที่ 6 : เม็ดสตาร์ชที่พองตัวแล้ว
ที่มา : ปราณี (2534)

การเกิดเจลของเม็ดแป้ง จะเกิดขึ้นเมื่อเม็ดแป้งได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดที่ทำให้แป้งสุก เม็ดแป้งจะขาดคุณสมบัติเดิมทั้งหมด (คุณสมบัติของแป้งดิบ) เนื่องจากมีอะไมโลสบางส่วนได้หลุดออกไปจากเม็ดแป้งแล้ว เมื่อปล่อยแป้งเปียกนี้ให้เย็นตัว แป้งจะมีลักษณะข้นหนืดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโมเลกุลของแป้ง (amylose และ amylopectin) จับตัวกันในสามทิศทาง เรียกว่า การเกิดเจล ความแข็งแรงของเจลขึ้นอยู่กับ การแตกตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของเม็ดแป้งขณะได้รับความร้อน ถ้าแป้งแตกตัวมากเจลจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเม็ดแป้งส่วนใหญ่ยังคงรูปอยู่อย่างสมบูรณ์เจลที่เกิดขึ้นจะนุ่ม ดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 : การพองตัวและการเกิดเจลของแป้ง

ที่มา : Glicksman (1969)

2.3.5 โครงสร้างของเจล (สมศักดิ์และสุธี,2541)

เจลมีโครงสร้างเป็นร่างแห ประกอบด้วยโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน และน้ำประสานเข้าด้วยกัน โดยพันธะระหว่างโมเลกุล (Intermolecular bonds) พันธะนี้จะแข็งแรงขึ้นเมื่อแป้งเปียกเย็นตัวลง พันธะนี้เกิดจากอะไมโลสที่เป็นเส้นตรงและแขนงของอะไมโลเพคติน ซึ่งสามารถงอตัวไปมาเข้าจับกันได้ และอุ้มน้ำไว้เกิดเป็นเจลซึ่งทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวโมเลกุลจำนวนมากเข้าด้วยกันไว้ในร่างแห โดยมีอะไมโลสเป็นส่วนสำคัญของโครงร่างที่เป็นร่างแห เจลจะเกิดได้ดีเมื่อแป้งเย็นตัวอย่างรวดเร็ว หากมีการเย็นตัวอย่างช้าๆ ในโมเลกุลของอะไมโลสอาจเคลื่อนที่จับตัวกันเองอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ผลึกของสตาร์ชซึ่งสังเกตได้จากการตกตะกอนของแป้ง หากแป้งมีอะไมโลสค่อนข้างมากจะเกิดเจลได้เมื่อความเข้มข้น ประมาณ 4-5% ส่วนแป้งที่มีอะไมโลสน้อย หรือ ไม่มีเลย จะเกิดเจลได้ก็ต่อเมื่อ น้ำแป้งมีความเข้มข้นของสูงมากกว่า 30% เพราะที่ความเข้มข้นต่ำๆ การเกิดพันธะระหว่าง โมเลกุลของอะไมโลเพคตินมีน้อยมาก

2.3.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลาตินไนซ์ของสตาร์ช (ทศรัฐ,2541)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลาตินไนซ์ของสตาร์ช ได้แก่

1. ชนิดและปริมาณของสตาร์ชหรือแป้ง จากพืชต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เม็ดสตาร์ชเกิดการพองตัวเต็มที่เป็แป้งเปียกและได้ความหนืดสูงสุดจะแตกต่างกันไป สตาร์ชหรือแป้งที่มีอะไมโลสสูงจะใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าชนิดที่มีอะไมโลสต่ำ และพืชชนิดเดียวกันจะใช้สตาร์ชน้อยกว่าแป้ง (flour) เนื่องจากแป้งมีส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น โปรตีนหรือเยื่อใยผสมอยู่ด้วย เช่น พบว่าความหนืดสูงสุดของแป้งเปียกได้จากสตาร์ชข้าวโพดมีค่ามากกว่าพืชชนิดอื่น เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. อุณหภูมิและเวลา เมื่อต้มน้ำแข็งแต่ละชนิดจนสุกดีแล้ว ได้แบ่งเป็ยกที่มีความหนืดสูงสุดหากต้มต่อไปอีกที่อุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดจะลดลง เนื่องจากการแตกตัวของเม็ดสตาร์ช และการขาดออกจากกันของโมเลกุลอะไมโลสที่อยู่ใตารละลายรอบๆสตาร์ช และการขาดออกจากกันของโมเลกุลอะไมโลสที่อยู่ใตารละลายรอบเม็ดสตาร์ช

3. น้ำตาล น้ำตาลมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นจึงดูดความชื้นแข่งกับแป้งทำให้การพองตัวของเม็ดสตาร์ชเกิดได้ช้าลง แต่พบว่าความหนืดจะเพิ่มขึ้น ถ้าความเข้มข้นของน้ำตาลไม่มากเกินไป ทั้งนี้เพราะความหนืดที่ได้เป็นความหนืดรวมของแป้งกับน้ำตาล

4. ความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าส่วนผสมของน้ำแป้งมีค่า พีเอช ระหว่าง 4-7 จะไม่มีผลต่อความหนืดของแป้งเป็ยกมากนักแต่ถ้าให้พีเอชต่ำกว่า 4 หรือสูงกว่า 7 จะได้แป้งเป็ยกที่มีความหนืดน้อยลงเนื่องจากกรดหรือด่างที่มีอยู่ในน้ำแป้งทำให้โมเลกุลของเม็ดสตาร์ชแตกออกจากกันมีขนาดเล็กลง ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้ทั้งกรด น้ำตาล ผลของกรดที่มีต่อแป้งจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากน้ำตาลทำให้น้ำเข้าไปในเม็ดแป้งไม่สะดวก การทำงานของกรดจึงลดลง

5. น้ำมันและไขมัน ที่ใช้เป็นส่วนผสมจะทำให้เม็ดสตาร์ชดูดน้ำและพองตัวได้ช้าลง เพราะน้ำมันจะห่อหุ้มเม็ดสตาร์ชไว้ทำให้การดูดซับน้ำของเม็ดสตาร์ชลดลง หากต้มน้ำแป้งที่มีไขมันหรือน้ำมันผสมอยู่ควรจะคนหรือกวน จะทำให้การพองตัวของเม็ดสตาร์ชเกิดมากขึ้น แต่ความหนืดของแป้งซึ่งมีไขมันหรือน้ำมันผสมอยู่จะน้อยกว่าปกติ

6. โปรตีน เนื่องจากโปรตีนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ สามารถเกาะตามผิวของเม็ดสตาร์ชได้ ทำให้การซึมผ่านของน้ำเข้าสู่เม็ดสตาร์ชได้น้อยลง ทำให้ได้เจลที่มีกำลังลดลง

2.4 คุณลักษณะที่ต้องการของไอ้กึ่งสำเร็จรูป (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2522)

1. คุณลักษณะทางกายภาพ

ไอ้กึ่งสำเร็จรูปต้องมีสีและกลิ่นรสตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และต้องไม่มีกลิ่นหืนเมื่อนำมาเติมน้ำเดือดตามสัดส่วนที่แจ้งไว้แล้วจะต้องสุกรับประทานทันทีหลังจากเหน้ำเดือดแล้วเป็นเวลา 1 นาที

2. คุณลักษณะทางเคมี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางเคมีของ ไอ้กึ่งสำเร็จรูป

รายการ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิเคราะห์ตามวิธี
ความชื้นไม่เกินร้อยละของน้ำหนัก	5	AOAC(1975)ข้อ14.125 หรือ 14.126

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(2522)

3. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ไอ้กึ่งสำเร็จรูปยอมให้มีจุลินทรีย์ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate count) ต่อกรัมของตัวอย่าง 1×10^5

จำนวนรา (mold) ต่อกรัมของตัวอย่าง 100

จำนวนอีโคไล (*E. coli*) ต่อกรัมของตัวอย่าง(MPN) 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่จะขออนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คลอสทริเดียมเวลชii (*Clostridium welchii* or *Clostridium perfringens*) ต้องไม่พบ ใน 0.01 กรัม ของตัวอย่าง

สเตตาฟีลลอคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) ต้องไม่พบ ใน 0.01 กรัม ของตัวอย่าง
จำนวนซัลโมเนลลา (*Salmonella*) ต้องไม่พบ ใน 25 กรัม ของตัวอย่าง

2.5 การทำแห้ง (สุกนชื้น, 2540)

การทำแห้ง (drying) คือ การลดความชื้นของอาหารจนถึงระดับที่สามารถระงับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ คือ มีค่า water activity ต่ำกว่า 0.70 ทำให้เก็บอาหารไว้ได้นาน

การอบแห้ง คือ การใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า ก๊าซ หรือ ไอน้ำในเครื่องอบแห้งในการทำแห้งจะต้องมีการให้พลังงานแก่อาหาร ทำให้น้ำในอาหารเปลี่ยนสถานะเป็นไอแล้วเคลื่อนย้ายออกจากอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการทำแห้ง จะได้แก่ ธรรมชาติของอาหาร ขนาดและรูปร่าง ตำแหน่งของอาหารในเตา ปริมาณอากาศต่อภาคความสามารถในการรับไอน้ำของอากาศร้อน อุณหภูมิของอากาศร้อนและความเร็วของลมร้อน

2.5.1 ประเภทของการอบแห้ง

1. การอบแห้งแบบตู้ (สมชาติ, 2540)

เป็นการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยลมร้อนในตู้ซึ่งมีถาดบรรจุผลิตภัณฑ์อยู่ วิธีการอบแห้งแบบนี้เป็นแบบพื้นฐาน มีที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุณหภูมิลมร้อนที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการอบแห้งผลไม้ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ถ้าใช้สูงกว่านี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเขียวเข้มซึ่งไม่สวย ผิวอาจเหี่ยวยุบมาก เป็นต้น เวลาที่ใช้อบแห้งอาจจะหลายสิบชั่วโมง

2. การอบแห้งแบบอุโมงค์

เป็นวิธีการอบแห้งที่คล้ายกับการอบแห้งแบบตู้ แต่ตัวตู้มีความยาวมาก ทำให้ดูเหมือนอุโมงค์ ดังนั้นจึงมักเรียกกันว่าอุโมงค์อบแห้ง ภายในอุโมงค์จะมีรถเข็นจำนวนหลายคันบรรจุถาดซึ่งมีผลิตภัณฑ์วางอยู่ ทุก ๆ ช่วงเวลาหนึ่งจะมีการนำเอาถาดเข็นที่ผลิตภัณฑ์แห้งดีแล้วออกจากอุโมงค์ และพร้อมกันนั้นก็มีการบรรจุรถเข็นที่ผลิตภัณฑ์ยังเปียกเข้าไปในอุโมงค์ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลมร้อนและรถเข็นอาจจะเป็นแบบไหลตามกันหรือไหลสวนทางกัน

การอบแห้งแบบไหลตามกันและไหลสวนทางกันมีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของโปรไฟล์ของอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ในเครื่องอบแห้ง กล่าวโดยสรุปอุณหภูมิผลิตภัณฑ์หลังอบแห้งในกรณีของการไหลตามจะต่ำกว่าของการไหลสวนทาง ซึ่งจะทำได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียคุณภาพได้ง่าย เมื่อมีอุณหภูมิสูง แต่ประสิทธิภาพการอบแห้งอาจจะต่ำกว่าได้

3. การอบแห้งแบบสายพาน

โดยการอบแห้งผลิตภัณฑ์บนเครื่องขนถ่ายวัสดุแบบสายพาน ซึ่งตัวสายพานมีรูให้อากาศไหลผ่านได้ ส่วนมากมักจะอบให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปอบแห้งในถังอบแห้งต่อไป เพื่อให้การอบแห้งของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างทั่วถึง อาจมีการกลับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมร้อนจากขึ้นบนสลับกับลงล่าง ในช่วงแรกขณะที่ความชื้นของผลิตภัณฑ์ยังสูงอยู่อาจใช้อุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูงและเมื่อผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ไปตามสายพานระยะหนึ่งและมีความชื้นลดต่ำลงมากแล้ว อาจใช้อุณหภูมิของอากาศต่ำลง เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภัณฑ์ การอบแห้งแบบสายพานเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง ไม่ควรอบแห้งผลิตภัณฑ์จนถึงระดับความชื้นที่ใช้ในการเก็บรักษา เพราะจะสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแห้งมาก ควรลดความชื้นจนถึงระดับหนึ่งแล้วนำผลิตภัณฑ์ไปอบแห้งต่อในเครื่องลดความชื้นแบบอื่น เช่นการอบแห้งในถังเป็นต้น

4. การอบแห้งแบบแช่แข็ง

เป็นการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งมาแล้วภายใต้ภาวะสุญญากาศ ทำให้น้ำแข็งระเหิดกลายเป็นไอ ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์หลังอบแห้งมีโครงสร้างดี คือมีโครงสร้างเปิดเป็นรูพรุน ซึ่งเป็นผลให้สามารถทำให้กลับคืนรูปเดิมได้ดีและรวดเร็ว มีกลิ่นดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลังอบมีความชื้นต่ำ ดังนั้นจึงต้องบรรจุหีบห่อภายในห้องที่มีความชื้นต่ำ เพื่อป้องกันการดูดความชื้นกลับ และอาจต้องใส่สารดูดความชื้นภายในถุงบรรจุผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วย แม้ว่าการอบแห้งแบบแช่แข็งจะได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศ แต่การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงมากด้วย ดังนั้นจึงยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่จะใช้ในงานที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจริงๆ

5. การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ

เป็นการอบแห้งโดยใช้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้แห้ง โดยคลื่นดังกล่าวจะถูกดูดกลืนโดยน้ำที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการระเหยของน้ำจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก การอบแห้งโดยวิธีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะต้องลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายสูง

6. การลดความชื้นโดยออสโมซิส

เป็นการลดความชื้นโดยกระบวนการออสโมซิส ซึ่งทำได้โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ลงในน้ำเชื่อม เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำตาลในผลิตภัณฑ์และน้ำเชื่อมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเกิดการแพร่ของน้ำจากผลิตภัณฑ์สู่น้ำเชื่อม ซึ่งเข้มข้นกว่า เราอาจลดความชื้นได้ครึ่งหนึ่งของความชื้นเริ่มต้น จากนั้นจึงนำไปอบแห้งตามปกติต่อไป

2.5.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารอบแห้ง (คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2539)

กรรมวิธีการผลิตอาหารอบแห้งแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร ดังนี้

1. อาหารผักและผลไม้

อาหารผักและผลไม้วิธีการเตรียมเหมือนการบรรจุกระป๋องคือ การปอกเปลือก ตัดแต่งตัดเป็นขนาดตามความนิยมหรือความสะดวกในการใช้ ผักสีเขียวนิยมแช่สารละลายคาร์บอเนตเพื่อรักษาสีเขียว ผักและผลไม้ที่ง่ายเนื่องจากเอนไซม์ นิยมแช่สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ 1% หรือกรดซิตริก 0.5% หรือโซเดียมไบซัลไฟต์ 0.1% ระหว่างรอการแปรรูป ผักประเภทแป้งนิยมลวกทำลายเอนไซม์ที่ทำให้อาหารมีสีคล้ำ แต่ผักที่ให้กลิ่นเช่นใบมะกรูด กระเพรา ไม่นิยมลวกเพราะกลิ่นรสเสียไปมาก ถ้ามีการลวกต้องมีการทำให้เย็นหลังการลวก มิฉะนั้นอาหารจะเละ หรือเสียรสชาติ ในการอบแห้งผัก ใช้อุณหภูมิช่วงแรก 88-90 องศาเซลเซียส แล้วลดเหลือ 60 องศาเซลเซียส ถ้าไม่ใช้สารประกอบซัลเฟอร์ หรือลดเหลือ 71-74 องศาเซลเซียส ถ้าใช้สารประกอบซัลเฟอร์ ส่วนผลไม้ไม่นิยมใช้อุณหภูมิต่ำเพราะมีน้ำตาล ใช้อุณหภูมิ 60-63 องศาเซลเซียส ความชื้นสุดท้ายของผักประมาณ 4% และผลไม้ประมาณ 10-20%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.อาหารเนื้อสัตว์

นิยมทำแห้ง เนื้อวัว ปลา ปลาหมึกและกุ้ง เนื้อวัวและเนื้อปลาแห้งได้ช้าและเกิด case hardening ได้ง่าย เนื่องจากการเคลื่อนย้ายโปรตีนที่ละลายน้ำมาที่ผิว จึงต้องใช้อุณหภูมิทำแห้งที่ต่ำนิยมใช้ร่วมกับเกลือซึ่งให้ผลดีในเรื่องให้รสชาติและเก็บรักษาได้ที่มีความชื้นไม่ต่ำนัก และมักแห้งเป็นชั้นบางเพื่อให้แห้งได้ง่าย ส่วนปลาหมึกจะแห้งได้ง่ายกว่าเมื่อล้างเอาเมือกที่ผิวออก นิยมทำแห้งปลาหมึกขนาดเล็กทั้งตัวและแล่เป็นแผ่นสำหรับปลาหมึกขนาดใหญ่ ส่วนกุ้งแห้งจะต้มกับเกลือจนสุกทำให้เย็นแล้วทำแห้ง จากนั้นแยกเปลือกซึ่งกรอบด้วยการทุบให้แตก แล้วร่อนออกจากกันปลาป่นที่ใช้ทำอาหารสัตว์ทำจากปลาเล็กปลาน้อยคุณภาพต่ำนำมาหนึ่งให้สุกบีบน้ำออก นำกากปลาที่ได้ไปป้อนต่อจนแห้ง เนื้อปลาที่สุกแล้วไม่เกิด case hardening สามารถใช้อุณหภูมิสูงได้

2.5.3 การคืนรูปอาหารแห้ง(อรุณี,2530)

การคืนรูปหรือการดูดซับน้ำเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของอาหารแห้ง อาหารจำพวก เห็ด เนื้อ ผัก และผลไม้แห้ง บางครั้งอาจจะต้องแช่น้ำไว้นานกว่าจะคืนรูปได้ แต่การใช้เวลานานนี้ยังไม่มีปัญหาทำอาหารที่เสียสภาพการดูดซับน้ำ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณสารที่สามารถดูดซับน้ำได้ เช่น โปรตีนและแป้ง ถูกทำลายในระหว่างการอบ โดยเฉพาะช่วงแรกของการอบ นอกจากนี้ยังขึ้นกับลักษณะของชิ้นอาหาร แต่ที่สำคัญคือเนื้อเยื่อของอาหารถูกทำลาย วิธีแก้ไขอาจกระทำได้โดยปรับอุณหภูมิของช่วงต่าง ๆ ในการอบแห้งให้พอเหมาะ ในกรณีของอาหารผงมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการคืนรูป เช่น

ก. ความสามารถในการดูดน้ำของผิวอาหาร (wettability)

ความสามารถในการดูดซับน้ำของผิวอาหารขึ้นกับขนาดของอาหาร อาหารยังมีขนาดเล็กการดูดซับน้ำจะต่ำ เพราะผลเหล่านี้ไม่สามารถดูดซับน้ำได้ตามลำพังในขณะที่ละลายจึงจับตัวรวมกันเป็นก้อนแน่นทำให้น้ำซึมเข้าลำบาก ดังนั้นการทำให้ผงมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยนำผงมารวมตัวอย่างหลวม ๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ำได้ นอกจากนี้ผิวของผงที่มีไขมันมากทำให้การดูดซับน้ำลดลง อาหารที่มีไขมันอาจต้องเติมสารเพิ่มการกระจายตัว(surface active agents) เช่น เลซิธิน

ข. การจมในน้ำ (sinkability)

อาหารผงที่ละลายน้ำได้ดีจะต้องจมน้ำได้รวดเร็ว ขึ้นกับขนาดและความหนาแน่นของผง

ค. การกระจายตัว (dispersability)

อาหารที่จมน้ำได้ดีจะกระจายตัวได้ดีด้วย แต่ถ้าอาหารรวมกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นจะไม่กระจายตัว

ง. ความสามารถละลายน้ำ (solubility)

ความสามารถในการละลาย และอัตราเร็วของการละลาย ขึ้นกับลักษณะหรือส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร

สรุปได้ว่าผงอาหารจะคืนรูปได้ดี ควรจะมีลักษณะครบทั้งสี่ประการ แต่ที่สำคัญคือขนาดและความโปร่งของผง

2.5.4 เทคนิคที่ช่วยแก้ไขปัญหาคืนรูปคือ

1. เปลี่ยนแปลงสภาพการอบ

เปลี่ยนแปลงสภาพการอบแห้งอาจช่วยเพิ่มการดูดซับน้ำได้ เช่น ความชื้นและอุณหภูมิของอาหาร อัตราเร็วและความดันของหัวฉีด อุณหภูมิของลมร้อน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อขนาดและความแน่นของผงทั้งนั้น

2. การทำให้ผิวอาหารชื้น (rewetting)

วิธีปรับปรุงการคืนรูปของอาหารผงอย่างมีประสิทธิภาพ คือการทำให้ผิวอาหารชื้น โดยพ่นด้วยไอน้ำ อ่อน ๆ ในขณะที่หเวียงอาหารลงสู่ถังอบ ส่วนถังอบจะต้องปลดหัวฉีดอาหารออกใส่หัวพ่นอาหารผงและท่อส่งไอน้ำแทน เมื่อผิวอาหารชื้นจะรวมตัวอย่างหลวม ๆ และมีขนาดใหญ่ขึ้น เม็ดอาหารในช่วงนี้จะมีมากขึ้นมาก จะส่งเข้าเครื่องอบแห้งฟลูอิดไดส์ ซึ่งติดตั้งระบบเขย่าอาหารด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำให้อาหารแห้งและเย็นตัว ส่วนเศษอาหารที่มีขนาดเล็กจะส่งกลับไปในช่วงรวมตัว

พบว่าการรวมตัวอย่างหลวม ๆ นี้ทำให้มีอากาศแทรกอยู่มาก เมื่อละลายเม็ดอาหารน้ำจะเข้าแทนที่ช่องว่างนี้ ทำให้อาหารเปียกและกระจายตัวได้เร็ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3 วัตถุดิบ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 วัตถุดิบ

❁	ปลายข้าวกล้องหอมมะลิจากสวนจิตรลดา
❁	เห็ดหอม
❁	แครอท
❁	ต้นหอม
❁	กระเทียม
❁	จิง
❁	สาหร่ายอบแห้ง
❁	เนื้อหมู
❁	พริกไทยป่น
❁	เกลือเสริมไอโอดีน ตรา ประจักษ์
❁	น้ำตาลทรายขาว ตรา มิตรผล
❁	แป้งข้าวเจ้า ตรา พักโบก


3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

❁	ตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN)
❁	ตู้อบลมร้อนแบบถาด (TRAY DRYER)
❁	โถเก็บความชื้น (DESICCATOR)
❁	เครื่องชั่งละเอียด (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
❁	เครื่องบด
❁	เทอร์โมมิเตอร์
❁	เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่างๆ
❁	เครื่องครัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

3.3.1. การเตรียมปลายข้าวกล้องกิ่งสำเร็จรูป แสดงให้เห็นดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 : กระบวนการผลิตข้าวกล้องกิ่งสำเร็จรูป

ที่มา : ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ(2543)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

3.3.2.1 การศึกษาปัจจัยในการเตรียมปลายข้าวกล้อง โดยศึกษา ปัจจัยการอบปลายข้าวกล้อง อุณหภูมิการแช่ อุณหภูมิและเวลาเข้าเครื่อง Exhaust ที่แตกต่างกันหลังจากนั้นนำมาผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 16 การทดลอง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

การทดลองที่	อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที	อุณหภูมิการ soaking (องศาเซลเซียส)	อุณหภูมิที่เข้า exhaust (องศาเซลเซียส)	เวลาที่เข้า exhaust (นาที)
1	ทำการอบ	60	105	10
2	ทำการอบ	60	105	20
3	ทำการอบ	60	110	10
4	ทำการอบ	60	110	20
5	ไม่ทำการอบ	60	105	10
6	ไม่ทำการอบ	60	105	20
7	ไม่ทำการอบ	60	110	10
8	ไม่ทำการอบ	60	110	20
9	ทำการอบ	70	105	10
10	ทำการอบ	70	105	20
11	ทำการอบ	70	110	10
12	ทำการอบ	70	110	20
13	ไม่ทำการอบ	70	105	10
14	ไม่ทำการอบ	70	105	20
15	ไม่ทำการอบ	70	110	10
16	ไม่ทำการอบ	70	110	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของปลายข้าวกล้อง

ปัจจัยที่นำมาศึกษาซึ่งผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป มีดังนี้คือ

- การอบ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที
- การแช่น้ำ ที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมง
- อุณหภูมิ และเวลาในการเข้า exhaust

นำปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ทดลองศึกษาด้วยปัจจัยดังกล่าวแล้ว มาตรวจสอบคุณภาพ

โดยสามารถแบ่งการตรวจสอบได้ดังนี้ คือ

- ก. ตรวจสอบคุณภาพของปลายข้าวกล้อง หลังจากนำมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือด เป็นเวลา 1 นาที ทำการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทำการทดลอง ซึ่งพิจารณาจากลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่ม เป็นได้น้อยเหมาะสำหรับการทำโจ๊ก
- ข. ตรวจสอบระดับการเกิดเจลาตินไนส์ เพื่อเปรียบเทียบระดับการเกิดเจลาตินไนส์ โดยจะนำปลายข้าวกล้องที่ถูกคัดเลือกจาก 3 ปัจจัย จากข้อ 1.2.1 มาตรวจสอบ
- ค. วิเคราะห์ปริมาณความชื้นของปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปด้วยวิธี AOAC(1995) และวิเคราะห์หา % yield โดยจะนำตัวอย่างปลายข้าวกล้องที่มีระดับการเกิดเจลาตินไนส์ที่สูงที่สุดจากข้อ 1.2.2 มาตรวจสอบ

3.3.2 .การเตรียมส่วนผสมแห้ง เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสและการศึกษาकिनรูปของผักอบแห้ง

3.3.2.1 ผักอบแห้ง

แครอทอบแห้ง เตรียมได้โดยโดยนำแครอทมาล้าง ปอกเปลือกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ายาวขนาด 3X3X3 มิลลิเมตรแล้วจึงนำมาต้มในน้ำเดือดอุณหภูมิ 100 °c เป็นเวลา 12 นาที นำมาจุ่มในน้ำเย็น 10 วินาที แล้วจึงนำมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 °c เวลา 12 ชั่วโมง จะได้แครอทอบแห้งที่คั้นรูปได้ในน้ำเดือด 1 นาที (ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ, 2544)

เห็ดหอมอบแห้ง เตรียมได้โดยนำเห็ดหอมมาแช่น้ำ 10 นาที แล้วจึงนำมาต้มในน้ำเดือดอุณหภูมิ 100 °c เป็นเวลา 15 นาที จุ่มในน้ำเย็น 10 วินาที จึงหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ายาวขนาด 3X3X3 มิลลิเมตรแล้วจึงอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 °c เวลา 12 ชั่วโมง จะได้เห็ดหอมอบแห้งที่คั้นรูปได้ในน้ำเดือด 1 นาที (ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ, 2544)

ต้นหอมอบแห้ง เตรียมได้โดยนำต้นหอมมาล้างให้สะอาด หั่นเป็นท่อนขนาด 3X3 มิลลิเมตร แล้วจึงนำมาลวกในน้ำเดือดอุณหภูมิ 100 °c เป็นเวลา 30 วินาที นำมาจุ่มในน้ำเย็น 10 วินาที แล้วจึงนำมาอบแห้งที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุณหภูมิ 70°C เวลา 12 ชั่วโมง จะได้ต้นหอมอบแห้งที่คืนรูปได้ในน้ำเดือด 1 นาที (ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ, 2544)

3.3.2.2 ผงปรุงแต่ง

จึงผงและกระเทียมผง เตรียมได้โดยนำมาล้าง ปอกเปลือก และหั่นเป็นชิ้นบางๆ จึงนำอบแห้งที่อุณหภูมิ 70°C เวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำมาบดให้ละเอียด แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 28 เมช จะได้จึงผงและกระเทียมผง (ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ, 2544)

3.3.2.3 การศึกษาการคืนรูปของผักอบแห้ง (แครอท , เห็ดหอม)

เตรียมผักอบแห้งคือ แครอท และเห็ดหอม ตามข้อ 3.3.2.1 โดยศึกษาการใช้เวลาในการต้มที่แตกต่างกันก่อนผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน กล่าวคือ นำแครอทและเห็ดหอม มาต้มในน้ำเดือดที่เวลาต่างๆกัน โดยใช้เวลา 10 , 12 และ 15 นาที ตามลำดับ ทำการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

3.3.2.3.1 การตรวจสอบทางด้านประสาทสัมผัส

นำผักอบแห้งที่ผ่านการต้มที่เวลาต่าง ๆ กันทั้ง 3 ตัวอย่างมาคืนรูปโดยใส่ในน้ำเดือด เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำมาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทำการทดลอง ซึ่งพิจารณาจากลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่ม

3.3.2.3.2 การตรวจสอบทางด้านเคมี

นำผักอบแห้งที่ได้จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดจากข้อ 3.3.2.3.1 มาตรวจสอบหาปริมาณความชื้น โดยวิธี AOAC(1995) และตรวจสอบหา % yield

3.3.3. การเตรียมเนื้อหมอบแห้งและศึกษาการคืนรูปของเนื้อหมอบแห้ง

3.3.3.1 เนื้อหมอบแห้ง

เตรียมได้โดยนำเนื้อหมูส่วนที่เป็นเนื้อสันในติดมัน ส่วนติดซี่หัวใจ มาล้างทำความสะอาด แล้วจึงนำมาตุ๋นในน้ำซุปจนเปื่อย จากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จึงนำมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 70°C เวลา 4 ชั่วโมง จะได้เนื้อหมอบแห้ง (ดัดแปลงจากธิดารัตน์และคณะ, 2544)

3.3.3.2 การศึกษาการคืนรูปของเนื้อหมอบแห้ง

ศึกษาการคืนรูปของเนื้อหมอบแห้ง ที่ใช้เวลาในการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนและขนาดของชิ้นเนื้อที่แตกต่างกัน โดยศึกษาเวลาในการอบแห้งที่ 2 , 3 และ 4 ชั่วโมง และศึกษาขนาดของชิ้นเนื้อเท่ากับ 0.5 , 1.0 และ 1.5 ซม³ แบ่งการทดลองได้ 9 การทดลอง นำมาตรวจสอบคุณภาพดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.3.2.1 นำเนื้อหมูบแห้ง 9 ตัวอย่างมาคั้นรูปโดยใส่ในน้ำเดือด เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำมาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยพิจารณาจากลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่ม

3.3.3.3.2 การตรวจสอบทางด้านเคมี นำเนื้อหมูบแห้งที่คั้นรูปได้ดีที่สุดจากข้อ 3.2.1 มาทำการตรวจสอบปริมาณความชื้น โดยวิธี AOAC(1995) และตรวจสอบหา % yield

3.3.4. การผลิตไอ้กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

3.3.4.1 การผลิตไอ้กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป นำส่วนผสมของปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ผักอบแห้ง ผงปรุงแต่งกลิ่นรส และเนื้อหมูบแห้ง ที่เตรียมได้มาผสมรวมกันจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ไอ้กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป โดยมีสูตรพื้นฐานดังนี้ คือ ปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป 100 กรัม ผักอบแห้ง 2.75 กรัม (แครอท 0.9 กรัม ต้นหอม 0.4 กรัม เห็ดหอม 1.15 กรัม และสาหร่าย 0.3 กรัม) ผงปรุงแต่งกลิ่นรส 20.5 กรัม (จิงผง 1.5 กรัม กระเทียมผง 1 กรัม เกลือ 8 กรัม น้ำตาล 9 กรัม และ พริกไทย 1 กรัม) และเนื้อหมูบแห้ง 16.80 กรัม

3.3.4.2 การศึกษาการคั้นรูปและเนื้อสัมผัสของปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ปริมาณแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน นำปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีระดับการเจลาติไนส์ที่ดีที่สุด จากข้อ 1.1 มาผสมแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 0% , 8% , 10% และ 12% ตามลำดับ ตามข้อ 4.1 ได้เป็นไอ้กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป นำไอ้กข้าวกล้องทั้ง 4 สูตรมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือด จำนวน 8 เท่า เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำมาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบ 20 คน ทดสอบโดยใช้วิธี Hedonic scale สเกล 1-5 เพื่อคัดเลือกการทดลองที่ผู้ทดสอบยอมรับมากที่สุด

3.3.5. การตรวจสอบคุณภาพของไอ้กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

นำไอ้กข้าวกล้องที่ได้จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ผู้ทดสอบยอมรับมากที่สุด มาตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้

3.3.5.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ

- ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ประสาทสัมผัสทดสอบ สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส
- ตรวจวิเคราะห์การคั้นรูป โดยเติมน้ำเดือดจำนวน 8 เท่า เป็นเวลา 1 นาที

3.3.5.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น โดยวิธี AOAC(1995)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.6 การศึกษาคุณภาพในการเก็บรักษาของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

เตรียมโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป มาเก็บรักษาในถุงตัวอย่างของ โจ๊กยี่ห้อเบญจมา ที่อุณหภูมิห้อง เก็บตัวอย่าง ทุกๆ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือนมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

3.3.6.1 การตรวจสอบทางด้านเคมี

- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น โดยวิธี AOAC(1995)

3.3.6.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส

- นำมาทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ 20 คน ทดสอบโดยใช้วิธี Hedonic scale สเกล 1-5 โดยนำโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมาคืนรูปโดยเติมน้ำเดือดจำนวน 10 เท่าของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

3.3.6 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

เตรียมตัวอย่างโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปจำนวน 250 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบผู้บริโภค โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคจากหลายๆแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมทั้งออกแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา สภาพครอบครัว รายได้ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า และการบริโภคโจ๊กเป็นอาหารเช้า ตลอดจนความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปถ้ามีการจัดจำหน่าย บันทึกข้อมูลและรายงานผล

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลาตินซ์ของปลายข้าวกล้อง

จากการศึกษาปัจจัยในการอบปลายข้าวกล้อง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือทำการอบปลายข้าวกล้องด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 15 นาที และไม่ทำการอบ พบว่าการนำปลายข้าวกล้องมาอบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 15 นาที เมื่อนำมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาที จะให้ลักษณะทางเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหมาะกับการทำโจ๊กมากกว่าไม่ทำการอบ หลังจากนั้นทำการศึกษาปัจจัยในการแช่น้ำ โดยนำปลายข้าวกล้องมาอบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 15 นาที แล้วนำไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 และ 70 °C เป็นเวลา 1 ชม. พบว่าการแช่น้ำที่อุณหภูมิ 70 °C เมื่อนำมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาที จะให้ลักษณะทางเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากกว่า และสุดท้ายทำการศึกษาปัจจัยของการเข้าเครื่อง exhaust โดยนำปลายข้าวกล้องมาเข้าเครื่อง exhaust ที่อุณหภูมิและ เวลาต่างกัน แล้วจึงนำมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 °C เวลา 8 ชม. และบดร่อนผ่านตะแกรงให้มีขนาด 28 เมช หลังจากนั้นนำมาคัดเลือกการทดลองที่มีลักษณะที่นุ่มและเป็นได้น้อยที่สุดเหมาะแก่การทำโจ๊ก และนำมาตรวจสอบหาระดับการเกิดเจลาตินซ์ ดังตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบระดับการเกิดเจลาตินซ์แล้วนำการทดลองที่มีระดับการเกิดเจลาตินซ์มากที่สุดมาวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น

ตารางที่ 4 ระดับการเจลาตินซ์ของปลายข้าวกล้องหลังผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน

การทดลอง	การทำให้เกิดเจลาตินซ์โดย เข้าเครื่อง exhaust		การทำให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน DG(%)
	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)	
1	105	10	39.97
2	105	20	34.77
3	110	10	66.34
4	110	20	24.14

จากตารางที่ 4 พบว่า การทดลองที่ 3 คือการเข้าเครื่องexhaust ที่อุณหภูมิ 110°Cเป็นเวลา 10 นาที เมื่อนำมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาทีจะให้เนื้อสัมผัสที่มีลักษณะนุ่มมากที่สุดและเมื่อนำมาตรวจสอบหาระดับการเกิดเจลาตินซ์จะได้เท่ากับ 66.34% ซึ่งเป็นระดับการเกิดเจลาตินซ์ที่สูงที่สุด ดังนั้นการทดลองที่ 3 จึงเป็นการทดลองที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปหลังจากการอบแห้ง พบว่าจะมีปริมาณความชื้น เท่ากับ 3.35% และมี %yield เท่ากับ 88.61%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมส่วนผสมผักกึ่งสำเร็จรูป

ในการทดลองนี้จะศึกษาเฉพาะ แครอทอบแห้งและเห็ดหอมอบแห้งเท่านั้น จากการศึกษาปัจจัยเวลาในการต้มของผักกอบแห้ง โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือนำแครอท และเห็ดหอมมาต้มที่เวลา 10, 12 และ 15 นาที ตามลำดับ แล้วนำมาอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 70°C เวลา 12 ชม.

จากการทดลองพบว่าแครอทที่ต้มที่เวลา 12 นาทีจะให้ผลทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มที่สุดเมื่อนำมาคั้นรูป โดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาที ส่วนเห็ดหอมจะต้มที่เวลา 15 นาทีจะให้ผลทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มที่สุดเมื่อนำมาคั้นรูป โดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาทีเช่นกัน

4.2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นและ%yield ของผักกอบแห้ง

นำแครอทอบแห้ง เห็ดหอมอบแห้งและต้นหอมอบแห้งที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มที่สุด เมื่อนำมาคั้นรูปมาตรวจสอบหาปริมาณความชื้น และ % yield ได้ผล ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ปริมาณความชื้น และ% yield ของผักกอบแห้ง

ชนิดผัก	ความชื้น (%)	% yield
แครอทอบแห้ง	1.61	8.03
ต้นหอมอบแห้ง	3.82	13.13
เห็ดหอมอบแห้ง	3.12	75.19

จากการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น พบว่า ผักกอบแห้งทั้ง 3 ชนิด มีความชื้นต่ำกว่าความชื้นมาตรฐานของ ใจักข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2522) ซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์จะมีอายุการเก็บรักษาที่นาน และจากการวิเคราะห์หา % yield ที่ได้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ผักกอบแห้งมี %yield ที่ลดลง เนื่องมาจากการสูญเสียในระหว่างกรรมวิธีในการผลิต เช่น การต้ม การลวก และการอบแห้ง

4.2.2 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

นำเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งได้แก่ จิงผง และกระเทียมผง นำมาตรวจสอบหาปริมาณความชื้น พบว่า มีปริมาณความชื้นที่ต่ำ เมื่อนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์ ใจักข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นรวมไม่เกินความชื้นมาตรฐาน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5%(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2522)

4.3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมเนื้อหมอบแห้ง

ในการเตรียมเนื้อหมอบแห้ง ได้ทำการศึกษาปัจจัยของขนาดของชิ้นเนื้อหมูและเวลาในการอบเนื้อหมู โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 9 การทดลอง พบว่าลักษณะเนื้อสัมผัสและความชื้นของเนื้อหมอบแห้งแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ลักษณะเนื้อสัมผัสและปริมาณความชื้นของเนื้อหมอบแห้ง

การทดลองที่	ขนาดชิ้นเนื้อ (ซม.)	เวลาในการอบ(ชม.)	ลักษณะเนื้อสัมผัส	ความชื้น(%)
1	0.5	2	เนื้อค่อนข้างนุ่ม	5.12
2	0.5	3	เนื้อค่อนข้างแข็ง	3.70
3	0.5	4	เนื้อค่อนข้างแข็ง	3.54
4	1.0	2	เนื้อค่อนข้างนุ่ม	4.70
5	1.0	3	เนื้อนุ่ม	3.60
6	1.0	4	เนื้อนุ่ม อุ่มน้ำ	3.48
7	1.5	2	เนื้อแข็ง คิวหน้าแห้ง	8.38
8	1.5	3	เนื้อแข็ง สีคล้ำ	4.84
9	1.5	4	เนื้อแข็ง สีคล้ำ	4.12

จากตารางที่ 6 พบว่าการทดลองที่ 6 ที่มีขนาดชิ้นเนื้อ 1 ซม. และใช้เวลาในการอบ 4 ชม. เมื่อนำมาคั้นรูปโดยใส่น้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาที จะให้ลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่มที่สุดและมี%ความชื้น เท่ากับ 3.48 % ซึ่งมีความชื้นน้อยที่สุดจากการทดลอง ดังนั้นการทดลองที่ 6 จึงเป็นการทดลองที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมเนื้อหมอกึ่งสำเร็จรูป หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ หา% yield จะได้เท่ากับ 36.36%

4.4 การทดสอบการยอมรับของผู้ทดสอบโดยวิธีทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี Hedonic scale

จากการนำปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่มีระดับการเจลาติไนส์ที่ดีที่สุด คือปลายข้าวกล้องที่อบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 15 นาที แช่น้ำที่อุณหภูมิ 70 °C 1 ชม. และเข้า exhaust ที่ อุณหภูมิ 110 °C 10 นาที มาผสมแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 0% , 8% , 10% และ 12% ตามลำดับและผสมกับส่วนผสมหมอบแห้ง เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส และเนื้อหมอบแห้ง จากนั้นนำมาทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ผู้ทดสอบ 20 คน ที่ชิมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคั้นรูป โดยการเติมน้ำเดือดจำนวน 8 เท่าของน้ำหนักโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำโจ๊กข้าวกล้องสำเร็จรูปที่มีแป้งอยู่ในอัตราส่วนต่างๆ มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้วิธี Hedonic scale ผลแสดงดังตารางที่ 7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่อัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้าที่ต่างกัน

ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	เติมแป้ง 0%	เติมแป้ง 8%	เติมแป้ง 10%	เติมแป้ง 12%
สี	3.35 ^a	3.55 ^a	3.45 ^a	3.35 ^a
กลิ่น	4.00 ^b	3.60 ^{ab}	3.45 ^a	3.30 ^a
รสชาติ	3.50 ^a	3.55 ^a	3.15 ^a	3.35 ^a
เนื้อสัมผัส	3.20 ^a	3.20 ^a	3.40 ^a	3.50 ^a
ความชอบโดยรวม	3.30 ^{ab}	4.15 ^c	3.70 ^{bc}	3.05 ^a

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ ($P > 0.05$)

จากตารางที่ 7 พบว่า การเติมแป้งข้าวเจ้าไม่มีผลต่อความแตกต่างทางด้านสี นั่นคือ ผู้ทดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างทางด้านสีของการทดลองต่างๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ แต่สามารถบอกได้ว่า ผู้ทดสอบชอบสูตรที่มีการเติมแป้ง 8% มากที่สุด โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด ส่วนสูตรที่มีการเติมแป้ง 0% และ 12% พบว่าผู้ทดสอบมีความชอบทางด้านสีน้อยที่สุด

ด้านกลิ่น พบว่า การเติมแป้งข้าวเจ้ามีผลต่อความแตกต่างทางด้านกลิ่น ผู้ทดสอบสามารถแยกความแตกต่างทางด้านกลิ่นของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปได้ โดยผู้ทดสอบชอบกลิ่นของสูตรที่ไม่มีการเติมแป้งมากที่สุด และชอบสูตรที่มีการเติมแป้ง 12% น้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านรสชาติ พบว่า การเติมแป้งข้าวเจ้าไม่มีผลต่อความแตกต่างทางด้านรสชาติของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป แต่สามารถบอกได้ว่าผู้ทดสอบชอบรสชาติของโจ๊กสูตรที่เติมแป้ง 8% มากที่สุด โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด และชอบสูตรที่เติมแป้ง 10% น้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า การเติมแป้งข้าวเจ้าไม่มีผลต่อความแตกต่างทางด้านเนื้อสัมผัสของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป แต่สามารถบอกได้ว่าผู้ทดสอบชอบเนื้อสัมผัสของโจ๊กสูตรที่เติมแป้ง 12% มากที่สุด โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด และชอบสูตรที่มีการเติมแป้ง 8% และ ไม่เติมแป้งน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านความชอบโดยรวม พบว่า ผู้ทดสอบสามารถแยกความแตกต่างทางด้านความชอบโดยรวมของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปได้ โดยผลของความชอบโดยรวมของสูตรต่างๆที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งผู้ทดสอบมีความชอบโดยรวมของสูตรที่เติมแป้ง 8% มากที่สุด และผู้ทดสอบชอบสูตรที่เติมแป้ง 10% , 0% และ 12% ตามลำดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย และชอบสูตรที่มีการเติมแป้ง 12% น้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

สรุปได้ว่า การเติมแป้งมีผลทำให้เกิดความแตกต่างทางด้าน กลิ่น และความชอบโดยรวมซึ่งพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย โดยผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ได้จากสูตรที่เติมแป้ง 8% มากที่สุด โดยแป้งมีผลช่วยเมล็ดข้าวมีการเกาะตัวกันมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความนุ่ม และมีสีที่น่ารับประทาน ดัง

เอกสารนั้นจึงนำการทดลองนี้ไปตรวจสอบคุณภาพต่อไป การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การตรวจสอบคุณภาพของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

นำโจ๊กข้าวกล้องที่เติมแป้งข้าวเจ้า 8% มาผสมกับส่วนผสมแห่งอื่นๆ ตามกรรมวิธีผลิตโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปแล้วจึงนำตัวอย่างมาเติมน้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาที แล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพได้ผลดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 คุณภาพของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

การตรวจสอบคุณภาพ	ปัจจัยคุณภาพ
ทางกายภาพ	สี : มีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งเป็นสีของข้าวกล้อง และมีสีของผักอบแห้ง เนื้อหมูและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสตามธรรมชาติ กลิ่น : มีกลิ่นของข้าวกล้องและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ตามธรรมชาติ รสชาติ : เหมือน โจ๊กทั่วไป ซึ่งมีรสของเนื้อหมูและเครื่องปรุง เนื้อสัมผัส : ปลายข้าวกล้องมีลักษณะนุ่ม ไม่แข็งเป็นไต ส่วนเนื้อหมูและผักอบแห้งมีลักษณะนุ่ม คินรูปได้ดี
ทางเคมี	โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป มีปริมาณความชื้น เท่ากับ 3.19%

จะเห็นได้ว่า โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป มีลักษณะเหมือน โจ๊กทั่วไป เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตได้มีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพมากที่สุดหลังการคินรูปและ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ได้มีความชื้น 3.19% ทำให้มีอายุการเก็บรักษาที่ค่อนข้างนาน

4.6 การศึกษาคุณภาพในการเก็บรักษาของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

นำโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ที่เก็บรักษาในถุงตัวอย่างของโจ๊กยี่ห้อเบญจมา ที่อุณหภูมิห้อง เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือนมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ได้ผลดังตารางที่ 9 และตารางที่ 10

ตารางที่ 9 คุณภาพ ในการเก็บรักษาของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(เดือน)	ปริมาณความชื้นของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป(%)
1	3.23
2	3.35
3	3.54

จากตารางที่ 9 พบว่า การเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ปริมาณความชื้นของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังมีปริมาณความชื้น ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับมาตรฐาน

ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของ โฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 เดือน

ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป	0 เดือน	1 เดือน	2 เดือน.	3 เดือน
สี	3.53 ^a	3.48 ^a	3.43 ^a	3.37 ^a
กลิ่น	3.62 ^a	3.46 ^{ab}	3.39 ^{ab}	3.08 ^b
รสชาติ	3.55 ^a	3.62 ^a	3.44 ^a	3.32 ^a
เนื้อสัมผัส	3.24 ^a	3.19 ^a	3.10 ^{ab}	2.98 ^b
ความชอบรวม	3.98 ^a	3.71 ^{ab}	3.62 ^{ab}	3.48 ^b

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P > 0.05$)

จากตารางที่ 10 พบว่า การเก็บรักษาโฉกข้าวกล้องไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่มีผลต่อความแตกต่างทางด้านสี นั่นคือ ผู้ทดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างทางด้านสีของการทดลองต่างๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ แต่สามารถบอกได้ว่า ผู้ทดสอบชอบสีของโฉกข้าวกล้องที่ผลิตใหม่ๆ โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด และพบว่าผู้ทดสอบมีความชอบทางด้านสีของโฉกข้าวกล้องที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนน้อยที่สุด

ด้านกลิ่น พบว่า อายุการเก็บมีผลต่อความแตกต่างทางด้านกลิ่น ผู้ทดสอบสามารถแยกความแตกต่างทางด้านกลิ่นของโฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปได้ โดยผู้ทดสอบชอบกลิ่นของโฉกข้าวกล้องที่ผลิตใหม่ๆมากที่สุด และชอบโฉกข้าวกล้องที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านรสชาติ พบว่า อายุการเก็บรักษาไม่มีผลต่อความแตกต่างทางด้านรสชาติของโฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป แต่สามารถบอกได้ว่าผู้ทดสอบชอบรสชาติของโฉกข้าวกล้องที่ผลิตใหม่ๆมากที่สุด โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด และชอบโฉกข้าวกล้องที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า อายุการเก็บรักษามีผลต่อความแตกต่างทางด้านเนื้อสัมผัสของโฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป แต่สามารถบอกได้ว่าผู้ทดสอบชอบเนื้อสัมผัสของโฉกข้าวกล้องที่ผลิตใหม่ๆมากที่สุด โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุด และชอบโฉกข้าวกล้องที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

ด้านความชอบรวม พบว่า ผู้ทดสอบสามารถแยกความแตกต่างทางด้านความชอบรวมของโฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปได้ โดยผลของความชอบรวมของสูตรต่างๆที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งผู้ทดสอบมีความชอบโดยรวมของโฉกข้าวกล้องที่ผลิตใหม่ๆมากที่สุด และผู้ทดสอบชอบสูตรที่เก็บรักษาเป็นเวลา 1 เดือนและ 2 เดือนตามลำดับ และชอบโฉกข้าวกล้องที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด

สรุปได้ว่า การเก็บรักษามีผลต่อคุณภาพด้านกลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของโฉกข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาของโฉกต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.7 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

ผลทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15 – 50 ปี จำนวน 250 คน โดยแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ปรุงแล้วพร้อมรับประทาน พร้อมทั้งแบบสอบถามกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จากตารางที่ 11 ผู้บริโภคที่นำมาทดสอบการยอมรับส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 15 – 25 ปี 36 – 40 ปี 41 – 45 ปี 50 ปี และ 46 – 50 ปี ตามลำดับ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว และมีอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว พ่อค้า/แม่ค้า พนักงานเอกชน และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 5,000 – 10,000 บาท/เดือน 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มากกว่า 20,000 บาท และ 15,000 บาท/เดือน ตามลำดับ

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยรับประทานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และนิยมรับประทานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสไก่และหมูซี่ห่อ คนอร์ เบญจมา และมามา ตามลำดับ พฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่รับประทานโจ๊กในช่วงเช้า ความถี่ในการบริโภคส่วนใหญ่คือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และเมื่อทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปพบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 82 และไม่ยอมรับร้อยละ 18 เหตุที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับเพราะไม่ชอบรับประทานโจ๊กและไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อร้อยละ 61 เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร ชอบรสชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคตัดสินใจไม่ซื้อร้อยละ 7 เพราะไม่ชอบรับประทานโจ๊ก และไม่แน่ใจร้อยละ 32 เพราะไม่ทราบราคาและมีห้อยที่รับประทานอยู่แล้ว

ตารางที่ 11 ข้อมูลของผู้บริโภคที่ทำการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์

ปัจจัย	ความถี่ (ร้อยละ)
อายุ	
15 – 25 ปี	30
26 – 35 ปี	31
36 – 40 ปี	14
41 – 45 ปี	10
46 - 50 ปี	6
50 ปีขึ้นไป	9
การศึกษา	
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา	29
มัธยมศึกษา / ปวช.	15
อนุปริญญา / ปวส.	14
ปริญญาตรี	37
สูงกว่าปริญญาตรี	5
อาชีพ	
นิสิต / นักศึกษา	33
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ	5
พนักงานบริษัทเอกชน	15
ธุรกิจส่วนตัว	31
พ่อค้า / แม่ค้า	16
รายได้ต่อเดือน	
ต่ำกว่า 5,000 บาท	40
5,000 – 10,000 บาท	29
10,001 – 15,000 บาท	15
15,001 – 20,000 บาท	6
มากกว่า 20,000 บาท	10
ครอบครัว	
ครอบครัวเดี่ยว	84
ครอบครัวขยาย	16


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 12 พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ทำการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์

ปัจจัย	ความถี่ (ร้อยละ)
การบริโภคอาหารเช้า	
เคย	89
ไม่เคย	11
การบริโภคจ็อกกิ้งสำเร็จรูป	
เคย	94
ไม่เคย	6
ยี่ห้อจ็อกกิ้งที่บริโภค	
คนอร์	52
มามา	29
เบญจา	19
รสชาติของจ็อกกิ้งสำเร็จรูป	
หมู	43
ไก่	39
ทะเล	11
เจ	7
ช่วงเวลาในการบริโภค	
ช่วงเช้า	51
ช่วงกลางวัน	8
ช่วงเย็น	12
ช่วงกลางคืน	29
ความถี่การบริโภคใน 1 สัปดาห์	
ทุกวัน	11
3 – 4 ครั้ง	23
1 – 2 ครั้ง	66
การยอมรับ	
ยอมรับ	82
ไม่ยอมรับ	18
การซื้อ	
ซื้อ	61
ไม่ซื้อ	7
ไม่แน่ใจ	32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป แสดงให้เห็น
 คติภาพที่ 9 พบว่า ทุกระดับอายุมีการยอมรับโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมากกว่าไม่ยอมรับ แสดงให้เห็นว่าโจ๊กข้าว
 กล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตออกมา น่าจะมีแนวโน้มนำไปข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 กรรมต่อไป ได้ แต่ต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างในการผลิตให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 9: ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

5.1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมปลายข้าวกล้อง ซึ่งได้แก่ การอบปลายข้าวกล้อง อุณหภูมิในการแช่น้ำและการเข้าเครื่อง exhaust พบว่าการอบปลายข้าวกล้องที่อุณหภูมิ 120 °C เวลา 15 นาที หลังจากนั้นนำไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ 70 °C เวลา 1 ชม. และนำเข้าเครื่อง exhaust ที่อุณหภูมิ 110 °C เวลา 10 นาที จะมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำเป็นปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป เนื่องจากเนื้อสัมผัสหลังการคั้นรูปมีลักษณะที่นุ่ม ไม่แข็งเป็นไต สามารถคั้นรูปได้ในน้ำเดือดภายในเวลา 1 นาที หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเหนียวมากขึ้น อาจจะทำปลายข้าวกล้องมาผ่านเตาแรงที่มีขนาดเมชเล็กกว่า 28 เมช

5.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมส่วนผสมอบแห้งผักกึ่งสำเร็จรูป

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมส่วนผสมผักกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งก็คือ เวลาในการต้ม พบว่าแครอทต้มใช้เวลา 12 นาที และเห็ดหอมต้มใช้เวลา 15 นาที เมื่อนำมาคั้นรูปด้วยน้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาทีจะให้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหมาะแก่การทำผักอบแห้งมากที่สุด แต่ถ้าต้องการส่วนผสมอบแห้งชนิดอื่น ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่าแครอท และเห็ดหอม ควรที่จะใช้เวลาในการต้มให้นานขึ้น

5.3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมเนื้อหมูอบแห้ง

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมเนื้อหมูอบแห้ง ซึ่งก็คือ ขนาดของชิ้นเนื้อหมู และเวลาในการอบแห้ง จากการทดลองพบว่า เนื้อหมูที่มีขนาดชิ้น 1 ซม³ และอบเป็นเวลา 4 ชม. เมื่อนำมาคั้นรูปด้วยน้ำเดือดเป็นเวลา 1 นาทีจะให้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหมาะแก่การทำเนื้อหมูอบแห้งมากที่สุด หากต้องการชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 ซม³ อาจจะต้องใช้เวลาในการอบที่มากขึ้น แต่ไม่ควรจะมีปริมาณความชื้นมากกว่า 10% เนื่องจากจะมีผลต่ออายุการเก็บรักษา

5.4. การผลิตโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

จากการทดสอบผู้ชิมโดยทางประสาทสัมผัส พบว่า การเติมแป้งมีผลต่อกลิ่นของโจ๊ก ซึ่งถ้าเติมแป้งในปริมาณที่มากขึ้น แนวโน้มความชอบของผู้ทดสอบจะน้อยลง และการทดลองที่มีการเติมแป้งเป็นปริมาณ 8% เป็นการทดลองที่ได้รับการยอมรับของผู้ทดสอบมากที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.8 การศึกษาคุณภาพในการเก็บรักษาโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

การเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ปริมาณความชื้นของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังมีปริมาณความชื้นไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ส่วนคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบไม่พบความแตกต่างของสี รสชาติ ของ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป การเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน มีผลต่อคุณภาพด้านกลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาของโจ๊กต่อไป

5.9 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

ผลทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15 – 50 ปี จำนวน 250 คน โดยแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ปรุงแล้วพร้อมรับประทาน พร้อมทั้งแบบสอบถามกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปพบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 82 และไม่ยอมรับร้อยละ 18 เหตุที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับเพราะไม่ชอบรับประทานโจ๊กและไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อร้อยละ 61 เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร ชอปรสชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคตัดสินใจไม่ซื้อร้อยละ 7 เพราะไม่ชอบรับประทานโจ๊กและไม่แน่ใจร้อยละ 32 เพราะไม่ทราบราคาและมียี่ห้อที่รับประทานอยู่แล้ว

5.10 ข้อเสนอแนะ

5.10.1 ควรบรรจุเครื่องปรุง (ผักอบแห้ง, หมูอบแห้ง และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส) แยกออกจากปลายข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป เพื่อป้องกันความชื้นจากเครื่องปรุงที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง โดยอาจบรรจุเครื่องปรุงลงในถุงออลูมิเนียมฟอยล์

5.10.2 อาจจะมีการเติมวิตามินหรือสารอาหารลงไป เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2537. “การผลิตข้าวกล้องสำเร็จรูป.” รายงานกิจกรรมกรรม วิทยาศาสตร์บริการ, 52:116-130
- “ข้าวกล้อง.” 2001. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.kph.go.th/departmt/social/Hearb13.html>
- คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร. 2539. “การถนอมอาหารโดยการทำแห้ง.” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 93-98. คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- “คู่มือสร้างสุขภาพกับข้าวกล้อง.” 2001 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : <http://www.egat.or.th/thai/broenrice/rice5.html>
- “งานวิจัย แปรรูปข้าว(2).” 2001. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thai.foodmarketexchange.com/dc_ns_index_detail_th.php3?newsid=629
- ณรงค์ นิยมวิทย์. 2538. “องค์ประกอบของข้าวกล้อง.” ธัญชาติและพืชหัว, 12-15. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ทศรัฐ อินแปลง. 2541 “อัตราการเกิดเมล็ดในสีของข้าวเหนียวก่อนการผลิตข้าวเหนียวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง.” สัมมนาปริญญาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ธิดารัตน์ จิรกิจจารุณ, พงนา สาธาระกุล, และสุธิดา แซ่ฮึง. 2543 “โ้จ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป.” ปัญหาพิเศษปริญญาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด
- นรีเทพ เรืองทิพย์. 2544 “การพัฒนาโ้จ๊กพูน้ากึ่งสำเร็จรูป.” วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปรกรณ์พรรณ เผือกสวัสดิ์. 2542 “เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว.” สัมมนาปริญญาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปราณี วราสวัสดิ์. 2534. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืช. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจการเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. กรุงเทพฯ.
- สมชาติ โสภณธรรมฤทธิ์. 2540 “การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารบางประเภท.” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 7
- สมศักดิ์ ภักดีวารภรณ์ และสุธี สุทธิรักษ์. 2541 “ผลของไอน้ำที่มีต่อการเกิดเมล็ดในสีเซชันและการดูดซึมน้ำของข้าวกล้อง.” ปัญหาพิเศษปริญญาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สุคนธ์ชื่น ศรีงาม. 2540. “กระบวนการทำแห้ง.” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 165-172. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2522. “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โ้จ๊กกึ่งสำเร็จรูป.” ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 421:1-4
- อรุณี อภิชาติสร่างกูร. 2530. “การคั้นรูปของอาหารแห้ง.” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารทั่วไป, 168-171. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. คณะเกษตรศาสตร์. โยชนด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Abraham,C. And Bernard,S. 1967. Biochemistry. Fourth edition. Edited by The Chemical Co,Ltd
- AOAC. 1995. Official Method of analysis. 16 th edition, edited by Patricia Cunniff. The Association Of Official Analytical Chemists(AOAC) International, Virginia USA.
- Bhat,B.P.,Chakrabarty,T.K. and Bhatia,B.S.1972. "Technology of Quick Cooking Rice". Indian Food Packer. September – October : 16-27
- Brich, G. G. and Priestly, R. J. 1973. Degree of Gelatinization of Cooked rice. Die Starke. 2(3):98-100.
- Furia,T.E. 1968. Handbook of Food Additives. The Chemical Rubber Co.Ltd,Ohio,USA.
- Glicksman,M. 1969. Gum Technology in Food Industry. Academic Press Inc,New York. USA
- Luh,B.S. 1991. "Quick Cooking Rice". In Rice:Utilization edited by Luh,B.S.New York.Van Nostrand Reinhold
- Roberts,R.L.1985. "Quick Cooking Rice". In Rice:Chemistry and Technology edited by Juliano,B.O.St.Pual.Minn.The American Association of Cereal Chemists.
- Weibye,B.1983. Quick Coking Rice and Process for Making The Same.U.S.Pat.4,385,074.May 24

ภาคผนวก ก

แบบประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส

ชื่อ (ผู้ทำการชิม) วันที่

คำชี้แจง : โปรดประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆของไอ้ก๋วยจั๊วกุ้งสำเร็จรูป โดยให้ผู้ชิมให้ระดับคะแนนตามความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้อธิบายความรู้สึกชอบและไม่ชอบในระดับใด ดังนี้

ไม่ชอบ = 1 ชอบเล็กน้อย = 2 ชอบปานกลาง = 3
 ชอบ = 4 ชอบมาก = 5

ข้อแนะนำในการทดสอบ

ก่อนทำการชิมควรดื่มน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

รหัสตัวอย่าง _____

สี _____

กลิ่น _____

รสชาติ _____

เนื้อสัมผัส _____

ความชอบโดยรวม _____


คำแนะนำ

.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

♣ วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น




ภาคผนวกที่ 1 : แผนผังแสดงวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น

ที่มา : AOAC(1995)

หมายเหตุ: หาคความชื้นผั้ อุณหภูมิ 100°C เวลา 2 ชม. และเนื้อหุม อุณหภูมิ 105°C เวลา 3 ชม.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

♣ วิธีการวิเคราะห์หาระดับการเกิดเจลาตินไนต์



ภาคผนวกที่ 2 : แผนผังแสดงวิธีการวิเคราะห์หาระดับการเกิดเจลาตินไนต์

ที่มา : Brich and Priestly (1973)

หมายเหตุ : วิธีการคำนวณน้ำหนักฐานแห้ง


สมมติ ข้าวที่บดแล้วมี % MC = 8.8275 และต้องการน้ำหนักฐานแห้ง 10 กรัม

จากสูตร Weight dry basis = $100 \cdot x / (100 - 8.8275)$

จะต้องชั่งข้าวเท่ากับ = $100 \cdot 10 / (100 - 8.8275)$ กรัม

= 10.9682 กรัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



กราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์ปริมาณ DG (%) ของข้าวหอมมะลิ 620 นาโนเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Standard Curve

ตัวอย่างข้าวหอมมะลิ

สมการ $Y = mx + c$

DG (%) = $415.293(OD) - 83.1679$ เมื่อ $\alpha = 0.05$, $R^2 = 0.926$

♣ วิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการทดลอง

10 N KOH เตรียม 500 ml

$$\begin{aligned} \text{M.W KOH} &= 39+16+1 \\ &= 10 \times 56 \times (500/1000) \\ &= 280 \text{ g ปรับปริมาตร 500 ml} \end{aligned}$$

0.5 N HCL เตรียม 500 ml

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร } V &= \frac{M M' \times 1000}{Pd} \\ \text{เมื่อ } V &= \text{ปริมาตรกรดความเข้มข้นที่ต้องการเตรียมเป็นสารละลาย (l)} \\ M &= \text{ความเข้มข้นที่ต้องการเตรียม (mol/l)} \\ M' &= \text{M.W} \\ P &= \% \text{ความเป็นกรดของ HCL (ระบุข้างขวด)} \\ d &= \text{ความหนาแน่นของกรด} \\ V &= \frac{0.5 \times 36.46 \times 100}{37 \times 1.19} \\ &= 41.40 \text{ ml} \end{aligned}$$

ใช้กรด 41.40 ปรับปริมาตร 1000 ml

หรือใช้กรด 20.70 ปรับปริมาตร 500 ml

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

รูปภาพ




ภาพที่ 10 : การนำข้าวเข้าเครื่อง exhaust



ภาพที่ 11 : การนำข้าวเข้าเครื่อง TRAY DRYER

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 12 : ปลายข้าวกล้องกิ่งสำเร็จรูปอบแห้ง



ภาพที่ 13: ผักอบแห้งอบในตู้อบลมร้อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 14: แครอทอบแห้ง




ภาพที่ 15 : เห็ดหอมอบแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 16: ต้นหอมอบแห้ง




ภาพที่ 17: จิงผง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 18: กระจ๊ะเทียมผง



ภาพที่ 19: หมอบแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้