

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดโกโก้
ที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อตามธรรมชาติ



นายอดิพล บุญเรืองถาวร
นายอนุรักษ์ อมรเศรษฐชัย
นางสาวอัญญรัตน์ เศรษฐาภินันท์

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นพ.

๐๑๔๒ ๙

พ.ศ. 2539

เลขหมู่..... 2839

เลขทะเบียน..... 28144

วัน, เดือน, ปี. 17. 0. 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Comparative Studies on Quality of Fermented Cocoa Bean
Inoculated with Isolated Microorganisms**



Mr.Atipol Boonraungthavorn

Mr.Anurak Amornsetthachai

Miss Anyarat Setthapinan

**A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement for the Degree of Bachelor of Science**

Department of Applied Biology

Faculty of Science

King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang

1996

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ด โกโก้ที่ได้จาก
การหมักด้วยเชื้อตามธรรมชาติ

นักศึกษา นายอดิพล บุญเรืองถาวร
นายอนูรักษ์ อมรเศรษฐชัย
นางสาวอัญญรัตน์ เศรษฐาภินันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดวงใจ โอชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล


ภาควิชา ชีววิทยาประยุกต์


ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง อนุมัติให้นำโครงการพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลัก
สูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต


----- หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประยุกต์
(ผศ.ดร.พรณี จิตาภิชิต)

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการพิเศษ


----- ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.พรณี จิตาภิชิต)


----- กรรมการ
(อาจารย์ดวงใจ โอชัยกุล)


----- กรรมการ
(ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

cerevisiae และแบคทีเรียกลุ่มแลคติกทั้งหมดที่แยกได้ และตีกว่าชุดการทดลองควบคุม ซึ่งไม่มีการเติมจุลินทรีย์ในกองหมัก โดยพบปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก กรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสีติก และกรดแลคติกในชุดการทดลองที่หนึ่งต่ำกว่าชุดการทดลองอื่น ส่วนค่าดัชนีการหมักในชุดการทดลองที่หนึ่งจะมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองอื่น เมื่อนำค่าเหล่านี้มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ชุดการทดลองทั้งสามไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Special Project Title Comparative Studies on Quality of Fermented Cocoa Bean Inoculated with Isolated Microorganisms

Name Mr. Atipol Boonruangthavorn
Mr. Anurak Amornsetthachai
Miss Anyarat Setthapinan

Special Project Adviser Mrs. Duangjai Ochaikul

Co-adviser Miss Orawan Chailapakul

Department Applied Biology

Academic year 1996

Abstract

The changes of total amounts of microorganisms, yeasts, lactic acid bacteria and acetic acid bacteria were high in the day of fermentation and the highest in the second day of fermentation. The counts of total microorganisms, yeast and lactic acid bacteria were 4.25×10^7 , 2.85×10^7 and 2.85×10^7 CFU/g respectively. For acetic acid bacteria, the highest amount obtained in the third day of fermentation which a value of 7.5×10^6 CFU/g. After that their amounts were decreased. From the studies on classification of yeasts, it was found that Saccharomyces cerevisiae was the most common during fermentation, while Candida tropicalis and Candida sorbosa were found in equal amount. For lactic acid bacteria, Lactobacillus was found the most common in the early stage of fermentation and Streptococcus was found the most abundant at the end stage of fermentation.

Studies on biochemical changes of cocoa bean isolated after fermentation found that the first treatment added with all yeasts had better result than the second

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

treatment added with *Saccharomyces cerevisiae* and all lactic acid bacteria and also better than the control treatment which had no addition of microorganisms. The types of acids found were citric acid, volatile acid in the form acetic acid and lactic acid which were lower in the first treatment than in other treatments. The fermentation index in the first treatment was higher than in others. For statistical analysis suggested that all treatments were insignificantly different.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดวงใจ โอชัยกุล และ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษที่กรุณาให้คำแนะนำในการทำโครงการพิเศษ และตรวจทานแก้ไขโครงการพิเศษ ขอขอบพระคุณผศ.ดร.พรรณี ฐิตาภิชิต ประธานกรรมการ ที่กรุณาให้คำแนะนำและตรวจทานแก้ไขโครงการพิเศษให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำโครงการพิเศษตลอดมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาชีววิทยา ประยุกต์ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำโครงการพิเศษทำให้โครงการพิเศษ สำเร็จสมบูรณ์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ โครงการงานพิเศษภาษาไทย	ก
บทคัดย่อ โครงการงานพิเศษภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1	
บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์	3
1.2 ขอบเขตโครงการพิเศษ	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2	
2.1 พันธุ์โกโก้	5
2.2 การหมักเมล็ดโกโก้	5
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการหมัก	9
2.4 การทำแห้ง	13
2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง	14
2.6 การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง	16
2.7 ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ของเมล็ดโกโก้	16
2.8 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	16
2.9 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมัก	21
2.10 เอนไซม์ในเมล็ดโกโก้	23
2.11 คุณภาพและรสชาติ	24
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ	27
บทที่ 4 ผลการทดลอง	34
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	52

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ภาคผนวก ก	54
ภาคผนวก ข	60
ภาคผนวก ค	68
ภาคผนวก ง	74
ภาคผนวก จ	76
เอกสารอ้างอิง	77



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการหมักกับค่า cut-test ของเมล็ดโกโก้ การเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสช็อคโกแลตและการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนี ขององค์ประกอบต่าง ๆ	15
2. แสดงชนิดของยีสต์ที่แยกได้จากการหมักของเมล็ดโกโก้	19
3. แสดงปริมาณของกลิ่นรสและการย่อยสลายโปรตีนหลังจากทำการบ่มเมล็ด โกโก้ที่อุณหภูมิต่างๆ	25



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1. การหมักในเชิง	6
2. การหมักในถังไม้	7
3. การหมักเป็นกองสูงบนพื้น	8
4. การหมักในกระบะหรือถาดไม้	9
5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	34
6. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมักระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	35
7. การเปลี่ยนแปลงยีสต์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	36
8. การเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของยีสต์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	37
9. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียแอสซิดิกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	38
10. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียแลคติกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้	39
11. ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากกองหมักเมล็ดโกโก้	40
12. การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ	41
13. การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ	42
14. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมักเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ	43
15. การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริกระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองต่างๆ	44
16. การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ	45
17. การเปลี่ยนแปลงกรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสซิดิกระหว่างการหมักของเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองต่างๆ	46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

18. การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในรูปน้ำตาลกลูโคสในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้
ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ 47
19. การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในรูปน้ำตาลกลูโคสในเมล็ด โกโก้
ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ 48
20. การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก
ของชุดการทดลองต่าง ๆ 49
21. การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของ
ชุดการทดลองต่างๆ 50
22. การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีการหมักระหว่างการหมักเมล็ด โกโก้ของชุดการ
ทดลองต่างๆ 51



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

โกโก้(Theobroma cacao L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง และเป็นพืชยืนต้นพุ่มเตี้ย ที่มีองค์ประกอบของเมล็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งเมล็ดประกอบด้วยไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ บริโภคในรูปเครื่องดื่มและอาหารขบเคี้ยวเช่น ช็อกโกแลต โกโก้เริ่มปลูกครั้งแรกในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ต่อมาจึงแพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก กลุ่มประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ คือ ไอเวอรีโคสต์ กานา บราซิล ในจีเรียและมาเลเซีย โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศนำเข้ามากที่สุด(ประพันธ์ บุญกลิ่น ขจร และคณะ. 2529)

ประเทศไทยมีความต้องการผลิตภัณฑ์โกโก้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี มีการนำเข้าทั้งในรูปแบบเมล็ดโกโก้แห้งและผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าได้แก่ โกโก้เพสต์ ไขมันโกโก้ ช็อกโกแลต และอาหารอื่น ๆ ที่ผสมโกโก้ ขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถส่งออกเมล็ดโกโก้แห้งไปยังต่างประเทศได้ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์โกโก้ เช่น ช็อกโกแลต ผงโกโก้และอาหารปรุงแต่งอื่นๆที่มีโกโก้ ตลาดส่งออกเมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์โกโก้ที่สำคัญได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง และเวียดนาม(ยอดยิ่ง คงทอง, 2529;มณฑา ส.รัตนูปถัมภ์, 2531)

โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6(พศ.2530-2534) ได้มีการส่งเสริมการผลิตตามแผนการผลิตเพื่อขายและกระจายการผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้า แต่ในระยะเวลาดังกล่าว นับได้ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้(ปิยนุช นาคะ, 2537) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกโกโก้ทั้งหมด 18,732 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 10,001 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ 15,002 ไร่ ส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ปลูกโกโก้ 400 และ 3,326 ไร่ ตามลำดับ (ปิยนุช นาคะ, 2537) การปลูกโกโก้ที่นั่นทำได้ 2 ลักษณะดังนี้ คือ ปลูกแบบพืชเดี่ยว และปลูกเป็นพืชแซมระหว่างพืชอื่น เช่น มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าวมากที่สุด เพื่อเป็น

การเสริมรายได้ นอกจากนั้นยังมีผลให้มะพร้าวออกลูกดกขึ้น (มณฑา ส.รัตนูปถัมภ์, 2531) สำหรับปริมาณความต้องการใช้โกโก้เพื่ออุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งมากขึ้น อัตราปีละ 15,000 ตัน ดังนั้นการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง จึงมีความจำเป็นมากขึ้น

กรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งนั้นมีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การหมักเมล็ดโกโก้ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดโกโก้สด โดยเฉพาะสีและกลิ่นรส และขั้นตอนการอบแห้งเมล็ดโกโก้ การหมักมีผลสำคัญต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้ โดยขบวนการหมักจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโกโก้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองส้ม การเก็บเกี่ยวผลโกโก้ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเยื่อหุ้มเมล็ด โดยน้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งในที่สุดจะเปลี่ยนไปเป็นกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ โดยกิจกรรมของยีสต์และแบคทีเรีย มีผลให้อุณหภูมิของกองหมักสูงขึ้นและเมล็ดโกโก้สูญเสียการงอก ส่วนเมล็ดโกโก้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่อองค์ประกอบของโปรตีนและไนโตรเจนมีการสร้างสารตั้งต้นของกลิ่นรสช็อคโกแลตขึ้นมา (Knapp,1937; Forsyth, 1952; Wood,1985; Rohan,1963) แต่กลิ่นรสช็อคโกแลตนั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการนำเมล็ดโกโก้ที่ได้จากการหมักไปตากแห้งแล้วนำไปคั่ว

จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการหมัก คือ ยีสต์ แบคทีเรียแลคติก และแบคทีเรียแอซิดิก โดยยีสต์เจริญในระยะแรกของการหมักและสร้างแอลกอฮอล์ ต่อมาแบคทีเรียแอซิดิกเจริญขึ้นและเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดแอซิดิก ส่วนแบคทีเรียแลคติกพบได้ตลอดการหมัก แต่เจริญได้ดีในช่วงที่ยีสต์เริ่มลดจำนวนลง ก่อนที่แบคทีเรียแอซิดิกเจริญขึ้นแทนที่ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของเยื่อหุ้มเมล็ดในระหว่างการหมัก คือ ในระยะแรกเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้มีสีชมพูหรือสีขาว ต่อมาเมื่อเกิดการหมักจะมีสีดำขึ้น และเมื่อจางหายไป โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมา ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดโดยกิจกรรมของเอนไซม์ชนิดต่างๆ ทำให้เกิดกลิ่น รสช็อคโกแลตขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ที่ทำการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากการหมักตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากธรรมชาติ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ ปริมาณกรดแอสซิติค เปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุมที่หมักเมล็ดโกโก้ตามธรรมชาติ

1.2 ขอบเขตโครงการพิเศษ

ทำการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากการหมักเมล็ดโกโก้ตามธรรมชาติ จากนั้นทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ด้วยเชื้อที่แยกได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงขบวนการผลิตเมล็ดโกโก้ให้ได้เมล็ดโกโก้ที่ดีมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
3. เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดโกโก้ต่อไป

บทที่ 2

บทตรวจสอบเอกสาร

โกโก้เป็นพืชยืนต้นเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศเขตร้อนและชุ่มชื้นเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนถึงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต ในแหล่งที่มีฝนตกสม่ำเสมอ โกโก้เป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก ส่วนใหญ่ต้องการร่มเงาจากพืชอื่น ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกโกโก้ ควรเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุมาก ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินระหว่าง 5.5-7.0 อุณหภูมิที่เหมาะสม 24-29 องศาเซลเซียส ผลโกโก้มีลักษณะคล้ายมะละกอ ภายในผลหนึ่งๆ มีเมล็ดอยู่ประมาณ 30-45 เมล็ด ขึ้นกับพันธุ์โกโก้ (สมศักดิ์ วรรณศิริ, 2532) แหล่งปลูกโกโก้ในประเทศไทยที่สำคัญคือ ภาคใต้ของประเทศ นอกจากนี้ยังปลูกในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคกลางอีกด้วย (อรพิน ภูมิภมร และคณะ, 2536) กลุ่มประเทศผู้ผลิตที่สำคัญได้แก่ ไอเวอรีโคส กานา บราซิล ในจีเรียและมาเลเซีย โกโก้เป็นพืชที่เกษตรกรผู้ปลูกจำหน่ายในรูปแบบเมล็ดโกโก้แห้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าจำหน่ายในรูปแบบของเมล็ดโกโก้เปียก เกษตรกรต้องรีบจำหน่ายโดยเร็ว ภายในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากเก็บเกี่ยวผล หรือภายในเวลา 2 วัน ถ้าแกะเมล็ดออกจากฝักแล้ว ตลาดรับซื้อจะนำเมล็ดโกโก้แห้งส่งโรงงานแปรรูปเป็นโกโก้ผง โกโก้เหลวและช็อคโกแลต โรงงานอุตสาหกรรมจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ เช่นทำเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนมขบเคี้ยว ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใช้เพิ่มกลิ่นและรสชาติในอาหารจำพวกคุกกี้และเค้ก ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เช่นน้ำหอม ลิปสติก ใช้ผสมในอุตสาหกรรมนุหรีและอุตสาหกรรมผลิตยาเป็นต้น (พานิต งานกรณาธิการและวิทย์ สุวรรณวุธ, 2531) นอกจากนี้เปลือกโกโก้ยังใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้อีกด้วย เพราะมีปริมาณมาก แร่ธาตุสูง และมีปริมาณสารทรีโอโบรมินต่ำ (Abiola and Tewe, 1991)

2.1 พันธุ์โกโก้ แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ (พานิต งานกรณาธิการ, 2532; Wood, 1975) คือ

2.1.1 สายพันธุ์ครีโอลโล ผลมีสีแดงหรือเขียว เปลือกบาง ผิวขรุขระ ก้นผลแหลมและผลยาว เมื่อสุกผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือส้ม เมล็ดขนาดใหญ่มีสีขาวหรือม่วงอ่อน สายพันธุ์นี้จะให้กลิ่นและรสชาติดี ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตช็อกโกแลต แต่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ำและไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงจึงไม่นิยมปลูก

2.1.2 สายพันธุ์ฟอร์ราสเทอโร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

2.1.2.1 เวสต์แอฟริกันอะมิโลนาโด (West African Amelonado) ผลมีสีเขียว เมื่อสุกฝักมีสีเหลืองเปลือกหนา ก้นมน เมล็ดแบนกว่าพันธุ์ครีโอลโล และมีสีม่วงเข้ม สามารถผสมตัวเองได้จึงไม่ค่อยกลายพันธุ์ แต่เป็นพันธุ์ที่ไม่ทนต่อโรคยอดแห้งและกิ่งแห้ง แต่สามารถต้านทานต่อแมลงได้ดี เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด

2.1.2.2 อัปเปอร์อเมซอน (Upper Amazon) เป็นพันธุ์ที่เจริญได้รวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง ต้านแข็งแรง เจริญเติบโตดี ทนทานต่อการรบกวนของโรคและแมลงบางชนิด กลายพันธุ์ได้ง่าย ผลมีลักษณะสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองเมล็ดขนาดเล็กสีม่วงเข้ม ขนาดของผลใกล้เคียงกับพันธุ์อะมิโลนาโด

2.1.3 สายพันธุ์ทรินิตาโร (Trinitario) ผลและเมล็ดมีขนาดใหญ่ ก้นผลแหลม เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ครีโอลโลกับพันธุ์เวสต์แอฟริกันอะมิโลนาโด ให้ผลผลิตต่ำกว่าพันธุ์เวสต์แอฟริกันอะมิโลนาโด นิยมปลูกด้วยการตัดตา หรือปักชำ (วิทย์ สุวรรณวร, 2527)

2.2 การหมักเมล็ดโกโก้

การหมักเมล็ดโกโก้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างสารตั้งต้นของสารให้กลิ่นรสช็อกโกแลต การหมักยังช่วยป้องกันการย่อยสลายไขมันเนยโกโก้ได้ และยังช่วยเร่งการย่อยสลายเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ให้เร็วขึ้น ทำให้สามารถทำแห้งเมล็ดโกโก้ที่ได้จากการหมักง่ายขึ้น (Zak et al., 1972)


หลังจากเก็บเกี่ยวผลโกโก้ที่สุกจากต้นมากองไว้ ต้องแกะฝักแยกเอาเมล็ดโกโก้ ออกมาใส่ในภาชนะสำหรับหมัก อาจใช้ขังสาน ลังไม้ กระบะ หรือกองบนพื้น ขณะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดเป็นการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หมักมีการกลับเมล็ดเป็นครั้งคราวเพื่อให้อากาศแก่กองหมัก และเป็นการผสมเมล็ด
โกโก้ที่หมักให้เข้ากัน ทำให้การหมักเกิดสม่ำเสมอ วิธีการหมักเมล็ดโกโก้มีหลายวิธี
ต่างๆ กันดังนี้คือ

2.2.1 การหมักในเข่ง (Basket Fermentation)

เป็นวิธีที่นิยมกันมากในหมู่เกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย จะ
บรรจุโกโก้สดลงในเข่งที่รอบเข่งด้วยใบตองสด บรรจุประมาณ 25-30 กิโลกรัม ปิดทับ
ผิวหน้าเมล็ดโกโก้ในเข่งด้วยใบตองสด 2-3 ชั้น นำเข่งตากแดดไว้ 2 วัน จึงถ่ายโกโก้ลง
เข่งใหม่ กลมด้วยใบตอง เมื่อครบ 2 วันถ่ายเมล็ดโกโก้ลงในเข่งใบแรกทิ้งไว้ 2 วัน เมื่อ
หมักครบ 7 วัน ก็นำเมล็ดโกโก้ออกจากเข่งนำไปตากแดด(Wood and Lass,1985) ดัง
แสดงในรูปที่ 1 สำหรับเกษตรกรในประเทศไทยพบว่าร้อยละ 78 ใช้เข่งเป็นภาชนะ
บรรจุในการหมัก เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมทำการหมักเป็นเวลา 5-7 วัน มีการกลับเมล็ด
ทุก 2 วัน (ไพบูลย์ ชรรมรัตน์วาลิก และคณะ, 2534)




รูปที่ 1 การหมักในเข่ง

ที่มา : Rohan (1963)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.2 การหมักในถังไม้ (Box Fermentation)

การหมักแบบนี้ใช้ในสวนขนาดใหญ่หรือในโรงงานรับซื้อเมล็ดโกโก้สด ขนาดของถังไม้ที่ใช้หมักขึ้นอยู่กับปริมาณของเมล็ดโกโก้สด ถังไม้ทำจากไม้เนื้อแข็งและมีร่องเล็กๆ ด้านใต้ เพื่อให้ น้ำหมักที่เกิดขึ้นไหลออกได้ โดยขนาดของร่องกว้าง 15 มิลลิเมตร ระยะห่างกัน 10-15 มิลลิเมตร ขนาดของถังไม้ควรจะมีควมลึกไม่เกิน 0.75 เมตร นิยมใช้ถังไม้ในการหมักของประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ ด้านบนปิดด้วยใบตองหรือกระสอบ ทำการหมัก 6 วันโดยมีการกลับเมล็ดทุกวันหรือ ทุก 2 วัน การกลับกองหมักกระทำโดยการถ่าเมล็ดโกโก้จากถ่่งใบที่หนึ่งไปยังถ่่งอีกใบหนึ่งซึ่งปกตวางอยู่ในระดับต่ำกว่ถ่่งใบแรกและวางติดกัน วิธีนี้ให้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพดีเช่นกัน (ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาศิก และคณะ, 2534; อรพิน ภูมิภมร และคณะ, 2536)



รูปที่ 2 การหมักในถังไม้


ที่มา : Rohan (1963)

2.2.3 การหมักเป็นกองสูงบนพื้น (Heap Fermentation)

นำเมล็ดโกโก้เล็กน้อยน้ำหนักประมาณ 450 กิโลกรัม นำมากองไว้บนใบตองสดซึ่งปูไว้และมีไม้ท่อนยาวรองไว้ข้างล่างเพื่อให้ของเหลวไหลออกได้ระหว่างการหมักแล้วคลุมทั้งกองเมล็ดโกโก้ด้วยใบตองสดอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้อุณหภูมิของเมล็ดโกโก้ที่หมักสูงขึ้น โดยให้มีความสูงของกองเมล็ดโกโก้ประมาณ 60-90 เซนติเมตร กลับเมล็ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทุก 2 วัน โดยคลุกเมล็ดกลับไปมาให้เข้ากันและหมักนาน 6 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3 แล้วจึงนำไปตากแดดให้แห้ง (Wood and Lass ,1985)




รูปที่ 3 การหมักเป็นกองสูงบนพื้น

ที่มา : Rohan (1963)

2.2.4 การหมักในกะบะหรือถาดไม้ (Tray Fermentation)

การหมักโดยวิธีนี้เหมาะกับโกโก้ที่มีปริมาณน้อย โดยภาชนะมีหลายขนาดได้แก่ 90x90x10 เซนติเมตร หรือ 90x90x13 เซนติเมตร เป็นต้น โกโก้ที่ใช้หมักในกะบะเช่นนี้ จะต้องใช้อย่างน้อย 8-12 ถาด วางซ้อนทับกันเพื่อให้มีความร้อนเพียงพอ โดยในแต่ละถาดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ถาดบนสุดจะปิดด้วยใบตองและชั้นของถาดทั้งหมดจะคลุมด้วยกระสอบ ส่วนใหญ่จะเว้นถาดสุดท้ายให้ว่าง เพื่อให้มีการให้อากาศได้ดีโดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 4 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4 การหมักในถาดไม้
ที่มา : Rohan (1963)

2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการหมัก

2.3.1 ระยะเวลาในการหมัก

เวลาในการหมักโกโก้อยู่ในช่วง 2-12 วัน ซึ่งระยะเวลาที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ ฤดูกาล สถานที่ ปริมาณของเมล็ดโกโก้ กรรมวิธีในการหมักและพันธุ์ของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โกโก้ (Roelofsen,1958; Rohan, 1963) เช่น เมล็ดพันธุ์ครีโอลโลหะใช้เวลาในการหมัก 2 วัน พันธุ์ฟอราสเทอโร ใช้เวลาในการหมัก 4-12 วัน (Roelofsen, 1958)

Forsyth and Quesnel (1957) ได้ให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงการสิ้นสุดของการหมักเมล็ดโกโก้ คือการใช้ตารางเวลากำหนด การผ่าดูสีเมล็ดโกโก้ที่ได้จากการหมัก การสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายนอกของเมล็ด การสังเกตการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของกองหมัก การลดลงของอุณหภูมิของกองหมัก

Wood and Lass(1985) พบว่าหากหมักเมล็ดโกโก้เวลานานเกินไป ทำให้แบคทีเรียกลุ่มย่อยสลายโปรตีนในสภาพไร้อากาศเจริญได้ มีผลให้เกิดกลิ่นรสของชีอคโกแลตน้อยลง แต่หากระยะเวลาการหมักสั้นเกินไป เมล็ดโกโก้ที่ได้มีสีม่วง และมีรสฝาดหรือขม

2.3.2 การให้อากาศแก่กองหมัก

การให้อากาศแก่กองหมักเมล็ดโกโก้ มีผลให้เกิดการออกซิไดซ์ของเอทานอลที่สร้างขึ้นโดยยีสต์ในช่วงแรกของการหมักในสภาพใช้อากาศไปเป็นกรดแอซีติก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลให้เกิดการสลายส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นของเหลว(Lehrian and Patterson,1983)

Lopez and Quesnel(1973) พบว่าหากเกิดความล่าช้าในการให้อากาศ หรือการกักกองหมักมีผลให้การสร้างกรดแอซีติกเกิดขึ้นช้ากว่าปกติและมีผลทำให้ปริมาณกรดในตอนสุดท้ายของการหมักสูงขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าอุณหภูมิของกองหมักเพิ่มขึ้นเหมือนปกติ กรดที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของการหมักเป็นตัวจำกัดปริมาณ กรดแอซีติกในเมล็ดโกโก้ โดยกรดแอซีติกมีผลต่อการเจริญของยีสต์และยับยั้งการสร้างเอทานอล

การให้อากาศในระยะหลังของการหมักช่วยให้เกิดการออกซิไดซ์ของกรดแอซีติกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Carr et al.,1980)

2.3.3 ขนาดของกองหมักและปริมาณของเมล็ดโกโก้ที่ใช้หมัก

ปริมาณโกโก้ที่ใช้หมักมีผลต่ออัตราการให้อากาศแก่กองหมัก หากกองหมักมีขนาดใหญ่ บริเวณผิวหน้าของกองหมักมีการถ่ายเทอากาศดีกว่า เป็นผลให้อุณหภูมิบริเวณผิว ของกองหมักเพิ่มขึ้นเร็วกว่าบริเวณในกองหมัก ถ้ากองหมักมีขนาดเล็กมาก ทำให้อากาศสามารถแพร่เข้าสู่กองหมักได้ดีกว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มกิจกรรม

ของจุลินทรีย์จะแพร่ออกจากกองหมักได้ง่าย การหมักเมล็ดโกโก้ปริมาณน้อยมีผลทำให้สูญเสียปริมาณความร้อน ได้เร็วกว่าปกติ แนวทางหนึ่งในการหมักเมล็ดโกโก้ปริมาณน้อยๆ ให้ได้ผลดี คือ การกลับกองหมักให้น้อยครั้งและควรทำจนวนหุ้มภาชนะหมักเพื่อลดการสูญเสีย ความร้อน (ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร และคณะ, 2529) การเพิ่มขึ้นของความร้อนในกองหมักนั้นพบว่าหากมีการเพิ่มอย่างช้าๆ จะให้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีกลิ่นรสซ็อคโกแลตดีกว่าการให้ความร้อนของกองหมักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.3.4 การกลับกองหมักหรือการคนเมล็ดโกโก้ที่หมัก

การกลับกองหมักเป็นวิธีการผสมเมล็ดโกโก้ให้สัมผัสกับอากาศและช่วยให้อากาศแพร่เข้าสู่ภายในกองหมักได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้กองหมักผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเมล็ดโกโก้และป้องกันการเกิดเชื้อราบริเวณผิวหรือมุมอับของกองหมัก วิธีการกลับกองหมักจะกลับช่วงเวลา 2 วัน หรือ 4 วัน การกลับกองหมักในช่วงแรกของการหมัก เป็นการให้อากาศแก่กองหมัก ช่วยให้มีการสร้างเอทานอลและยับยั้งการสร้างกรดแลคติกได้ (Lehrian and Patterson, 1983)

Dougan และคณะ (1981) ศึกษาการกลับกองหมักต่อการให้อากาศ โดยการวัดปริมาณออกซิเจนในกองหมักผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การกลับกองหมักในช่วง 3 วันแรกของการหมักมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนในกองหมัก คือปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการกลับกองหมักในครั้งแรก แต่ลดลงเมื่อมีการกลับกองหมักในครั้งที่สอง นอกจากนั้นการกลับกองหมักทุกวันยังทำให้อุณหภูมิของกองหมักลดลงอีกด้วย ซึ่งทำให้อัตราการเกิดเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ต่ำลงและทำให้กรดแอซิติกในเมล็ดโกโก้แห้งเพิ่มขึ้น

2.3.5 การเก็บรักษาฝักโกโก้ก่อนการหมัก

การเก็บฝักโกโก้ไว้ก่อนการหมักมีผลต่อการหมัก คือ เมื่อนำเมล็ดโกโก้ไปทำการหมักทำให้อุณหภูมิของการหมักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(Hancock,1949; Rohan,1963; Wood and Lass,1985) เพราะการเก็บฝักโกโก้ทำให้มีการสูญเสียความชื้น ช่วยให้อากาศแพร่เข้าไปภายในกองหมักได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำและของแข็งในเมล็ดโกโก้ลง ซึ่งเป็นผลของการระเหย และกระบวนการออกซิเดชันของน้ำตาลกลูโคส พบว่าการเก็บโกโก้ไว้ก่อนการหมัก ทำให้การสร้างกรดและการแพร่ของกรดเข้าไปใน

เมล็ดโกโก้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณกรดเอซิดิกในเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้จากผลโกโก้ ทั้งที่ผ่านการเก็บฝักไว้ 1 สัปดาห์ และไม่ผ่านการเก็บฝักไว้มีค่าไม่ต่างกันแต่ปริมาณกรดแลคติกในเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการเก็บฝักโกโก้ไว้ก่อนทำการหมัก 1 สัปดาห์มีค่าสูงกว่าเมล็ดโกโก้ที่ไม่ได้เก็บฝักไว้ก่อนทำการหมัก นอกจากนี้ยังพบว่าฝักโกโก้ที่เก็บไว้ก่อนทำการหมักเป็นเวลา 2-4 วัน ให้สัดส่วนเมล็ดสีม่วงและเมล็ดที่มีรอยย่นต่ำกว่าเมล็ดโกโก้ที่เก็บไว้วันเดียว การเก็บฝักโกโก้ไว้ก่อนทำการหมักทำให้ความชื้นในเนื้อเยื่อโกโก้ลดลง มีผลให้เวลาในการหมักสั้นลง และยังเป็นกรรวบรวมผลโกโก้ให้เพียงพอต่อการหมักในแต่ละครั้งอีกด้วย ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และคณะ (2534) ได้ทดลองเปรียบเทียบกรรมวิธีการหมัก การบ่มฝักโกโก้ก่อนทำการหมัก และความถี่ในการกลับเมล็ดโกโก้ขณะหมัก พบว่าการเก็บโกโก้ไว้ก่อนทำการหมักช่วยลดเวลาในการหมักแบบใช้กลองจาก 6 วันเหลือเพียง 4 วัน โดยให้ค่าครรชนิกการหมักสูงเป็น 1.0-1.1 มีกรดแลคติก กรดที่ระเหยได้ และกรดทั้งหมดต่ำกว่าชุดการทดลองควบคุม ส่วนความถี่ในการกลับเมล็ดโกโก้ พบว่าเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้จากชุดการทดลองที่มีการกลับเมล็ดทุก 2 วัน มีคุณภาพดีกว่าชุดการทดลองที่กลับเมล็ดโกโก้ในวันที่ 2 และ 3 ของการหมัก

2.3.6 การตายของเมล็ดโกโก้

ในระหว่างที่ทำการหมักเมล็ดโกโก้จะถูกทำลายการงอก เมื่อเมล็ดโกโก้สูญเสียการงอกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไปกระตุ้นให้มีการรวมตัวกันของสารตั้งต้น และเอนไซม์ต่างๆ ในเมล็ดโกโก้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสารตั้งต้นของกลิ่นรสซ็อคโกแลตขึ้น ในช่วง 48 ชั่วโมงแรกของการหมัก เมล็ดโกโก้สร้างเอทานอลและกรดเอซิดิกขึ้นมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 0.4 ตามลำดับ (Wadsworth and Howet, 1954) ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำลายการงอกของเมล็ดโกโก้ได้

2.3.7 ความสุขของฝักโกโก้

ความสุขของฝักโกโก้มีผลต่อการหมักเมล็ดโกโก้ โดยพบว่าถ้าฝักโกโก้ไม่สุขจะทำให้กระบวนการหมักไม่สมบูรณ์ อุณหภูมิจะไม่สูงขึ้น (Knapp, 1926)

2.3.8 ความแตกต่างของอัตราส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดต่อเมล็ด

อัตราส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงตามพันธุ์ของโกโก้และสภาพในการเจริญเติบโต พบว่าพันธุ์อะมีโลนาโด ในประเทศกานา มีอัตราส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดต่อเมล็ดโกโก้เท่ากับ 0.75 ขณะที่พันธุ์อัปเปอร์เมซอนในประเทศมาเลเซียและกานา มีอัตราส่วนเป็น 1.12 และ 1.16 ตามลำดับ ถ้าปริมาณร้อยละของอัตราส่วนดังกล่าวสูง ปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้ปริมาณกรดในเมล็ดมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก (Carr et al., 1981)

2.4 การทำแห้ง

โกโก้จะต้องผ่านการทำแห้ง เพื่อลดปริมาณความชื้นซึ่งอาจทำได้โดย วิธีการตากแดดโดยตรง (Sun drying) การใช้เครื่องมือในการให้ความร้อน (Artificial drying) หรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อลดปริมาณความชื้นในเมล็ดลง ทำให้สามารถเก็บรักษานาน ปริมาณความชื้นหลังสิ้นสุดการหมักจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 55 หลังจากการทำแห้งแล้วเมล็ดโกโก้ควรมีความชื้นเหลือประมาณร้อยละ 6-7 การทำแห้งยังช่วยลดปริมาณกรดลงและยังทำให้เมล็ดโกโก้เกิดสีน้ำตาลขึ้น เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอล พร้อมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานิน (Anthocyanins)

เมล็ดแห้งจะมีอายุการเก็บรักษานาน ขณะที่เมล็ดที่มีความชื้นจะเกิดความเสียหายเนื่องจากมีความเจริญของเชื้อราขึ้นและแทงทะลุเข้าไปในเปลือก ผิวสัมผัสของเมล็ดที่ผ่านการทำแห้งที่ดีจะกรอบ ไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ดหลงเหลืออยู่ ทั้งยังมีกลิ่นรสช็อคโกแลตที่ดี ไม่มีกลิ่นกรด กลิ่นคาว และกลิ่นที่ไม่ต้องการอื่นๆ เนื่องจากความชื้นลดลง ปริมาณกรดระเหยได้ซึ่งมีอยู่ในเมล็ดโกโก้ก็จะมีปริมาณลดลงตามไปด้วย ก่อให้เกิดการออกซิเดชันของสารตั้งต้นของกลิ่นรสช็อคโกแลตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดแลคติก ซึ่งหากความชื้นในเมล็ดลดลงในอัตราที่ช้าเกินไปทำให้เกิดกรดแลคติกได้ดี (Lopez and Quesnel, 1973)

การทำแห้งโดยใช้แสงแดด เป็นวิธีที่ทำให้เมล็ดโกโก้แห้งมีกลิ่นรสที่ดี และเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือใช้เวลานาน ต้องการแรงงานสูง ถ้าจำนวนโกโก้มีปริมาณมากจะทำให้วิธีนี้ไม่ได้ผล การ

ทำแห้งโดยแสงแดดใช้เวลาประมาณ 6 วัน ในกรณีที่อากาศแห้ง และใช้เวลาจนถึง 6 สัปดาห์ ในกรณีอากาศชื้น ส่วนการทำแห้งโดยใช้ความร้อนจากแหล่งอื่นจะใช้ได้ดีในกรณีที่มีเมล็ดโกโก้จำนวนมากๆและอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูง (Jinap et al.,1990)

2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง

2.5.1 การทำ cut test

เป็นการนำเมล็ดโกโก้แห้งมาทำการผ่าออกเพื่อดูลักษณะภายในของเมล็ด ซึ่งควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ เป็นเมล็ดที่มีผิวเต่ง ไม่เหี่ยวยุบ ขนาดของเมล็ดสม่ำเสมอ แห้งสนิท ปราศจากกลิ่นควันไฟหรือสิ่งอื่นใด เมล็ดโกโก้ไม่แตกหักมากเกินไป

เมล็ดโกโก้แห้งที่ได้มาตรฐานจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(Wood and Lass,1985)

1. ความชื้นของเมล็ดไม่ควรเกินร้อยละ 7
2. มีน้ำหนักเฉลี่ยเมล็ดโกโก้ไม่น้อยกว่า 1 กรัมต่อเมล็ด
3. ปริมาณเยื่อหุ้มเมล็ดไม่ควรเกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก
4. สุ่มตัวอย่างเมล็ดโกโก้แห้ง 200 เมล็ด โดยนำมาผ่าตามยาว เมื่อนับจำนวน

เมล็ดจะต้องมีจำนวนเมล็ดดังต่อไปนี้

- เมล็ดที่เป็นเชอร์รามีไม่เกินร้อยละ 7
- เมล็ดที่มีสีเทาหรือสีหินชนวนไม่เกินร้อยละ 3
- เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทำลาย เมล็ดงอกและเมล็ดเสียหรือตีบรวมกันแล้ว

ไม่เกิน ร้อยละ 3

- เมล็ดสีม่วงมีไม่เกินร้อยละ 2-3

-ถ้าเป็นสีม่วงหรือสีน้ำตาลบางส่วนจะมีได้ร้อยละ 40 และอย่างมากไม่เกินร้อยละ 60

5. ปริมาณไขมันโกโก้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

ถ้าหากมีเมล็ดที่มีลักษณะดังกล่าวเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ถือว่าเมล็ดโกโก้ นั้นไม่ได้มาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหมักกับค่า cut test ของเมล็ด

โกโก้ แสดงดังตารางที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหมักกับค่าcut test ของเมล็ดโกโก้ การเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสซ็อกโกแลตและการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีขององค์ประกอบต่างๆ

เวลาการหมัก (วัน)	เมล็ดโกโก้แห้ง (100เมล็ด)			กลิ่นรส ซ็อกโกแลต	ค่าดัชนีองค์ประกอบ ต่าง ๆ		
	น้ำตาล	ม่วง	หินชนวน		Nitrogen	Catechin	Carbohydrate
0	-	94	6	ไม่มีกลิ่นโกโก้ มี กลิ่นถั่ว รสฝาด	30	1.70	0.245
2	-	80	20	ไม่มีกลิ่นโกโก้ หุนกรวด รสฝาด	35	0.81	0.262
4	42	54	4	มีกลิ่นโกโก้อ่อน ขม ฝาด	50	0.81	0.915
6	-	-	-	-	40	0.50	1.470
6:	88	10	2	กลิ่นโกโก้แรง ขม มีกรดต่ำ	33	0.23	1.660

ที่มา : ดัดแปลงจาก Hoskin และคณะ (1984)

0: = เมล็ดโกโก้ที่ผ่านการทำแห้งด้วยแสงแดดแล้ว

- = ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

2.5.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

การประเมินคุณภาพจะมีส่วนช่วยในการตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณภาพตามต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

คุณภาพอาหารที่รู้สึกได้โดยประสาทสัมผัสได้แก่ ลักษณะที่มองเห็นได้ ลักษณะสัมผัสได้โดยกลิ่นเนื้อและลักษณะที่รู้สึกได้ด้วยกลิ่นรส การประเมินคุณภาพว่าอาหารนั้นๆมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับหรือไม่ต้องอาศัยประสาททั้ง 5 ของคน ได้แก่ ประสาทเกี่ยวกับการมองเห็น การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัสและการได้ยิน

นอกจากนี้การประเมินคุณภาพยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำใบไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดสอบคุณภาพของ โกโก้แห้งนั้น จะทำการอบเมล็ด โกโก้แห้งก่อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกและป่นให้ละเอียด และทำการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 โกโก้ที่มีคุณภาพดีจะมีกลิ่นกรด กลิ่นควัน และกลิ่นหืนน้อย แต่มีกลิ่นโกโก้ชัดเจนและต้องมีรสเปรี้ยว รสฝาดน้อย

2.6 การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง(Cocoa storage)

การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้งจะต้องเก็บที่ความชื้นน้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ เพราะเมล็ดโกโก้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดี(Hygroscopic) โดยจะดูดความชื้นได้ดีที่บรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง

ดังนั้นจึงควรมีการระบายอากาศในห้องเก็บ โดยเปิดประตูเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และปิดประตูในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกสูงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยให้มีสภาวะพอเหมาะในโกดังเก็บได้ และจะต้องออกแบบโกดังเพื่อป้องกันมิให้มีการเจริญเติบโตของราและแมลง ซึ่งปริมาณเชื้อราเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่สามารถแยกออกได้ในกระบวนการแปรรูป แมลงที่เข้าทำลายเมล็ดโกโก้ ได้แก่ Cigarette beetle(*Lasioderma semicorne*) , Rust red flour beetle(*Tribolium castaneum*) , Tropical warehouse moth(*Eschestia cautella*)

2.7 ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ของเมล็ดโกโก้

วัสดุเหลือใช้ของเมล็ดโกโก้ สามารถนำไปผลิตเยลลี่และน้ำโกโก้ สำหรับเป็นของหวานและเครื่องดื่มได้จากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาล 10-15 เปอร์เซ็นต์ เพคติน 1 เปอร์เซ็นต์ กรดซิตริก 1.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ดังนั้นการสกัดเอาของเหลวออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ โดยไม่ทำให้เมล็ดเสียหายก่อนนำไปหมักเพื่อนำไปทำเป็นเยลลี่ และน้ำโกโก้ นั้น จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับฝักโกโก้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นแหล่งของโพลีแซคคาไรด์และโปรตีน โดยสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

2.8 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

โดยปกติแล้วเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้จะอยู่ในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่พบนั้นได้รับจากสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เมล็ดถูกแกะออกจากฝักแล้ว จุลินทรีย์ที่แยกได้จากกองหมักคือ *Enterobacteriaceae* , *Lactobacillaceae* , *Bacillaceae* ,

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

Pseudomonadaceae , *Micrococcaceae* , *Corynebacteriaceae* , *Propionibacteriaceae* , *Actinomycetaceae* , *Azotobacteriaceae* และ *Brevibacteriaceae* (Ostovar and Keeney ,1973) จุลินทรีย์เหล่านี้แยกได้จากผิวของผัก มือของคนงาน และมีที่ใช้ การหมัก เมล็ดโกโก้ที่ประสบผลสำเร็จจะต้องมีปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ที่เหมาะสม บทบาทของจุลินทรีย์ในการหมักเมล็ดโกโก้ นอกจากนี้จะเกี่ยวข้องกับการเกิดกลิ่นรสแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการกระบวนการสร้างกรด และกระบวนการย่อยสลายโปรตีนในเมล็ดโกโก้ อีกด้วย จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการหมัก คือ ยีสต์แบบที่เรียกละดติก และแบคทีเรีย แอซีติก

2.8.1 ยีสต์

ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้มากที่สุดในระยะ 1-2 วันแรกของการหมัก ยีสต์จะใช้น้ำตาลในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้อย่างรวดเร็วได้ผลิตภัณฑ์คือเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังได้กรดเอสเทอร์ กลีเซอรอลและสารประกอบอัลดีไฮด์ ยีสต์จะมีเอนไซม์สำหรับการย่อยสลายเพคตินในเยื่อหุ้มเมล็ด เกิดเป็นของเหลว กระบวนการเมตาบอลิซึมของยีสต์ ทำให้ความเป็นกรด-ด่างของเมล็ดโกโก้ลดลง ประมาณ 4.0 โดยการเกิดเมตาบอลิซึมของกรดซิตริก(Roelofsens,1958)หลังจากที่เยื่อหุ้มเมล็ดย่อยสลายเป็นของเหลวแล้ว จะทำให้แบคทีเรียพวกแอซีติกเจริญแทนที่ยีสต์ นอกจากนี้การลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะยีสต์

ยีสต์ชนิดต่างๆที่พบได้ในการหมักเมล็ดโกโก้แสดงดังตารางที่ 2 โดยยีสต์ชนิดต่างๆจะเจริญในสภาวะที่เหมาะสมต่างกันไปเช่น *Saccharomyces sp.*เจริญได้ดีเมื่อมีน้ำตาลในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้สูง และมีความเข้มข้นออกซิเจนในระดับต่ำ ขณะที่ *Candida krusei* เจริญได้ดีในสภาพมีอากาศและใช้เอทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนได้(Lehrian and Patterson,1983)

อรพิน ภูมิภมร และคณะ(2536) ได้ศึกษาการหมักเมล็ดโกโก้ในเชิงหมัก และในถังไม้เป็นเวลา 6 วัน โดยกลับกองหมักวันละครั้งในระยะสองวันแรกของการหมัก พบว่ายีสต์ที่เจริญในกองหมักเมล็ดโกโก้เป็นกลุ่มที่เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic yeasts) ซึ่งจะพบได้ในปริมาณสูงในช่วงแรกของการหมัก หลังจากนั้นยีสต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะมีปริมาณลดลง นิยม กำล้างดี(2537) ศึกษาบทบาทของยีสต์ในระหว่างการหมักเมล็ด
 โกโก้โดยใช้ยีสต์ 3 ชนิดคือ *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida sorbosa*, *C. sake* เป็น
 เชื้อเริ่มต้นในการหมักเมล็ดโกโก้เป็นเวลา 7 วัน ที่ 37 องศาเซลเซียส พบว่า *S.*
cerevisiae มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากที่สุดในการหมักเมล็ดโกโก้คือสามารถเจริญใน
 กองหมักได้ดี ย่อยสลายน้ำตาลในเยื่อหุ้มเมล็ดได้ดี เมล็ดโกโก้มีค่าดัชนีการหมักสูง
 ปริมาณกรดแลคติก กรดซิตริก และกรดแอสซิติคต่ำ และยังให้เมล็ดโกโก้แห้งสีน้ำตาล
 สูงสุดคือร้อยละ 77.78



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2 แสดงชนิดของยีสต์ที่แยกได้จากการหมักเมล็ดโกโก้

ยีสต์ที่พบ	เอกสารอ้างอิง
<i>Candida sp.</i>	(1),(2)
<i>C. catenulata</i>	(6)
<i>C. krusei</i>	(2),(6),(7)
<i>C. mycoderma</i>	(2)
<i>C. parapsilosis</i>	(2)
<i>C. sake</i>	(7)
<i>C. sorbosa</i>	(7)
<i>C. tropicalis</i>	(7)
<i>Saccharomyces sp.</i>	(2),(6)
<i>S. cerevisiae</i>	(2),(7)
<i>S. carlsbergensis</i>	(2),(7)
<i>Pichia sp.</i>	(1)
<i>P. farinosa</i>	(6)
<i>P. fermentans</i>	(2),(5),(6)
<i>S. rosei</i>	(5)
<i>S. chevalieri</i>	(3)
<i>Trichosporon cutaneum</i>	(5)
<i>T. pullulans</i>	(6)
<i>T. rosei</i>	(6)
<i>T. holmii</i>	(3)
<i>T. castellii</i>	(3)
<i>T. candida</i>	(3),(4)

ที่มา : (1) Carr et al. (1979,1980) (2) De Carmago et al. (1963)
 (3) Rombouts (1952) (4) Maravalhas (1966)
 (5) Ravelomanana (1986) (6) ดวงใจ ช่วยสถิตย์ (2535)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8.2 แบคทีเรียแลคติก

แบคทีเรียแลคติกสามารถพบได้ตลอดการหมักมีทั้งกลุ่ม โยโมเฟอร์เมนเตติฟ ซึ่งสามารถเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นกรดแลคติกด้วยวิถีไกลโคลิซิส และกลุ่มเฮเทอโรเฟอร์เมนเตติฟซึ่งเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นกรดแลคติก เอทานอล กรดแอซิดิก และคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิถีฟอสโฟคีโตเลส บทบาทสำคัญของแบคทีเรียแลคติกคือการสร้างกรดให้รสเปรี้ยวและให้สารให้กลิ่นหอมต่างๆ แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม ไมโครแอโรไฟล์ (Microaerophile) เจริญได้ดีในสภาพที่มีความเข้มข้นออกซิเจนต่ำหรือมีออกซิเจนอยู่แต่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง แบคทีเรียแลคติกที่พบในการหมักเมล็ดโกโก้ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลแลคโตบาซิลลัส ได้แก่ *Lactobacillus lactis*, *L. bulgaricus*, *L. casei*, *L. plantarum*, *Leuconostoc mesenteroides* และในช่วงสุดท้ายของการหมักพบแบคทีเรียแลคติกในกลุ่ม *Streptococcaceae sp.* เจริญได้ในปริมาณสูง (Lehrian and Patterson, 1983; Passos et al., 1984)

2.8.3 แบคทีเรียแอซิดิก

ในช่วง 2 วันแรกของการหมักจะพบแบคทีเรียแอซิดิกจำนวนน้อย โดยพบเพียง *Acetobacter roseus*, *A. aceti*, *A. suboxydans* และ *Gluconobacter oxydans* เนื่องจากช่วงแรกของการหมักมีสภาพไร้อากาศแต่แบคทีเรียแอซิดิกเป็นจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในสภาพที่มีอากาศ แบคทีเรียแอซิดิกพบเป็นจำนวนมากในช่วง 72 ชั่วโมงแรกของการหมัก ซึ่งเป็นช่วงที่มีออกซิเจน หลังจากนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้จะค่อยๆ ลดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียแอซิดิก คือ 30-35 องศาเซลเซียส (Ostovar and Keeny, 1973) แบคทีเรียแอซิดิกที่พบมี 2 สกุล คือ *Gluconobacter* ซึ่งสามารถออกซิไดซ์เอทานอลเป็นกรดแอซิดิกได้แต่ไม่สามารถออกซิไดซ์กรดแอซิดิกไม่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและสกุล *Acetobacter* สามารถใช้น้ำตาลเฮกโซส และกลีเซอรอลได้ที่ pH 7-4.5 และสามารถออกซิไดซ์เอทานอลเป็นกรดแอซิดิกได้ ขณะเดียวกันสามารถออกซิไดซ์กรดแอซิดิกต่อไปแล้ว ได้เป็นผลิตภัณฑ์คือ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญของแบคทีเรียแอซิดิกกลุ่มนี้ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 4.5-6.3 แบคทีเรียแอซิดิกสามารถพบได้ตลอดเวลาการหมัก (Roelofsen, 1958) การเจริญของแบคทีเรียแอซิดิกทำให้อุณหภูมิของการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หมักสูงขึ้นไปถึง 50 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า มีการสร้างกรดต่างๆ นั้น เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดโกโก้ตายและมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีในเมล็ดโกโก้เกิดสารตั้งต้นของกลิ่น รสช็อคโกแลตขึ้นมา (Wood and Lass,1985)

2.8.4 จุลินทรีย์อื่นๆ ที่พบในการหมัก

ในระยะสุดท้ายของการหมักเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลดลงหรือในขณะที่แห้งจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสปอร์และเจริญในสภาวะที่มีอากาศ โดยเฉพาะกลุ่ม *Bacillus* สามารถเจริญได้ (Ostovar and Keeney 1973) และมีรายงานว่า *B. subtilis* มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสาร tetramethylpyrazine (TMP) ซึ่งเป็นสารกลุ่ม alkylpyrazine ที่เป็นสารเริ่มต้นชนิดหนึ่งของสารให้กลิ่นรสในเมล็ดโกโก้

จุลินทรีย์อื่นๆ ที่พบ เช่น *Micrococcus sp.* ซึ่งถ้ามีในกองหมักจะช่วยทำให้ความเป็นกรดของเมล็ดลดลงเนื่องจากสามารถไปเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดซ์กรดแอซิดิกและกรดแลคติก นอกจากนี้ยังพบฟรุกโตสและซูโครส ในกระบวนการหมักได้เป็นเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับจุลินทรีย์ในกลุ่ม *Actinomyces* หากเจริญในกองหมักจะทำให้เกิดการเน่าเสียและเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นอับและมีรสชาติผิดปกติ (De Camargo et al.,1967) จุลินทรีย์ที่สามารถพบได้ในกองหมักเมล็ดโกโก้ อีกชนิดหนึ่ง คือ เชื้อราซึ่งจะมีผลต่อการเกิดกลิ่นรสผิดปกติของเมล็ดโกโก้

2.9 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมัก

2.9.1 น้ำตาล

Rohan and Stewart (1967) ศึกษาการย่อยสลายของน้ำตาลซูโครสเป็นกลูโคสและฟรุกโตส ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ในประเทศกานาและไนจีเรีย โดยการวัดปริมาณน้ำตาลทั้งหมด และน้ำตาลรีดิคซ์ในเมล็ดโกโก้ตลอดเวลาการหมัก 6 วัน พบว่าน้ำตาลทั้งหมดมีค่าลดลงตลอดการหมัก ส่วนน้ำตาลรีดิคซ์นั้นมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 4 ของการหมัก หลังจากนั้นปริมาณของน้ำตาลรีดิคซ์จึงลดลง

Reineccius และคณะ (1972) ศึกษาและรายงานชนิดและปริมาณของน้ำตาลที่พบในเมล็ดโกโก้และเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้ดังตารางแสดงให้เห็นว่าชนิดของน้ำตาลที่พบในเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ต่างๆ นั้นไม่แตกต่างกัน แต่อัตราส่วนน้ำตาลที่พบจะแตกต่างกัน

ไปในแต่ละสายพันธุ์ที่เห็นชัดเจนคือ อัตราส่วนของน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีในการหมัก

Berbert (1979) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลระหว่างการหมัก พบว่า เมล็ดโกโก้ที่ไม่ผ่านการหมักนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส ภายหลังการหมัก ปริมาณน้ำตาลซูโครสลดลง โดยถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสและพบว่า ปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสเพิ่มขึ้นในระยะ 4 วันของการหมัก หลังจากนั้นปริมาณคงที่ สำหรับน้ำตาลกลูโคสมีปริมาณต่ำเกือบตลอดการหมัก ในระหว่างการหมักน้ำตาล กลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสมีปริมาณลดลงแต่น้ำตาลแมนนิทอลมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2.9.2 โพรตีน

Dewitt (1957) แยกสารประกอบไนโตรเจนในเมล็ดโกโก้สด โดยการสกัดด้วย เอทานอล พบว่าในเมล็ดโกโก้สดนั้นประกอบด้วยปริมาณกรดอะมิโนอิสระและเปปไทด์อยู่น้อย Offem (1990) พบว่าเมล็ดโกโก้ที่มีปริมาณ โพรตีนสูงนั้นต้องใช้เวลาในการหมักนานกว่าพันธุ์ที่มีปริมาณ โพรตีนต่ำกว่า นอกจากนี้ต้นโกโก้ที่มีอายุอ่อนจะให้เมล็ดโกโก้ที่มีปริมาณโปรตีนทั้งหมดสูงกว่าเมล็ดโกโก้จากต้นที่มีอายุมาก

การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้พบว่ามีปริมาณ ในโตรเจนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 2 วันแรกของการหมักทั้งนี้เพราะว่า ในโตรเจนจากส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภายในเมล็ด หลังจากนั้น ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดลดลงในอัตราที่เกือบคงที่ตลอดการหมัก การย่อยสลาย โปรตีนเกิดขึ้นหลังจากเริ่มต้นการหมักจนกระทั่งสิ้นสุดลง การลดลงของโปรตีนสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดอะมิโนอิสระและเปปไทด์ แต่เมล็ดโกโก้ที่มี ปริมาณกรดอะมิโนหรือเปปไทด์สูงไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดกลิ่นรสที่ดีกับ เมล็ดโกโก้ (Biehl et al., 1985)

Zak and Keeney (1976) พบว่าในระหว่างการหมักปริมาณโปรตีนที่สกัดได้ลดลงถึงร้อยละ 56 ความสัมพันธ์ของกรดอะมิโนทั้ง 4 กลุ่มเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการหมัก คือ อัลบูมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 40-70 ขณะที่โกลบูลิน โปรลามีน และกลูทีลีนที่มี ปริมาณลดลง การลดลงของโปรตีนที่สกัดได้เป็นผลจากปฏิกิริยาสึน้ำตาลที่เกิดขึ้นใน

เมล็ดโกโก้ ส่วนอัลบูมินที่เพิ่มขึ้นเกิดการย่อยสลายโปรตีนของสารประกอบเชิงซ้อนในเมล็ดโกโก้ ในเมล็ดมีต่ำกว่าจุดวิกฤติของการทำงานของเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน

2.10 เอนไซม์ในเมล็ดโกโก้

สามารถจำแนกเอนไซม์ในเมล็ดโกโก้ ออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

2.10.1 เอนไซม์กลุ่มไกลออกซิเดส

ดรรรชนีการหมักของเมล็ดโกโก้วัดโดยใช้การเปลี่ยนสีของเมล็ดโกโก้จากสารสีม่วงไปเป็นสารสีน้ำตาล เมล็ดโกโก้หากมีสีหินขุ่นหรือสีเทาแสดงว่าเป็นเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่เกิดการหมัก เอนไซม์ไกลออกซิเดสทำหน้าที่ตัดโมเลกุลของแอนโทไซยานิน ออกเป็นน้ำตาล และแอนโทไซยานิน ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสจึงทำปฏิกิริยาในช่วงสุดท้ายของการหมักและการทำแห้ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขึ้นในเมล็ดโกโก้ (Maravalhas, 1996)

2.10.2 เอนไซม์กลุ่มโปรติเอส

ในระหว่างการหมักที่มีสภาพไร้อากาศนั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกรดอะมิโนโปรตีนเกิดจากกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน Roelofsens (1958) ศึกษาการปล่อยกรดอะมิโนในโตรเจน และโปรตีนในโตรเจน ระหว่างการหมักของเมล็ดโกโก้พันธุ์ ICS-1 ในประเทศศรีนิแวกซ์ข้อมูลที่ได้ แสดงให้เห็นว่าปริมาณไนโตรเจนที่ไม่ละลายในเอทานอลลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันมีการเพิ่มของกรดอะมิโนในโตรเจนมากขึ้น อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวมีค่าต่ำในช่วงฤดูร้อน อันมีสาเหตุมาจากการระเหยน้ำอย่างรวดเร็วของเมล็ดโกโก้ในขณะที่หมักจนทำให้ค่า water activity ในเมล็ดมีต่ำกว่าจุดวิกฤติของการทำงานของเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน นอกจากนั้นพบว่าการให้ความร้อนแก่เมล็ดโกโก้ที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส มีผลในการเพิ่มปริมาณกรดอะมิโนในโตรเจนน้อยกว่าการเพิ่มระยะเวลาในการหมักเมล็ดโกโก้

2.10.3 เอนไซม์กลุ่มโพลีฟีนอลออกซิเดส

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือการเกิดออกซิเดชันของสารอพิคาทิจินไปเป็นควิโนน ซึ่งจะเกิดการรวมกับตัวเองหรือสารประกอบควิโนนตัวอื่นๆ เป็นสารประกอบสีน้ำตาลขึ้น สีที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดอย่างถาวรในเมล็ดโกโก้ เป็นผลให้มีการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิดและมีผลในการลดปริมาณโปรตีนอันเป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์โปรติเอสลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปฏิกิริยาของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวมีความสำคัญต่อการหมักเมล็ดโกโก้คือ ก่อให้เกิดสารสีน้ำตาลขึ้นในเมล็ดโกโก้ ช่วยลดความขมของสารแทนนินและลดกลิ่นไหม้ในเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการอบแห้งลงได้

2.11 คุณภาพและรสชาติ

คุณภาพของเมล็ดโกโก้มีความสำคัญมากต่อการเกิดเป็นกลิ่นรสช็อคโกแลต ซึ่งคุณภาพของเมล็ดโกโก้จากแหล่งผลิตต่างกันจะมีคุณภาพต่างกัน เมล็ดโกโก้ที่มาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกมีคุณภาพดีที่สุดในคุณภาพนอกจากขึ้นกับแหล่งผลิตแล้วยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล การขนส่ง การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดโกโก้ ผู้ผลิตจากแหล่งใหญ่ๆ มักใช้ผู้ที่มีความชำนาญสูงและประสบการณ์มาก

การเกิดกลิ่นรสที่ไม่ต้องการเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นรสช็อคโกแลตต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการเก็บเกี่ยว การหมักไม่สมบูรณ์ การทำแห้งโดยใช้ไฟ หรือการเก็บรักษาไม่ดีหลังขั้นตอนการทำแห้ง กลิ่นรสที่ไม่ต้องการส่วนใหญ่จะไม่สามารถกำจัดออกได้แม้ว่าจะผ่านขบวนการแปรรูปแล้ว กลิ่นรสที่ไม่ต้องการสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. กลิ่นรสของรา (Mould off-flavors) เกิดในเมล็ดที่ขึ้นราและสามารถเกิดเพิ่มขึ้นได้จากการหมักที่นานเกินไป นำเมล็ดมาทำแห้งซ้ำ (ถ้าความชื้นในเมล็ดโกโก้มากเกินไปร้อยละ 8 จะมีโอกาสขึ้นราสูง)

2. กลิ่นควัน (Smoke off-flavors) บางครั้งเรียกว่า hammy ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ

- การทำแห้งโดยการอบแบบตู้อบแห้งไม่ถูกต้อง การควบคุมระบบไม่ดี ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน
- สภาพะในการเก็บรักษาหลังการทำแห้งแล้วไม่ดี

3. กลิ่นรสของกรด (Acidic off-flavors) มักเกิดจากความหลากหลายของเมล็ดโกโก้ หรือวิธีการหมัก การทำแห้งไม่ดี

4. การเกิดรสขม (Excessive bitterness and astringency) เกิดจากการหมักเมล็ดไม่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากการทำ cut test จะพบเมล็ดมีสีหินขมน

Rohan (1963) พบว่าสารฟลาโวนอยด์ เพียวรีนและกรดอะมิโน มีบทบาทในการพัฒนาเป็นสารตั้งต้นของกลิ่นรสช็อคโกแลต เมล็ดโกโก้จะมีการพัฒนาเป็นสารที่เอกลักษณะเป็นเอกลักษณะที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ให้กลิ่นรสของชีอคโกแลตหลังจากทำการคั่วเมล็ดแล้วเท่านั้น นอกจากนี้พบว่าความเป็นกรด-ด่างระหว่างการหมักจะมีผลต่อการเกิดกลิ่นรสของชีอคโกแลต ซึ่งความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมสำหรับการย่อยสลายโปรตีนอยู่ในช่วง 3.5-4.5 จะได้กรดอะมิโนและเปปไทด์ที่ทำให้เกิดกลิ่นรสชีอคโกแลต ขณะที่ Keeny และคณะ(1985) พบว่าการเกิดกลิ่นรสชีอคโกแลตไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณกรดอะมิโนและเปปไทด์ที่ปลดปล่อยออกมา การเกิดกลิ่นรสชีอคโกแลตจะสูงเมื่อเมล็ดมีความเป็นกรดต่ำรวมทั้งมีปริมาณกรดอะมิโนต่ำในระหว่างการหมัก ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปริมาณของกลิ่นรสและการย่อยสลายโปรตีนหลังจากทำการบ่มเมล็ด โกโก้ที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	pH	ไนโตรเจน (%)	peptide-N (%)	Flavour profile			
				a	b	c	d
40	4.5	9.8	48.8	0	2.5	2	1
50	4.5	8	42.6	0	1.5	1	1.5
50	4.5	2.7	28.9	2.5	0.5	1	0.5
40	4.8	5.8	29.1	2	2.5	2.5	2.5
50	4.9	4.1	23	1.5	1.5	1.5	0
40	4.6	10.5	41.2	0	1.5	1.5	0.5

a = กรด

b = กลิ่นหอม

c = กลิ่นรสโกโก้

d = รสขม

ที่มา : Biehl และคณะ (1985)

เมล็ดโกโก้ที่มีกรดไขมันที่ระเหยได้ในปริมาณน้อยเหมาะสมต่อการเกิดกลิ่นรสช็อคโกแลต ถ้าปริมาณกรดไขมันที่ระเหยมากเกินไปจะทำให้เกิดการเน่าเสียเนื่องจากกิจกรรมของแบคทีเรียได้ ทำให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์และการหมักเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้พบว่าปริมาณของกรดแลคติกและกรดแอซีติกจะมีความสำคัญต่อการเกิดกลิ่นกรด เมื่อเปรียบเทียบกับกรดซิตริกและกรดออกซาลิกซึ่งมีปริมาณน้อย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุ

1. ผลโกโก้

ใช้ผลโกโก้สดจากสวนเกษตรกรในจังหวัดชุมพร

2. จุลินทรีย์และอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ

2.1 อาหารที่ใช้สำหรับการเก็บและการเลี้ยงเชื้อ

ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากการหมักตามธรรมชาติในการหมักเมล็ด โกโก้ครั้งที่

1 อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อมีหลายชนิดดังนี้ คือ

- อาหาร PDA ใช้จำแนกและเก็บรักษาเชื้อยีสต์
- อาหาร TYGKCP ใช้ับจำนวนจุลินทรีย์ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการหมักเมล็ด
โกโก้
- อาหาร MRS ใช้จำแนกและเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียแลคติก
- อาหาร DSM ใช้จำแนกเชื้อแบคทีเรียแอซิดิก
- อาหาร AA ใช้เก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียแอซิดิก

วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทำ โดยเก็บเชื้อจุลินทรีย์ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4

องศาเซลเซียส วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ แสดงรายละเอียดในภาคผนวก

2.2 อาหารที่ใช้ทดสอบ

- อาหารทดสอบการหมักแบบโฮ โมแลคติกเฟอร์เมนเทตีฟ และเฮทเทอโรแลคติกเฟอร์เมนเทตีฟ

- อาหารทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาลในสภาพมีอากาศของยีสต์
- อาหารทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาลในสภาพที่ไม่มีอากาศของยีสต์

3. สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์

สารเคมีและวิธีการเตรียม (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก) ประกอบด้วย

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาณกรดทั้งหมด

3.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาณกรดแลคติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 3.3 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดระเหยได้
- 3.4 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลซูโครสและน้ำตาลรีดิซ
- 3.5 สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าคาร์บอนิก

อุปกรณ์

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

- 1.1 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
- 1.2 เครื่องวัดพีเอช (pH meter)
- 1.3 เครื่องปั่นละเอียด
- 1.4 เครื่องชั่งอย่างหยาบและละเอียด
- 1.5 เครื่องเขย่า
- 1.6 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หากรดที่ระเหยได้
- 1.7 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาน้ำตาลซูโครสและน้ำตาลรีดิซในรูปน้ำตาลกลูโคส
- 1.8 ตู้อบแห้ง (Hot air oven)
- 1.9 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
- 1.10 หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
- 1.11 เครื่องแยกเหวี่ยง (Centrifuge) ชนิดปรับอุณหภูมิได้
- 1.12 ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar air flow cabinet)และอุปกรณ์เขี่ยเชื้อ

2. อุปกรณ์อื่นๆ

- 2.1 บีเปต ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร
- 2.2 บีเวตขนาด 50 มิลลิลิตร พร้อมขาตั้ง (Clamp)
- 2.3 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmayer flask)
- 2.4 บีกเกอร์
- 2.5 หลอดทดลอง
- 2.6 กระบอกตวง
- 2.7 ขวดปรับปริมาตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.8 เทอร์โมมิเตอร์

2.9 ชุดกรวยกรองแบบสุญญากาศและกระดาษกรองเบอร์ 1

2.10 หลอดฝาเกลียว

2.11 งานเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

2.12 ขวดฝาเกลียว

2.13 กล้องจุลทรรศน์

2.14 แข่งผลไม้

วิธีการ

1. สถานที่และการหมักเมล็ดโกโก้

ทำการหมักเมล็ด โกโก้ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น ในกองหมักเมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนตามธรรมชาติ สำหรับการหมักครั้งที่ 2 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ด โกโก้ทางทางชีวเคมีที่ได้จากการหมักซึ่งเติมเชื้อที่แยกได้จากการหมักครั้งแรกเปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม ซึ่งไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไป การหมักทั้ง 2 ครั้ง ทำที่ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. วิธีการหมักเมล็ดโกโก้

การหมักทั้ง 2 ครั้งใช้วิธีการหมักแบบดั้งเดิม โดยเก็บผลโกโก้ที่แก่เต็มที่มาผ่าเปลือกออกทันทีและแกะเมล็ดที่อยู่ในฝักออกจากใส่เมล็ดที่ยัดติดกัน ให้เมล็ดกระจายออกจากกัน โดยแยกเมล็ดที่เสียและเป็นราทิ้ง นำเมล็ด โกโก้สดบรรจุในแข่งที่สานด้วยไม้ไผ่ที่รองด้วยใบตอง โดยในการหมักครั้งที่ 1 บรรจุเมล็ด โกโก้สด 40 กิโลกรัมใน 1 แข่ง และไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไป สำหรับการหมักครั้งที่ 2 บรรจุเมล็ด โกโก้สดแข่ง ละ 15 กิโลกรัม และมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไป ในกองหมัก ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดแรกเติมเชื้อยีสต์ที่แยกได้ทั้งหมดลงไป (เติมเชื้อยีสต์แต่ละชนิดร้อยละ 5) ชุดที่สองเติมยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* ร้อยละ 5 และเติมแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้ทั้งหมดลงไปร้อยละ 5 ต่อเชื้อ 1 ชนิด ชุดที่สามเป็นชุดการทดลองควบคุมไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ใด ๆ ลงไปในกองหมัก หลังจากบรรจุเมล็ด โกโก้สดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปิดแข่งด้วยใบตองแล้ววางทับด้วยกระสอบป่านอีกครั้ง ทำการกลับเมล็ดทุก 2 วัน โดยถ่ายลงในเชิงใบใหม่และทำการวัดอุณหภูมิและสูมตัวอย่างเมล็ดโกโก้ มาวิเคราะห์ซึ่งการหมักครั้งแรกจะเก็บตัวอย่างทุกวันมาทำการแยกเชื้อบนอาหารชนิดต่าง ๆ และตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ ส่วนการหมักครั้งที่สองจะเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางเคมี

3. การเก็บตัวอย่าง

ทำการสูมตัวอย่างทุกวันในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ โดยเก็บตัวอย่างบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างสุดของกองหมัก นำตัวอย่างมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิของกองหมัก

4. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดโกโก้

จากการหมักครั้งที่ 2 (รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในภาคผนวก)

4.1 ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้พีเอชมิเตอร์

4.2 ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก โดยการไตเตรตกับสารละลายต่างมาตรฐาน 0.1 N

4.3 กรดแลคติกตามวิธีของ Barber and Summerson (1941)

4.4 กรดระเหยได้ในรูปกรดแอสติก ตามวิธี A.O.A.C (1984)

4.5 น้ำตาลซูโครสและน้ำตาลรีดิซในรูปน้ำตาลกลูโคสตามวิธีของ Luff-Schoorl (Egan และคณะ, 1981)

4.6 ดรรชนีการหมัก(Fermentation Index) ตามวิธีของ Gourieva and Tserevitinov (1979)

5. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมัก

โดยเฉพาะแบคทีเรียแลคติก แบคทีเรียแอสติก และยีสต์

5.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

ชั่งตัวอย่างเมล็ดโกโก้ 50 กรัมใส่ในขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในบรรจุน้ำเปปโตนร้อยละ 0.1 ปริมาณ 450 มิลลิลิตร ซึ่งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว เขย่าให้เข้ากัน ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจาง 1 ต่อ 10 มา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่มีน้ำเปปโตนที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเพื่อให้ตัวอย่างเจือจาง 1 ต่อ 100 ทำเช่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างโกโก้เจือจาง 10 เท่าไปเรื่อยๆ จนถึง 1 ต่อ 100,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2 การตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดตามวิธี Standard plate count

(American Public Health Association,1960)

5.2.1 ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจางเหมาะสม 3 ระดับ (จากข้อ 5.1) ระดับละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเพาะเชื้อทำระดับละ 2 จาน เทอาหาร TYGKCP agar ที่หลอมเหลวและอุ่นประมาณ 15 มิลลิลิตรลงไป หมุนจานให้ตัวอย่างอาหารกระจายไปทั่ว ๆ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนอาหารเพาะเชื้อแข็งตัว พลิกกลับจานเพาะเชื้อและนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง

5.2.2 นับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยเลือกจานที่มีจำนวนโคโลนี 30-300 โคโลนี หากค่าเฉลี่ยคิดเป็นจำนวนจุลินทรีย์ต่อกรัมของตัวอย่าง

5.3 การตรวจนับจำนวนยีสต์

5.3.1 ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจางเหมาะสม 3 ระดับ (จากข้อ 5.1) ระดับละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเพาะเชื้อทำระดับละ 2 จาน เทอาหาร PDA ที่หลอมเหลวและอุ่น (เติม Oxytetracycline ร้อยละ 0.1) ประมาณ 15 มิลลิลิตรลงในแต่ละจาน หมุนจานอาหารให้ตัวอย่างอาหารกระจายไปทั่ว ๆ บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 48-72 ชั่วโมง

5.3.2 เลือกจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนี 30-300 โคโลนีทั้งหมด หากค่าเฉลี่ยคิดเป็นจำนวนยีสต์ต่อกรัมของตัวอย่าง

5.3.3 เก็บเชื้อโดยใช้วิธีการสุมจากจานเพาะเชื้อที่มี โคโลนี 30-300 โคโลนี เป็นจำนวนทั้งหมด 10 โคโลนี streak บนอาหารPDA จนได้เชื้อบริสุทธิ์ นำไปใช้ในการทดสอบต่อไป

5.4 การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียแอซิดิก

5.4.1 ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจางเหมาะสม 3 ระดับ (จากข้อ 5.1) ระดับละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานเพาะเชื้อทำระดับละ 2 จาน เทอาหาร DSM ที่หลอมเหลว และอุ่นประมาณ 15 มิลลิลิตรลงในแต่ละจาน หมุนจานให้ตัวอย่างอาหารกระจายไปทั่ว ๆ บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 48-72 ชั่วโมง

5.4.2 เลือกจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนี 30-300 โคโลนี นับจำนวนโคโลนีที่มีสีเหลืองและสีม่วง หากค่าเฉลี่ยคิดเป็นจำนวนแบคทีเรียแอซิดิกต่อกรัมของตัวอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.4.3 เก็บเชื้อโดยใช้วิธีการสุ่มจากงานเพาะเชื้อ ที่มีโคโลนี 30-300 โคโลนี เป็นจำนวนทั้งหมด 10 โคโลนี จีบนอาหาร AA จนได้เชื้อบริสุทธิ์ ศึกษา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการติดสีแกรม

5.5 การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียแลคติก

5.5.1 ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจางเหมาะสม 3 ระดับ ระดับละ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในงานเพาะเชื้อทำระดับละ 2 งาน เทอาหารMRS ที่หลอมเหลวและอุ่น ประมาณ 15 มิลลิลิตรลงในแต่ละงาน หมุนงานให้ตัวอย่างอาหารกระจายไปทั่วๆ บ่มที่ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 48-72 ชั่วโมง

5.5.2 เลือกงานเพาะเชื้อที่มีโคโลนี 30-300 โคโลนี นับจำนวนโคโลนีที่มีลักษณะเป็นรูปกระสวยและเปลี่ยนสีอาหารจากสีม่วงแดงเป็นสีเหลืองคิดค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนแบคทีเรียแลคติกต่อกรัมของตัวอย่าง

5.5.3 เก็บเชื้อโดยใช้วิธีการสุ่มจากงานเพาะเชื้อ ที่มีโคโลนี30-300 โคโลนี เป็นจำนวน 10 โคโลนี จีบนอาหาร MRS จนได้เชื้อบริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการติดสีแกรม

6. การจำแนกเชื้อ

6.1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของยีสต์

โดยศึกษาคุณสมบัติดังนี้ นำเชื้ออายุ 24 ชั่วโมง จากอาหารเลี้ยงเชื้อPDA มาทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

6.1.1 ความสามารถในการใช้อาหารคาร์บอนในสภาพไร้อากาศ โดยใช้ น้ำตาล 7 ชนิด คือ เดกซ์โทรส,กาแลคโตส,แลคโตส,มอลโตส,ราฟฟิโนส,ซูโครสและ ทรีฮาโลส โดยใช้ปริมาณร้อยละ 1 ในอาหารbase for yeast fermentation (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก) บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง อ่านผล โดยดูปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดดักแก๊สที่ใส่ไว้ในอาหาร

6.1.2 ความสามารถในการใช้แหล่งอาหารคาร์บอน ในสภาพมีอากาศ โดยใช้แหล่งคาร์บอน 12 ชนิด คือ เดกซ์โทรส,ซูซิทอล,มอลโตส,ซูโครส,แลคโตส,กาแลคโตส,เมลลิไมโอส,เซลดิโอไบโอส,อินโนซิทอล,ไซโลส,ราฟฟิโนสและทรีฮาโลส ซึ่ง

ใช้ Yeast nitrogen base [Difco] (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก) เป็น basal medium

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และนำแผ่น disc ที่จุ่มน้ำตาล แต่ละชนิด(ความเข้มข้นร้อยละ10) วางบนอาหารบ่มที่ อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง ผลบวกแสดงโดยมีเชื้อเจริญรอบ แผ่นdisc

6.1.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ที่ กษาสัณฐานวิทยาของ Vegetative cell ในอาหาร 2% glucose-yeast extract-peptone agar ความสามารถในการสร้าง pseudomycelium and true mycelium โดยการทำให้ slide culture บนอาหาร com meal agar [Difco] ตรวจสอบได้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40-100 เท่า

6.1.4 ลักษณะการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ นำยีสต์เลี้ยงบนอาหารทดสอบ บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน นำมาตรวจดูการสร้าง ascospore และรูปร่างของ ascospore โดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100 เท่า

6.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติก(Sharpe and Fryer,1966;Krieg and Hott,1986)

นำเชื้ออายุ 24 ชั่วโมงจากอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS มาทดสอบคุณสมบัติต่างๆดังนี้

6.2.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตรวจสอบการติดสีแกรม รูปร่างและการ จัดเรียงตัวของเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์

6.2.2 การสร้างเอนไซม์คาตาเลส หยด H_2O_2 ร้อยละ3 ลงบนโคโลนีของ เชื้อที่เจริญบนอาหารวุ้น ถ้ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่ามีเอนไซม์คาตาเลส


6.2.3การหมักแบบไฮโมแลคติกเฟอร์เมนเตดและเฮเทอโรแลคติก เฟอร์เมนเตด ตามวิธีของGibson and Abd-el-Malek(1945)เลี้ยงเชื้อและนำมาทดสอบ ในอาหารทดสอบ(Gibson's Semi-solid Tomato Juice Medium (แสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก)เทวุ้นเข้มข้นร้อยละ3 ปิดผิวหน้าให้หนาประมาณ 1 เซนติเมตร บ่มเชื้อที่ อุณหภูมิห้องและตรวจผลทุกวันจนครบ 7 วัน แบคทีเรียที่หมักแบบเฮเทอโรเฟอร์เมน เตดจะให้แก๊สและดันวุ้นที่ปิดทับผิวหน้าขึ้นมา ส่วนพวกที่หมักแบบไฮโมเฟอร์เมนเตด วุ้นจะมีลักษณะปกติ

บทที่ 4


ผลการทดลอง

1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดระหว่างการหมัก

ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นในการหมักมีปริมาณ 3.5×10^3 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ที่พบในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้จะแตกต่างกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การปะปนของจุลินทรีย์ที่มาจากฝักโกโก้ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงปริมาณจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะมีปริมาณจุลินทรีย์สูงสุดในวันที่ 2 ของการหมัก คือ มีปริมาณ 4.25×10^7 โคโลนีต่อกรัม จากนั้นปริมาณจะเริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆ จน มีปริมาณต่ำสุดในวันที่ 6 ของการหมักโดยมีปริมาณจุลินทรีย์ 3×10^5 โคโลนีต่อกรัมสำหรับช่วงสุดท้ายของการหมักปริมาณจุลินทรีย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการปนเปื้อนของเชื้อราดังแสดงในรูปที่ 5 อุณหภูมิที่วัดได้จากกองหมักเมล็ดโกโก้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนมีอุณหภูมิสูงสุด 45 องศาเซลเซียสในวันที่ 5 ของการหมัก หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยในวันสุดท้ายของการหมักอุณหภูมิกองหมักมีค่าเป็น 39 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 6



เอกสารนี้เป็นรูปที่ 5 ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ การคำนวณค่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมักระหว่างการผลิตโกโก้

2. การเปลี่ยนแปลงของยีสต์ระหว่างการหมัก

ผลการตรวจนับปริมาณของยีสต์ในระหว่างการหมักพบว่าปริมาณสูงโดยการเปลี่ยนแปลงยีสต์มีลักษณะแปรผันตามปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่าในตอนเริ่มต้นของการหมักยีสต์มีปริมาณ 2.23×10^3 โคโลนีต่อกรัม เมื่อหมักเมล็ดโกโก้ได้สองวัน ยีสต์จะมีปริมาณ 2.85×10^7 โคโลนีต่อกรัม หลังจากนั้นปริมาณของยีสต์จะลดลงจนถึงวันที่ 5 ของการหมักและเริ่มมีการปนเปื้อนของเชื้อราทำให้ปริมาณของยีสต์ที่นับได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA มีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงสุดท้ายของการหมัก ดังแสดงในรูปที่ 7 การที่ในช่วงแรกของการหมักยีสต์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากในช่วงแรกของการหมักเกิดสภาพไร้อากาศ และมีน้ำตาลในเยื่อหุ้มเมล็ดคอยู่สูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ หลังจากนั้นปริมาณของยีสต์จะเริ่มลดลงและปริมาณแบคทีเรียแอซิดิกจะเพิ่มขึ้น การที่ยีสต์ลดปริมาณลงอาจเนื่องมาจากแบคทีเรียแลคติกและแบคทีเรียแอซิดิกผลิตรกรดต่าง ๆ รวมทั้งมีการกลีบกองหมักเมล็ดโกโก้ ซึ่งทำให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณยีสต์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

3. คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของยีสต์ที่พบระหว่างการหมัก


เมื่อนำยีสต์ที่แยกได้มาจัดจำแนกตามวิธีของ Kreger-Van Rij (1984) โดยศึกษาถึงความสามารถในการใช้แหล่งคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่มีและไม่มีอากาศ รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆ พบว่าเชื้อยีสต์ที่จำแนกได้มี 3 ชนิด ดังนี้คือ *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida sorbosa*, *Candida tropicalis* คุณสมบัติของยีสต์เหล่านี้แสดงรายละเอียดในภาคผนวก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิดและปริมาณของยีสต์พบว่าในระยะแรกของการหมักพบยีสต์เพียงชนิดเดียว คือ *Saccharomyces cerevisiae* ต่อมาจะพบ *C. sorbosa* and *C. tropicalis* ในปริมาณใกล้เคียงตลอดระยะเวลาของการหมัก โดยพบในปริมาณน้อยกว่า *S. cerevisiae* ดังแสดงตามรูปที่ 8



รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของยีสต์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

4. การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียแอซิดิกระหว่างการหมัก

จากการศึกษาพบว่าปริมาณแบคทีเรียแอซิดิกเปลี่ยนแปลงโดยแปรผันตามปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ระยะเริ่มต้นของการหมักแบคทีเรียแอซิดิก 2.58×10^3 โคโลนีต่อกรัม และหลังจากการหมักได้หนึ่งวันปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจะเพิ่มในอัตราที่ช้าลง ระหว่างการหมักปริมาณแบคทีเรียแอซิดิกสูงสุดในวันที่ 3 ของการหมักคือ มีปริมาณ 7.5×10^6 โคโลนีต่อกรัม ดังแสดงในรูปที่ 9 การที่ปริมาณแบคทีเรียแอซิดิกเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 3 ของการหมักเนื่องมาจากมีการกลับเมล็ดโกโก้ในวันที่ 2 ของการหมักจึงทำให้กองหมักเมล็ดโกโก้เกิดสภาพมีอากาศซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียแอซิดิก




รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียแอซิดิกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียแอซิดิกมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงไม่ได้ทำการศึกษาและจำแนกชนิดของแบคทีเรียแอซิดิก รวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดโกโก้ทางเคมีได้

5. การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียแลคติกระหว่างการหมัก

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียแลคติกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้แสดงในรูปที่ 10 โดยปริมาณแบคทีเรียแลคติกเริ่มต้นมีปริมาณ 3.37×10^3 โคโลนีต่อกรัม หลังจากหมักเมล็ดโกโก้เป็นเวลา 2 วัน จะพบปริมาณแบคทีเรียแลคติกสูงสุดคือมีปริมาณ 2.85×10^7 โคโลนีต่อกรัม หลังจากนั้นปริมาณแบคทีเรียกลุ่มนี้จะลดลงและในระยะสุดท้ายของการหมัก จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะนำแก๊สออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อยลงเกิดสภาพไร้อากาศในกองหมักอีกครั้ง จึงมีผลให้แบคทีเรียแลคติกนี้เจริญขึ้นมาอีก




รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียแลคติกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

6. คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแบคทีเรียแลคติกที่พบในระหว่างการหมัก

เมื่อนำแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้มาจำแนกตามหลักของ Sharpe และ Fryer (1966) ,Krieg และ Hott (1986) สามารถจำแนกได้ 2 ตระกูล คือ Streptococcus และ Lactobacillus การศึกษานี้จะทดสอบเพื่อจำแนกตระกูลของแบคทีเรียแลคติกเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลา โดยจะทดสอบคุณสมบัติการสร้างเอนไซม์คาตาเลส การย้อมสีแกรม และการทดสอบการหมักแบบไฮโดรโมเฟอร์เมนเทตีฟหรือแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเทตีฟ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

การเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดแบคทีเรียแลคติกพบว่าในช่วงแรกของการหมักจะมีปริมาณแบคทีเรียแลคติกในตระกูล Lactobacillus เป็นจำนวนมาก หลังจากการหมักเมล็ดโกโก้เป็นเวลา 4 วัน แบคทีเรียในตระกูลนี้จะเริ่มมีปริมาณลดลง ส่วนแบคทีเรียแลคติกในตระกูล Streptococcus จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลที่ได้ตรงกันกับการทดลองของ Rombouts (1952)



รูปที่ 11 ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากกองหมักเมล็ดโกโก้


7. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเมล็ดและเชื้อหมักเมล็ด โกโก้ ในการหมักครั้งที่ 2

7.1 การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

ค่าการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างในเชื้อหมักเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด พบว่า ชุดแรกซึ่งทำการเติมเชื้อยีสต์ทุกชนิดที่แยกได้จากการทดลองครั้งที่ 1 ชุดที่สองเติมเชื้อ *S. cerevisiae* และเชื้อแบคทีเรียแลคติกทุกชนิดที่แยกได้จากการหมักครั้งที่ 1 ชุดที่สามเป็นชุดการทดลองควบคุมไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ใดๆ พบว่าเริ่มต้นของการหมักทั้ง 3 ชุดการทดลองมีค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น โดยค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นมีค่าเป็น 4.95 หลังจากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดในวันที่ 4 ของการหมัก ในช่วงสุดท้ายของการหมักคือ วันที่ 5-7 จะไม่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเชื้อหมักเมล็ดโกโก้ได้ เนื่องจากเชื้อหมักเมล็ดโกโก้ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จนหมด เชื้อหมักเมล็ดโกโก้จึงกลายสภาพเป็นของเหลว ชุดการทดลองที่หนึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ตลอดการหมัก โดยมีค่าสูงสุดในวันที่ 4 ของการหมักเป็น 6.0 ดังแสดงในรูปที่ 12 และชุดการทดลองที่สองมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าชุดการทดลองควบคุมตลอดการหมักเช่นกัน การที่เชื้อหมักเมล็ดโกโก้มีค่าความ

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อผู้ใช้งานท่านใดได้ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เช่นกัน การที่เชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้มีค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากน้ำตาลในเชื้อหุ้มเมล็ดถูกนำไปใช้ในการสร้างกรดชนิดต่างๆโดยจุลินทรีย์หลายชนิดจากนั้นกรดที่สร้างขึ้นจะถูกส่งเข้าไปในเมล็ดโกโก้ จึงมีผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้มีค่าเพิ่มขึ้น



รูปที่ 12 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมล็ดโกโก้ของทุกชุดการทดลองแสดงดังรูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมล็ดโกโก้ของทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มลดลงตลอดการหมัก โดยในวันเริ่มต้นการหมักวัดค่าความเป็นกรด-ด่างได้ 7.04 ชุดการทดลองที่หนึ่งจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงน้อยที่สุด ซึ่งในวันสุดท้ายของการหมักชุดการทดลองที่หนึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็น 5.4 สำหรับชุดการทดลองที่สอง และชุดการทดลองควบคุม มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.8 และ 3.4 ตามลำดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมล็ดโกโก้มีความสัมพันธ์กับค่าความเป็นกรด-ด่างที่เพิ่มขึ้นในเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมักเมดโกโก้พบว่า ชุดการทดลองที่หนึ่ง อุณหภูมิของกองหมักมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในวันที่ 4 ของการหมักเป็น 44 องศาเซลเซียส วันที่ห้าของการหมักอุณหภูมิลดลงเป็น 42 องศาเซลเซียส และมีค่าคงที่จนการหมักสิ้นสุดลง สำหรับอุณหภูมิของกองหมักเมดโกโก้ชุดที่สองและสาม มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกันและอุณหภูมิจะสูงสุดในวันที่ห้าของการหมักเป็น 42 และ 41 องศาเซลเซียสตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมักแสดงดังรูป 14

อุณหภูมิของกองหมักเมดโกโก้มีผลต่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในระหว่างการหมักเมดโกโก้




รูปที่ 14 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองผึ้งเมล็ดโกโก้ในระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่าง ๆ

8. การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริกในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก พบว่าชุดการทดลองทั้ง 3 มีค่ากรดทั้งหมด เริ่มต้นเป็น 0.035 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และทุกชุดการทดลองจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดดังนี้คือ ปริมาณกรดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีปริมาณสูงสุดหลังจากนั้นปริมาณกรดทั้งหมดจะมีค่าลดลง โดยในชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์ทั้งหมดจะมีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุดในวันที่ 4 ของการหมักเป็น 0.07 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก สำหรับชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์และแบคทีเรียแลคติก มีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุดในวันที่ 6 ของการหมักเป็น 0.088 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนักและชุดการทดลองควบคุมจะมีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุดในวันที่ 5 ของการหมักเป็น 0.111 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ในวันสุดท้ายของการหมักชุดการทดลองที่หนึ่งมีปริมาณกรดทั้งหมดต่ำสุดคิดเป็น 0.04 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 15 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดอะซิติกในระหว่างการหมักเมล็ด โกโก้




รูปที่ 15 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซिटริกระหว่างการหมักเมล็ด โกโก้ของชุดการทดลองต่าง ๆ

7.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในระหว่างการหมัก

การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลกติกในเมล็ด โกโก้ระหว่างการหมักของทุกชุดการทดลองจะมีปริมาณกรดแลกติกเพิ่มขึ้นตลอดการหมัก เนื่องจากกรดแลกติกเป็นกรดที่ไม่ระเหยจึงทำให้เกิดการสะสมตลอดการหมัก ปริมาณกรดแลกติกในตอนเริ่มต้นของทุกชุดการทดลองเป็น 0.001 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ชุดการทดลองควบคุมจะมีปริมาณกรดแลกติกมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ตลอดการหมักโดยมีค่าสูงสุดในวันที่ 7 คือ มีปริมาณกรดแลกติก 0.07 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์ทั้งหมดในตอนเริ่มต้นการหมักจะมีปริมาณกรดแลกติกเพิ่มสูงขึ้นน้อยที่สุดคือ มีปริมาณกรดแลกติกในวันสุดท้ายเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนักดังแสดงในรูปที่ 16 การที่ปริมาณกรดแลกติกในชุดการทดลอง ที่เติมเชื้อยีสต์เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดลองควบคุมอาจมีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียแลคติกในปริมาณที่สูงกว่าในชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์เพียงอย่างเดียว




รูปที่ 16 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

7.4 การเปลี่ยนแปลงกรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสติกในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงกรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสติกมีแนวโน้มที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก โดยในช่วงแรกของการหมักปริมาณกรดแอสติกจะเพิ่มขึ้นจนมีปริมาณสูงสุดในวันที่ 3 ของการหมัก จากนั้นปริมาณกรดแอสติกจะมีปริมาณลดลงจนสิ้นสุดการหมัก ดังแสดงในรูปที่ 17 โดยชุดการทดลองควบคุมจะมีปริมาณกรดแอสติกสูงสุดเป็น 0.24 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และชุดการทดลองที่หนึ่งซึ่งเติมเชื้อยีสต์ในระยะเริ่มต้นของการหมักจะมีกรดแอสติกเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด โดยมีปริมาณกรดแอสติกในวันสุดท้ายของการหมักเป็น 0.156 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก การที่ปริมาณกรดแอสติกของชุดการทดลองควบคุมมีปริมาณสูงเนื่องมาจากอุณหภูมิของหมักเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองควบคุมเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จึงไม่อาจทำลายเชื้อจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียแอสติกได้มากเท่ากับ

เอกสารชุดการทดลองอื่นๆ สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพิ่มขึ้นไม่มากนัก จึงไม่อาจทำลายเชื้อจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียแอสิดิกได้มากเท่ากับชุดการทดลองอื่น ๆ




รูปที่ 17 การเปลี่ยนแปลงกรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสิดิกระหว่างการหมักเมล็ด โกโก้ของชุดการทดลองต่างๆ

7.5 การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในรูปน้ำตาลกลูโคส

การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ ในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองต่าง ๆ แสดงดังรูป 18 โดยปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้จะมีค่าลดลงตลอดการหมัก และมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในวันแรกของการหมัก ซึ่งจะสามารถวัดปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ได้เพียงวันที่ 4 ของการหมัก เนื่องจากเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้จะถูกย่อยสลายกลายเป็นของเหลว ทุกชุดการทดลองมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในวันเริ่มต้นของการหมัก 0.85 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ชุดการทดลองที่หนึ่ง มีการลดลงของน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น สำหรับชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์พร้อมกับเชื้อแบคทีเรียแลคติกและชุดการทดลองควบคุมมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ในวันที่ 4 ของการหมักเป็น 0.19 และ 0.24 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ตามลำดับ การที่ชุดการทดลองที่หนึ่งซึ่ง

เติมยีสต์มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ต่ำสุดเนื่องจากมีเชื้อยีสต์เป็นจำนวนมาก
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


มากในกองหมัก โดยเชื่อยีสต์จะใช้น้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้อย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการหมักเนื่องจากกองหมักมีสภาพไร้อากาศ



รูปที่ 18 การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในรูปน้ำตาลกลูโคสในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้ของทุกชุดการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นตลอดการหมักโดยชุดการทดลองควบคุมมีการเพิ่มของน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้ที่น้อยที่สุด คิดเป็น 0.91 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และชุดการทดลองที่เติมเชื่อยีสต์ในตอนเริ่มต้นของการหมักจะมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้สูงสุด โดยพบว่าในวันสุดท้ายของการหมักมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์คิดเป็น 0.98 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก ค่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้แสดงดังรูป 19 น้ำตาลรีดิวซ์ที่เพิ่มขึ้นในชุดการทดลองต่างๆเป็นผลจากเมล็ดโกโก้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายน้ำตาลซูโครสในเมล็ดโกโก้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้จึงมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเมล็ดโกโก้ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 19 การเปลี่ยนแปลงน้ำตาสดรีดิวซ์ในรูปน้ำตาลกลูโคสในเนื้อเยื่อผักกาดระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

7.6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในระหว่างการหมัก

จากการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำตาลซูโครสในเนื้อเยื่อผักกาดมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาสดรีดิวซ์ก็มียาลดลงจนสิ้นสุดการหมัก โดยชุดการทดลองควบคุมมีการลดลงของปริมาณน้ำตาลซูโครสน้อยที่สุด คือ มีปริมาณน้ำตาลซูโครส 0.095 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก และชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์ในตอนเริ่มต้นของการหมักมีการลดลงของปริมาณน้ำตาลซูโครสมากที่สุด โดยมีปริมาณน้ำตาลซูโครสในเนื้อเยื่อผักกาด 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 20


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 20 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาชงโครสในเยื่อหุ้มเมล็ดโกไค้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่าง ๆ

ปริมาณน้ำตาชงโครสในเมล็ดโกไค้ของทุกชุดการทดลองจะมีค่าลดลงตลอดการหมัก โดยในวันสุดท้ายของการหมักชุดการทดลองที่เติมยีสต์ ชุดการทดลองที่เติมทั้งยีสต์และแบคทีเรียแลคติกและชุดการทดลองควบคุมมีปริมาณน้ำตาชงโครสในเมล็ดโกไค้ดังนี้ คือ 0.25, 0.32 และ 0.43 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อน้ำหนักตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์มีปริมาณน้ำตาชงโครสในเมล็ดโกไค้น้อยที่สุด เนื่องจากน้ำตาชงโครสถูกย่อยสลายให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์จึงทำให้ชุดการทดลองนี้มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกไค้สูงที่สุดดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับชุดการทดลองควบคุมมีน้ำตาชงโครสลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากชุดการทดลองควบคุมนี้ไม่มีการเติมจุลินทรีย์ลงไป ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการลดลงของพีเอช จากกิจกรรมของจุลินทรีย์น้อยกว่าชุดการทดลองที่เติมจุลินทรีย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 21 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักของชุดการทดลองต่างๆ

7.7 ค้ำดรชนีการหมักในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

ค่าค้ำดรชนีการหมักของชุดการทดลองต่างๆ แสดงดังรูป 22 พบว่าทุกชุดการทดลองจะมีค่าค้ำดรชนีการหมักเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการหมัก โดยชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์ในตอนเริ่มต้นของการหมักมีค่าค้ำดรชนีการหมักใกล้เคียง 1 ตั้งแต่วันที่ 5 ของการหมักและมีค่าค้ำดรชนีการหมักสูงสุดในวันสุดท้ายของการหมักเป็น 1.074 ส่วนอีก 2 ชุดการทดลองมีค่าค้ำดรชนีการหมักใกล้เคียง 1 ในวันที่ 6 ของการหมักและมีค่าค้ำดรชนีการหมักสูงสุดในวันสุดท้ายของการหมักเป็น 1.021 และ 0.964 สำหรับชุดการทดลองที่เติมยีสต์และแบคทีเรียแลคติกในตอนเริ่มต้นของการหมักและชุดการทดลองควบคุมตามลำดับ ชุดการทดลองที่เติมเชื้อยีสต์มีค่าค้ำดรชนีการหมักสูงที่สุดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของหมักมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในเมล็ดโกโก้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดโกโก้โดยปฏิกิริยาต่างๆ ได้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 22 การเปลี่ยนแปลงค่าครรชั้การหมักระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

1. จุลินทรีย์ที่แยกได้จากการหมักเมล็ดโกโก้ตามธรรมชาติ

การตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์ และแบคทีเรียแลคติก พบว่า ปริมาณจุลินทรีย์เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระยะแรกของการหมัก หลังจากนั้นจะมี ปริมาณลดลงโดยจะพบปริมาณสูงสุดในวันที่ 2 ของการหมัก สำหรับแบคทีเรียแอสีติกมี ปริมาณสูงสุดในวันที่ 3 หลังจากนั้นก็ลดลงเช่นกัน เมื่อนำจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์ไปทำการ จัดจำแนกโดยวิธีของ Kreger-Van Rij(1984) พบยีสต์ 3 ชนิดคือ *Saccharomyces cerevisiae* , *Candida sorbosa* และ *Candida tropicalis* โดย *S. cerevisiae* จะพบใน ปริมาณสูงตลอดระยะเวลาของการหมักสำหรับ *C. sorbosa* and *C. tropicalis* จะมี ปริมาณใกล้เคียงกันและพบในปริมาณไม่สูงมากนัก จากการจำแนกแบคทีเรียแลคติกตามวิธีของ Sharpe and Fryer (1966) และ Krieg and Hott(1986) พบแบคทีเรียแลคติก 2 ตระกูล คือ ตระกูล *Lactobacillus* และ *Streptococcus* ช่วงแรกของการหมัก ส่วนใหญ่พบ *Lactobacillus* และช่วงสุดท้ายจะพบ *Streptococcus* ในปริมาณสูง สำหรับ แบคทีเรียแอสีติกไม่สามารถทำการจัดจำแนกได้ เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ชนิดอื่นในระหว่างการหมัก ดังนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเมล็ดโกโก้ที่หมักด้วยแบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่สามารถทำได้

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่แยกได้

จากการทดลองมี 3 ชุดการทดลอง ดังนี้ ชุดแรกเติมเชื้อยีสต์ที่แยกได้จากการหมักครั้งแรกโดยเติมเชื้อแต่ละชนิดมีความเข้มข้นร้อยละ 5 ชุดการทดลองที่สองเติม *Saccharomyces cerevisiae* ร้อยละ 5 และแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้มีความเข้มข้นของเชื้อแต่ละชนิดร้อยละ 5 เช่นกัน สำหรับ ชุดการทดลองที่สาม เป็นชุดควบคุมไม่มีการเติมจุลินทรีย์ลงในกองหมัก จากการทดลองพบว่าระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ด้วยเชื้อต่าง ๆ เหล่านี้ ชุดการทดลองแรก เมล็ดโกโก้จะมีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก กรดอะซิติก กรดแลคติก ต่ำกว่าชุดการทดลองอื่นๆ และค่าครรชนี

การหมักมีค่าใกล้เคียง 1 ในวันที่ 5 ของการหมัก ขณะที่ชุดการทดลองที่สองและสาม มีค่าธรรมชาติการหมักใกล้เคียง 1 ในวันที่ 6 ของการหมัก รวมทั้งปริมาณน้ำตาลซูโครส และน้ำตาลรีดิซในเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้ของชุดการทดลองแรก มีค่าลดลงมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ เมื่อนำค่าต่าง ๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเมล็ดโกโก้จากชุดการทดลองทั้งสาม ส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

จากการทดลองนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหมักเมล็ดโกโก้ เพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะทำให้ราคาของเมล็ดโกโก้แห้งสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการทดลองครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดโกโก้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมมีดังนี้

1. ศึกษาชนิดของแบคทีเรียแอซิดิกที่พบในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้รวมถึงบทบาทของแบคทีเรียแอซิดิกที่มีผลต่อการหมัก
2. การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ในรูปที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เติมในตอนเริ่มต้นของการหมัก
3. ศึกษาความเข้มข้นของเชื้อที่ใช้ต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง
4. ศึกษาคุณภาพทางเคมีของเมล็ดโกโก้หลังจากทำการตากแห้ง

ภาคผนวก ก

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อและอาหารทดสอบเชื้อและวิธีการทดสอบ

1. TYGKCP (Ostovar and Keeney,1973)

ประกอบด้วย

K_2HPO_4	1	กรัม
$CaCO_3$	1	กรัม
ทรีปโตน	1	กรัม
ยีสต์สกัด	5	กรัม
น้ำตาลกลูโคส	1	กรัม
เยื่อหุ้มเมล็ดคอกโก้	10	กรัม
ผงวุ้น	20	กรัม

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

2. MRS (Rogosa and Sharpe,1959)

ประกอบด้วย

K_2HPO_4	2.00	กรัม
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0.20	กรัม
$MnSO_4 \cdot 4H_2O$	0.05	กรัม
$CH_3COONa \cdot 3H_2O$	5.00	กรัม
$(NH_4)_3C_6H_5O_7$	2.00	กรัม
เปปโตน	10.00	กรัม
ยีสต์สกัด	4.00	กรัม
น้ำตาลเดกซ์โทรส	20.00	กรัม
ผงวุ้น	17.00	กรัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น เติม Bromocresol purple ร้อยละ 1 มิลลิเมตร ปรับพีเอชให้เป็น 6.2 ด้วยกรดเกลือร้อยละ 10 เติมน้ำจนครบ 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

3. DSM (Cirigliano, 1982)

ประกอบด้วย

KH_2PO_4	1.0	กรัม
$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0.02	กรัม
Calcium Lactate	15.0	กรัม
D-sorbitol	1.0	กรัม
D-mannitol	2.0	กรัม
bromocresol purple [Difco]	0.03	กรัม
cycloheximide	0.004	กรัม
sodium desoxycholate [Difco]	0.1	กรัม
หรือ brilliant green [Difco]	29.5	ไมโครกรัม
โปรติโอสเปปโตน	10.0	กรัม
ยีสต์สกัด	3.0	กรัม
น้ำตาลเดกซ์โตรส	1.0	กรัม
ผงวุ้น	15.0	กรัม

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น ยกเว้น cycloheximide ละลายในแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 แล้วเติมในอาหารก่อนฆ่าเชื้อ ปรับพีเอชให้เป็น 4.2-4.4 ด้วยกรดเกลือร้อยละ 10 เติมน้ำจนครบ 1 ลิตร นำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

4. Acetobacter agar

ประกอบด้วย

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	1	กรัม
------------------------------	---	------

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้ำตาลกลูโคส	18	กรัม
ยีสต์สกัด	2	กรัม
ผงวุ้น	17	กรัม
น้ำกลั่น	1	กรัม
สารละลาย A	5	มิลลิลิตร
สารละลาย B	5	มิลลิลิตร

สารละลาย A

K_2HPO_4	50	กรัม
KH_2PO_4	50	กรัม
น้ำกลั่น	500	มิลลิลิตร
วิธีการ		

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

5. PDA

ประกอบด้วย

มันฝรั่ง	200	กรัม
น้ำตาลเดกซ์โทรส	20	กรัม
ผงวุ้น	15	กรัม
วิธีการ		

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

6. 2% Glucose-yeast extract-peptone agar

ประกอบด้วย

น้ำตาลกลูโคส	20	กรัม
เปปโตน	10	กรัม
ยีสต์สกัด	5	กรัม
ผงวุ้น	10	กรัม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

7. Sporulating medium

ประกอบด้วย

Sodium acetate trihydrate	8.2	กรัม
น้ำตาลกลูโคส	1.0	กรัม
ยีสต์สกัด	2.5	กรัม
ผงวุ้น	15.0	กรัม

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น ปรับพีเอชให้เป็น 4.8 ด้วยกรดเกลือ ร้อยละ 10 เติมน้ำจนครบ 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

8. Base for yeast fermentation

ประกอบด้วย

bromthymol blue 1%	10	กรัม
ยีสต์สกัด	5.5	กรัม
เปปโตน	7.6	กรัม

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

9. Yeast nitrogen base [Difco]

ประกอบด้วย

Yeast nitrogen base	0.67	กรัม
ผงวุ้น	20	กรัม

วิธีการ

ละลายสารทั้งหมดเข้าด้วยกันในน้ำกลั่น 1 ลิตร นำไปต้มให้เดือด และฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

10. Gibson's Semi-solid Tomato Juice Medium

ประกอบด้วย

Nutrient agar	200	มิลลิลิตร
ยีสต์สกัด	2.5	กรัม
น้ำตาลกลูโคส	50.0	กรัม
น้ำมะเขือเทศ	100.0	มิลลิลิตร
นมผงกึ่งรูป	800.0	มิลลิลิตร

วิธีการ

นำน้ำมะเขือเทศผสมกับน้ำนม เติมยีสต์สกัดและน้ำตาลกลูโคส นำไปต้มให้เดือด และเติม Nutrient agar ผสมให้เข้ากัน ปรับพีเอชให้ได้ 6.5 ด้วยกรดเกลือร้อยละ 10 เติมน้ำจนครบ 1 ลิตร ฆ่าเชื้อโดยการต้มในน้ำเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 30 นาที เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

วิธีการทดสอบและสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบด้านจุลินทรีย์

1. การย้อมแกรม

สารเคมี

1. คริสตัลไวโอเลต (Crystal Violet)

ชั่งผงคริสตัลไวโอเลต 2 กรัม ละลายในเอทานอลร้อยละ 95 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ละลายสารผสมให้เข้ากัน แล้วเติมสารละลายแอมโมเนียมออกซาลेटร้อยละ 1 ลงไป 80 มิลลิลิตร

2. สารละลายไอโอดีน (Iodine)

ชั่งผงไอโอดีน 1 กรัม โปแตสเซียมไอโอไดด์ 2 กรัม น้ำกลั่น 300 มิลลิลิตร ละลายส่วนผสมให้เข้ากัน เก็บในขวดสีชา

3. สารละลายซาฟรานีน [Safranin]

สารละลายซาฟรานีน 10 มิลลิลิตร (ซึ่งเตรียมโดยซังซาฟรานีน 2.5 กรัม ในเอทานอล ร้อยละ 95 100 มิลลิลิตร) ผสมกับน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร

4. เอทิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 95

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการ

1. เกลี่ยเชื่อมบนสไลด์ที่แห้งและสะอาด ปล่อยให้แห้งและยึดเชื่อมด้วยเปลวไฟ
2. หยดสารละลายคริสตัลไวโอเล็ตลงบนรอยเกลี่ยทิ้งไว้ 1 นาที ล้างน้ำ 2-3 วินาที แล้วเทน้ำออกให้หมด
3. หยดสารละลายไอโอดีน 1 นาที ล้างด้วยน้ำ
4. หยดแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ล้างจนสีน้ำเงินจางเกือบหมด (30วินาที) และล้างด้วยน้ำ
5. หยดสารละลายซาฟรานีน 15 วินาที ล้างด้วยน้ำ ซับให้แห้งนำไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

วิธีการวิเคราะห์เมล็ดโกโก้และเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้

1. การหาค่าความเป็นกรด-ด่าง

นำตัวอย่าง 10 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร เติมน้ำร้อนปริมาตร 90 มิลลิลิตร อย่างช้าๆเขย่า แล้วนำไปกรอง ทำให้เย็นจนอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส วัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยเครื่องวัดพีเอช

2. การหาค่าดัชนีการหมัก (Fermentation Index) (Gourieva and Tserevitino.1979)

สารเคมี

- เมทานอล

- กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

เตรียมโดยผสม เมทานอลกับกรดไฮโดรคลอริกในอัตราส่วน 97 ต่อ 3

วิธีการวิเคราะห์

1. ชั่งเมล็ดโกโก้ที่บดแล้วปริมาณ 0.5 กรัม ใส่ในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 125 มิลลิลิตร
2. เติมสารละลายผสมของเมทานอลกับกรดไฮโดรคลอริกที่เตรียมไว้ลงไป 50 มิลลิลิตร
3. เขย่าขวดรูปกรวยดังกล่าวนำไปเก็บในตู้เย็น (8 องศาเซลเซียส) เป็นเวลานาน 16-18 ชั่วโมง
4. นำสารละลายในขวดรูปกรวย มากรองด้วยระบบสุญญากาศ โดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 1
5. สารละลายที่ได้จากการกรอง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 และ 530 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
6. คำนวณค่าดัชนีการหมัก

$$\text{ค่าดัชนีการหมัก} = \frac{\text{ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร}}{\text{ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร}}$$

3. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และน้ำตาลซูโครส (Egan et al., 1981; A.O.A.C., 1990)

3.1 การหาปริมาณน้ำตาลกลูโคสด้วยวิธี Luff-Schoorl method

สารเคมี

- anhydrous sodium carbonate
- citric acid monohydrate
- copper(II) sulphate pentahydrate
- zinc acetate dihydrate
- acetic acid
- potassium ferrocyanide trihydrate
- potassium solution 30% w/v
- sulphuric acid solution (3M)
- isopentanol
- sodium thiosulphate solution (0.1M)

การเตรียมสารละลาย Carrez I

เตรียมโดยละลายกรดแอซีติก ปริมาณ 3 กรัม ในน้ำกลั่นปริมาณเล็กน้อย แล้วเติมสาร Zinc acetate dihydrate ปริมาณ 2.19 กรัมลงไปละลาย แล้วปรับปริมาตรสุดท้ายด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร

การเตรียมสารละลาย Carrez II

เตรียมโดยทำการละลาย potassium ferrocyanide trihydrate ปริมาณ 10.6 กรัม ในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร

การเตรียม Luff-Schoorl Reagent

1. ละลาย Anhydrous sodium carbonate 143.8 กรัม ด้วยน้ำกลั่น 300 มิลลิลิตรในขวด ปรับปริมาตรขนาด 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้จนเย็น จึงเติมสารละลายที่เตรียมจากข้อ 2
2. ละลาย citric acid monohydrate ปริมาณ 50 กรัม ในน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตร แล้วจึงเติมลงไป ในสารละลายที่เตรียมไว้ในข้อ 1 พร้อมกับเขย่าให้ทั่ว
3. เมื่อสารละลายไม่มีฟองแก๊สเกิดแล้ว เติม copper(II) sulphate pentahydrate 25 กรัม ลงไปในสารละลาย

4. ปรับปริมาตรของผสมภายในขวด และผสมให้เข้ากัน นั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองเอาตะกอนที่เกิดขึ้นออก
6. สารละลายที่ได้จะต้องมีความเข้มข้นของสารที่แน่นอน คือ copper(II) มีความเข้มข้น 0.1 โมล และ sodium carbonate มีความเข้มข้น 1 โมล

วิธีการทำ Standardize สาร Luff-Schoorl Reagent

1. ใช้สารละลาย reagent ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เติมด้วยโปแตสเซียมไอโอไดด์ 3 กรัม และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 3 โมลาร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
2. ไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮโอซัลเฟต ที่มีความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ โดยใช้ น้ำแบ่งเป็นอินดิเคเตอร์ (ความเข้มข้นร้อยละ 0.5) เมื่อสิ้นสุดการไตเตรตควรใช้โซเดียมไฮโอซัลเฟตประมาณ 25 มิลลิลิตร
3. ใช้ reagent 10 มิลลิลิตร มาทำให้เจือจางเป็น 100 มิลลิลิตร
4. เติมสาร reagent ที่เจือจางแล้วในข้อ 3 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
5. นำไปวางบนอ่างน้ำเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
6. ทำให้เย็นลง และปรับปริมาตรให้เท่าเดิมด้วยน้ำกลั่น
7. นำไปไตเตรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 N โดยมีฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ควรอยู่ในช่วง 5.5-6.5 มิลลิลิตร
8. ไตเตรตสาร reagent ที่เจือจางแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ปริมาตรของกรดที่ใช้ในการไตเตรตควรจะเท่ากับ 6.0-7.5 มิลลิลิตร
9. ค่าพีเอชของสาร reagent ควรประมาณ 9.3-9.4

วิธีการวิเคราะห์

1. ชั่งตัวอย่างให้ได้น้ำหนักที่แน่นอน (ประมาณ 15-20 กรัม) ใส่ในขวดปรับปริมาตร ขนาด 250 มิลลิลิตร
 2. เติมน้ำร้อนลงไป 150 มิลลิลิตร ทำการเขย่า เพื่อสกัดสารที่ละลายน้ำออกมา
 3. ทำสารละลายให้ใส ด้วยการเติมสารละลาย Carrez I ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วตามด้วยการเติมสารละลาย Carrez II อีก 5 มิลลิลิตร
 4. เขย่าและปรับปริมาตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อ นาที นาน 10 นาที แยกส่วนของของเหลวออกมาโดยการกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1
- ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. นำส่วนของเหลวที่ได้มาเจือจางจนกระทั่งตัวอย่างสารละลายที่เจือจาง 25 มิลลิลิตร นั้นมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์อยู่ 15-60 มิลลิลิตร
6. ใส่สารละลาย Luff-Schoorl Reagent ปริมาตร 25 มิลลิลิตรลงในพลาสติก 300 มิลลิลิตร
7. เติมสารละลายที่เจือจางไว้ ปริมาตร 25 มิลลิลิตรลงไป
8. ใส่เม็ดแก้วกันกระแทกลงไปในพลาสติก 2-3 อัน
9. ทำการ reflux โดยปรับอุณหภูมิให้สารละลายเดือด เป็นเวลา 2-3 นาที แล้วลดอุณหภูมิของการ reflux ลงไป ปล่อยให้เย็นให้เดือดเบาๆอีก 10 นาที หลังจากนั้นทำให้เย็นในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
10. เติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ (30%w/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตรแล้วค่อยๆ เติมด้วย 25 มิลลิลิตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 โมลาร์ อาจเติม isopentanol ลงไป 2-3 หยด เพื่อป้องกันการเกิดฟอง
11. เมื่อไม่มีฟองเกิดขึ้นแล้วนำไปไตเตรต กับสารละลายโซเดียมไรโอซัลเฟตความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนกระทั่งสารละลายไม่มีสี จึงเติมน้ำแข็ง (ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก) ลงไป 2-3 มิลลิลิตร แล้วไตเตรตต่อจนกระทั่งสารละลายไม่มีสี ปริมาตรที่ได้เท่ากับ x มิลลิลิตร
12. ไตเตรตสารละลาย blank โดยใช้ น้ำกลั่นแทนสารละลายตัวอย่าง แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับสารละลายตัวอย่าง ปริมาตรที่ได้เท่ากับ y มิลลิลิตร
13. เมื่อนำปริมาตร $y-x$ จะเป็นปริมาตรของ copper ที่ถูกรีดิวซ์ด้วยน้ำตาลในสารตัวอย่าง ซึ่งสามารถเปิดเทียบค่าได้จากตารางภาคผนวก
14. คำนวณค่าร้อยละของน้ำตาลกลูโคส (ในรูปของน้ำตาลอินเวอร์ท์)

3.2 การหาปริมาณน้ำตาลซูโครสด้วยวิธี Luff-Schoorl

1. นำสารละลายตัวอย่างที่เตรียมได้จากข้อ 4 ของการหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์มา 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 250 มิลลิลิตร
2. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1:1 (โดยปริมาตรต่อปริมาตรในน้ำกลั่น) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงไปผสม
3. นำขวดปรับปริมาตรไปวางลงในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

4. เอาออกมาวางไว้ให้เย็น แล้วเติมฟีนอล์ฟทาลีนลงไป 2-3 หยด

หมายเหตุให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. ไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 6 N เมื่อใกล้จุดยุติ เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.5 N ลงไป ปริมาณเล็กน้อย จนกระทั่งสีแดงของสารละลายหายไป
6. ทำการเจือจาง และปรับปริมาตรของสารละลายด้วยน้ำกลั่น แล้วเขย่าเพื่อให้เกิดการผสมกัน

วิธีการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลซูโครส

1. นำสารละลายที่เตรียมได้จากก่อนและหลังการย่อยด้วยกรด มาเจือจางให้มีน้ำตาลรีดิวซ์ประมาณ 15-60 มิลลิลิตร ต่อ 25 มิลลิลิตรของสารตัวอย่าง
2. ใส่สารละลาย Luff-Schoof ลงไปในพลาสติกขนาด 300 มิลลิลิตร 2 ใบ ปริมาตรใบละ 25 มิลลิลิตร
3. เติมสารละลายตัวอย่างที่เจือจางแล้วปริมาตร 25 มิลลิลิตรลงไป โดยพลาสติกใบแรก เติมสารละลายตัวอย่างก่อนการย่อยสลายด้วยกรด และใบหลังเติมสารละลายตัวอย่างที่ได้หลังจากการย่อยด้วยกรด
4. ใส่ antifoam-chip ลงในพลาสติก
5. ทำการreflux โดยปรับอุณหภูมิให้สารละลายเดือดเป็นเวลา 2-3 นาที แล้วลดอุณหภูมิของการ reflux ลงไป ปล่อยให้ทิ้งไว้ให้เดือดเบาๆอีก 10 นาที หลังจากนั้นทำให้เย็นในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
6. เติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ (30%w/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วค่อยๆ เติมด้วย 25 มิลลิลิตร ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 3 โมลาร์ อาจเติม isopentanol ลงไป 2-3 หยด เพื่อป้องกันการเกิดฟอง
7. เมื่อไม่มีฟองเกิดขึ้นแล้ว นำไปไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนกระทั่งสารละลายไม่มีสี จึงเติมน้ำแข็ง (ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก) ลงไป 2-3 มิลลิลิตรแล้วไตเตรตต่อจนกระทั่งสารละลายไม่มีสี ปริมาตรที่ได้เท่ากับ x มิลลิลิตร
8. ไตเตรตสารละลาย blank โดยใช้ น้ำกลั่นแทนสารละลายตัวอย่าง แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกับสารละลายตัวอย่าง ปริมาตรที่ได้เท่ากับ y มิลลิลิตร
9. เมื่อนำปริมาตร y-x จะเป็นปริมาตรของสาร copper ที่ถูกรีดิวซ์ด้วยน้ำตาลในสารละลายตัวอย่าง ซึ่งสามารถเปิดเทียบค่าได้จากตารางภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

10. กำหนดหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (ร้อยละน้ำตาลรีดิวซ์) ในรูปน้ำตาลอินเวอร์ทที่ไตเตรตได้จากสารละลาย ทั้งก่อนและหลังการย่อยสลายน้ำตาลด้วยกรด

11. กำหนดหาปริมาณน้ำตาลน้ำตาลซูโครสในตัวอย่าง เมื่อกำหนดให้

BI = ค่าร้อยละของน้ำตาลรีดิวซ์ก่อนการย่อยสลายน้ำตาลด้วยกรดในรูปน้ำตาลอินเวอร์ท

TI = ค่าร้อยละของน้ำตาลรีดิวซ์หลังการย่อยสลายน้ำตาลด้วยกรดในรูปน้ำตาลอินเวอร์ท

ปริมาณน้ำตาลซูโครส กำหนดได้จากสูตร

$$\text{ร้อยละน้ำตาลซูโครสในตัวอย่าง} = (TI - BI) \times 0.95$$

4. การหาปริมาณกรดแลกติกโดยการวัดสี (Barber and Summerson, 1941)

สารเคมี

- sulphuric acid A.R. grade
- ผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ A.R. grade
- colour reagent เตรียมโดยละลาย 1.5 กรัมของ p-hydroxybiphenyl ในสารละลาย 0.5% NaOH ปริมาณ 10 มิลลิลิตร
- สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 4 และความเข้มข้นร้อยละ 20
- สารละลายมาตรฐาน เตรียมโดยเติมสารลิเทียมแลคเตท ปริมาณ 213 มิลลิกรัม ในน้ำกลั่นปริมาณเล็กน้อย แล้วเติมกรดซัลฟูริก 0.5 มิลลิลิตร ทำสารละลายให้เจือจางเป็น 500 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่น ปริมาณของกรดแลกติกสุดท้ายจะมีค่า 40 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร

วิธีการวิเคราะห์

1. ชั่งตัวอย่างโกโก้ 10 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมน้ำกลั่นลงไป 50 มิลลิลิตร ปิดฝาต้มให้เดือดนานประมาณ 30 นาที
2. กรองของผสมผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 ด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ
3. เจือจางสารละลายให้มีปริมาณกรดแลกติกอยู่ในช่วง 10- 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
4. บีบเปิดสารละลายตัวอย่างที่เจือจางเหมาะสม 2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง
5. เติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ความเข้มข้นร้อยละ 20 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเจือจางด้วยน้ำกลั่นเป็น 10 มิลลิลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. เติมผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไป 1 กรัม และเขย่าอย่างแรง ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที แล้วนำไปเหวี่ยงแยก
7. ปิเปตสารละลายส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง
8. เติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตความเข้มข้น ร้อยละ 4 ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตรลงไป
9. เขย่าพร้อมกับเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ลงไป และเขย่าอีกครั้ง
10. วางในเครื่องอังน้ำเดือดเป็นเวลา 7 นาที แล้วทำให้อุณหภูมิลดลงถึง 20 องศาเซลเซียส ในอ่างน้ำแข็ง
11. เติมสาร colour reagent ลงไป 0.1 มิลลิลิตร
12. เขย่าและตั้งทิ้งไว้ใน waterbath อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
13. นำมาเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้ใน waterbath อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอีกไม่น้อยกว่า 15 นาที แล้วนำหลอดไปวางในน้ำเดือดนาน 1.5 นาที เพื่อละลายตะกอน
14. ทำให้เย็นโดยผ่านน้ำก๊อก แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร (สีที่ปรากฏจะมีความคงตัวในระยะเวลาสั้นๆ)
15. เตรียมกราฟมาตรฐานโดยใช้สารละลายลิเทียมแกลกเตท
16. เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้กับกราฟมาตรฐานแล้ว คำนวณปริมาณกรดแลคติก

5. การหาปริมาณกรดทั้งหมด (A.O.A.C.,1990)

สารเคมี

- สารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 N
- ฟีนอล์ฟทาลีน

วิธีการวิเคราะห์

1. นำตัวอย่างเชื้อหุ้มหรือเมล็ดโกโก้มา 5 กรัม เติมน้ำกลั่นปรับปริมาตรเป็น 50 มิลลิลิตร
2. ผสมให้เข้ากัน โดยการปั่นผสมด้วยเครื่องปั่น เป็นเวลา 5 นาที อาจต้องกรองเอาตะกอนออก หากมีตะกอนมาก
3. ไตเตรตสารละลายกับสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 N หากจุดยุติ มีฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

4. คำนวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก จากสูตร

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซัลฟูริก(\%)} = \frac{\text{ไตเตรท} \cdot N \cdot 64 \cdot 100}{\text{มิลลิลิตรของสารตัวอย่าง} \cdot 100}$$

6. การหาปริมาณของกรดที่ระเหยได้ (A.O.A.C.,1990)

สารเคมี

- สารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.01 N
- ฟีนอล์ฟทาลีน

วิธีการวิเคราะห์

1. นำตัวอย่างโกโก้ผงมา 10 กรัม กลั่นด้วยไอน้ำ ให้ได้ปริมาตรของของเหลวที่รองรับได้ 250 มิลลิลิตร
2. ทำการไตเตรตของเหลวที่ได้จากการกลั่นในข้อ 1 ด้วยสารละลายมาตรฐาน โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.01 N โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์
3. กำหนดปริมาณกรดที่ระเหยได้ในรูปของกรดแอสซิติค

$$\text{มิลลิลิตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 N} = 0.006 \text{ กรัมกรดแอสซิติค}$$

ภาคผนวก ค

ตารางผลการวิจัยและตารางวิเคราะห์ทางสถิติ

ตารางภาคผนวกที่ ค1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์ แบคทีเรียแลคติกและแบคทีเรียแอซีติกในระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้

ระยะเวลา การหมัก (วัน)	log no. ของปริมาณ			
	จุลินทรีย์ทั้งหมด	ยีสต์	แบคทีเรียแลคติก	แบคทีเรียแอซีติก
0	3.54	3.35	3.53	3.41
1	6.78	7.28	6.65	5.60
2	7.63	7.45	7.45	5.78
3	7.43	7.41	7.39	6.88
4	6.31	6.37	6.22	5.57
5	5.60	5.48	5.78	5.48
6	5.48	6.39	6.23	5.86
7	7.17	7.93	7.88	6.22

ตารางภาคผนวกที่ ค2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกองหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ชุดควบคุม	28 a	28 a	28 a	33 a	37 a	41 a	41 a	37 a
ยีสต์+แบคทีเรีย แลคติก	28 a	29 a	30 a	34 a	39 a	42 a	42 a	40 a
ยีสต์ทั้งหมด	28 a	31 a	31 a	39 a	44 a	42 a	42 a	42 a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ ค3 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเชื้อหุ้มเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)				
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
ยีสต์ทั้งหมด	4.95a	5.70a	5.82a	5.95a	6.00a
ยีสต์+แบคทีเรีย	4.95a	5.55a	5.57a	5.62a	5.81a
แลคติก					
ชุดควบคุม	4.95a	5.19a	5.20a	5.35a	5.40a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ ค4 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	7.01a	6.80a	6.29a	6.24a	5.70a	5.65a	5.45a	5.40b
ยีสต์+แบคทีเรีย	7.01a	6.95a	6.80a	6.45a	6.00a	5.25a	5.00a	4.80
แลคติก								ab
ชุดควบคุม	7.01a	6.79a	6.73a	5.50a	5.26a	4.76a	3.36a	3.40a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกในเมล็ด โกโก้ระหว่าง
การหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	0.001	0.003	0.009	0.015	0.028	0.039	0.047	0.060
	a	a	a	a	a	a	a	a
ยีสต์+แบคทีเรีย แลคติก	0.001	0.003	0.013	0.019	0.030	0.042	0.055	0.062
	a	a	a	a	a	a	a	a
ชุดควบคุม	0.001	0.005	0.017	0.024	0.033	0.048	0.061	0.070
	a	a	a	a	a	a	a	a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ 6 การเปลี่ยนแปลงกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริกในเมล็ด โกโก้
ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	0.035	0.035	0.043	0.041	0.070	0.053a	0.052	0.040
	a	a	a	a	a		a	a
ยีสต์+แบคทีเรีย แลคติก	0.035	0.045	0.045	0.059	0.065	0.067	0.088	0.051
	a	a	a	a	a	ab	a	a
ชุดควบคุม	0.035	0.045	0.081	0.083	0.094	0.111b	0.073	0.064
	a	a	a	a	a		a	a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ ค7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดที่ระเหยได้ในรูปกรดแอสติกใน
เมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	0.108	0.192	0.324	0.516	0.480	0.396	0.264	0.156
	a	a	a	a	a	a	a	a
ยีสต์+แบคทีเรีย	0.108	0.228	0.336	0.564	0.516	0.444	0.288	0.180
แลคติก	a	a	a	a	a	a	a	a
ชุดควบคุม	0.108	0.312	0.480	0.636	0.588	0.468	0.336	0.240
	a	a	a	a	a	a	a	a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ ค8 การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลรีดิวซ์ในเยื่อหุ้มเมล็ดโกโก้ระหว่างการ
หมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)				
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
ยีสต์ทั้งหมด	0.85a	0.45a	0.21a	0.15a	0.09a
ยีสต์+แบคทีเรีย	0.85a	0.50a	0.29ab	0.20a	0.19b
แลคติก					
ชุดควบคุม	0.85a	0.73a	0.56b	0.39b	0.24b

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ ค9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	0.47a	0.48a	0.73a	0.79a	0.88a	0.95a	1.10b	0.98a
ยีสต์+แบคทีเรีย แลคติก	0.47a	0.48a	0.69a	0.75a	0.81a	0.90a	0.95	0.95a
ชุดควบคุม	0.47a	0.49a	0.92a	0.67a	0.75a	0.82a	0.80a	0.91a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ ค10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเชื้อหมักเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)				
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
ยีสต์ทั้งหมด	0.981a	0.103a	0.093a	0.070a	0.050a
ยีสต์+แบคทีเรีย แลคติก	0.981a	0.115a	0.096a	0.083a	0.076ab
ชุดควบคุม	0.981a	0.157a	0.124a	0.098a	0.095b

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ ก11 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	1.540	0.907	0.754	0.683	0.634	0.596	0.283	0.250
	a	a	a	a	a	a	a	a
ยีสต์+แบคทีเรีย	1.540	1.011	0.927	0.786	0.749	0.652	0.400	0.320
แลคติก	a	a	a	a	a	a	a	a
ชุดควบคุม	1.540	1.312	1.055	0.917	0.748	0.632	0.511	0.430
	a	b	a	a	a	a	a	a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสมมุติเดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

ตารางภาคผนวกที่ ก12 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีการหมักของเมล็ดโกโก้ระหว่างการหมัก

ชุดการทดลอง	ระยะเวลา(วัน)							
	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
ยีสต์ทั้งหมด	0.410	0.437	0.427	0.499	0.828	0.978	1.042	1.074
	a	a	a	a	a	a	a	a
ยีสต์+แบคทีเรีย	0.410	0.433	0.447	0.472	0.535	0.807	0.981	1.021
แลคติก	a	a	a	a	a	a	a	a
ชุดควบคุม	0.410	0.467	0.564	0.599	0.657	0.923	0.957	0.964
	a	a	a	a	a	a	a	a

*ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ 2 ซ้ำ

อักษรเหมือนกันในสมมุติเดียวกันแสดงว่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางนัยสำคัญ $P < 0.05$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง

คุณสมบัติทางสัณฐาน สรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์

ตารางภาคผนวกที่ ง1 คุณสมบัติทางชีวเคมีของยีสต์ซึ่งแยกได้จากการหมักเมล็ด โกโก้

	<u>Saccharomyces cerevisiae</u>	<u>Candida sorbosa</u>	<u>Candida tropicalis</u>
แอสซิมิเลชัน			
เดกซ์โทรส	+	+	+
มอลโตส	+	-	+
ซูโครส	+	-	+
แลคโตส	-	-	-
กาแลคโตส	+	-	+
เมลลิไบโอส	-	-	-
เซลลูโลส	-	-	+
อินโนซิทอล	-	-	-
ไซโลส	-	-	+
ราฟไฟโนส	+	-	-
ทรีฮาโลส	+	-	+
คูซิทอล	-	-	-
เฟอร์เมนเทชัน			
เดกซ์โทรส	AG	+	+
กาแลคโตส	AG	-	+
ซูโครส	AG	-	+
มอลโตส	AG	-	+
ทรีฮาโลส	AG	-	+
แลคโตส	-	-	-
ราฟไฟโนส			

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น. ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Sab's broth	+	+	+
Urease	-	-	-

AG = มีการสร้างกรดและแก๊ส

คุณสมบัติทางกายภาพของยีสต์ซึ่งแยกจากการหมักเมล็ดโกโก้

Candida sp.

ลักษณะการเจริญบนอาหาร 2% glucose-yeast extract-peptone agar : โคลิโคนี้มีรูปร่างกลมมน สีขาว ผิวเรียบ ขอบโคโลนีเรียบ รอบโคโลนีมีเส้นใยยื่นออกมา

ลักษณะใน slide culture บนอาหาร com meal agar : เชื้อสามารถสร้างได้ทั้ง true mycelium และ pseudomycelium

ลักษณะการสืบพันธุ์ : ไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เชื้อมีการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ(budding) เซลล์แม่แต่ละเซลล์สามารถแตกหน่อได้จากทุกตำแหน่งของเซลล์(multilateral budding)

Saccharomyces sp.

ลักษณะการเจริญบนอาหาร 2% glucose-yeast extract-peptone agar : โคลิโคนี้มีรูปร่างกลมมน สีขาวและสีครีม ผิวเรียบ

ลักษณะใน slide culture บนอาหาร com meal agar : เชื้อสามารถสร้างได้ทั้ง true mycelium และ pseudomycelium

ลักษณะการสืบพันธุ์ : มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยเชื้อจะสร้าง ascospore

ตารางภาคผนวกที่ 2 คุณสมบัติทางสัณฐาน สรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติก


ลักษณะที่ศึกษา	<u>Streptococcus</u>	<u>Lactobacillus</u>
รูปร่าง	กลม	แท่ง
การติดสีแกรม	+	+
การสร้างเอนไซม์คาตาเลส	-	-
รูปแบบของการหมัก	ไฮโมเฟอร์เมนเตติฟ	เฮเทอโรโรเฟอร์เมนเตติฟ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก จ

ตัวย่อและสัญลักษณ์

CFU	= Colony Forming Unit
MRS	= De Man, Rogosa and Sharp agar ใช้ในการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติก
DSM	= Dextrose Sorbitol Mannitol ใช้ในการคัดเลือกแบคทีเรียแอซิดิก
PDA	= Potato Dextrose Agar ใช้ในการเพาะเลี้ยงยีสต์
AA	= Acetolacter Agar ใช้ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแอซิดิก
TYGKCP	= อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วย tryptone, Yeastextract, Glucose, K_2HPO_4 and Cocoa pulp extract
OD	= Optical Density



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- นิยม คำลั้งดี. 2537. การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และชีวเคมี ในระหว่างการหมักเมล็ด
โกโก้ด้วยเชื้อยีสต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
- ดวงใจ ช่วยสถิตย์. 2535. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักโกโก้.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ประพันธ์ บุญกลั่นขจร, ศรี ปิยะพงศ์, เชิญ คำวัก, โกวิท ยันตศาสตร์, เกรียงศักดิ์
ศิริพงษาโรจน์ และ สุมาลัย ศรีกำไลทอง. 2529. เกษตรและอุตสาหกรรมโกโก้.
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ.
- ผานิต งานกรณาธิการ. 2532. พันธุ์โกโก้. เอกสารประกอบการประชุมเรื่องโกโก้กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม, 31 มกราคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บาง
เขน กรุงเทพฯ.
- ผานิต งานกรณาธิการ และวิทย์ สุวรรณวุธ. 2531. บทบาทของโกโก้ในทศวรรษหน้า
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง พืชเศรษฐกิจขึ้นต้น, 23-25 พฤศจิกายน 2531.
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.
- ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาศิก, กนก ตีระวัฒน์, ไพศาล วุฒิจำนงค์, เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิด
กุล, พรชัย ศรีไพบุลย์, มนัส ชัยสวัสดิ์, สมชาย สุคนธสิงห์, เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ
และ ปิยนุช นาคะ. 2534. โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีแปรรูปเมล็ด คโกโก้
แห่ง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 1-193 หน้า.
- มณฑา ส. รัตนูปถัมภ์ 2531 พืชที่น่าสนใจในภาคใต้ โกโก้พืชนำปลูกจริงหรือไม่.ว.
เกษตรชาวใต้ 1(2) : 6-10
- ยอดยิ่ง กงทอง. 2529. ภาวะการค้าต่างประเทศของโกโก้. รายงานสัมมนาเรื่องโกโก้
พืชความหวังใหม่. กรมส่งเสริมการเกษตร, มิถุนายน 2529. หน้า 33-35.
- วิทย์ สุวรรณวุธ. 2527. การพัฒนาโกโก้ในประเทศไทย. รายงานสัมมนาเรื่องมะพร้าว
และโกโก้, 19-23 กรกฎาคม 2527. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. หน้า 41-44.
- สมศักดิ์ วรรณศิริ 2532 สวนโกโก้. ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, กรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อรพิน ภูมิภมร, ปิยนุช นาคะและ อัมพล จุลสวัสดิ์ 2536 การหมักโกโก้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์ ฟิสิกส์ และเคมี ในระหว่างการหมักโกโก้ ว. เกษตรศาสตร์ (วิทช.) 27: 303-313

A.O.A.C. 1984 official method of analysis of the association of analytical chemists . 14th ed. Association of official Analytical Chemist,USA.

A.O.A.C. 1990. Official method of analysis of the association of analytical chemist. 14th ed. Association of official analytical chemist, USA.

Abdul Samah, O., Fared Putih, M., Selamat, J. and Alimon, H. 1993. Fermentation product in cocoa beans inoculated with *Acetobacter xylinum*. ASEAN Food J. 86(1) : 22-25.

Abiola, S.S. and Tewe, O.O. 1991 Chemical evaluation of cocoa by-product. Trop. Agric. 68 [4] : 335-336

American Public Health Association. 1960 . Standard method for the examination of dairy products. 11th ed. American public Health Association, Inc New York.

Barber, S. B. and Summerson, W. M. 1941. Analytical of lactic acid in fruits. J. Biol. Chem. 138: 535.

Berbert, P. R. F. 1979. Contribuicao para o conhecimento dos acucares componentes da amendoa e do mel de cacau. Revista Theobroma. 9: 955.

Biehl, B., Meyer, Crone, G. and Pollman, L. 1989. Chemical and physical changes in the pulp during ripening and postharvest storage of cocoa pods. J. Sci. Food Agric. 48: 189-208.

Biehl. B., Brunner, E., Passern, D., Quesnel, V.C. and Adomako, D. 1985. Acidification Proteolysis and flavour potential in fermenting cocoa beans. J. Sci. Food Agric. 36 :583-598.

Carr, J. G., Davies, P. A. and Dougan. 1980. Cocoa Fermentation in Ghana and Malaysia. Part II. Further microbiological methods and results. Ghana: The Cocoa Research Institute.

Carr, J. G., Davies, P. A. and Dougan. 1981. Cocoa Fermentation in Ghana and Malaysia. Proc. Conference International sur la Recherche Caoyere, Teme,

- Douala, Cameroun, Actes. London: J. de Lafforest and Transla-Inter Limited. 573.
- De Camargo, R., Leme, J. and Martinelli, A. 1963. General observations on the microflora of fermenting cocoa beans in Bahia (Brazil). *Food Technol.* 19: 116-117.
- Dewitt, K. W. 1957 . Nitrogen metabolism in fermenting cocoa. In A Report on Cocoa Research, 1955-1965. p.54 The imperial College of Tropical Agriculture. St Augustine,Trinidad. cited by Lehrian. D.W. and Patterson, G.R. 1983 Cocoa fermentation. In *Biotechnology*. [ed. Reed. G., and Rehm, H.J] vol. 5 Food and Feed production with microorganisms [vol. ed Reed, G.] pp. 531-575,Wienheim:Verlag Chemie.
- Dougan, J. 1980. *Methods for the Analysis of Cocoa Pulp and Cotyledons*. London: Tropical Products Institute.
- Dougan, J., Duncan, R. J. E., Jardine, Robinson, Simmons, P. M. and Woodage,C. 1981. The Relationship Between Oxygen, Temperature, Acetic Acid and Lactic Acid During Cocoa Fermentation. London: Cocoa Chocolate and Confectionery Alliance.
- Egan, H., Rick, R. S. and Sawyer, R. 1981. *Pearson's chemical analytical of food*. 8th ed. Edinburgh, Churchill Livingstone.
- Forsyth, W. G. C. and Quesnel, V. C. 1957. Variations in cocoa preparation.VI. Conf. Interam. de Cacao Salvador, Bahia. cited by Wood, G. A. R. and Lass. 1985. *Cocoa*, 4th ed, Tropical Agriculture Series, Longman, New York. 157-168.
- Gibson, T. and Abd-el-Malek, Y.1948. The formation of carbondioxide by lactic acid bacteria and *Bacillus licheniformis* and a cultural method of detecting the process. *J. Dairy Res.* 14:35.
- Gourieva, V. B. and Tserevitinov. 1979. Method of evaluating the degree of fermentation of cocoa beans. USSR. State Committe on Invention and Discoveries, UDC 911. 13.

- Hancock, B. L. 1949. Quality in cocoa. Trinidad Rep. Cocoa Conf, London. 75-79.
cited by Wood, G. A. R. and Lass. 1985. Cocoa, 4th ed, Tropical Agriculture Series Longman, New York. 461-462.
- Hoskin, J. C. and Dimick, P. S. 1984. Role of non-enzymatic browning during the processing of chocolate flavour: A Review. Proc. Biochem. 19 (3): 92.
- Jinap, S. and Dimick, P.S. 1990. Acidic characteristics of fermented and dried cocoa beans from different origins. J. Food Sci. 55(2) : 547-550.
- Keeney, P. G. 1972. Various interactions in chocolate flavour. J. Am. Oil Chem. Soc. 49 (10): 567.
- Knapp, A. W. 1926. Experiment in the fermentation of cocoa. J. Soc. Chem. Ind. 45 : 140-142. cited by Wood, G. A. R. and Lass. 1985. Cocoa, 4th ed, Tropical Agriculture Series, Longman, New York.
- Kreger-van Rij N.J.W. 1984 . The yeast -a taxonomic study Elsevier Science Publishers Amsterdam.p. 1082
- Lehrian, D. W. and Patterson, G.R. 1983. Cocoa fermentation on Biotechnology. Weinheim: Verlag Chemie. Food and Feed Production with Microorganisms. Rehm, H. J. and Reed, G. 5:531-575.
- Lopez, A. and Quesnel, V. C. 1973. Volatile fatty acid production in cocoa fermentation and effect on chocolate flavour. J. Sci. Food Agric. 24 : 319-326.
- Offem, J. O. 1990. Individual variation in the amino acid and chemical composition of defatted cocoa bean meal of three varieties of cocoa (*Theobroma cocoa*) from South-eastern Nigeria. J. Sci. Food Agric. 52 : 129-135.
- Ostovar, K. and Keeney, P. G. 1973. Isolation and characterization of microorganisms involved in the fermentation of Trinidad's cocoa beans. J. Food Sci. 38 : 11-61.
- Passos, F. M. L., Solva, D. O., Lopez, A., Ferreira, C. L. L. F. and Guimaraes, W. V. 1984. Characterization and distribution of lactic acid bacteria

- from traditional cocoa bean fermentations in Bahia (Brazil). *J. Food Sci.* 49(1) : 205-208.
- Quesnel, V.C. 1965. Agents inducing the death of cocoa seeds during fermentation. *J. Sci. Food Agric.* 16 : 441-447.
- Reineccius, G. A., Andersen, D.A., Kavanagh, T.E. and Keeney, P.G. 1972. Identification and quantification of the free sugars in cocoa beans. *J. Agric. Food chem.* 20:199-202.
- Roelofsen, P. A. 1958. Fermentation, Drying and Storage of cocoa beans. *Adv. Food Res.*, 8 : 25-296
- Rohan, T. A. 1963. Processing of raw cocoa for the market. *FAO Agricultural Studies No. 60.* Rome: FAO.
- Rohan, T. A. 1964. Precursors of chocolate aroma. A comparative study of fermented and unfermented cocoa beans. *J. Food Sci.* 29 : 456-459.
- Rohan, T. A. and Stewart, T. 1964. The volatile and non-volatile acids of cocoa beans. *Rev. Int. Choc.* 19 (11): 503.
- Rohan, T. A. and Stewart, T. 1967. Precursors of chocolate aroma : Production of free amino acids during fermentation of cocoa beans. *J. Food Sci.* 32 : 395.
- Rombouts, J.E. 1952 Observations on the microflora of fermenting cocoa beans in Trinidad. *Proc. Soc. Appl. Bacteriol.* 15, 103. cited by de Camargo, R., Leme, J., and Martinelli, A. 1963. General observation on the microflora of fermenting cocoa beans (*Theobroma cacao*) in Bahia (Brazil). *Food Technol.* 19 : 116-117.
- Romboute, J. E. 1952. Observation on the microflora of fermenting cocoa beans in Trinidad *Proc. Soc. Bacteriol.* 15: 111-130.
- Sharpe, M.E. and Fryer, T.F. 1966 Identification of the lactic acid bacteria. In *Identification methods for Academic Press, London.* p. 65-79.
- Wadsworth, R. V. and Howat, G.R. 1954 Cocoa fermentation. *Nature.* 28 : 392-394

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Wood, G. J. B. and Lass, R.A. 1985. Cocoa, 4th ed, Tropical Agriculture Series. Longman, New York.
- Zak, D. K., Ostovar, K. and Keeney, P. G. 1972. Implication of *Bacillus subtilis* in the synthesis of tetramethylpyrazine during fermentation of cocoa beans. J. Food Sci. 37 : 967-968.
- Zak, D. K. and Keeney, P. G. 1976. Extraction and fractionation of cocoa protein as applied to several varieties of cocoa beans. J. Agric. Food Chem. 24(3) : 479-482.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้