

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

เรื่อง

อิทธิพลของสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก

Effect of some Chemical Substances on the Germination of Bean Sprout

(Phaseolus aureus L.)



T100010



โดย

นายนราธิป แสงสุวรรณ

นายคเชนทร์ ศิริหล้ม้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. รัชชัย อุบลเกิด

ส/พ.
๔๖ ๒ ๓๓๑
๒๕๔๘

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน...100010..

วัน,เดือน,ปี...17 11 2548..

เสนอ

b. 116๕๐๐๕๐
i.

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่)

พุทธศักราช ๒๕๔๘

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบรับรองปัญหาพิเศษปริญญาตรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เรื่อง

อิทธิพลของสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก

Effect of some Chemical Substances on the Germination of Bean Sprout

(*Phaseolus aureus* L.)

โดย

นายนราธิป แสงสุวรรณ

นายคเชนทร์ ศิริหาล้า

ได้รับพิจารณาเห็นชอบจาก

(อ. ธวัชชัย อุดมเกิด)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชารับรอง

(รศ. ดร. สมยศ เดชภิรัตน์มงคล)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เรื่อง : อิทธิพลของสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก
โดย : นาย นราธิป แสงสุวรรณ
 : นาย คเชนทร์ ศิริหาล้า
ภาควิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธวัชชัย อุบลเกิด

บทคัดย่อ

การศึกษอิทธิพลของสารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก จุดประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาถึงสารเคมีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและรากของถั่วงอกพันธุ์กำแพงแสน 2 และมีการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 9 สิ่งทดลอง กับ 1 ตัวควบคุม จำนวน 3 ซ้ำ ใช้สาร 5 ชนิด คือ ฮอริโมน BA, ฮอริโมน BA+GA₃, ฮอริโมน GA₃, น้ำตาลและสารประกอบอะมิโนแอซิด

พบว่าความยาวเฉลี่ยของลำต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยฮอริโมน BA+GA₃ มีความยาวเฉลี่ยดีที่สุด คือ 6.93 เซนติเมตร รองลงมาคือ ฮอริโมน GA₃ 6.16 เซนติเมตร

ในการเปรียบเทียบความยาวเฉลี่ยของรากพบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยฮอริโมน BA+GA₃ มีความยาวเฉลี่ยสั้นที่สุด คือ 5.06 เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ำตาล 6.07 เซนติเมตร

ในการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของต้นถั่วงอกให้ผลการเจริญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยถั่วงอกที่ได้จากการรดด้วยฮอริโมน BA+GA₃ มีน้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุด คือ 384.25 กรัม และรองลงมาคือถั่วงอกที่ได้จากการรดฮอริโมน BA ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ย คือ 362.51 กรัม

จากการศึกษอิทธิพลของสารเคมีบางชนิด ที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอก ผลจากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อใช้สาร BA+ GA₃ จะให้ผลดีที่สุดและให้ผลผลิตถั่วงอกที่มีลักษณะอ้วนรากสั้นดีกว่าสารอื่น ๆ เป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค จึงเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตเพื่อรับประทานเองและสามารถใช้ในการผลิตเป็นการค้าขนาดเล็กได้ด้วย ทั้งยังช่วยให้เราได้ถั่วงอกที่ปลอดสารพิษอีกด้วย

คำสำคัญ : ถั่วงอก, ฮอริโมน, ราก, ลำต้น

Title : Effect of some Chemical Substances on the Germination of
Bean Sprout (*Phaseolus aureus* L.)
Author : Mr. Narathip Sangsuwan
: Mr. Kachain Silila
Department : Plant Production Technology
Faculty : Agricultural Technology
Advisor : Mr. Tawatchai Ubonkerd

Abstract

Effect of some chemical substances on the germination of bean sprout. For experiment study on growth and development of hypocotyl and radicle of bean sprout kampangsaen 2. The experiment was Completely Randomized Design (CRD), 9 treatments and water(control), 3 replications. substance consist of hormone BA, hormone BA+GA₃, hormone GA₃, Sugar and amino acid.

The results indicated that average length of hypocotyl concluded that bean sprouts were significantly average length of hypocotyl which dipped in hormone BA+GA₃ was the best 6.93 centimeters and was 6.16 centimeters with hormone GA₃ was shorter than hormone BA+GA₃.

The resulte indicated the average length of radicle concluded that bean sprouts were significantly average length of radicle which dipped in hormone BA+GA₃ was the shortest was 5.06 centimeters and was 6.07 centimeters in sugar with was longer than hormone BA+GA₃.

And average weight after dipped bean sprouts in hormone BA+GA₃ was the highest 384.25 gram and dipped bean sprouts in hormone BA with was less weight than hormone BA+GA₃ 362.51 gram, the result of average weight were significantly.

Key word : bean sprout, hormone, hypocotyl, radicle

คำนิยม

ปัญหาพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ อ. ธวัชชัย อุบลเกิด อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษที่เคารพ เป็นอย่างสูง ที่คอยให้คำแนะนำและตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ นายสยามรัตน์ เกียงคำ และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ เพื่อนทั้งสองคนที่คอยดูแลและช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการศึกษาและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณครับ

นราธิป แสงสุวรรณ
คเชนทร์ ศิริห้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญตารางผนวก	(3)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	1
การตรวจเอกสาร	2
อุปกรณ์และวิธีการ	17
ผลการทดลอง	19
วิจารณ์	23
สรุป	24
เอกสารอ้างอิง	25
ภาคผนวก	27
ประวัติผู้เขียน	30



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการงอก	5
2	อุณหภูมิที่เมล็ดสามารถงอกได้	6
3	คุณค่าทางอาหารของถั่วงอกดิบและสุก	16
4	ผลความยาวเฉลี่ยของต้น (hypocotyl) โดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ	20
5	ผลความยาวเฉลี่ยของราก (radicle) โดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ	21
6	ผลน้ำหนักโดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ	22



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตารางผนวก

ตารางผนวกที่		หน้า
1	การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของความยาวต้น (hypocotyl) ของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ	28
2	การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของความยาวราก (radicle) ของถั่วงอกใน	28
3	การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของน้ำหนักของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ	29



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ถั่วงอกเป็นผลิตผลที่ได้จากการเพาะถั่วงอกเขียวอายุประมาณ 3-4 วัน เนื่องจากถั่วงอกเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย สามารถนำมาบริโภคแทนผักสดกันอย่างแพร่หลาย และเป็นพืชผักปลอดสารพิษ จึงมีผู้ทำการเพาะถั่วงอกเป็นอาชีพกันมาก เนื่องจากใช้ต้นทุนน้อยและให้ผลตอบแทนสูง ส่วนการทดลองในครั้งนี้จะใช้สารฮอร์โมน GA₃, ฮอร์โมน BA, น้ำตาล, สารประกอบอะมิโนแอซิด และฮอร์โมน GA₃+BA เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดสามารถนำมาเพาะถั่วงอกเพื่อผลิตรับประทานในครัวเรือนได้และไม่ทำให้เกิดสารพิษตกค้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสารฮอร์โมนชนิดหนึ่งและใช้ในปริมาณที่น้อย โดยองค์ประกอบของสารคือ จิบเบอเรลลินและไซโตไคนิน ซึ่งไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค การใช้สารชนิดนี้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณให้กับถั่วงอกได้ดีกว่าการเพาะถั่วงอกโดยวิธีอื่น หรือไม่ใช้สารอะไรเลย โดยลักษณะของถั่วงอกที่ได้จะมีขนาดความยาวของ Hypocotyl ที่อวบอ้วนและยาวขึ้นทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด วิธีการเพาะถั่วงอกโดยวิธีนี้ ปัจจุบันได้เป็นที่แพร่หลายกันมาก แต่ที่สำคัญคือ ถั่วงอกในตลาดส่วนใหญ่จะมีการปลอมปนของสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่มาก ซึ่งสารเหล่านี้จะสะสมภายในร่างกายของผู้บริโภคซึ่งอาจนำไปสู่สารก่อมะเร็ง ซึ่งเราสามารถใช่วิธีการเพาะถั่วงอกโดยวิธีนี้ เท่านั้นเราก็จะได้ถั่วงอกที่กรอบอร่อยไม่ดำและยังปลอดสารพิษอีก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของสาร GA₃, BA, BA+GA₃, น้ำตาล, สารประกอบอะมิโนแอซิด ที่มีผลต่อการงอกของถั่วงอกและลักษณะของถั่วงอกซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือเทคนิคในการเพาะถั่วงอกเพื่อการผลิต การค้า และการบริโภคในครัวเรือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตรวจเอกสาร

ถั่วเขียวมีชื่อวิทยาศาสตร์เดิมว่า *Phaseolus aureus* L. ถั่วเขียวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น นำมาทำขนม อาหาร และสิ่งที่สำคัญคือ สามารถนำมาใช้เพาะถั่วงอกได้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วเขียว (ไล่ว, 2534)

ถั่วเขียวเป็นพืชใน

Family *Papilionaceae*

Genus *Vigna*

Species *radiata*

ราก ถั่วเขียวมีระบบรากแบบ tap root system รากที่เจริญมาจาก radicle คือรากแก้ว จะมีการแตกแขนงมาก และเจริญลงไปใต้ผิวดินค่อนข้างลึก ถั่วเขียวสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความชื้นจำกัด บริเวณรากจะพบปมซึ่งเกิดจากแบคทีเรียพวก *Rhizobium* spp. เข้าไปอาศัยอยู่เพื่อสร้างปมและตรึงไนโตรเจน การอยู่ร่วมกันระหว่างถั่วเขียวและแบคทีเรียนี้เรียกว่า symbiosis

ลำต้น ถั่วเขียวเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นตั้งตรงเป็นพุ่มสูงประมาณ 30-120 ซม. ลำต้นมีการแตกแขนง บางพันธุ์มีลำต้นแบบกึ่งเลื้อย ส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือใบเลี้ยง (cotyledon) ค่อนข้างเหลี่ยม มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่วไป

ใบ ใบของถั่วเขียวเป็นใบประกอบเกิดสลับบนลำต้น ใบประกอบหนึ่งๆประกอบด้วย ใบย่อย 3 ใบ แต่ต้นที่เกิดจากรากกลายสายพันธุ์ (mutation) สามารถมีใบย่อยมากกว่า 3 ใบ ก้านใบยาว ที่ฐานของก้านมีหูใบ 2 อัน ก้านใบย่อยสั้น ใบย่อยใบกลางมีหูใบย่อย 2 อัน ส่วนใบย่อย 2 ใบ ใบล่างมีหูใบย่อยข้างละอัน ใบขนปกคลุมทั่วไป เช่นเดียวกับลำต้น

ดอก ถั่วเขียวมีดอกที่เกิดเป็นช่อ ช่อดอกเกิดตามมุมใบที่อยู่ตอนบนของลำต้นและที่ปลายยอดของลำต้นหรือกิ่งก้าน ช่อของดอกถั่วเขียวเป็นแบบ condensed raceme คือมีก้านดอกยาว และมีดอกเกิดเป็นกลุ่มที่ปลาย ช่อดอกหนึ่งๆ มีดอกประมาณ 10-25 ดอก กลีบดอกมีสีม่วง เหลือง และ ขาว ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 ซม. แต่ละดอกประกอบด้วย calyx ที่มีฐานเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ที่ฐานของ calyx จะพบ calyx bract 2 อัน มีความยาวมากกว่า calyx เล็กน้อย corolla ประกอบด้วย 1 standard 2 wing 3 keel มี stamen 10 อัน เป็นแบบ diadelphonus คือฐานของ stamen 9 อันเชื่อมติด united stamen และอีก 1 stamen แยกอยู่เป็นอิสระ (free stamen) pistil มี ovary ยาวรี ovary หนึ่งๆ มีประมาณ 10-15 ovule

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฝัก และถั่วเขียว ฝักของถั่วเขียวมีรูปร่างกลมยาว ส่วนปลายอาจโค้งออกเล็กน้อยเมื่อแก่ ฝักจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม และดำและขาวนวลแตกต่างกันไปตามพันธุ์ ฝักหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ดประมาณ 10-15 เมล็ด น้ำหนัก 1000 เมล็ดประมาณ 20-80 กรัม

เมล็ด คือไข่ (ovule) ที่ได้รับการผสมแล้ว เมื่อเจริญเติบโตจนแก่สุก คัพภะ (embryo) ซึ่งพักตัว (dormant) อยู่ภายใต้เปลือกนอกเรียกว่า seed coat หรือ testa และอาจมีอาหารเก็บค้าง อยู่ในเมล็ดนั้นด้วย คัพภะจะสามารถคงความงอกงามไว้ได้ ในขณะที่เมล็ดอยู่ในระยะพักตัว เมื่อพ้นระยะพัก และได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การงอกแล้ว คัพภะก็จะงอกออกมา เมล็ดเป็นสิ่งจำเป็นของการสำหรับการกระจายพันธุ์ ซึ่งอากาศ, น้ำ และสัตว์ เป็นพาหะที่ดีที่จะนำเมล็ดไปตกที่ ต่าง ๆ แล้วก็จะงอกเป็นต้นอ่อนต่อไปได้ (Haupt, 1946)

โครงสร้างของเมล็ด เมล็ดพืชทุกชนิดจะมีคัพภะ และเปลือกหุ้มเมล็ด เมล็ดของพวก pea bean ขณะที่เจริญเติบโตเต็มที่คัพภะของมัน จะดูดเอาอาหาร (food material) เข้าไปไว้ทั้งหมดไม่มีที่เก็บอาหารแยกออกไปจากตัวคัพภะเลย เมล็ดพวกนี้จึงเป็นชนิดที่เรียกว่า non-endospermic หรือ exalbuminous ส่วนเมล็ดพวก corn, wheat, castor bean เหล่านี้ยังคงเหลืออาหารภายนอกคัพภะ คัพภะจะเอาอาหารไปใช้ตอนเมล็ดนั้นงอก ดังนั้นเมล็ดพวกนี้ จึงเป็น endospermic หรือ albuminous เมล็ดที่เก็บอาหารไว้ในคัพภะนี้ จะอยู่ในใบเลี้ยง (cotyledon) ของคัพภะนั้นเอง เปลือกหุ้มเมล็ด (testa) มีหน้าที่เป็นตัวป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเมล็ด ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นเดียวซึ่งเกิดมาจากเนื้อเยื่อที่ครอบคลุม ห่อหุ้มรังไข่ด้านนอก (outer integument) ที่ยังอ่อน เมื่อรังไข่กลายเป็นเปลือกหุ้มเมล็ด ส่วนเนื้อเยื่อชั้นใน (inner integument) จะเกิดเป็นเปลือกบาง ๆ อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ดอีกชั้นหนึ่ง เปลือกหุ้มเมล็ดเป็นเปลือกชั้นนอก ซึ่งมีรอยแผล (hilum) ที่เกิดจากเมล็ดและผลหลุดออกจากกันตอนเมล็ดแก่ (Weier, 1964)

ชนิดของถั่วงอก

โดยทั่วไปถั่วทุกชนิดใช้เพาะเป็นถั่วงอกได้ ในปัจจุบันถั่วที่นำมาเพาะเป็นถั่วงอก หรือ เมล็ดงอก ได้แก่ ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วลันเตา, ถั่วพุ่ม, ถั่วอัลพัลฟา เป็นต้น

แม้จะมีเมล็ดถั่วหลายชนิดที่สามารถนำมาเพาะเป็นถั่วงอกได้ แต่ถั่วงอกที่ได้รับความนิยม คือ ถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียวที่นำมาเพาะเป็นถั่วงอกมี 2 ชนิด คือถั่วเขียวผิวมัน (ชัชนาถ 72, ชัชนาถ 36, ชัชนาถ 60, กำแพงแสน 1 และ กำแพงแสน 2) และถั่วเขียวผิวดำ (คู่ทอง 2 และพิษณุโลก 2) ถั่วเขียวผิวมัน เมื่อนำมาเพาะแล้วจะได้ถั่วงอกต้นโตสีเหลือง และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเขียวผิวดำเมื่อนำมาเพาะจะได้ถั่วงอกที่ต้นเล็กกว่า และมีสี

ขาว แต่ข้อดีของถั่วงอกที่ใช้เพาะจากถั่วเขียวผิวดำ คือ จะมีความคงทน เมื่อโดนลมหรือแสงสว่าง

โดยที่จะยังคงมีสีเขียวขาวไม่ออกคล้ำเหมือนถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียวผิวมัน นอกจากนี้เมล็ดถั่ว
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เชียวมีวตั๋ยงสำมรณเก็บร้กษำวไ้ได้นำนโดยอ้ตรำกรำงอกจะมไ้ลดตลงมำกน้ก ทำให้เพำะได้ตลอดปี แต่ถั้วเชียวมีวตั๋ยงอ้ตรำกรำงอกจะลดตลงเรื่อย ๆ เมื่อก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นำน อย่ำงไรก็ตำมผู้บรีภำค ม้กจะชอบถั้วงอกที่เพำะจำกถั้วเชียวมีวตั๋ยงมำกกว่ำ เพำะต้นอวบอ้วนสือมเหลื่องดูนำร้บประทำน รชขำติหวำนกว่ำและมไ้เหม็นเชียว เมื่อก็บกับถั้วเชียวมีวตั๋ยง (คมสัน และกำพล, 2542)

การงอกของเมล็ด (The germination of seeds)

เนวรัตน์ (2526) กล่าวว่า Bewley และ Black (1985) ซึ่งเป็นนักสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ พบว่ากระบวนการงอก (germination process) คือกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การดูดน้ำของเมล็ด (imbibition) และสิ้นสุดที่การยึดตัวของแกนคัพภะ (โดยปกติเป็นราก) ในระหว่างการงอกมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นได้แก่ การดูดน้ำของโปรตีน (protein hydration) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่และการยึดตัวของเซลล์ เหตุการณ์เหล่านี้มีผลรวมกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจากคัพภะแห่งที่อยู่ในภาวะงีบ (resting of quiescent embryo) ไปสู่คัพภะที่มีเมตาบอลิซึมสูง จะปรากฏมีการเจริญเติบโตออกมาให้เห็น ดังนั้นกระบวนการงอกในความหมายนี้ ไม่ได้หมายถึงการเจริญเติบโตของต้นกล้า (seedling growth) ซึ่งเริ่มต้นจากที่รากอ่อนแทงทะลุเปลือกเมล็ดออกมา นอกจากนี้ ขบวนการขนย้ายอาหารสะสมในเมล็ด (mobilization of storage reserves) ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงอกนี้ เพราะการเคลื่อนย้ายอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลัง

ปัจจัยที่จำเป็นในการงอกของเมล็ดพืช (The Physical Requirements for Germination)

1. น้ำ (Water)
2. อุณหภูมิ (Temperature)
3. ออกซิเจน (Oxygen)

นอกจากปัจจัยที่จำเป็นทั้ง 3 ปัจจัยดังที่กล่าวแล้วแสง (light) อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เมล็ดพืชบางชนิดจำเป็นต้องใช้ในการงอก นักวิทยาศาสตร์บางคนจึงรวมเข้าไว้เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ด ทั้ง ๆ ที่เมล็ดพืชส่วนใหญ่ไม่ต้องการแสงในการงอก

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ (วันชัย, 2537)

1. น้ำหรือความชื้นทำให้อาหารที่เก็บสะสมไว้ในเมล็ดในรูปโมเลกุลใหญ่แตกย่อย ออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ เพื่อย้ายไปยังจุดที่เจริญเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่แห้งโดยทั่วไป มีความชื้นประมาณร้อยละ 6-14 แต่การที่จะงอกได้นั้น เมล็ดต้องมีความชื้นประมาณร้อยละ 30-60 ของน้ำหนักแห้ง (ตารางที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1 แสดงความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการงอก (เปอร์เซ็นต์)

ชนิด	ความชื้น
ข้าว	32-35
ข้าวโอ๊ต	32-36
ข้าวโพด	30
ถั่วเหลือง	50
ถั่วลิสง	50-55
ข้าวสาลี	69
ถั่วลันเตา	49
ถั่วแขก	80
ถั่วเขียว	30-60

ที่มา : (วันชัย, 2537)

2. ออกซิเจน การงอกของเมล็ดเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ที่มีชีวิตและต้องใช้พลังงาน จึงต้องใช้ออกซิเจนสำหรับการหายใจเพื่อย่อยสลายอาหารให้ได้มาซึ่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับการงอก โดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์พืชงอกได้บรรยากาศที่มีออกซิเจนร้อยละประมาณ 20 ถ้าบรรยากาศรอบ ๆ เมล็ดมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้อัตราการงอกของเมล็ดลดลง

3. อุณหภูมิที่พอเหมาะ ปกติเมล็ดพันธุ์พืชทั่ว ๆ ไปสามารถงอกได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10 - 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจะยับยั้งหรือทำให้เมล็ดไม่งอก (ตารางที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2 อุณหภูมิที่เมล็ดสามารถงอกได้

ชนิด	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)		
	ต่ำสุด	เหมาะสม	สูงสุด
ข้าว	10-20	20-30	40-42
ข้าวบาร์เลย์	3-5	15-20	30-40
ข้าวโพด	8-10	25	40-44
ข้าวสาลี	3-5	15-20	30-43
ถั่วเขียว	8	20-35	40

ที่มา : (วันชัย, 2537)

การดูดน้ำ (Imbibition) (เพิ่มพูน, 2531)

เมื่อเมล็ดได้รับน้ำหรือความชื้นในระยะแรกโมเลกุลของน้ำเข้าสู่เมล็ดโดยการแพร่ (diffusion) แรงดูดน้ำของเมล็ดที่เกิดขึ้นในระยะนี้เรียกว่า imbibitional force แรงดูดน้ำนี้จะลดลงเมื่อเมล็ดดูดน้ำเข้าไปมากขึ้น ต่อมาจะมีการดูดน้ำโดยขบวนการออสโมซิส แรงดูดน้ำแบบนี้ osmotic force ซึ่งมีผลต่อความชื้นสุดท้ายของเมล็ดขณะสิ้นสุด hydration phase ซึ่งโดยทั่วไปความชื้นของเมล็ดที่ระยะนี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช อาจผันแปรอยู่ในช่วง 30-60 เปอร์เซ็นต์ การดูดน้ำของเมล็ดพืชปรกติจะเกิดขึ้นรอบเปลือกเมล็ด แต่สำหรับในพืชตระกูลถั่ว ตำแหน่งที่ไวต่อการดูดซับน้ำเข้าสู่เมล็ดคือ micropyle และ hilum ตัวอย่างเช่น เมล็ดพืชพวก Vicia และ Phaseolus นำเข้าสู่เมล็ดทางรู micropyle มากกว่าทางอื่น สำหรับในเมล็ดพืชที่มีเมล็ดแข็งบางชนิดเช่น melilotus alba และ Trigonella Arabica ที่บริเวณ hilum และ micropyle ของเมล็ดจะมี plug มาอุด เรียกว่า strophilar cleft การที่น้ำจะเข้าสู่เมล็ดได้นั้น เนื้อเยื่อบริเวณนี้จะต้องอ่อนนุ่มลงก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่เมล็ดผ่านช่องเปิดนี้ และแพร่เข้าไปสู่เซลล์รอบ ๆ เมล็ดอย่างรวดเร็ว

แบ่งการดูดน้ำได้เป็น 3 ระยะ

1. ระยะดูดน้ำ (Imbibition)
2. ระยะจั้น (Lag phase)
3. ระยะการเจริญเติบโตของคัพภะ (Embryo growth)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การหายใจขณะเมล็ดงอก (Respiration during germination) (เพิ่มพูน, 2531)

เมล็ดที่กำลังงอก บางครั้งจะมีการหายใจของจุลินทรีย์ที่ติดมากับเมล็ดเข้ามาเสริม ทำให้ อัตราการหายใจของพืชสูงขึ้น ทันทีที่เมล็ดมีการดูดน้ำเข้ามา จะมีการสร้างสารพวก keto acid เช่น a-katoglutarate และ pyruvate ขึ้นมาจาก amino acid โดยปฏิกิริยา deamination และ transamination ซึ่ง keto acid จะเป็น intermediate ที่สำคัญในขบวนการหายใจ

การดูใช้ออกซิเจนของเมล็ดอาจแบ่งออกได้เป็น 3 หรือ 4 ระยะ

ระยะที่ 1 การดูใช้ออกซิเจนจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ระยะที่ 2 เป็นระยะงัน (lag phase) ออกซิเจนจะถูกดูใช้อย่างช้า ๆ

ระยะที่ 3 เป็นระยะที่มีการหายใจสูงขึ้น

ระยะที่ 4 เกิดในส่วนสะสมอาหารเท่านั้น

การสังเคราะห์โปรตีนของเมล็ด (Protein synthesis during germination)

การสังเคราะห์โปรตีนมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการงอกของเมล็ด ในขณะที่เมล็ด กำลังพัฒนาบนต้นแม่เท่านั้น มีการสังเคราะห์โปรตีนมาก แต่การสังเคราะห์หยุดลงเมื่อเมล็ดเริ่ม และคายความชื้น (เพิ่มพูน, 2531)

การเคลื่อนย้ายของอาหารสะสมในระหว่างการงอก (Mobilization of seed germination)

การงอกแบบอีพิเจียล (Epigeal Germination) การงอกของเมล็ดแบบนี้ เป็นการงอกของ พืชตระกูลถั่ว แต่พบว่าเมล็ดพวกกะหล่ำ หอม

การงอกแบบไฮโปจีเจียล (Hypogeal Germination) การงอกของเมล็ดแบบนี้ เป็นการงอก ของเมล็ดข้าวโพด แต่ก็ยังมีเมล็ดของพืชตระกูลถั่วบางชนิด เช่น ถั่วลิสง เต้า ถั่วพั่ว และถั่วหรั่ง (เพิ่มพูน, 2531)

การงอกในที่มืด (Etionlation)

เมล็ดที่งอกในที่มืด ลักษณะของต้นกล้าจะแตกต่างไปจากการงอกในที่ที่มีแสงสว่าง คือต้น กล้าจะยืดยาว ใบอ่อนมีขนาดเล็ก และมีสีเหลือง การงอกในที่มืด เรียกว่า Etionlation เป็นการ ปรับตัวของต้นกล้า โดยพยายามยืดใบเลี้ยงหรือใบอ่อนขึ้นเพื่อหาแสงแดดเหนือดิน หรือให้พ้นจาก ร่มเงาที่บดบังต้นกล้าอยู่ เพื่อให้ยอดอ่อนได้รับแสงจะได้มีการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเลี้ยง ตัวเองได้ในเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น เมล็ดข้าวโพดเมื่อนำไปเพาะในที่มืดจะมีการยืดยาวของเม ซอคอทิล (mesocotyl) มากผิดปกติ ในที่มีแสงเมซอคอทิลจะยืดตัวเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ขณะที่มืดเม

เอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้หลายชนิด เติมน้ำให้ต้นกล้าในที่มืดจะมีปลอกหุ้มยอด (coleotile) ห่อหุ้มใบ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อ่อนไว้ โดยที่ใบอ่อนนั้นไม่มีการสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้สีเหลืองซีด แสงสว่างมีความสำคัญต่อการงอก ดังนี้

1. แสงสว่าง สามารถกระตุ้นให้ใบเลี้ยง และใบอ่อนของต้นกล้าสร้างคลอโรพลาสต์
2. กระตุ้นให้มีการขยายตัวของใบเห็นได้ชัดในพืชใบเลี้ยงคู่มากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แสงแดดสามารถยับยั้งการยืดตัวที่ผิดปกติของต้นกล้า (ไฮโปคอติล หรือเมโซคอติล) แสงกระตุ้นให้มีการพัฒนาของราก ต้นกล้าที่เพาะในที่มืดจะมีการพัฒนาของรากดีกว่าต้นกล้าที่เพาะในที่มืด (วันชัย, 2537)

สารควบคุมการเจริญเติบโต (พีเรเดซ, 2529)

สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ฮอรโมน จัดเป็นกลุ่มของสารที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางและเห็นผลได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยมากใช้ในการติดผลเร่ง หรือชะลอการแก่ การสุก ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ถูกควบคุมโดยสารแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้น ถ้ามีการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้เราสามารถควบคุมการเติบโตของพืชได้ตามต้องการ เมื่อกล่าวถึง ฮอรโมนพืช (plant hormones) ก็เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินและรู้จักว่าเป็นสารที่ใช้ฉีดพ่นต้นไม้เพื่อให้มีการออกดอก ติดผลตามที่ต้องการ แต่โดยความจริงแล้ว คำว่า ฮอรโมนพืช นี้มีความหมายในเชิงวิชาการว่าเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเอง ในปริมาณน้อยมาก แต่มีผลในด้านการส่งเสริมหรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในต้นพืชนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมพวกน้ำตาล หรือสารอาหารที่เป็นอาหารพืชโดยตรง จะเห็นได้ว่าพืชสร้างฮอรโมนขึ้นน้อยมาก โดยมีปริมาณเพียงพอที่จะควบคุมการเติบโตภายในต้นพืชนั้น ๆ ดังนั้นการสกัดสารฮอรโมนออกมาจากต้นพืช เพื่อไปพ่นให้ต้นไม้อื่น ๆ จึงเป็นเรื่องยาก และไม่ค่อยคุ้มค่า จึงได้มีการค้นคว้าและสังเคราะห์สารต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอรโมนธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์แทน เมื่อเป็นเช่นนี้ สารที่เรานำมาฉีดพ่นให้ต้นพืชเพื่อให้เกิดลักษณะตามที่เราต้องการนั้น จึงไม่ใช่ฮอรโมนพืช แต่จัดเป็นสารสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอรโมนจึงได้มีการบัญญัติศัพท์ทางวิชาการขึ้นมาว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators) ซึ่งมีความหมายถึงฮอรโมนพืช และสารสังเคราะห์ มีคุณสมบัติในการกระตุ้นยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชได้ การเติบโตของพืชในทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมโดยฮอรโมนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการงอกของเมล็ดจนกระทั่งต้นตาย ดังนั้นการใช้สารสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอรโมนฉีดพ่นให้กับต้นพืชจึงเป็นการเปลี่ยนระดับความสมดุลของฮอรโมนภายใน ทำให้ต้นพืชแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมานอกเหนือการควบคุมของธรรมชาติ แต่ก่อนที่จะใช้สารสังเคราะห์เหล่านี้ให้ได้ผลควรที่จะต้องศึกษาคุณสมบัติฮอรโมน และสารสังเคราะห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าชนิดต่าง ๆ โดยละเอียดเสียก่อน

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการงอก (นภคธ, 2537)

จิบเบอเรลลิน (gibberellins) พบครั้งแรก ในประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาโรคของข้าวที่เจริญเป็นต้นที่สูงมาก ต้นข้าวที่เป็นโรคนี้อาจไม่สามารถค้าจุนตัวเองได้ มักโคนล้มและตายไปเนื่องจากอ่อนแอมีโรคแมลงเข้าไปทำลายได้ง่าย ในตอนต้นปี ค.ศ.1890 ญี่ปุ่นเรียกโรคนี้อีกว่า bakanae disease (foolish seedling disease) สาเหตุเนื่องจากเชื้อรา *Gibberella fujikuroi* เป็นระยะไม่สมบูรณ์เพศของเชื้อ *Fusarium moniliforme* ในปีค.ศ.1926 นักโรคพืชพบว่า เมื่อนำสารที่สกัดได้จากเชื้อรานี้ไปให้กับต้นข้าว จะก่อให้เกิดอาการเช่นเดียวกับที่เกิดจากเชื้อรานี้โดยตรง แสดงว่าสารสกัดนี้เป็นตัวก่อให้เกิดโรคนี้อีกขึ้น ในปี ค.ศ. 1930 T. Yabuto และ T. Hayashi สามารถแยกสารที่เป็นสารออกฤทธิ์ได้ (active compound) จากเชื้อรา ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า gibberellin และจิบเบอเรลลินที่ค้นพบแล้วในเชื้อรา และพืชมีมากกว่า 72 ชนิด รวมทั้งที่สังเคราะห์ได้โครงสร้างของจิบเบอเรลลินประกอบด้วยคาร์บอน 19 หรือ 20 อะตอม และมี carboxyl group อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเป็นส่วนประกอบ จิบเบอเรลลินใช้ตัวย่อ GA และตามด้วยตัวเลขกำกับ เช่น GA_1 , GA_2 , GA_3 เป็นต้น

ตำแหน่งที่สังเคราะห์จิบเบอเรลลินในพืช (ช.ณิกศิริ, 2543)

1. ที่บริเวณยอดอ่อนของพืช โดยทดลองนำต้นกล้าทานตะวันมาตัดส่วน apex มาวิเคราะห์พบว่ามี GA มาก
2. ราก โดยทดลองดื่มน้ำจากส่วนรากมาวิเคราะห์หาจิบเบอเรลลิน ได้พบว่ามีปริมาณมากพอสมควร
3. ในเมล็ดที่กำลังเจริญเมล็ดที่ยังอ่อน มีปริมาณจิบเบอเรลลินสูง ได้มีการทดลองเอาเมล็ดตัวมาทำ embryo culture พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ ต่อมานำสารยับยั้งจิบเบอเรลลิน คือ Amo-1618 พบว่าจะเจริญเติบโตระยะหนึ่งแล้วชะงักลงแสดงว่ามีจิบเบอเรลลินอยู่ในเมล็ดแล้ว ซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโต พอหมดพืชจะชะงักการเจริญเติบโต การทดลองนี้เป็นหลักฐานว่า จิบเบอเรลลินถูกสร้างขึ้นในเมล็ดที่กำลังเจริญเติบโต

1. จิบเบอเรลลิน (Gibberellins)

การสังเคราะห์จิบเบอเรลลินทางชีววิทยา (Biosynthesis)

เนาวรัตน์ (2526) กล่าวว่า Birch (1958) เป็นผู้ค้นพบโครงสร้างของจิบเบอเรลลิน ซึ่งประกอบขึ้นด้วย ไอโซพรีนอยด์หน่วยเล็กๆ มาต่อเนื่อกัน จัดเป็นสารประเภทเทอร์ปีนอยด์ (terpenoid) ประกอบด้วยคาร์บอนทั้ง 20 ตัว และมีต้นกำเนิดมาจากกรดมีวาโลนิก ซึ่งได้จากอะเซทิลโคเอ ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งในวัฏจักรเครบ

จิบเบอเรลลินที่มีคุณสมบัติกระตุ้นความเจริญเติบโตของพืชได้ดี คือ GA_1 , GA_2 , GA_3 , GA_4 , GA_5 , GA_6 , GA_7 , GA_9 , GA_{20} , GA_{29}

คุณสมบัติของจิบเบอเรลลิน

1. กระตุ้นการแบ่งเซลล์
2. กระตุ้นการขยายตัวของเซลล์
3. ไม่ช่วยและไม่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองให้เกิดการโค้งงอในพืช
4. ไม่มีการเคลื่อนย้ายลงจากยอด

จิบเบอเรลลินที่ใช้ในการเกษตร

จิบเบอเรลลินได้เข้ามามีบทบาทในการเกษตร โดยไปช่วยในเรื่องต่างๆ ของพืชดังนี้

1. เพิ่มความยาวของก้าน เพิ่มผลผลิตของคั้นชาวย
2. ขจัดการพิกัดตัวของหัวมันฝรั่ง
3. เพิ่มขนาดของผลองุ่น
4. กระตุ้นการเกิดผลที่ไม่มีเมล็ดองุ่น
5. เพิ่มขนาดของดอกไม้
6. ยืดเวลาการแก่ของผลไม้บางชนิด
7. ยืดเวลาในการเก็บเกี่ยวของพืชบางชนิด
8. ช่วยทำให้ผลไม้มีคุณภาพสูง

2. ไซโตไคนิน (Cytokinins)

2.1 ไซโตไคนินตามธรรมชาติใช้ตัวย่อว่า BA

มิลเลอร์ (Miller) พบไซโตไคนินในข้าวโพดต่อมาลีแธม (Letham) ได้สกัดแยกไซโตไคนินจากข้าวโพด แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า ซีเอติน (Zeatin) ซึ่งเป็นไซโตไคนินธรรมชาติตัวแรกที่พบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 รูปแบบของไซโตไคนิน

ไซโตไคนินสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ

2.2.1 Free Cytokinins เกิดในแบบอิสระให้ผลตอบสนองต่อพืช ไซโตไคนินแบบนี้ ได้แก่ Zeatin, benzyl adenine

2.2.2 Bound Cytokinins ได้แก่ ไซโตไคนินที่เกิดในรูปรวมกับสารประกอบอื่น ๆ เช่น มีโมเลกุลของ t-RNA เกาะติดโครงสร้างของไซโตไคนิน ไม่ให้ตอบสนองต่อพืชในทันที

คุณสมบัติสำคัญของไซโตไคนิน คือ

1. ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืช
2. ช่วยในการเปลี่ยนสภาพเซลล์
3. กระตุ้นการเจริญเติบโตของตาข้าง
4. ชะลอการแก่ (senescence)

ผลของไซโตไคนินที่มีผลต่อชีววิทยาของพืช คือ

1. การชะลอการแก่ เนื่องมาจากไซโตไคนินไปลดกิจกรรมในขบวนการต่าง ๆ ของพืชให้ช้าลง เมตาโบลิซึมของใบข้าง เอนไซม์ต่าง ๆ ลดกิจกรรมน้อยลงทำให้เซลล์ชะลอการแก่
2. ช่วยในการเคลื่อนที่ย้ายธาตุอาหาร จากการทดลอง Mothes ในประเทศเยอรมันพบว่า การเคลื่อนย้ายอาหารต้องมีโคเอนจินร่วมด้วยสารอาหารต่าง ๆ จะถูกดูดเคลื่อนย้ายไปรวมตัวกันตรงที่มี ไซโตไคนินอยู่ในพืช activity สูงตรงส่วน apical ของรากหรือตา เมื่อมีการแบ่งเซลล์ และส่วนที่กำลังเจริญเติบโตจะมีโคเอนจินอยู่มาก เพื่อดึงเอาธาตุอาหารให้เคลื่อนย้ายไปสู่บริเวณนั้น

ไซโตไคนินที่ใช้ในวงการเกษตร

1. ช่วยในการแบ่งเซลล์และกระตุ้นการเกิดตาออก
2. ช่วยในการเปลี่ยนสภาพของเซลล์และกระตุ้นการเจริญเติบโตของกิ่งแขนง
3. ชะลอการแก่
4. ช่วยในการออกดอก
5. ช่วยในการติดผล
6. ช่วยให้ผลหรือพืชสุกช้าลง
7. ช่วยในการออกรากของพืชที่ออกรากยาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(เจิ้งสุน, 2520) กล่าวว่า การเพาะถั่วงอกให้ได้ผลดีนั้นจะไม่ใช้วัสดุเพาะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ต้องเลือกภาชนะที่ทึบแสง ถ้าใช้เข่งก็ต้องพลาสติกสีดำมาล้อมรอบเข่งกันแสงเข้า
2. ถัวยาวที่จะนำมาเพาะถั่วงอกต้องเป็นถั่วเก่า มีการพักตัวพอสมควร ถ้าเป็นถั่วใหม่จะทำให้เกิดการเน่าและไม่ค่อยงอกในระหว่างการเพาะ
3. เลือกเมล็ดถัวยาวที่ปราศจากแมลงเจาะ แดงหัก เอาออกทิ้งไป
4. ถ้าเป็นถั่วใหม่ จะต้องมีพักตัว โดยผึ่งแดดหรือแช่น้ำร้อนพออุ่นๆ ก็ได้
5. การทำการเพาะ ควรแช่ถัวยาวอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
6. นำขึ้นมาผึ่งลม และเอาเมล็ดเสียออกอีกครั้ง
7. ใส่ถัวยาวที่แช่น้ำแล้วนำลงไปใส่ภาชนะครั้งเดียวพร้อมกันทั้งหมด ประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของภาชนะที่ใช้เพาะ
8. คลุมเมล็ดถัวยาวด้านบนด้วยกระสอบหรือผ้า เพื่อควบคุมความชื้นและกันแสง
9. ถ้าปล่อยให้อากาศเข้าไปในภาชนะมากจะทำให้ถั่วงอกมีลักษณะผอมยาว
10. ถ้าน้ำได้ภาชนะขังมากเกินไปจะทำให้ถั่วเน่าได้ และไม่ค่อยงอก
11. ควรรดน้ำทุก ๆ 4 ชั่วโมง
12. อากาศที่เย็นเกินไปจะทำให้ถัวยาวงอกช้ากว่าปกติ
13. น้ำที่ใสรดจะต้องสะอาด ปราศจากความเป็นกรดและคลอรีน
14. ถั่วงอกชอบน้ำที่มีความเป็นด่างอ่อน ๆ
15. การรดน้ำจะต้องให้น้ำผ่านต้นถั่วงอกจนกว่าจะเย็น

ถั่วงอกผักเศรษฐกิจที่น่าสนใจ(www.google.co.th)

(http://www.doae.go.th/library/html/detail/KUmagazine/june_44/tuongok/bean.html)

ถั่วงอก พืชผักที่คนไทยรู้จักบริโภคกันมานานแล้ว เพราะถั่วงอกเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน เหล็กแร่และวิตามิน นอกจากนี้ถั่วงอกยังเป็นพืชผักชนิดเดียวที่สามารถใช้เวลาในการเพาะจนถึงเก็บเกี่ยวขายหรือบริโภคได้เร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ถ้าเพาะถั่วงอกในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝนจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวและมีอุณหภูมิของอากาศเย็นจะต้องใช้เวลาเพาะเพียง 4 วันเท่านั้น ถั่วงอกเป็นพืชที่นำรายได้ให้ผู้เพาะขายเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบและเทคนิคการเพาะถั่วงอกในเมืองไทยมีรูปแบบการพัฒนาแตกต่างกันไปตามความชำนาญและทักษะของผู้เพาะ พร้อมทั้งความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบภาชนะที่ใช้เพาะ แต่เทคนิคการดูแลและคล้ายคลึงกัน เช่น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเพาะถั่วงอกแบบใช้ไหดิน

เลือกใช้ไหดินที่มีคอยาว ลักษณะคล้ายไหใส่น้ำปลาแต่มีขนาดความสูง 40-50 เซนติเมตร มีการเจาะรูระบายน้ำที่ก้นไหขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ใสถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้ว จนเมล็ดเริ่มพองลงในไห และใช้ฟางอุดที่ปากไหเพื่อป้องกันแสงสว่าง และสะดวกต่อการรดน้ำ ให้น้ำ ทุก ๆ 4-5 ชั่วโมง นาน 3 วัน ก็สามารถเก็บมาขายหรือบริโภคได้

การเพาะถั่วงอกในเชิงไม้ไผ่

ควรใช้เชิงไม้ไผ่ผิวเรียบ ละเอียด ฐานเป็นเชิง ล้างถั่วเขียวให้สะอาด ปูลงในเชิงไม้ไผ่ความสูง 1/2 ของความสูงเชิง และปูกระสอบป่านคลุมผิวหน้าเชิงหรือใช้ไม้ขัดแตะที่ผิวหน้า อาจจะใช้ ก้อนกรวดเรียงทับผิวหน้าอีกครั้งหนึ่ง วางไว้ในที่ร่มและใช้น้ำสะอาดรดทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง นาน 3 วัน ก็สามารถเก็บขายหรือบริโภคได้

การเพาะถั่วงอกในโถงดินเผาหรือโถงเคลือบ เจาะรูที่ก้นโถง

ล้างถั่วให้สะอาด ใสถั่วลงในโถง (ขนาดความสูงของโถง 0.6-0.8 เมตร) และใช้กระสอบป่านคลุมผิวหน้าถั่วในโถง รดน้ำสะอาด 4-5 ชั่วโมง วางไว้ในที่มีदनาน 3 วันก็สามารถเก็บขายหรือบริโภคได้

การเพาะถั่วงอกในถังซีเมนต์กลม

ใช้ถังซีเมนต์กลมมาหล่อทำพื้นก้นถังตรงกลางเป็นช่องให้มีรูระบายน้ำออกจากถังซีเมนต์ได้ นำถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดแล้วเทลงไปในถังซีเมนต์และคลุมกระสอบป่านที่ผิวหน้า และรดน้ำสะอาดทุก ๆ 4-5 ชั่วโมง นาน 3 วัน หลังเพาะแล้วสามารถนำมาจำหน่ายบริโภคได้

การเพาะถั่วงอกในบิ๊อบลูมิเนียม

ให้เจาะรูที่ก้นบิ๊อบ มีการวางแคร่ไม้เล็ก ๆ รองไว้ที่ก้นเพื่อช่วยในเรื่องการระบายน้ำ ปูผ้าพลาสติกกริดให้เป็นรู ๆ ลงบนแคร่ไม้ วัสดุที่ใช้เพาะถั่วงอกเป็นทรายหยาบหรือซีเถ้าแกลบที่ล้างเผาโดยเจเพาะ (โดยที่แกลบยังอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นผุยผงยังคงเป็นรูปตัวแกลบอยู่) ปูทรายหยาบหรือซีเถ้าแกลบหนา 1.5 นิ้ว ลงไปบนผ้าพลาสติกหรือในบิ๊อบ แล้วเรียงเมล็ดถั่วเขียวลงไปหนา 1 นิ้ว ทับผิวหน้าเมล็ดถั่วด้วยทรายหยาบหรือซีเถ้าแกลบสลับกันระหว่างการเรียงถั่วเขียวกับทรายหยาบหรือซีเถ้าแกลบประมาณ 5-6 ชั้น ความสูงของเมล็ดถั่วเขียวในบิ๊อบไม่เกินครึ่งหนึ่งของความสูงบิ๊อบรดน้ำทุกวันวันละ 3 ครั้ง ได้แก่ เช้า ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 16.00 น.

และช่วงกลางคืน เวลา 24.00 น. นาน 3 วัน จึงสามารถเก็บขายหรือบริโภคได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลการค้า โทร. 02-262-4000 หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.doe.go.th ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การเพาะถั่วงอกในตะกร้าพลาสติก หรือลังพลาสติก

แบบใส่ตะกร้าผลไม้ (ขนาดที่บรรจุผลไม้ในท้องตลาด) เนื่องจาก ตะกร้าพลาสติกประเภทนี้มีรูระบายน้ำอยู่แล้ว จึงควรกรูตะกร้าพลาสติกด้วยกระสอบป่านก่อนนำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้ว ถ่ายลงไป ในตะกร้าพลาสติกปิดหน้าเมล็ดถั่วด้วยกระสอบป่านเช่นเดิม รดน้ำด้วยสายยางทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง นาน 3 ชั่วโมง จึงสามารถนำมาจำหน่ายหรือบริโภคได้

การเพาะถั่วงอกในถังพลาสติก

เป็นวิธีที่ง่ายในครัวเรือน และสามารถขายเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนได้ โดยใช้ถังพลาสติกทึบแสงเจาะรูระบายน้ำที่ก้นถังตามแนวตะเข็บถังเพื่อระบายน้ำ และเจาะรูด้านข้างถังเพื่อระบายอากาศ นำเมล็ดถั่วเขียวล้างน้ำให้สะอาด เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนหรือสิ่งสกปรกจากเมล็ดพันธุ์ ใช้น้ำอุ่นอัตราส่วนน้ำร้อน : น้ำเย็น 1:1 (อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส ตอนเริ่มแช่) แช่เมล็ดถั่วเขียวไว้นาน 8-10 ชั่วโมง จนเมล็ดพองตัวขึ้น ถ่ายเมล็ดถั่วลงในถังเพาะ นำฟองน้ำปิดไว้ที่ผนังด้านบนเมล็ด วางถังเพาะในที่มืดรดน้ำสม่ำเสมอทุก ๆ 1.5 ชั่วโมง โดยรดน้ำผ่านฟองน้ำ หลังจากเพาะถั่วเขียวลงในถังนาน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ถั่วเขียวเริ่มงอกมีรากสีขาวเล็ก ๆ ขนาด 0.8-1.0 เซนติเมตร ใส่สารถั่วอ้วนเพื่อช่วยการเพิ่มการสร้างโปรตีนในถั่วงอกอ้วนขึ้น โดยก่อนรดสารถั่วอ้วนควรรดการให้น้ำก่อนและหลัง 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผิวหน้าเมล็ดถั่วแห้ง สารถั่วอ้วนจะได้เข้าไปทำงานเต็มที่ หลังจากนั้นรดน้ำปกติทุก ๆ ชั่วโมง จนกระทั่งครบ 2 วัน ให้รดสารถั่วอ้วนอีกครั้งหนึ่ง โดยอัตราการใส่สารขึ้นอยู่กับปริมาณของถั่วเขียวที่ใช้เพาะ รดน้ำให้ชุ่มและรดน้ำก่อนและหลัง 2 ชั่วโมงเช่นกัน เมื่อเพาะครบ 3 วัน (ประมาณ 65-72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่เริ่มแช่ถั่วในน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในช่วงฤดูกาลที่เพาะ เช่น ถั่วร้อนอาจใช้เวลาเพียง 65 ชั่วโมง แต่ในช่วงฤดูหนาวใช้เวลาจนถึง 72 ชั่วโมงจึงสามารถนำมาจำหน่ายหรือบริโภคได้

ถั่วงอกเมื่อเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วในถังหรือภาชนะเพาะ แต่ละแบบจะมีลักษณะขาวสวย แต่เมื่อนำออกมาจากถังเพาะและถูกลมหรือแสงสว่างนานเกิน 3-4 ชั่วโมง ถั่วงอกจะสามารถสังเคราะห์แสงได้อีก สีขาวของถั่วงอกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเมื่อถูกแสงนานเกินไป ใบเลี้ยงจะโผล่ออกมาทำให้ไม่น่ารับประทาน

ขั้นตอนและวิธีการเพาะ (คมสัน และกำพล, 2542)

1. การเตรียมเมล็ดถั่ว

- เลือกเมล็ดถั่วที่ไม่เก่าเก็บเศษสกปรกและเลือกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง
- แช่ถั่วในน้ำอุ่น และแช่ต่อไปจนน้ำเย็น ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง เมล็ดถั่วจะพองขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สแกนเก็บเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้งไป เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ล้างตัวให้สะอาด
- 2. การเตรียมภาชนะ และวัสดุเพาะ
 - ภาชนะเพาะจะต้องสะอาดแห้งผ่านการตากแดดหรือฆ่าเชื้อแล้ว
 - ฟองน้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนแล้วตากแดดแห้ง
- 3. นำถั้วเขียวจากข้อ 1 ใส่ในถังเพาะเกลี่ยให้เสมอกัน
- 4. วางฟองน้ำปิดทับบนเมล็ดถั้ว
- 5. รดน้ำบนฟองน้ำให้ทั่วอาจจะใช้ฝักบัวรดน้ำหรือสายยางก็ได้
- 6. ปิดฝาถังเพาะ วางไว้ในที่ร่ม ไม่ร้อน และพื้นแห้ง อาจจะวางบนอ่างล้างจานในล้าง
- 7. รดน้ำทุก ๆ 3 - 4 ชั่วโมง โดยรดน้ำให้ทั่วบนฟองน้ำ ให้น้ำไหลผ่านออกทางรูด้านล่าง ควรรด 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อระบายความร้อน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ถั้วชุ่มน้ำ หากเวลากลางวันออกไปทำงานหรือ กลางคืน อาจจะวางถังเพาะ เปิดฝาไว้ในอ่างล้างแล้วปล่อยให้ น้ำค่อย ๆ หยดตลอดเวลา
- 8. รดน้ำตามข้อ 7 นาน 3 วัน วันที่ 2 ถั้วอกจะถอดปลอก ควรรับประทานในวันที่ 3 หรือ 4 หากยังไม่รับประทาน ให้นำถั้วใส่ในตู้เย็น หรือเก็บถั้วอกใส่ถุงพลาสติก หากทิ้งไว้ ถั้วจะงอกยืดยาวออก
- 9. เก็บถั้วอกออกจากถัง ทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้แล้ว

คุณค่าทางอาหาร

ในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของถั้วอก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของ ถั้วอก เป็นน้ำ ซึ่งมีถึงร้อยละ 90 และในถั้วอก 100 กรัมประกอบด้วยโปรตีน 2.8 มิลลิกรัม (ถ้าเป็นถั้ว เหลืองงอก หรือถั้วอกหัวโตจะมีโปรตีนมากกว่าถั้วเขียวงอกถึง 2 เท่า) แคลเซียม 27 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 85 มิลลิกรัม เหล็ก 1.2 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.07 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.03 มิลลิกรัม ในอาซีน 1 มิลลิกรัม วิตามินซี 6 มิลลิกรัม และใยอาหาร 2.2 กรัม (คมสัน และกำพล, 2542) (ตารางที่ 3)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3 คุณค่าทางอาหารของถั่วงอกดิบและสุก

แร่ธาตุ	ถั่วงอกดิบ	ถั่วงอกสุก	หน่วย
Moisture	88.80	91.00	gm.
Calory	35.00	28.00	Unit.
Fat	0.20	0.20	gm.
Carbohydrate	6.60	5.20	gm.
Fiber	0.70	0.70	gm.
Protein	3.80	3.20	gm.
Calcium	19.00	17.00	Mgm.
Phosphorus	64.0	48.00	Mgm.
Ferrus	1.30	0.90	Mgm.
Vitamin A	20.00	20.00	I.U.
Vitamin B1	0.13	0.90	Mgm.
Vitamin B2	0.13	0.10	Mgm.
Niain	0.80	0.70	Mgm.
Vitamin C	19.00	6.00	Mgm.

ที่มา : (ดรุณี, 2530)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. กระจกดินเผา จำนวน 30 ใบ
2. เมล็ดถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2
3. ฮอริโมน GA_3
4. ฮอริโมน BA
5. น้ำตาล
6. สารประกอบอินทรีย์อะมิโนแอซิด
7. น้ำเปล่าสะอาด
8. ถุงดำ ผ้าขาวบาง
9. บัวรดน้ำ
10. กระบอกตวงสารขนาด 50 มิลลิลิตร
11. กระบอกตวงสารขนาด 1000 มิลลิลิตร
12. เครื่องชั่งหยابขนาด 5 กิโลกรัม
13. เข็มฉีดยา
14. บีกเกอร์ขนาดต่าง ๆ
15. ไม้บรรทัด, ปากกา, สมุดบันทึก

วิธีการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มีจำนวน 1 การทดลอง มี 9 สิ่งทดลอง กับ 1 ตัวควบคุม จำนวน 3 ซ้ำ ใช้สาร 5 ชนิด คือ ฮอริโมน BA อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอริโมน BA+ GA_3 อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอริโมน GA_3 , น้ำตาลและสารประกอบอะมิโนแอซิด แต่ละซ้ำใช้ถั่วเขียว 150 กรัม วิธีการที่ 1 ให้น้ำเพียงอย่างเดียว (control) 10 ลิตร รดทุก ๆ 3 ชั่วโมง วิธีการที่ 2 ใช้น้ำตาลที่เจือจางกับน้ำปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร วิธีการที่ 3 ใช้ฮอริโมน GA_3 ปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร วิธีการที่ 4 ใช้สารประกอบอินทรีย์อะมิโนแอซิดปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร วิธีการที่ 5 ใช้ฮอริโมน BA+ GA_3 ทดสอบในปริมาณสารที่แตกต่างกัน 3 ความเข้มข้น จำนวน 3 ซ้ำ คือ 1. ใช้สารปริมาณ 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร 2. ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร 3. ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร และวิธีการที่ 6 ใช้ฮอริโมน BA ทดสอบในปริมาณสารที่แตกต่างกัน 3 ความเข้มข้น จำนวน 3 ซ้ำ คือ 1. ใช้สารปริมาณ 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร 2. ใช้สาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร 3. ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตรจะให้น้ำทุก ๆ 3 ชั่วโมงและให้สารทุก ๆ 12 ชั่วโมง เมื่อทำการทดลองครบ 3 วัน ทำการสังเกตและบันทึกผล

การทดลอง

1. ล้างทำความสะอาดกระถาง แล้วนำกระถางไปตากแดด
2. เตรียมสารเคมีที่จะใช้ในการทดลองตามสัดส่วนที่กำหนด
3. ชั่งน้ำหนักถั่วเขียวตามจำนวนสิ่งทดลองและตามจำนวนซ้ำ ๆ ตามวิธีการทดลอง
4. แช่ถั่วเขียวที่ชั่งน้ำหนักแล้วในน้ำที่อุณหภูมิปกติ นาน 8 ชั่วโมง แล้วนำไปใส่ลงในกระถางที่รองกันด้วยผ้าขาวบางกระถางละ 150 กรัม
5. จากนั้นดวงสารตามสิ่งทดลองคือสารต่ออัตราน้ำเปล่าตามวิธีการทดลองโดยการรดฮอร์โมนและน้ำในครั้งแรกของวันโดยให้สารท่วมเมล็ดถั่ว
6. เมื่อรดน้ำเสร็จแล้วทิ้งไว้แล้วทำการรดน้ำเปล่าในทุก ๆ 3 ชั่วโมงและเมื่อจะครบรอบที่ต่อรดสารจะหยุดให้น้ำหนึ่งรอบเพื่อให้ถั่วจะได้ดูดซับสารอย่างเต็มที่
7. หลังจากนั้นเมื่อครบ 3 วันสังเกตถั่วงอกเมื่อได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วจึงทำการเก็บถั่วงอกและทำการบันทึกผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง นำมาวิเคราะห์หาข้อมูลตามแผนการทดลอง Completely Randomized Design (CRD) และหาค่า LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย หลังจากนั้น ทำตารางและรายงานผลการทดลองโดยหลังจากที่รดน้ำถั่วงอกเป็นเวลา 3 วันได้ถั่วงอกในขนาดที่เหมาะสมจึงทำการเก็บบันทึกผล โดยทำการชั่งน้ำหนัก วัดจากความยาวของ hypocotyl และ radicle ของถั่วงอกที่ได้และสุ่มตัวแทนถั่วงอกแต่ละสิ่งทดลองแต่ละซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างถั่วงอกที่ทดสอบกับน้ำเปล่า (Control) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของงานทดลองโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SIRICHAH เวอร์ชัน 6.0

ระยะเวลาในการทดลอง

เริ่มทำการทดลองวันที่ 9 มกราคม 2549

สิ้นสุดการทดลองวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549

สถานที่ทดลอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลอง

จากการศึกษาการเพาะถั่วงอกในกระถาง 9 สิ่งทดลอง กับ 1 ตัวควบคุม จำนวน 3 ซ้ำ ใช้สาร 5 ชนิด คือ ฮอร์โมนBA อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอร์โมนBA+GA₃ อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอร์โมนGA₃, น้ำตาลและสารประกอบอะมิโนแอซิด ผลปรากฏว่า

หลังจากเก็บข้อมูลความยาวของต้นถั่วงอกในแต่ละวิธีการได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 4) ใช้น้ำเปล่าได้ความยาวเฉลี่ยมากที่สุดคือ 7.57 เซนติเมตร รองลงมาคือ ฮอร์โมนBA+ GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 6.39 เซนติเมตร ฮอร์โมนGA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 6.16 เซนติเมตร ฮอร์โมนBA ใช้สารปริมาณ 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 5.76 เซนติเมตร สารประกอบอะมิโนแอซิดใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 5.05 เซนติเมตร และที่ได้ความยาวน้อยที่สุดคือ น้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 4.32 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในแต่ละวิธีการมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางผนวกที่ 1)

หลังจากเก็บข้อมูลความยาวของรากถั่วงอกในแต่ละวิธีการได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 5) ฮอร์โมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ยสั้นที่สุดคือ 5.06 เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 6.07 เซนติเมตร ฮอร์โมนBA ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 6.16 เซนติเมตร ฮอร์โมนGA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 7.28 เซนติเมตร สารประกอบอะมิโนแอซิดใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้ความยาวเฉลี่ย 7.90 เซนติเมตร และที่ได้ความยาวเฉลี่ยยาวที่สุดคือ น้ำเปล่าได้ความยาวเฉลี่ย 8.19 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในแต่ละวิธีการมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางผนวกที่ 2)

หลังจากเก็บข้อมูลความยาวของรากถั่วงอกในแต่ละวิธีการได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 6) ฮอร์โมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุดคือ 384.25 กรัม รองลงมาคือ ฮอร์โมนBA ใช้สารปริมาณ 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักเฉลี่ย 362.51 กรัม สารประกอบอะมิโนแอซิดใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักเฉลี่ย 348.06 กรัม ฮอร์โมนGA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักเฉลี่ย 335.46 กรัม น้ำเปล่าได้น้ำหนักเฉลี่ย 330.47 กรัม และที่ได้น้ำหนักเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ น้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักเฉลี่ย 321.24 กรัม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในแต่ละวิธีการมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางผนวกที่ 3)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 ผลความยาวเฉลี่ยของต้น (hypocotyl) โดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ (หน่วยเป็น เซนติเมตร)

วิธีการ	ซ้ำ			รวม	เฉลี่ย
	1	2	3		
น้ำเปล่า	7.75	7.54	7.42	22.71	7.57 A
GA ₃	6.10	6.17	6.21	18.48	6.16 C
อะมิโนแอซิด	5.01	5.17	4.98	15.16	5.05 E
น้ำตาล	4.34	4.27	4.35	12.96	4.32 F
BA+GA ₃ 10/1	6.65	6.82	6.70	20.17	6.72 B
BA+GA ₃ 10/2	7.12	6.82	6.85	20.79	6.93 B
BA+GA ₃ 10/3	6.05	6.07	6.17	18.29	6.09 C
BA 10/1	5.93	5.78	5.58	17.29	5.76 D
BA 10/2	5.57	5.80	5.54	16.91	5.63 D
BA 10/3	5.50	4.93	5.12	15.55	5.18 E
P.VALUE					**
LSD.05					0.25

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 ผลความยาวเฉลี่ยของราก (radicle) โดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ (หน่วยเป็น เซนติเมตร)

วิธีการ	ซ้ำ			รวม	เฉลี่ย
	1	2	3		
น้ำเปล่า	8.16	8.38	8.03	24.57	8.19 A
GA ₃	7.24	7.13	7.47	21.84	7.28 B
อะมิโนแอซิด	7.52	7.80	8.39	23.76	7.90 A
น้ำตาล	5.99	6.25	6.00	18.23	6.07 D
BA+GA ₃ 10/1	5.34	5.64	5.42	16.40	5.46 E
BA+GA ₃ 10/2	5.68	5.76	5.45	16.89	5.63 E
BA+GA ₃ 10/3	5.12	5.00	5.07	15.19	5.06 F
BA 10/1	6.53	6.64	6.65	19.82	6.06 C
BA 10/2	6.11	6.28	6.09	18.48	6.16 D
BA 10/3	6.37	6.00	6.34	18.71	6.23 D
P.VALUE					**
LSD.05					0.33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 6 ผลน้ำหนักโดยเฉลี่ยของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ (หน่วยเป็นกรัม)

วิธีการ	ซ้ำ			รวม	เฉลี่ย
	1	2	3		
น้ำเปล่า	328.60	323.89	338.93	991.42	330.47 DE
GA ₃	336.65	340.43	329.32	1006.40	335.46 DE
อะมิโนแอซิด	356.13	352.41	335.66	1044.20	348.06 CD
น้ำตาล	322.75	326.63	314.35	963.73	321.24 E
BA+GA ₃ 10/1	378.92	355.06	385.60	1119.58	373.19 AB
BA+GA ₃ 10/2	381.06	380.05	391.66	1152.77	384.25 A
BA+GA ₃ 10/3	390.92	382.82	362.24	1135.98	378.66 AB
BA 10/1	366.88	365.06	355.60	1087.54	362.51 BC
BA 10/2	363.43	358.34	357.40	1079.17	359.72 BC
BA 10/3	345.19	326.25	365.90	1037.34	345.78 CD
P.VALUE					**
LSD.05					18.7169

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ผลการทดลอง

ในการเพาะถั่วงอกควรคำนึงถึงความสะดวกของน้ำที่รดและการระบายถ่ายเทของน้ำและอากาศ เนื่องจากจะทำให้รากของถั่วงอกแดงไม่น่ารับประทาน การควบคุมระบบการให้น้ำควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม อากาศ ซึ่งถ้าความชื้นและความชื้นมากเกินไปจะทำให้ถั่วงอกเน่าเสียได้ ถ้าถั่วงอกได้รับแสงจะทำให้เกิดไบโסיแซียว hypocotyl เหนียวและไม่กรอบ การทดลองครั้งนี้วิธีการที่ใช้ฮอร์โมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักของถั่วงอกเฉลี่ย 362.51 กรัม ความยาวของความยาวเฉลี่ยของลำต้น (hypocotyl) ที่ได้ลักษณะที่ดีคือฮอร์โมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 6.93 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ยของราก (radicle) คือฮอร์โมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 5.06 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าฮอร์โมนBA+GA₃ หลังจากเพาะได้ 3 วันจะให้ผลที่ดีที่สุด จะให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคแต่ถ้าใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวจะทำให้ถั่วงอกต้นผอมยาวมีไบโסיแซียวออกมารากยาวและเป็นฝอยไม่น่ารับประทาน อนึ่งในการเพาะถั่วงอกต้องหาภาชนะที่เหมาะสมเก็บความชื้นได้ดีจะได้ไม่ต้องให้น้ำบ่อยและควรหาโรงเรือนที่มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีและไม่มีแสงเข้า การที่จะทำการผลิตถั่วงอกเพื่อการค้าเราต้องทำการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญว่าต้องการถั่วงอกที่มีลักษณะอย่างไรแล้วจึงทำการผลิตถั่วงอกและต้องศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกอย่างถูกวิธี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลการทดลอง

จากการเพาะถั่วงอกในกระถาง 9 สิ่งทดลอง กับ 1 ตัวควบคุม จำนวน 3 ซ้ำ ใช้สาร 5 ชนิด คือ ฮอริโมนBA อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอริโมนBA+GA₃ อย่างละ 3 ความเข้มข้น, ฮอริโมน GA₃, น้ำตาลและสารประกอบอะมิโนแอซิด พบว่า ความยาวเฉลี่ยของลำต้น (hypocotyl) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยน้ำเปล่ามีความยาวเฉลี่ยยาวที่สุดคือ 7.57 เซนติเมตร แต่ลักษณะไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รองลงมาคือฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยคือ 6.93 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ยสั้นที่สุดคือ น้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร มีความยาวเฉลี่ย 4.32 เซนติเมตร

ความยาวเฉลี่ยของราก (radicle) พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร มีความยาวเฉลี่ยของรากสั้นที่สุดคือ มีความยาวเฉลี่ย 5.06 เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 6.07 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ยยาวที่สุด คือ น้ำเปล่ามีความยาวเฉลี่ย 8.19 เซนติเมตร

ในการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของต้นถั่วงอกพบว่ามีค่าแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งเช่นกัน โดยฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร มีน้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุด คือ 384.26 กรัม รองลงมาคือฮอริโมนBA ใช้สารปริมาณ 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร มีน้ำหนักเฉลี่ยคือ 362.51 กรัม และถั่วงอกที่ได้จากน้ำตาลใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร มีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 321.24 กรัม

จากการศึกษาประสิทธิภาพสารเคมีบางชนิดในการทดลองครั้งนี้วิธีการที่ให้ผลผลิตดีที่สุด มีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคคือการใช้ฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ได้น้ำหนักของถั่วงอกเฉลี่ย 362.51 กรัม ความยาวของความยาวเฉลี่ยของลำต้น (hypocotyl) ที่ได้ลักษณะที่ดีคือฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 2 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 6.93 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ยของราก (radicle) คือฮอริโมนBA+GA₃ ใช้สารปริมาณ 3 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 5.06 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าฮอริโมนBA+GA₃ หลังจากเพาะได้ 3 วันจะให้ผลที่ดีที่สุดและสามารถนำมาเพาะถั่วงอกเพื่อรับประทานภายในครัวเรือนหรือเพาะเพื่อเป็นการค้าขนาดเล็กและยังได้ถั่วงอกที่ปลอดสารพิษอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

- คมสัน หุตะแพทย์ และกำพล กาหลง. 2524. คู่มือพึ่งตัวเอง สารพัดวิธีเพาะถั่วงอก. เพาะกินเองก็ได้เพาะขายก็ดี. สยามศิลปการพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา. 2530. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. คณะเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. หน้า 439-441.
- ช. ญิฐศิริ สุขสุวรรณ. 2543. หลักพืชสวน. ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
- ดร.ณิ ชณะนันทกุล. 2520. เทคโนโลยีการผลิตอาหาร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ.
- นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2537. ฮอริโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: จิบเบอเรลลิน. สำนักพิมพ์วีวีเอ. กรุงเทพฯ. หน้า 57-60.
- เนาวรัตน์ ปานแย้ม. 2526. สรีระวิทยาของพืช เล่มที่ 1. พิมพ์ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
- ประธาน สีคตฐิตา หุดคงและพัชราวรรณ สอนสุภาพ. 2546. อิทธิพลของฮอริโมน Flomura # 5 (8503) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอกที่เพาะจากถั้วเขียวพันธุ์ชัชนาท 72 และพันธุ์ตามท้องตลาด. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
- พิระเดช ทองอำไพ. 2529. ฮอริโมนพืชและสารสังเคราะห์. แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. ไดนามิคการพิมพ์. กรุงเทพฯ.
- เพิ่มพูน ศักดิ์เกษม. 2531. ถั้วเขียว. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร. กรุงเทพฯ.
- วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2537. สรีระวิทยาเมล็ดพันธุ์. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- ไสว พงษ์เก่า. 2534. พืชเศรษฐกิจ เล่ม 1. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- อารมณ ศรีพิจิตต์. 2524. วิทยาการเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. หน้า 20-30.
- Feierabend, J. 1979. Role of cytoplasmic protein synthesis and its coordination with the plastidic protein synthesis in the biogenesis of chloroplasts. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 92: 553-594.
- Gulliver, R.L. and W. Heydecker. 1973. Establishment of seedlings in a changeable environment. In "Seed Ecology", pp. 433-462, Edited by W. Heydecker, Butterworth, London.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Haupt, A.W. 1946. An Introduction to Botany. Mc Graw-Mill Book Company, Inc.
New York and London.

Jones, R.L. and J.L. Stoddart. 1977. Gibberellins and seed germination. In "The
physiology and Biochemistly of Seed Dormancy and Germination", pp. 77-109.
Edited by A.A. Khan, North Holland. Amsterdam.

Weier, T.E. and C.R. Stocking. 1964. Botany. California wiley. California.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของความยาวต้น (hypocotyl) ของถั่วงอก
ในแต่ละวิธีการ (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

Source	df	SS	MS	F	F.05	F.01	F-Prob
Treatment	9	25.2893	2.8099	129.07**	2.39	3.46	0.0000
Ex.Error	20	0.4354	0.0218				
Total	29	25.7247	0.8871				

CV = 2.4824 %

LSD.05 = 0.2513

LSD.01 = 0.3427

** แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง

ตารางผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของความยาวราก (radicle) ของถั่วงอก
ในแต่ละวิธีการ (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

Source	df	SS	MS	F	F.05	F.01	F-Prob
Treatment	9	29.0455	3.2273	82.32**	2.39	3.46	0.0000
Ex.Error	20	0.7841	0.0392				
Total	29	29.8296	1.0286				

CV = 3.0642 %

LSD.05 = 0.3372

LSD.01 = 0.4599

** แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติของน้ำหนักของถั่วงอกในแต่ละวิธีการ
(หน่วยเป็นกรัม)

Source	df	SS	MS	F	F.05	F.01	F-Prob
Treatment	9	12209.7611	1356.6401	11.23**	2.39	3.46	0.0000
Ex.Error	20	2415.2666	120.7633				
Total	29	14625.0276	504.3113				

CV = 3.1049 %

LSD.05 =18.7169

LSD.01 =25.5272

** แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล : นาย นราธิป แสงสุวรรณ

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2526

ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน : 16/4 หมู่ 6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 0-4561-6845

ที่อยู่ปัจจุบัน : 16/4 หมู่ 6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 0-9157-0166

การศึกษา : พ.ศ.2533-2538 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2539-2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2542-2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2545 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชไร่)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อ - นามสกุล : นาย คเชนทร์ ศิริหาล้า

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน : 352/1 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ : 0-6392-4410

ที่อยู่ปัจจุบัน : 352/1 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ : 0-6392-4410

การศึกษา : พ.ศ.2532-2537 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเมืองเลย

พ.ศ.2538-2540 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลยพิทยาคม

พ.ศ.2541-2543 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม

พ.ศ.2545 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชไร่)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



๐๐๐๐๐๐

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้