

ปัญหาพิเศษ

เรื่อง

ผลของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกในระบบ  
การปลูกพืชไร่น้ำแบบ Deep flow techniques  
Effects of Calcium on Growth Amazon martii (Echinodorus martii)  
in Deep flow techniques



T099382



โดย  
นางสาววชิรินทร์ พลับเจริญสุข

ฉพ.  
๑386๗  
2550

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน <u>99382</u>
วันเดือนปี <u>15 Jun 2009</u>

.b. <u>1188339x</u>
.i. ....

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520  
ปีการศึกษา 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบรับรองปัญหาพิเศษ  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง

เรื่อง ผลของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกในระบบ  
การปลูกพืชไร่น้ำแบบ Deep flow techniques  
Effects of Calcium on Growth Amazon martii (*Echinodorus martii*) in  
Deep flow techniques

ชื่อนักศึกษา นางสาววิชรินทร์ พลับเจริญสุข


ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์)

ภาควิชารับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับวันที่ 6 เดือน พ.ค. 2550 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทคัดย่อปัญหาพิเศษ

### เรื่อง

#### ผลของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกในระบบการปลูกพืชไร่น้ำแบบ Deep flow techniques

#### Effects of Calcium on Growth Amazon martii (*Echinodorus martii*)

#### in Deep flow techniques

จากการศึกษาผลของธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3.10 mM (ชุดควบคุม) , 1.55 mM , 4.65 mM และ 6.20 mM วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 4 ชุดการทดลอง 3 ซ้ำ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับแคลเซียมต่างๆ กัน มีผลต่อ ความยาวใบ ความสูง ความกว้างใบ จำนวนใบ และ ความหนาใบของอเมซอนมาร์ตีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) โดยอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 4.65 mM ให้ความยาวใบและความสูงมากที่สุด  $13.03 \pm 0.34$  เซนติเมตรและ  $17.56 \pm 0.66$  เซนติเมตร ตามลำดับ ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM จะให้ความกว้างใบมากที่สุด คือ  $3.78 \pm 0.10$  เซนติเมตร ที่ระดับแคลเซียม 3.10 mM (ชุดควบคุม) ให้จำนวนใบมากที่สุด คือ  $18.00 \pm 0.51$  ใบต่อต้น ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM และ 6.20 mM ให้ความหนาของใบมากที่สุด คือ  $1.13 \pm 0.00$  มิลลิเมตร ส่วนน้ำหนักของอเมซอนมาร์ตีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ที่ชุดควบคุม 3-10 mM ให้น้ำหนักมากที่สุด  $25.36 \pm 2.28$  กรัมต่อต้น เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในอเมซอนมาร์ตี พบว่า ปริมาณไนโตรเจน และ แคลเซียม มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P > 0.05$ ) และธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ )

จากการศึกษาผลของธาตุแคลเซียมที่ดีต่อการเจริญเติบโตของอเมซอนมาร์ตี พบว่าที่ระดับแคลเซียมต่างๆ กัน มีผลต่อ ความยาวใบ ความสูง และน้ำหนักซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ส่วนความกว้างใบ จำนวนใบ และความหนาใบของ อเมซอนมาร์ตี ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในอเมซอนมาร์ตี พบว่า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียมที่สะสมในอเมซอนมาร์ตีมีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ส่วนโพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P > 0.05$ )

และปริมาณธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คำนิยม

การทำปัญหาพิเศษในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้นั้น ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. นงนุช เลหาะวิสุทธิ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการทดลอง และการแก้ปัญหาระหว่างการทำปัญหาพิเศษ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ สมเกียรติ สีสนอง ภาควิชาปฐพีวิทยา ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมงทุกท่านที่ให้ความรู้ และคำแนะนำที่ดีตลอดมา

ขอขอบคุณ คุณบุปผา จงพัฒน์ และ คุณนภพล เผ่ามณี ส ที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการทำการทดลอง

ขอขอบคุณ คุณมัลลิกา มิตรน้อย, คุณภววรรณตรี สมบุญโต และเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือตลอดการทดลอง และขอขอบคุณทุกๆ คนที่คอยเป็นกำลังใจให้

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าที่คอยเป็นกำลังใจและคอยห่วงใยข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาของข้าพเจ้า

นางสาววิชรินทร์ พลัฒ์เจริญสุข

มีนาคม 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

หน้า

สารบัญ	I
สารบัญตาราง	II
สารบัญภาพ	v
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	2
อุปกรณ์และวิธีการ	10
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	14
สรุปและข้อเสนอแนะ	37
เอกสารอ้างอิง	38
ภาคผนวก	40



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	15
2	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	16
3	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	17
4	จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	19
5	ความหนาของใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	20
6	น้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	21
7	ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	23
8	ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	25
9	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	26
10	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	28
11	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	29
12	จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	30
13	ความหนาใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	31

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
14	น้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอต่างๆ กัน	32
15	ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอต่างๆ กัน	34
16	ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอต่างๆ กัน	35
ตารางผนวกที่		หน้า
1	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	44
2	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	45
3	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	46
4	จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	47
5	ความหนาใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนตระดับต่างๆ กัน	48
6	น้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนตระดับต่างๆ กัน	49
7	ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืชที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	50

## สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
8	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอ ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	51
9	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอ ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	52
10	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอ ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	53
11	จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอ ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	54
12	ความหนาใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอระดับต่างๆ กัน	55
13	น้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีเอระดับต่างๆ กัน	56
14	ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืชที่แคลเซียมอิตีเอ ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์	57

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อเมซอนมาร์ตี ( <i>Echinodorus martii</i> )	2
2	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	15
3	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	17
4	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	18
5	จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	19
6	ความหนาของใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	20
7	น้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	21
8	ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	24
9	ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	24
10	ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน	25
11	ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอดีทีที่เอต่างๆ กัน	27
12	ความสูงของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอดีทีที่เอต่างๆ กัน	28
13	ความกว้างใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอดีทีที่เอต่างๆ กัน	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่		หน้า
14	จำนวนใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	30
15	ความหนาใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	31
16	น้ำหนักของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	32
17	ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	34
18	ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	35
19	ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีที่เอต่างๆ กัน	36

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คำนำ

พรรณไม้น้ำสกุล *Echinodorus* sp. มีชื่อไทยว่า อเมซอน จัดอยู่ในวงศ์ Alismataceae เป็นพรรณไม้น้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันมีการจัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำต่างๆ มากมาย และได้มีการนำเข้าพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ มาใช้ประดับตกแต่งตู้ปลา นอกจากนี้จะทำให้ตู้ปลาดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้ว พรรณไม้น้ำยังมีประโยชน์แก่ปลาด้วย โดยพรรณไม้น้ำมีการสังเคราะห์แสงให้ออกซิเจน ซึ่งปลานำไปใช้ในการหายใจ และยังช่วยกำจัดของเสียที่ขับถ่ายจากตัวปลาโดยนำไปเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ เนื่องจากอเมซอนเป็นพืชครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งบนบกและใต้น้ำ ในการปลูกพรรณไม้น้ำในระบบการปลูกแบบไร้ดินเป็นการปลูกพรรณไม้น้ำลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยรากของพรรณไม้น้ำสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง แต่ในการเจริญเติบโตของพืชนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ธาตุอาหารพืชก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์สามารถควบคุมได้

ธาตุแคลเซียมเป็นธาตุอาหารหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการต่างๆ ของพืช ได้แก่ เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างเซลล์ ช่วยให้เซลล์พืชทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งพืชจะดูดแคลเซียมในรูปของไอออนทางระบบรากส่งผ่านทางท่อส่งน้ำในปริมาณมากแล้วดูดทางท่อส่งอาหารปริมาณน้อยแล้วส่งขึ้นทุกส่วนของพืช นอกจากนี้ แคลเซียมยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนต่างๆ ของพืชให้เป็นไปตามปกติ

ในระบบการเลี้ยงแบบไฮโดรโปนิค ปัญหาการขาดแคลเซียมเป็นปัญหาที่พบอยู่ทั่วไป ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้พืชที่เลี้ยงในระบบนี้เกิดปัญหาการขาดแคลเซียม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ปริมาณของโลหะหนัก ปริมาณปุ๋ยที่เพิ่มเข้าไป ความเค็ม และปฏิกิริยาต่างๆ ในเซลล์ของพืช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียม ทำให้พืชไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้ทำให้เกิดอาการขาดแคลเซียม ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพรรณไม้น้ำเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการศึกษาระดับของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพรรณไม้น้ำ

### วัตถุประสงค์

1. ศึกษาระดับแคลเซียมคาร์บอนเตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี้
2. ศึกษาระดับแคลเซียมอีดีทีเอที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การตรวจเอกสาร

### ชีววิทยาของต้นอเมซอนมาร์ตี (Echinodorus martii)

อเมซอนมาร์ตี (Echinodorus martii) มีชื่อสามัญว่า Ruffled Amazon Sword พรรณไม้น้ำสกุลนี้จัดอยู่ในวงศ์ Alismataceae แต่พันธุ์นี้ใบจะเป็นแถบยาว ปลายเรียวมน สีเขียวอ่อนจนดูเหมือนใส มองเห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเป็นคลื่น ความยาวใบประมาณ 20-40 เซนติเมตร ความกว้างใบ 2.5-7.5 เซนติเมตร ก้านใบสั้นมาก แตกจากเหง้าแผ่เป็นกอใหญ่ โตเต็มที่อาจสูงถึง 50 เซนติเมตร ซึ่งในธรรมชาติ อเมซอนส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพครึ่งบกครึ่งน้ำ หรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ จะมีก้านช่อดอกยื่นยาวออกมาจากโคนต้น และมีดอกสีขาว การขยายพันธุ์จะใช้วิธีตัดต้นอ่อนบนก้านช่อดอกไปปลูกในแปลงดินปนทรายที่ชื้นแฉะ (วันเพ็ญ และกาญจนวี, 2543) อุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 20-25 องศาเซลเซียส และความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-7.2 (Eu Tian Han, 2001)



ภาพที่ 1 อเมซอนมาร์ตี (Echinodorus martii)

ที่มา : [http://www.tjorvar.is/.../images/Echinodorus\\_marjor.jpg](http://www.tjorvar.is/.../images/Echinodorus_marjor.jpg) (2007)

### การปลูกพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน

การปลูกพืชโดยปกติทั่วไป มักจะมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงต่างๆ มากมาย ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากดินที่เราปลูก การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ทำให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ สามารถวางแผนการปลูกได้ กำหนดปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือความต้องการของตลาดได้ดีกว่า ที่สำคัญในเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า หาระนี้คือสามารถขายได้ราคา ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการปลูกพืชให้ส่วนของรากแช่อยู่ในธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง หรือปลูกบนวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชหรือน้ำปุ๋ย วัสดุที่ใช้ปลูกพืชอาจเป็นสารอนินทรีย์ เช่น กรวด ทราย หิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือมนุษย์ทำขึ้นมา เช่น เพอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคิวไลท์ (Vermiculite) ร็อกวูล (Rockwool) หรือสารอินทรีย์ เช่น พีท (Peat) มอส (Moss) ขี้เลื่อย เปลือกไม้ เปลือกมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว แกลบสดและถ่านแกลบ เป็นต้น

### ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้

1. ความต้องการธาตุอาหารของพรรณไม้ (Nutrient requirement) ธาตุอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ ซึ่งแบ่งเป็น ธาตุอาหารหลัก (Macronutrient) และธาตุอาหารรอง (Micronutrient)

1.1 ธาตุอาหารหลัก (Macronutrient) พรรณไม้ต้องการธาตุอาหารหลักเป็นปริมาณมากในการเจริญเติบโต ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โบแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ธาตุอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อพรรณไม้ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโบแทสเซียม ไนโตรเจนมีความสำคัญในการสร้างโปรตีนของพรรณไม้ เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเร่งให้ใบและลำต้นเจริญได้ดีทำให้ใบสวยงามและแข็งแรง ฟอสฟอรัสและโบแทสเซียมจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

1.2 ธาตุอาหารรอง (Micronutrient) พรรณไม้ต้องการในปริมาณน้อย และขาดธาตุอาหารเหล่านี้ไม่ได้ ซึ่งได้แก่ คลอรีน เหล็ก แมงกานีส ทองแดง โมลิบดีนัม และโบรอน ธาตุอาหารรองที่สำคัญก็คือ ธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ช่วยให้ใบมีสีเขียว แต่ถ้ามีการให้ธาตุเหล่านี้มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อพรรณไม้ (นงนุช, 2549) โดยปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติมักจะมีธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ ละลายน้อยอยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพรรณไม้

สารละลายธาตุอาหารในระบบการปลูกแบบไร้ดินที่เหมาะสมสำหรับพรรณไม้มีค่า EC เท่ากับ 0.5 – 1.5 mS/cm (นงนุช, 2549) ค่า EC (Electrical conductivity) ของสารละลายเป็นการบอกค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งแสดงถึงปริมาณความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร

2. ปริมาณความเข้มแสง (Light intensity) แสงสว่าง มีความสำคัญ ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของพรรณไม้ พืชจะใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน เพื่อทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงที่บริเวณหรือส่วนที่มีสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวรับแสงเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นกลูโคสและออกซิเจน (อารักษ์, 2546) ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีคุณภาพดีที่สุดต่อการเจริญเติบโต แต่ยากต่อการควบคุมปริมาณแสงให้พอดีกับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความต้องการของพรรณไม้น้ำแต่ละชนิด ถ้าปริมาณแสงมากเกินไปจะทำให้ตะไคร่น้ำเจริญเติบโตได้ดี ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้น้ำขุ่นเขียว พรรณไม้น้ำต่างชนิดกันมีความต้องการปริมาณแสงที่ต่างกัน ส่วนใหญ่พรรณไม้น้ำต้องการความเข้มแสงประมาณ 3,000-7,500 ลักซ์ (นงนุช, 2549)

3. คาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น สามารถละลายน้ำได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจนถึง 200 เท่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะได้รับการแพร่ผ่านจากชั้นบรรยากาศ ขบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์วัตถุต่างๆ โดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำ และได้จากการหายใจของพืชและสัตว์ ในช่วงที่มีแสงพรรณไม้น้ำจะนำแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการดูดซึมจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำเข้าเซลล์จะทำปฏิกิริยากับน้ำ โดยอาศัยรงควัตถุสีเขียวในเซลล์หรือคลอโรฟิลล์ และแสงสว่างเพื่อผลิตกลูโคส ซึ่งเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ในขบวนการดังกล่าวให้ก๊าซออกซิเจนเป็นผลพลอยได้

ในอากาศทั่วไปมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.03 % (สมิตรา, 2544) ในบริเวณที่พืชขึ้นอยู่รวมกันหนาแน่น ช่วงเวลาที่มีการสังเคราะห์แสงของพืชมาก คาร์บอนไดออกไซด์ อาจเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชได้ แต่ในสภาพทั่วไปแล้วพืชมักไม่ขาดคาร์บอนไดออกไซด์

4. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved oxygen) ก๊าซออกซิเจนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ เพื่อช่วยในการหายใจในตอนกลางคืน หรือขณะที่ไม่มีแสงสว่าง เมื่อขบวนการสังเคราะห์แสงหยุดลง พรรณไม้น้ำที่อาศัยอยู่ใต้น้ำจะดูดซึมก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ส่วนพรรณไม้น้ำที่มีใบเจริญอยู่เหนือน้ำจะดูดซึมจากบรรยากาศโดยตรงเพราะในบรรยากาศมีก๊าซออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 20% (อารักษ์, 2546) ก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอาจได้จากบรรยากาศโดยตรง ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสง หรือได้จากขบวนการทางเคมีอื่นๆ ในน้ำ โดยในแหล่งน้ำมีสารประกอบหรือแร่ธาตุบางชนิดทำปฏิกิริยาต่อกันแล้วให้ออกซิเจนในน้ำได้ แต่ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่มีพรรณไม้น้ำจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มแสงเป็นสำคัญ ถ้าแหล่งน้ำนั้นๆ ได้รับแสงสว่างเพียงพอพรรณไม้น้ำจะใช้ออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงได้อย่างเพียงพอ ออกซิเจนควรจะมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะมีผลต่อการดูดซับธาตุอาหาร (วนาวรณ, 2539 ; นงนุช , 2549)

5. อุณหภูมิ (Temperature) เป็นปัจจัยที่ควบคุมอัตราเร็วของขบวนการทางสรีรซึ่งพรรณไม้น้ำแต่ละชนิดชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางชนิดชอบอุณหภูมิต่ำบางชนิดชอบอุณหภูมิสูง บางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกว้าง (Eurythermic plants) แต่บางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แคบ (Stenothermic plants) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ และการเพิ่มจำนวนของเอกสารเป็นเอกสารที่ส่งวันไว้สำหรับการแข่งขันเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นับญาติเห็นาเปเชประเขชันดานการค้ำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พรรณไม้ที่ต่างกัน ในประเทศไทยอุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพรรณไม้หลายชนิด อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส (นงนุช, 2549)

6. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) พรรณไม้สามารถใช้อาหารในน้ำได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ถ้าความเป็นกรดเป็นด่างต่ำหรือสูงเกินไป พรรณไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้ในน้ำที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6.5-7.5 ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำมีผลทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำเปลี่ยนแปลงโดยในเวลากลางวัน พรรณไม้ไม่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจึงทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดลง ส่วนในตอนกลางวันขณะมีแสงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำจะลดลงเนื่องจากการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะเพิ่มขึ้น (วนาวรรณ, 2539)

7. ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ หากรากของพรรณไม้ไม่สามารถดูดน้ำได้ทันกับอัตราการคายน้ำของพรรณไม้จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้หยุดชะงัก เซลล์ไม่เต่งตึงเท่าที่ควร (สุมิตรา, 2544) ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ (นงนุช, 2549)

8. วัสดุปลูก (Growing media) หน้าที่ของวัสดุปลูกเป็นที่อยู่ของรากของพรรณไม้ สารละลายธาตุอาหารและอากาศ ช่วยส่งเสริมรากพืชให้เจริญเติบโต ตลอดจนเป็นที่เกาะยึดค้ำยันต้นพืช วัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับพรรณไม้คือ ทราย รongลงมาคือ โยหิน และฟองน้ำ (นงนุช, 2549) ส่วน มณีรัตน์ และคณะ (2540) ได้ทำการศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญของต้นดาวกระจาย (*Hygrophila difformis*) 4 ชนิด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าปะการังขนาด 1-2 มิลลิเมตร เป็นวัสดุปลูกที่ทำให้ต้นดาวกระจายเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รongลงมาได้แก่ กรวดขนาด 1-2 มิลลิเมตร ทรายหยาบขนาด 0.5-1 มิลลิเมตร และกรวดขนาด 3-5 มิลลิเมตร ตามลำดับ

### ธาตุแคลเซียมในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน

การขาดธาตุแคลเซียมเป็นปัญหาที่พบบ่อยในพืชที่เลี้ยงในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน (Klougart, 1980) อาการขาดแคลเซียมมักเกิดจากมีปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอในพืช แต่ไม่ได้หมายความว่าแคลเซียมในสารละลายไม่เพียงพอ แต่เป็นปัญหาอัตราการดูดใช้แคลเซียมของพืชไม่เพียงพอ กล่าวคือ ในสารละลายถึงแม้จะมีปริมาณแคลเซียมในปริมาณมากพอเพียงกับความต้องการของพืชแต่มีปัญหาอัตราการดูดใช้แคลเซียมไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นปัญหาของเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ผ่านการขออนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือความไม่สมดุลของธาตุอาหารในสารละลายไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอัตราส่วนของแคลเซียมกับไอออนบวก ตัวอื่นๆ เช่น  $\text{NH}_4^+$  ,  $\text{K}^+$  ,  $\text{Mg}^{++}$  (อิทธิสุนทร, 2544)

### 1. หน้าที่ของแคลเซียม

แคลเซียมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆ ของพืช ทำให้โครงสร้างเซลล์และการทำงานของเมมเบรนของพืชสมบูรณ์ ทำให้โครงสร้างของผนังเซลล์คงรูป ควบคุมการขนส่งและแลกเปลี่ยนไอออน (Rengel, 1992 ; Marschner, 1995) และยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนต่างๆ ของพืชให้เป็นไปตามปกติ นอกจากนี้แคลเซียมยังมีส่วนช่วยในการควบคุมความรุนแรงของความเค็มโดยเฉพาะในพืชที่มีความรู้สึกไวต่อโซเดียมและคลอไรด์ (Mass, 1993; Grattan and Grieve, 1999) นอกจากนี้แคลเซียมยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ คือ ส่วนของ calcium pectate ทำหน้าที่คล้ายกาวเชื่อมผนังเซลล์ให้ติดกันซึ่งทำให้เซลล์มีความแข็งแรง ดังนั้นเป็นตัวทำให้ผลและใบแข็ง (อิทธิสุนทร, 2544) แคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการแบ่งเซลล์และการยึดของเซลล์ (โสระยา, 2546) เป็นธาตุที่กระตุ้นให้เอนไซม์หลายชนิดทำงาน (อารักษ์, 2546 ; สุมิตรรา, 2544)

### 2. การดูดใช้แคลเซียมของพืช

แคลเซียมเมื่อถูกดูดเข้าไปในต้นพืช ส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่อยู่ใน Xylem แบบ Passive transport ไปตามกระแสการไหลเวียนของสารละลายใน Xylem สู่อวัยวะของต้นพืช ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืชซึ่งจะมีผลให้การเคลื่อนที่ของสารละลายใน Xylem ช้าลง จะมีผลต่อการดูดใช้แคลเซียมของพืชด้วย (อิทธิสุนทร, 2544) ในเวลากลางคืนเมื่อมีการคายน้ำเกิดขึ้นน้อยพบว่า แคลเซียมถูกลำเลียงขึ้นโดยแรงดันราก การลำเลียงในท่ออาหารเกิดขึ้นได้น้อย และมีการสะสมของแคลเซียมในเซลล์บริเวณรอบๆ ท่ออาหาร (โสระยา, 2546) อัตราการดูดธาตุแคลเซียมจะช้ากว่าโพแทสเซียม แต่ค่อนข้างจะคงที่ตลอดช่วงวงจรชีวิตพืช การดูดใช้แคลเซียมจะขึ้นกับไอออนตัวอื่นในสารละลายโดยเฉพาะเมื่อมีไนเตรตจะทำให้การดูดใช้แคลเซียมสูงขึ้น (อารักษ์, 2546)

### 3. อาการขาดแคลเซียม

เนื่องจากแคลเซียมเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ กล่าวคือ เมื่อพืชใช้แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของส่วนต่างๆ ในพืช เมื่อปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอ แคลเซียมในส่วนต่างๆ ของพืชไม่สามารถเคลื่อนที่จากส่วนต่างๆ เหล่านั้นไปยังส่วนเจริญอื่นๆ ได้ เช่น ที่ใบอ่อน หรือส่วนยอด ดังนั้นอาการขาดจะแสดงที่ส่วนยอดเจริญของต้นและราก โดยอาการที่แสดงให้เห็น คือ มีการเจริญผิดปกติของใบอ่อน ใบอ่อนจะโค้งงอ ใบอาจแสดงขอบใบเป็นสีเหลือง และเมื่อขาดนานเข้าจะแสดงอาการไหม้เป็นสีน้ำตาลถึงดำ (อิทธิสุนทร, 2544) อาการที่เกิดขึ้นที่ใบอ่อนจะแสดง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาการคือ ใบจะบิดเบี้ยว ม้วนงอ ใบไม่สามารถคลี่ได้เต็มที่ (สุมิตรา, 2544) ในพืชที่เลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิก จะแสดงอาการของการขาดแคลเซียม เช่น ใบมีสีซีด (Van der Boon, 1974), พืชไม่ติดดอก (Klougart, 1980) และใบไม่แข็งแรง (Algera, 1968; Hoogerterp, 1979; Igarashi et al., 1981 and Klougart, 1980) อย่างอาการของทิวลิปที่ขาดแคลเซียม คือ ใบที่อยู่ใต้ดอกไม้แข็งแรงไม่สามารถประคองดอกไว้ได้ทำให้ดอกล้ม ใบมีสีซีด นอกจากนี้ยังทำให้ตาดอกที่งอกมาเน่า ทำให้ทิวลิปไม่ติดดอก (Igarashi et al., 1981; Klougart, 1980; Penningsfeld and Kalthoff, 1975; Van der Boon, 1974) ในพืชชนิดอื่นๆ ก็จะมีอาการต่างๆ กัน เช่น ขอบใบไหม้ ในมะเขือเทศจะแสดงอาการกันเน่า เป็นต้น

### ผลของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพืช

Nelson and Niedziela (1998) ได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบที่ระดับของแคลเซียมที่จำเป็นและการใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารอื่นๆ โดยทำการทดลองในทิวลิป Jingle Bell โดยนำหัวของทิวลิป มาเลี้ยงในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน ควบคุมอุณหภูมิที่ 20°C ในตอนกลางคืน และ 24°C ในตอนกลางวัน ให้แสง 08.00-17.00 น. ทำการทดลองทั้งหมด 10 ชุดการทดลอง สารละลายธาตุอาหารจะนำมาทดแทนหลังจาก 7 และ 14 วัน พบว่า พืชที่เจริญเติบโตในสารละลาย 0.125 mM ของ  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  มีอาการของการขาดแคลเซียม คือ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนกว่าปกติและในที่สุดก็เป็นโรคเรื้อรัง ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของพืชในชุดการทดลองที่ 1 เกิดอาการลำต้นและใบไม่แข็งแรง ส่วนในชุดการทดลองที่ 2-10 ไม่ปรากฏอาการนี้ มีอาการที่ทิวลิปไม่ติดดอกเกิดขึ้นในชุดการทดลองที่ 2 อาการนี้สามารถเกิดได้เนื่องจากการขาดแคลเซียมและปัจจัยอื่นๆ และระดับอาการไม่ติดดอกของทิวลิปในชุดการทดลองที่ 2 นี้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับชุดการทดลองอื่นๆ ที่มีอาการนี้เกิดขึ้น น้ำหนักแห้งของยอดทิวลิปไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.42 กรัม/ยอด) ผลที่ได้นี้ทำให้ทราบค่า 2.5 mM ของแคลเซียมเพียงพอที่จะป้องกันอาการขาดแคลเซียมได้ในระหว่างการเลี้ยง การเพิ่ม  $\text{BO}_3^{3-}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  และ สารละลายธาตุอาหารพืชสมบูรณ์ ไม่มีผลแต่อย่างใด

ปริมาณแคลเซียมที่สะสมในยอดของทิวลิปที่ได้รับ 0.125 mM ของแคลเซียม คือ 1.30 มิลลิกรัม/ยอด ปริมาณแคลเซียมที่สะสมสูงสุดคือ 7.64 มิลลิกรัม/ยอด ในทิวลิปที่ได้รับ 2.5 mM ของแคลเซียมตลอดการเลี้ยง ปริมาณแคลเซียมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นที่ 5 และ 10 mM ขณะที่การใช้ 5 mM ของแคลเซียมก่อนและหลัง 10 วัน เพียงพอในการป้องกันการขาดแคลเซียมได้ซึ่งพืชมีระดับของแคลเซียมประมาณครึ่งหนึ่งของระดับที่ได้จากการใช้อย่างต่อเนื่อง และที่ 5 mM  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  ที่อยู่ใน Hoagland's solution ในชุดการทดลองที่ 7 ปริมาณของแคลเซียมที่มีอยู่ในยอดต่ำกว่าในชุดการทดลองที่ 3 ซึ่งใช้เพียง 5 mM  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  อย่างเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Antosiewicz (2004) ได้ทำการศึกษาระดับของแคลเซียม โดยทำการทดลองใน ข้าวโพด , ข้าวไรน์, มะเขือเทศและมันฝรั่ง โดยจะนำเมล็ดของพืชมาเพาะใน full Knop's medium (Rychter and Mikulska , 1990) เมื่อดันอ่อนมีความยาวราก 1.0-2.5 เซนติเมตร จึงนำมาทดลอง โดยทำการเพาะเลี้ยงในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน โดยใช้สารละลายธาตุอาหารพืชดัดแปลงของ Knop ควบคุมอุณหภูมิที่ 24° C ในตอนกลางวันและ 19°C ในตอนกลางคืน ให้แสง 16 ชั่วโมงในการทดลอง จะทำการเสริมธาตุแคลเซียมเข้าไปในสารละลายธาตุอาหารพืชดัดแปลงของ Knop ที่ระดับความเข้มข้น 3.0 , 2.4 , 1.2 และ 0.3 mM ของ Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ผลที่ได้พบว่า การเสริมธาตุแคลเซียมเข้าไป ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ยกเว้นในระดับที่ต่ำสุด คือ 0.3 mM ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของรากใน มะเขือเทศ ข้าวโพด และข้าวไรน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Nelson et al., (2003) ได้ทำการทดลองในทิวลิป *Tulipa gesneriana* (Abra , Christmas Marvel , Jingle Bell , Golden Melody , Oscar) ที่เลี้ยงในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 2 ระดับ คือ 42% และ 82% และระดับของ Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 5 ระดับ คือ 0 , 2.5 , 5 , 10 และ 20 mM ทำการทดลองในห้องที่อุณหภูมิคงที่ 19° C ให้แสง 14 ชั่วโมง พบว่าการดูดซึมและการสะสมของแคลเซียมที่ 82% RH น้อยกว่าที่ 42% RH อย่างไรก็ตามสารละลาย Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 2.5 mM สามารถป้องกันอาการขาดแคลเซียมในพืชที่ทดลองทั้งหมดยกเว้น Abra การดูดซึมแคลเซียมและการคายน้ำลดต่ำลงเมื่ออยู่ในน้ำกลั่น (ความเข้มข้นของแคลเซียม 0 mM) และที่ 20 mM Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> เมื่อเทียบกับ Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ใน ชุดการทดลอง อื่นๆ

Antosiewicz (2004) ได้ทำการศึกษาระดับของแคลเซียมในการลดการสะสมของโลหะหนัก โดยทำการทดลองใน ข้าวโพด, ข้าวไรน์, มะเขือเทศและมันฝรั่ง โดยจะนำเมล็ดของพืชมาเพาะใน full Knop's medium (Rychter and Mikulska , 1990) เมื่อดันอ่อนมีความยาวราก 1.0-2.5 เซนติเมตร จึงนำมาทดลอง โดยทำการเพาะเลี้ยงในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน โดยใช้สารละลายธาตุอาหารพืชดัดแปลงของ Knop ควบคุมอุณหภูมิที่ 24° C ในตอนกลางวันและ 19°C ในตอนกลางคืน ให้แสง 16 ชั่วโมงในการทดลองและทำการเพิ่มตะกั่วในรูปของ lead nitrate ที่ระดับความเข้มข้น 5,10 และ 20 mg dm<sup>3</sup> ที่ระดับความเข้มข้นของแคลเซียม 3.0, 2.4, 1.2 และ 0.3 mM Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> เมื่อทำการทดลองครบ 7 วัน จะทำการวัดการเจริญเติบโตของรากและความเข้มข้นของแคลเซียมในรากและในยอดของพืชพบว่าการสะสมของแคลเซียมในรากและยอดที่ระดับแคลเซียม 0.3 mM มีความเข้มข้นของแคลเซียมในระดับต่ำทั้งในมะเขือเทศและมันฝรั่ง โดยไม่คำนึงถึงปริมาณตะกั่ว ในมันฝรั่งที่ระดับความเข้มข้นของแคลเซียมที่สูงสุดและต่ำสุด การ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สะสมของแคลเซียมในรากลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เพราะที่ 2.4 และ 1.2 mM ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงข้ามกับผลที่ได้ในยอด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## อุปกรณ์และวิธีการ

### อุปกรณ์

1. พรรณไม้ น้ำ จำนวน 204 ต้น
2. ปลูก Lettuce NFT (Belgium)
3. แคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_2$ )
4. แคลเซียม EDTA (Chelate calcium)
5. ถังพลาสติกขนาด จำนวน 12 ใบ
6. บั้มลม จำนวน 12 ตัว
7. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง
8. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter)
9. กรดไนตริก ( $\text{HNO}_3$ ) สำหรับปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
10. อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

แคลเซียม และแมกนีเซียม

### วิธีการ

**การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ อเมซอนมาร์ตี้**

#### แผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยใช้แคลเซียมที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน คือ 3.1 (กลุ่มควบคุม), 1.55, 4.65 และ 6.2 mM เติรมลงในสารละลายธาตุอาหารพืช โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ดังนี้

ชุดการทดลอง 1 อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 3.1 mM (กลุ่มควบคุม)

ชุดการทดลอง 2 อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 1.55 mM

ชุดการทดลอง 3 อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 4.65 mM

ชุดการทดลอง 4 อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 6.2 mM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับแคลเซียม EDTA ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ พรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี

### แผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยใช้แคลเซียมที่ระดับความเข้มข้นที่  
แตกต่างกัน คือ 3.1 (กลุ่มควบคุม), 1.55, 4.65 และ 6.2 mM เสริมลงในสารละลายธาตุอาหารพืช  
โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ดังนี้

ชุดการทดลอง 1 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 3.1  
mM (กลุ่มควบคุม)

ชุดการทดลอง 2 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 1.55  
mM

ชุดการทดลอง 3 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 4.65  
mM

ชุดการทดลอง 4 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารพืชระดับแคลเซียม 6.2  
mM

### วิธีการทดลอง

#### การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับแคลเซียมคาร์บอนเนตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ พรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี

1. การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช แบ่งสารละลายเป็น 2 ถัง ได้แก่

ถังที่ 1 ใช้  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  793 กรัม และ  $\text{Fe-EDTA}$  68 กรัม ละลายน้ำ 10 ลิตร  
โดยละลายทีละตัว เมื่อละลายหมดแล้ว เติมกรดไนตริก เพื่อปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 3-6 ส่วนถังที่ 2  
ใช้  $\text{KNO}_3$  1,534 กรัม,  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$  278 กรัม,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  28 กรัม,  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  373  
กรัม,  $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  2,378 กรัม,  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  0.406 กรัม,  $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  3.54 กรัม  
 $\text{H}_3\text{BO}_3$  3.812 กรัม และ  $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  0.171 กรัม ละลายในน้ำ 10 ลิตร โดย  
ละลายทีละตัว เติมกรดไนตริก ปรับ pH ไม่ให้ต่ำกว่า 6

2. การเตรียมน้ำ

2.1 ในการทดลอง 5 สัปดาห์แรก เตรียมน้ำที่มีความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร  
พืชในระดับที่เท่ากัน คือ ที่ EC เท่ากับ 0.7 mS/cm จำนวน 12 ถัง

2.2 เติมแคลเซียมคาร์บอนเนตปริมาณ 62 ppm ต่อถัง

2.3 เมื่อครบ 5 สัปดาห์ทำการเปลี่ยนระดับความเข้มข้นของสารละลายใหม่โดยปรับค่า EC  
เป็น 1.0 mS/cm และเพิ่มลดระดับแคลเซียมตามชุดการทดลอง เป็นเวลา 3 สัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3. การปลูกพรรณไม้หน้า

3.1 นำพรรณไม้น้ำมาชำไว้ก่อนการทดลองเป็นเวลา 2 อาทิตย์ โดยชำในถ้วยปลูกใช้ เพอร์ไลท์ เป็นวัสดุปลูก

3.2 นำพรรณไม้น้ำมาปลูกในรางปลูกที่เตรียมไว้ทั้งหมด 12 ราง รางละ 17 ต้น

3.3 วัดความยาวใบ ความกว้าง ความสูง และนับจำนวนใบจำนวน 5 ต้นต่อ 1 ช้ำ ทุก 2 สัปดาห์

3.4 วัดความหนาของใบ สัปดาห์ที่ 6 และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

3.5 วัดค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปรับให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ในช่วง 6.5-7.0 โดยใช้กรดไนตริก

3.6 เมื่อสิ้นสุดการทดลองชั่งน้ำหนักของพรรณไม้น้ำ บันทึกข้อมูล

4. การหาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในพรรณไม้น้ำ

4.1 นำพรรณไม้น้ำมาหาค่าน้ำหนักแห้ง โดยชั่งน้ำหนักกระดาษฟอยล์ และชั่งน้ำหนักกระดาษฟอยล์ร่วมกับพรรณไม้น้ำในแต่ละซ้ำการทดลอง

4.2 นำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมงรอให้เย็นโดยเก็บไว้ในโถดูดความชื้น ชั่งน้ำหนักและอบต่ออีก 1 ชั่วโมง รอให้เย็น ชั่งน้ำหนัก

4.3 นำพรรณไม้น้ำที่อบแห้งไปวิเคราะห์ไนโตรเจนในพืช ตามวิธีของเคลดาลและปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมที่สะสมในพืช

**การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับแคลเซียม EDTA ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี**

เตรียมการทดลองเหมือนการทดลองที่ 1 โดยเติมแคลเซียม EDTA แทนแคลเซียมคาร์บอเนต

### การบันทึกข้อมูล

1. บันทึก ความยาวใบ ความกว้างใบ ความสูง และจำนวนใบ ทุก 2 สัปดาห์
2. บันทึก ความหนาของใบ ก่อนและหลังเติมแคลเซียมระดับต่างๆ
3. บันทึก ค่าการนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ทุก 1 สัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลความยาวใบ ความกว้าง ความสูง จำนวนใบและความหนาของใบที่เพิ่มขึ้นในแต่ละชุดการทดลอง ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่สะสมใน พรรณไม้ นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for window version 10.0

### สถานที่ทำการทดลอง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

### ระยะเวลาทำการทดลอง

เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2550



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ผลการทดลองและวิจารณ์

### การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี

จากการทดลองระดับของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3.10 mM (ชุดควบคุม) , 1.55 mM , 4.65 mM และ 6.20 mM เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับแคลเซียมต่างๆ กัน มีผลต่อ ความยาวใบ ความสูง ความกว้างใบ จำนวนใบ ความหนา และน้ำหนักของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

#### ความยาวใบของอเมซอนมาร์ตี

ความยาวใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2)

ในสัปดาห์ที่ 4 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $7.38 \pm 0.48$ ) มีความยาวใบมากกว่า ชุดควบคุม ( $5.98 \pm 0.44$ ) แต่ชุดควบคุมไม่มีความแตกต่างกับชุดที่ปลูกที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $6.72 \pm 0.21$ ) และ 6.20 mM ( $6.63 \pm 0.48$ ) ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 1)

ในสัปดาห์ที่ 6 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $9.68 \pm 0.16$ ) , 4.65 mM ( $9.20 \pm 0.26$ ) และ ชุดควบคุม 3.10 mM ( $9.12 \pm 0.22$ ) มีความยาวใบมากกว่าชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $8.41 \pm 0.18$ ) ( $P < 0.05$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 1)


ในสัปดาห์ที่ 8 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $13.03 \pm 0.34$ ) ให้ความยาวใบมากกว่า ชุดควบคุม 3.10 mM ( $9.74 \pm 0.21$ ) และชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $8.55 \pm 0.18$ ) และ 6.20 mM ( $12.20 \pm 0.22$ ) แต่ชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $12.20 \pm 0.22$ ) ไม่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ปลูกในระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $13.03 \pm 0.34$ ) ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 1 ความยาวใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับ  
แคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	1.65 ± 0.04 <sup>a</sup>	4.20 ± 0.15 <sup>a</sup>	5.98 ± 0.44 <sup>a</sup>	9.12 ± 0.22 <sup>b</sup>	9.74 ± 0.21 <sup>b</sup>
1.55	1.60 ± 0.02 <sup>a</sup>	4.57 ± 0.25 <sup>a</sup>	6.72 ± 0.21 <sup>ab</sup>	8.41 ± 0.18 <sup>a</sup>	8.55 ± 0.18 <sup>a</sup>
4.65	1.67 ± 0.02 <sup>a</sup>	4.14 ± 0.19 <sup>a</sup>	7.38 ± 0.48 <sup>b</sup>	9.20 ± 0.26 <sup>b</sup>	13.03 ± 0.34 <sup>c</sup>
6.20	1.66 ± 0.01 <sup>a</sup>	4.24 ± 0.13 <sup>a</sup>	6.63 ± 0.48 <sup>ab</sup>	9.68 ± 0.16 <sup>b</sup>	12.20 ± 0.22 <sup>c</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 2 ความยาวใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ ระดับ  
แคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

### ความสูงของอเมซอนมาร์ตี

ความสูงของอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่าง  
กันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3)

ในสัปดาห์ที่ 6 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $12.09 \pm 0.40$ ) , 4.65  
mM ( $11.69 \pm 0.60$ ) และชุดควบคุม 3 mM ( $11.53 \pm 0.44$ ) ให้ความสูงมากกว่า ชุดที่ปลูกใน  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $10.49 \pm 0.17$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ )

ในสัปดาห์ที่ 8 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $17.56 \pm 0.66$ ) และที่ปลูกในระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $16.97 \pm 0.56$ ) ให้ความสูงมากกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $14.47 \pm 0.31$ ) และ ชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $11.87 \pm 0.10$ ) ให้ความสูงน้อยกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $14.47 \pm 0.31$ ) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอื่นๆ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 2)


### ความกว้างใบของอเมซอนมาร์ตี

ความกว้างใบของอเมซอนมาร์ตีที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันให้ความกว้างใบแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 8 คือ ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $3.78 \pm 0.10$ ) ให้ความกว้างใบมากกว่า ชุดควบคุม 3.10 mM ( $3.37 \pm 0.08$ ) , 4.65 mM ( $3.24 \pm 0.07$ ) และ 1.55 mM ( $3.01 \pm 0.13$ ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 4)

ตารางที่ 2 ความสูงของพรรณไม้ อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอนเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	$2.33 \pm 0.01^a$	$5.48 \pm 0.23^a$	$8.81 \pm 0.05^a$	$11.53 \pm 0.44^{ab}$	$14.47 \pm 0.31^b$
1.55	$2.33 \pm 0.01^a$	$5.25 \pm 0.21^a$	$8.13 \pm 0.21^a$	$10.49 \pm 0.17^a$	$11.87 \pm 0.10^a$
4.65	$2.33 \pm 0.01^a$	$5.46 \pm 0.49^a$	$9.13 \pm 0.76^a$	$11.69 \pm 0.60^{ab}$	$17.56 \pm 0.66^c$
6.20	$2.33 \pm 0.01^a$	$5.44 \pm 0.34^a$	$8.69 \pm 0.49^a$	$12.09 \pm 0.40^b$	$16.97 \pm 0.56^c$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 3 ความสูงของพรรณไม้ข้าวเมฆอนมารดีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน


ตารางที่ 3 ความกว้างใบของพรรณไม้ข้าวเมฆอนมารดีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	0.89 ± 0.01 <sup>a</sup>	1.22 ± 0.07 <sup>a</sup>	1.80 ± 0.23 <sup>a</sup>	2.73 ± 0.09 <sup>a</sup>	3.37 ± 0.08 <sup>b</sup>
1.55	0.87 ± 0.01 <sup>a</sup>	1.24 ± 0.07 <sup>a</sup>	2.00 ± 0.04 <sup>a</sup>	2.62 ± 0.05 <sup>a</sup>	3.01 ± 0.13 <sup>a</sup>
4.65	0.87 ± 0.01 <sup>a</sup>	1.07 ± 0.07 <sup>a</sup>	2.04 ± 0.16 <sup>a</sup>	2.70 ± 0.14 <sup>a</sup>	3.24 ± 0.07 <sup>ab</sup>
6.20	0.87 ± 0.01 <sup>a</sup>	1.19 ± 0.09 <sup>a</sup>	1.85 ± 0.37 <sup>a</sup>	2.96 ± 0.09 <sup>a</sup>	3.78 ± 0.10 <sup>c</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

99382

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4 ความกว้างใบของพรรณไม้ออเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมควาร์บอเนตต่างๆ กัน

#### จำนวนใบของออเมซอนมาร์ตี

จำนวนใบของพรรณไม้ออเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 5)

ในสัปดาห์ที่ 4 ออเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมชุดควบคุม 3.10 mM ( $12.40 \pm 0.51$ ) ให้จำนวนใบมากกว่าชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $11.13 \pm 0.36$ ), 4.65 mM ( $11.47 \pm 0.57$ ) และ 6.20 mM ( $10.93 \pm 0.28$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 4)

ในสัปดาห์ที่ 6 ออเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมชุดควบคุม 3.10 mM ( $15.47 \pm 0.52$ ) ให้จำนวนใบมากกว่าชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $13.47 \pm 0.36$ ), 4.65 mM ( $13.80 \pm 0.52$ ) และ 6.20 mM ( $13.47 \pm 0.40$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 4)


ในสัปดาห์ที่ 8 ออเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมชุดควบคุม 3.10 mM ( $18.00 \pm 0.5$ ) ให้จำนวนใบมากกว่าชุดที่ปลูกในระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $15.80 \pm 0.33$ ) มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) และมากกว่าที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $17.13 \pm 0.59$ ) แม้ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และ 6.20 mM ( $16.73 \pm 0.42$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จำนวนใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะรุมที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	$5.67 \pm 0.13^a$	$10.47 \pm 0.13^a$	$12.40 \pm 0.51^b$	$15.47 \pm 0.52^b$	$18.00 \pm 0.51^b$
1.55	$5.80 \pm 0.11^a$	$9.93 \pm 0.43^a$	$11.13 \pm 0.36^{ab}$	$13.47 \pm 0.36^a$	$15.80 \pm 0.38^a$
4.65	$5.47 \pm 0.13^a$	$10.40 \pm 0.16^a$	$11.47 \pm 0.57^{ab}$	$13.80 \pm 0.52^a$	$17.13 \pm 0.59^{ab}$
6.20	$5.47 \pm 0.13^a$	$10.27 \pm 0.15^a$	$10.93 \pm 0.28^a$	$13.47 \pm 0.40^a$	$16.73 \pm 0.42^{ab}$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 5 จำนวนใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะรุมที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

### ความหนาใบของมะรุม

ความหนาของใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะรุมที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุด


การทดลองพบว่าที่ระดับแคลเซียม 4.65 และ 6.20 mM นั้นให้ความหนาน้อยใบมากที่สุด การคำนวณว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

( $1.13 \pm 0.00$ ) และ ( $1.13 \pm 0.00$ ) ตามลำดับ รองลงมาคือ ชุดควบคุม 3.10 mM ( $0.12 \pm 0.00$ ) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) และที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM พบว่าให้ความหนาของไบน้อยที่สุด ( $1.11 \pm 0.00$ ) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 5 และ ภาพที่ 6)

ตารางที่ 5 ความหนาของไบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม(mM)	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 (ชุดควบคุม)	$0.11 \pm 0.00^a$	$1.12 \pm 0.00^b$
1.55	$0.11 \pm 0.00^a$	$1.11 \pm 0.00^a$
4.65	$0.11 \pm 0.00^a$	$1.13 \pm 0.00^b$
6.20	$0.11 \pm 0.00^a$	$1.13 \pm 0.00^b$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 6 ความหนาของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### น้ำหนักของอเมซอนมาร์ตี้

น้ำหนักของพรรณไม้ อเมซอนมาร์ตี้ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ที่ชุดควบคุม 3.10 mM ให้น้ำหนักมากที่สุด ( $25.36 \pm 2.28$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $23.60 \pm 3.11$ ) , 6.20 mM ( $23.59 \pm 1.90$ ) และ 1.55 mM ( $19.09 \pm 1.30$ ) ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 6 และ ภาพที่ 7)

ตารางที่ 6 น้ำหนักของพรรณไม้ อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 (ชุดควบคุม)	$0.65 \pm 0.01^a$	$25.36 \pm 2.28^a$
1.55	$0.65 \pm 0.01^a$	$19.09 \pm 1.30^a$
4.65	$0.64 \pm 0.01^a$	$23.60 \pm 3.11^a$
6.20	$0.68 \pm 0.01^a$	$23.59 \pm 1.90^a$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถวกันหมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 7 น้ำหนักของพรรณไม้ อเมซอนมาร์ตี้ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3.10 mM (ชุดควบคุม) , 1.55 mM , 4.65 mM และ 6.20 mM เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ได้แก่ ไนโตรเจน และ แคลเซียม ส่วน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 7)

ปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 3.10 mM (ชุดควบคุม) และ ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM มีปริมาณไนโตรเจนสะสมมากที่สุด ( $2.80 \pm 0.000$ ) รองลงมาคือที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $2.70 \pm 0.033$ ) และ 6.20 mM ( $2.66 \pm 0.067$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 8)

ปริมาณฟอสฟอรัสที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM มีการสะสมของฟอสฟอรัสมากที่สุด ( $21.23 \pm 0.941$ ) รองลงมาคือที่ระดับ 4.65 mM ( $20.63 \pm 2.234$ ) , 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $20.54 \pm 1.428$ ) และ ที่ระดับ 6.20 mM ( $18.80 \pm 0.967$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 8)

ปริมาณโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM มีการสะสมของโพแทสเซียมมากที่สุด ( $4.56 \pm 0.095$ ) รองลงมาคือที่ระดับ 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $4.27 \pm 0.346$ ) , 6.20 mM ( $4.25 \pm 0.233$ ) และ 4.65 mM ( $4.07 \pm 0.307$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 8)

ปริมาณแคลเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM มีการสะสมแคลเซียมมากที่สุด ( $0.72 \pm 0.114$ ) รองลงมาคือ 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $0.47 \pm 0.054$ ) , 1.55 mM ( $0.44 \pm 0.081$ ) และ 4.65 mM ( $0.43 \pm 0.055$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 9)

ปริมาณแมกนีเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM , 4.65 mM และ 6.20 mM มีการสะสมของแมกนีเซียมมากที่สุด ( $0.33 \pm 0.038$ ) , ( $0.33 \pm 0.015$ ) และ ( $0.33 \pm 0.030$ ) ตามลำดับ ส่วนที่ระดับแคลเซียม 3.10 mM (ชุดควบคุม) มีการสะสมของแมกนีเซียมน้อยที่สุด ( $0.29 \pm 0.017$ ) (ตารางที่ 7 และภาพที่ 9)

จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 8)


ปริมาณเหล็กที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM มีการสะสมของเหล็กมากที่สุด ( $81.25 \pm 19.843$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับ 1.55 mM ( $72.08 \pm 2.205$ ) , 6.20 mM ( $62.50 \pm 14.434$ ) และ 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $52.92 \pm 12.276$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 8 และภาพที่ 10)

ปริมาณแมงกานีสที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM มีการสะสมของแมงกานีสมากที่สุด ( $36.25 \pm 17.515$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับ 6.20 mM ( $29.17 \pm 5.465$ ) , 4.65 mM ( $22.08 \pm 0.417$ ) และ ที่ระดับ 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $19.58 \pm 0.417$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 8 และภาพที่ 10)


**ตารางที่ 7** ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอนเนตต่างๆ กัน

ธาตุอาหารหลัก (%)	ระดับแคลเซียม (mM)			
	3.10	1.55	4.65	6.20
ไนโตรเจน	$2.80 \pm 0.000^b$	$2.70 \pm 0.033^{ab}$	$2.80 \pm 0.000^b$	$2.66 \pm 0.067^a$
ฟอสฟอรัส	$20.54 \pm 1.428^a$	$21.23 \pm 0.941^a$	$20.63 \pm 2.234^a$	$18.80 \pm 0.967^a$
โพแทสเซียม	$4.27 \pm 0.346^a$	$4.56 \pm 0.095^a$	$4.07 \pm 0.307^a$	$4.25 \pm 0.233^a$
แคลเซียม	$0.47 \pm 0.054^{ab}$	$0.44 \pm 0.081^a$	$0.43 \pm 0.055^a$	$0.72 \pm 0.114^b$
แมกนีเซียม	$0.29 \pm 0.017^a$	$0.33 \pm 0.038^a$	$0.33 \pm 0.015^a$	$0.33 \pm 0.030^a$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 8 ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้น้ำเมฆอนมาริตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน




ภาพที่ 9 ปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมที่สะสมในพรรณไม้น้ำเมฆอนมาริตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 8 ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

ธาตุอาหารรอง	ระดับแคลเซียม (mM)				
	(ppm)	3.10	1.55	4.65	6.20
เหล็ก		52.92 ± 12.276 <sup>a</sup>	72.08 ± 2.205 <sup>a</sup>	81.25 ± 19.843 <sup>a</sup>	62.50 ± 14.434 <sup>a</sup>
แมงกานีส		19.58 ± 0.417 <sup>a</sup>	36.25 ± 17.515 <sup>a</sup>	22.08 ± 0.417 <sup>a</sup>	29.17 ± 5.465 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)



ภาพที่ 10 ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมคาร์บอเนตต่างๆ กัน

## การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับแคลเซียมอิตีทีเอ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี

จากการทดลองระดับของแคลเซียมอิตีทีเอที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3.10 mM (ชุดควบคุม), 1.55 mM, 4.65 mM และ 6.20 mM เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับแคลเซียมต่างๆ กัน มีผลต่อ ความยาวใบ ความสูง และ น้ำหนักซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน ความกว้างใบ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จำนวนใบ และความหนาของใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนเมซอนมาร์ตี พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P>0.05$ )

### ความยาวใบของอเมซอนมาร์ตี

ความยาวใบของอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P<0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 9 และภาพที่ 11)


ในสัปดาห์ที่ 6 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกด้วยระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $2.76 \pm 0.02$ ) ให้ความยาวใบมากกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $2.70 \pm 0.02$ ) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) และให้ความยาวใบมากกว่าอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกด้วยระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $2.73 \pm 0.02$ ) และ 6.20 mM ( $2.74 \pm 0.01$ ) แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P>0.05$ ) (ตารางที่ 9)

ในสัปดาห์ที่ 8 อเมซอนมาร์ตีที่ปลูกด้วยระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $3.87 \pm 0.03$ ) ให้ความยาวใบมากกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $3.73 \pm 0.02$ ) , 4.65 mM ( $3.69 \pm 0.02$ ) และ 6.20 mM ( $3.71 \pm 0.02$ ) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ ) (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ความยาวใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมชนิดที่เอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	$1.80 \pm 0.02^a$	$2.17 \pm 0.02^a$	$2.33 \pm 0.02^a$	$2.70 \pm 0.02^a$	$3.73 \pm 0.02^a$
1.55	$1.80 \pm 0.02^a$	$2.19 \pm 0.02^a$	$2.29 \pm 0.02^a$	$2.76 \pm 0.02^b$	$3.87 \pm 0.03^b$
4.65	$1.81 \pm 0.02^a$	$2.17 \pm 0.02^a$	$2.30 \pm 0.02^a$	$2.73 \pm 0.02^{ab}$	$3.69 \pm 0.02^a$
6.20	$1.79 \pm 0.02^a$	$2.17 \pm 0.02^a$	$2.30 \pm 0.02^a$	$2.74 \pm 0.01^{ab}$	$3.71 \pm 0.02^a$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ )



ภาพที่ 11 ความยาวใบของพริกผลไม่ห่อเมซอนมารีดีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

#### ความสูงของอเมซอนมารีดี

ความสูงของอเมซอนมารีดีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (ตารางที่ 10 และ ภาพที่ 12)

ในสัปดาห์ที่ 6 อเมซอนมารีดีที่ปลูกด้วยระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $3.92 \pm 0.03$ ) ให้ความสูงมากกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $3.75 \pm 0.02$ ), 4.65 mM ( $3.79 \pm 0.02$ ) และ 6.20 mM ( $3.79 \pm 0.02$ ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 10)

ในสัปดาห์ที่ 8 อเมซอนมารีดีที่ปลูกด้วยระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $4.80 \pm 0.02$ ) ให้ความสูงมากกว่าชุดควบคุม 3.10 mM ( $4.72 \pm 0.02$ ), 4.65 mM ( $4.70 \pm 0.02$ ) และ 6.20 mM ( $4.73 \pm 0.02$ ) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 10)

#### ความกว้างใบของอเมซอนมารีดี


ความกว้างใบของอเมซอนมารีดีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ที่ชุดควบคุม 3.10 mM ( $1.35 \pm 0.02$ ) และ 1.55 mM ( $1.35 \pm 0.02$ ) ให้ความกว้างใบมากกว่าชุดการทดลองที่ปลูกอเมซอนมารีดีที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM ( $1.31 \pm 0.02$ ) และที่ 6.20 mM ( $1.32 \pm 0.01$ ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน ให้ความกว้างใบไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 13)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 10 ความสูงของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	2.17 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.35 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.75 ± 0.02 <sup>a</sup>	3.75 ± 0.02 <sup>a</sup>	4.72 ± 0.02 <sup>a</sup>
1.55	2.15 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.29 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.80 ± 0.02 <sup>a</sup>	3.92 ± 0.03 <sup>b</sup>	4.80 ± 0.02 <sup>b</sup>
4.65	2.15 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.29 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.76 ± 0.02 <sup>a</sup>	3.79 ± 0.02 <sup>a</sup>	4.70 ± 0.02 <sup>a</sup>
6.20	2.17 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.30 ± 0.02 <sup>a</sup>	2.77 ± 0.02 <sup>a</sup>	3.79 ± 0.02 <sup>a</sup>	4.73 ± 0.02 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)



ภาพที่ 12 ความสูงของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 11 ความกว้างใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	$0.76 \pm 0.01^a$	$0.90 \pm 0.02^a$	$1.17 \pm 0.02^a$	$1.30 \pm 0.02^a$	$1.35 \pm 0.02^a$
1.55	$0.76 \pm 0.01^a$	$0.88 \pm 0.02^a$	$1.11 \pm 0.02^a$	$1.29 \pm 0.02^a$	$1.35 \pm 0.02^a$
4.65	$0.75 \pm 0.01^a$	$0.91 \pm 0.02^a$	$1.11 \pm 0.02^a$	$1.28 \pm 0.02^a$	$1.31 \pm 0.02^a$
6.20	$0.77 \pm 0.01^a$	$0.89 \pm 0.02^a$	$1.13 \pm 0.02^a$	$1.27 \pm 0.02^a$	$1.32 \pm 0.01^a$

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

### จำนวนใบของเมซอนมาร์ตี

จำนวนใบของเมซอนมาร์ตีที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $12.67 \pm 0.23$ ) ให้จำนวนใบมากกว่าที่ชุดควบคุม 3.10 mM ( $12.60 \pm 0.24$ ), 4.65 mM ( $12.27 \pm 0.18$ ) และที่ 6.20 mM ( $12.40 \pm 0.19$ ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน ให้จำนวนใบไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 12 และ ภาพที่ 14)



ภาพที่ 13 ความกว้างใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่

ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 12 จำนวนใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีซีทีเอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
	0	2	4	6	8
3.10 (ชุดควบคุม)	6.47 ± 0.13 <sup>a</sup>	7.47 ± 0.13 <sup>a</sup>	8.93 ± 0.21 <sup>a</sup>	11.13 ± 0.22 <sup>a</sup>	12.60 ± 0.24 <sup>a</sup>
1.55	6.47 ± 0.13 <sup>a</sup>	7.53 ± 0.13 <sup>a</sup>	9.13 ± 0.19 <sup>a</sup>	11.13 ± 0.22 <sup>a</sup>	12.67 ± 0.23 <sup>a</sup>
4.65	6.47 ± 0.13 <sup>a</sup>	7.53 ± 0.13 <sup>a</sup>	8.87 ± 0.22 <sup>a</sup>	10.73 ± 0.18 <sup>a</sup>	12.27 ± 0.18 <sup>a</sup>
6.20	6.40 ± 0.13 <sup>a</sup>	7.60 ± 0.13 <sup>a</sup>	9.07 ± 0.12 <sup>a</sup>	11.00 ± 0.17 <sup>a</sup>	12.40 ± 0.19 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

### ความหนาใบของอเมซอนมาร์ตี

ความหนาของใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกันให้ความหนาของใบไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 13 และ ภาพที่ 15)



ภาพที่ 14 จำนวนใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่

ระดับแคลเซียมอีซีทีเอ ต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 13 ความหนาของใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะขอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 (ชุดควบคุม)	0.07 ± 0.00 <sup>a</sup>	0.09 ± 0.00 <sup>a</sup>
1.55	0.07 ± 0.00 <sup>a</sup>	0.08 ± 0.00 <sup>a</sup>
4.65	0.07 ± 0.00 <sup>a</sup>	0.09 ± 0.00 <sup>a</sup>
6.20	0.07 ± 0.00 <sup>a</sup>	0.08 ± 0.00 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

### น้ำหนักของอเมซอนมาร์ตี

น้ำหนักของอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในระดับแคลเซียมแตกต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $2.35 \pm 0.00$ ) ให้น้ำหนักมากกว่า ชุดควบคุม 3.10 mM ( $2.34 \pm 0.00$ ), 4.65 mM ( $2.34 \pm 0.00$ ) และ 6.20 mM ( $2.33 \pm 0.00$ ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 14 และ ภาพที่ 16)




ภาพที่ 15 ความหนาของใบของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะขอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 14 น้ำหนักของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม (mM)	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 (ชุดควบคุม)	0.65 ± 0.01 <sup>a</sup>	2.34 ± 0.00 <sup>b</sup>
1.55	0.65 ± 0.01 <sup>a</sup>	2.35 ± 0.00 <sup>c</sup>
4.65	0.64 ± 0.01 <sup>a</sup>	2.34 ± 0.00 <sup>b</sup>
6.20	0.68 ± 0.01 <sup>a</sup>	2.33 ± 0.00 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )



ภาพที่ 16 น้ำหนักของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

### ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ปลูกที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 3.10 mM (ชุดควบคุม), 1.55 mM, 4.65 mM และ 6.20 mM เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม ส่วนเหล็ก แมกนีเซียม และ แมงกานีส ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P > 0.05$ ) (ตารางที่ 15) หมายความว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี ที่ปลูกที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 3.10 mM (ชุดควบคุม) และ ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM มีปริมาณไนโตรเจนสะสมมากที่สุด ( $2.83 \pm 0.033$ ) รองลงมาคือที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM ( $2.76 \pm 0.033$ ) และที่ระดับ 1.55 mM ( $2.60 \pm 0.100$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 15 และภาพที่ 17)

ปริมาณฟอสฟอรัสที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 3.10 mM (ชุดควบคุม) มีการสะสมของฟอสฟอรัสมากที่สุด ( $65.89 \pm 0.609$ ) รองลงมาคือที่ระดับ 4.65 mM ( $65.36 \pm 0.791$ ) , 6.20 mM ( $64.29 \pm 0.070$ ) และ ที่ระดับ 1.55 mM ( $63.27 \pm 0.731$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 15 และภาพที่ 17)

ปริมาณโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM มีการสะสมของโพแทสเซียมมากที่สุด ( $3.67 \pm 0.224$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM ( $3.66 \pm 0.302$ ) , 6.20 mM ( $3.65 \pm 0.199$ ) และ 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $3.44 \pm 0.197$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 15 และภาพที่ 17)

ปริมาณแคลเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM มีการสะสมแคลเซียมมากที่สุด ( $0.52 \pm 0.023$ ) รองลงมาคือ 4.65 mM ( $0.37 \pm 0.058$ ) , 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $0.33 \pm 0.015$ ) และ ที่ระดับ 1.55 mM ( $0.09 \pm 0.026$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 15 และภาพที่ 18)

ปริมาณแมกนีเซียมที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 4.65 mM มีการสะสมของแมกนีเซียมมากที่สุด ( $0.55 \pm 0.067$ ) รองลงมาคือที่ระดับ 6.20 mM ( $0.53 \pm 0.054$ ) , 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $0.43 \pm 0.055$ ) และ ที่ระดับ 1.55 mM ( $0.38 \pm 0.015$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 15 และภาพที่ 18)

จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางที่ 16)

ปริมาณเหล็กที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM มีการสะสมของเหล็กมากที่สุด ( $77.08 \pm 5.417$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับ 4.65 mM ( $73.33 \pm 7.229$ ) , 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $70.83 \pm 3.975$ ) และที่ระดับ 1.55 mM ( $62.92 \pm 11.509$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 16 และภาพที่ 19)


ปริมาณแมงกานีสที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตี พบว่า ที่ระดับแคลเซียม 6.20 mM มีการสะสมของแมงกานีสมากที่สุด ( $40.42 \pm 3.975$ ) รองลงมาคือ ที่ระดับ 4.65 mM ( $39.20 \pm 7.140$ ) , 3.10 mM (ชุดควบคุม) ( $37.50 \pm 0.722$ ) และที่ระดับ 1.55 mM ( $31.25 \pm 5.907$ ) ตามลำดับ (ตารางที่ 16 และภาพที่ 19)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 15 ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน


ธาตุอาหารหลัก	ระดับแคลเซียม (mM)				
	(%)	3.10	1.55	4.65	6.20
ไนโตรเจน		2.83 ± 0.033 <sup>ab</sup>	2.60 ± 0.100 <sup>a</sup>	2.83 ± 0.033 <sup>b</sup>	2.76 ± 0.033 <sup>ab</sup>
ฟอสฟอรัส		65.89 ± 0.609 <sup>b</sup>	63.27 ± 0.731 <sup>a</sup>	65.36 ± 0.791 <sup>ab</sup>	64.29 ± 0.070 <sup>ab</sup>
โพแทสเซียม		3.44 ± 0.197 <sup>a</sup>	3.66 ± 0.302 <sup>a</sup>	3.67 ± 0.224 <sup>a</sup>	3.65 ± 0.199 <sup>a</sup>
แคลเซียม		0.33 ± 0.015 <sup>b</sup>	0.09 ± 0.026 <sup>a</sup>	0.37 ± 0.058 <sup>b</sup>	0.52 ± 0.023 <sup>c</sup>
แมกนีเซียม		0.43 ± 0.055 <sup>a</sup>	0.38 ± 0.015 <sup>a</sup>	0.55 ± 0.067 <sup>a</sup>	0.53 ± 0.054 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)



ภาพที่ 17 ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สะสมในพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอีดีทีเอ ต่างๆ กัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 18 ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่สะสมในพรรณไม้จำพวกมะเขือเทศที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอัตราที่เอ ต่างๆ กัน

ตารางที่ 16 ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้จำพวกมะเขือเทศที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอัตราที่เอ ต่างๆ กัน

ธาตุอาหารรอง (ppm)	ระดับแคลเซียม (mM)			
	3.10	1.55	4.65	6.20
เหล็ก	70.83 ± 3.975 <sup>a</sup>	62.92 ± 11.509 <sup>a</sup>	73.33 ± 7.229 <sup>a</sup>	77.08 ± 5.417 <sup>a</sup>
แมงกานีส	37.50 ± 0.722 <sup>a</sup>	31.25 ± 5.907 <sup>a</sup>	39.20 ± 7.140 <sup>a</sup>	40.42 ± 3.975 <sup>a</sup>

\*ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแถว หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 19 ปริมาณธาตุอาหารรองที่สะสมในพรรณไม้ น้ำอเนกอนมารตีที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ระดับแคลเซียมอัตราที่เอ ต่างๆ กัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สรุป

การทดลองที่ 1 ระดับของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้ที่ปลูกที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับแคลเซียมในช่วง 4.65 – 6.20 mM ให้ ความยาวใบ ความสูง ความกว้างใบ จำนวนใบ ความหนา และน้ำหนักของพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้มากที่สุด จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ได้แก่ ไนโตรเจน และ แคลเซียม ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P > 0.05$ ) และธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ )

การทดลองที่ 2 จากการทดลองระดับของแคลเซียมอีซีทีเอทีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้หน้า อเมซอนมารีตี้ ที่ระดับแคลเซียมแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าที่ระดับแคลเซียม 1.55 mM ให้ ความยาวใบ ความสูง และ น้ำหนักมากที่สุด ส่วนความกว้างใบ จำนวนใบ และความหนาของใบของพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ( $P > 0.05$ ) จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ ) ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม ส่วนโพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P > 0.05$ ) และปริมาณธาตุอาหารรอง คือ เหล็ก และแมงกานีส ไม่มีความแตกต่างกัน ( $P < 0.05$ )

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการทดลองโดยใช้แคลเซียมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าแคลเซียมในรูปแบบใดที่ให้การเจริญเติบโตของอเมซอนมารีตี้มากที่สุด
2. ควรมีการทดลองกับธาตุอาหารหลายๆ สูตร เพื่อหาชนิดของสูตรธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอเมซอนมารีตี้

## เอกสารอ้างอิง

มนีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ วันเพ็ญ มินกานูจน์ และ ศิริ วัคสว่าง. 2540. ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวกระจาย *Hygrophila difformis*. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง. 24 น.

มาชะวัน อาสาวดีรส. 2547. ระดับธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอเมซอนไบบาวในระบบการปลูกแบบไร้ดิน. ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.

นงนุช เลหาะวิสุทธิ. 2549. การเพาะเลี้ยงพรรณไม้หน้า. เอกสารประกอบการฝึกอบรม. คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ไสระยา ร่วมรังสี. 2546. สารละลายธาตุอาหาร. โครงการตำรา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 18-38 น.

อารักษ์ ธีรอำพน. 2546. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อ.เมือง, นครราชสีมา.

ดิเรก ทองอร่าม. 2544. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3. ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 1-27 น.

สุมิตรา กุวโรดม. 2544. ธาตุอาหารพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3. ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 1-13 น.

อิทธิสุนทร นันทกิจ. 2544. การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบที่มีการนำสารละลายกลับมาใช้ใหม่. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3. ภาควิชาปฐพีวิทยา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23-45 น.

Nelson, P.V. and C.E. Niedziela Jr. 1998. Effects of calcium source and temperature regime on calcium deficiency during hydroponic forcing of tulip. *Scientia Horticulturae*. 73:137-150.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Nelson, P.V. and C.E. Niedziela Jr. 1998. Effect of ancymidol in combination with temperature regime, calcium nitrate, and cultivar selection on calcium deficiency symptoms during hydroponic forcing of tulip. *Scientia Horticulturae*. 74:207-218.
- Ruiz J. M., R. M. Rivero, Pablo C., M. Baghour and L. Romero. 1999. Role of  $\text{CaCl}_2$  in nitrate assimilation in leaves and roots of tobacco plants (*Nicotiana tabacum* L.) . *Plant Science*. 141:107-115.
- Savvas D. and G. Gizas. 2002. Response of hydroponically grown gerbera to nutrient solution recycling and different nutrient cation ratios. *Scientia Horticulturae* .96:267-280
- Nelson, P.V., W. Kowalczyk, C.E. Niedziela Jr., N.C. Mingis and W.H. Swallow. 2003. Effect of relative humidity, calcium supply and forcing season on tulip calcium status during hydroponic forcing. *Scientia Horticulturae*. 98:409-422.
- Antosiewicz, D.M. 2005. Study of calcium-dependent lead-tolerance on plants differing in their level of Ca-deficiency tolerance. *Environmental Pollution*. 134:23-34.
- Chunqin Z., W. Xiaofeng, W. Zhengyu and Z. Fusuo. 2005. Potassium and nitrogen distribution pattern and growth of flue-cured tobacco seedling influenced by nitrogen form and calcium carbonate in hydroponic culture. *Journal of plant nutrition*. 28:2145-2157.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวกที่ 1

## การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน

## สารเคมี

1. กรดกำมะถันเข้มข้น ( $H_2SO_4$  98 %)
2. สารเร่งปฏิกิริยา (mixed catalyst)
3. Boric Acid Indicator
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $NaOH$  4 N)
5. กรดกำมะถัน ( $H_2SO_4$  0.02 N)

## วิธีการย่อยสลายตัวอย่าง



เทสารละลายส่วนที่ใสเพื่อนำไปกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการกลั่น

เปิดเครื่องกลั่นและล้างเครื่องด้วยการกลั่นน้ำกลั่น 3 ครั้ง



ใส่ boric acid indicator 15 มิลลิลิตร ใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 มิลลิลิตร วางในที่รองรับของเครื่องกลั่น โดยปลายก้านอยู่เหนือถ้วย boric เพียงเล็กน้อย



ปิเปตสารละลายตัวอย่างพืช 15 มิลลิลิตร เติมลงใน distillation flask

- เติม NaOH 4 N 15-20 มิลลิลิตร

เริ่มกลั่นจับไนโตรเจนซึ่งอยู่ในรูปของ แอมโมเนียม ( $\text{NH}_4$ ) ได้ปริมาณใน Erlenmeyer flask ประมาณ 30-35 มิลลิลิตรจึงปิดเครื่องกลั่น



นำ distillation flask ที่ใช้แล้วล้างด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้ง ก่อนจะปิเปตตัวอย่างพืชต่อไป

## วิธีการไทเทรต

นำสารละลายใน Erlenmeyer flask ของแต่ละตัวอย่าง

- ไทเทรตด้วยกรดกำมะถัน (0.02 N)



สีของสารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นม่วงแดง  
จดบันทึกปริมาตรกรดที่ใช้คำนวณหาปริมาณไนโตรเจน

สูตรการคำนวณปริมาณไนโตรเจน

$$(A-B) \times C \times \frac{14 \text{ gm N}}{1,000 \text{ meq}} \times \frac{1,000 \text{ mg}}{\text{g}} \times \frac{75 \text{ ml}}{15 \text{ ml}} \times 100$$

เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน =  $\frac{\text{ค่าที่ได้จากสูตร}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างพืช (mg)}}$

A = มิลลิลิตรของกรดกำมะถันที่ใช้ไทเทรต

B = มิลลิลิตรของกรดที่ใช้ไทเทรต blank

C = ความเข้มข้นของกรดกำมะถัน = 0.02 N


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส

### สารเคมี

1. กรดเกลือ (HCl 6-6.5 N)
2. กรดไนตริกเข้มข้น (HNO<sub>3</sub>)
3. Vanadate reagent
4. Molybdate reagent
5. Stock standard solution (1,000 ppm P)
6. Working Standards
7. กรดเปอร์คลอริกเข้มข้น (HClO<sub>4</sub> 70 %)

### วิธีการย่อยสลายตัวอย่าง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการวัดหาปริมาณฟอสฟอรัส

ปิเปตสารละลายตัวอย่างพืช และ standards (0, 5, 10, 15, 20 ppm P)

อย่างละ 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง



- เติม Vanadate reagent 5 มิลลิลิตร
- ผสมเข้าด้วยกัน
- เติม Molybdate reagent 5 มิลลิลิตร
- เขย่าผสมกัน

วางหลอดทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที

วัดความเข้มของสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ 420 nm

สูตรการคำนวณ

เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัส =

$$\text{ppm reading} \times \text{dilution factor} \times 50 \times 10^{-6} \times 100$$

น้ำหนักตัวอย่างพืช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 1 ความยาวใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ  
กันเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	1.78	4.54	7.38	9.52	10.18
	2	1.62	3.56	3.86	9.12	9.60
	3	1.56	4.50	6.70	8.74	9.44
	เฉลี่ย	1.65	4.20	5.98	9.13	9.74
SE		0.07	0.32	1.08	0.23	0.22
1.55 mM	1	1.60	4.68	6.80	8.26	8.40
	2	1.64	4.12	6.70	8.48	8.60
	3	1.58	4.92	6.68	8.50	8.66
	เฉลี่ย	1.61	4.57	6.73	8.41	8.55
SE		0.02	0.24	0.04	0.08	0.08
4.65 mM	1	1.66	4.30	6.30	8.62	11.64
	2	1.68	4.38	7.30	9.42	13.68
	3	1.68	3.74	8.56	9.56	13.78
	เฉลี่ย	1.67	4.14	7.39	9.20	13.03
SE		0.01	0.20	0.65	0.29	0.70
6.20 mM	1	1.66	4.50	7.88	9.60	11.82
	2	1.70	3.74	4.24	9.32	12.30
	3	1.64	4.48	7.78	10.14	12.48
	เฉลี่ย	1.67	4.24	6.63	9.69	12.20
SE		0.02	0.25	1.20	0.24	0.20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 2 ความสูงของพรรณไม้หน้าเมซอนมารีตี้ที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	2.32	5.70	8.86	12.00	13.98
	2	2.34	5.72	8.86	11.94	14.40
	3	2.34	5.02	8.72	10.66	15.04
	เฉลี่ย	2.33	5.48	8.81	11.53	14.47
SE		0.01	0.23	0.05	0.44	0.31
1.55 mM	1	2.32	5.66	8.52	10.82	11.94
	2	2.32	4.98	8.06	10.38	11.66
	3	2.34	5.10	7.80	10.28	12.00
	เฉลี่ย	2.33	5.25	8.13	10.49	11.87
SE		0.01	0.21	0.21	0.17	0.10
4.65 mM	1	2.32	4.60	7.80	10.56	18.08
	2	2.34	5.50	9.16	11.94	16.24
	3	2.34	6.28	10.42	12.58	18.36
	เฉลี่ย	2.33	5.46	9.13	11.69	17.56
SE		0.01	0.49	0.76	0.60	0.66
6.20 mM	1	2.32	5.18	8.70	11.88	17.72
	2	2.32	5.02	7.84	11.52	17.32
	3	2.34	6.12	9.54	12.86	15.88
	เฉลี่ย	2.33	5.44	8.69	12.09	16.97
SE		0.01	0.34	0.49	0.40	0.56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 3 ความกว้างใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ  
กันเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	0.88	1.34	2.18	2.92	3.54
	2	0.88	1.10	1.40	2.64	3.28
	3	0.90	1.22	1.82	2.64	3.30
	เฉลี่ย	0.89	1.22	1.80	2.73	3.37
SE		0.01	0.07	0.23	0.09	0.08
1.55 mM	1	0.86	1.30	1.98	2.54	2.80
	2	0.88	1.10	1.94	2.60	2.98
	3	0.86	1.32	2.08	2.72	3.26
	เฉลี่ย	0.87	1.24	2.00	2.62	3.01
SE		0.01	0.07	0.04	0.05	0.13
4.65 mM	1	0.86	1.16	1.78	2.50	3.12
	2	0.88	1.12	2.00	2.62	3.24
	3	0.86	0.92	2.34	2.98	3.36
	เฉลี่ย	0.87	1.07	2.04	2.70	3.24
SE		0.01	0.07	0.16	0.14	0.07
6.20 mM	1	0.88	1.22	2.18	2.82	3.72
	2	0.86	1.02	1.12	2.94	3.64
	3	0.88	1.34	2.26	3.12	3.98
	เฉลี่ย	0.87	1.19	1.85	2.96	3.78
SE		0.01	0.09	0.37	0.09	0.10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 4 จำนวนใบของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตีที่เคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	6.20	11.40	12.80	16.20	18.60
	2	6.00	9.00	12.40	15.40	18.20
	3	5.60	8.60	10.40	14.80	17.20
	เฉลี่ย	5.93	9.67	11.87	15.47	18.00
SE		0.18	0.87	0.74	0.41	0.42
1.55 mM	1	6.00	10.20	11.00	13.80	16.20
	2	6.80	9.40	10.60	12.60	15.40
	3	5.60	9.80	11.20	14.00	15.80
	เฉลี่ย	6.13	9.80	10.93	13.47	15.80
SE		0.35	0.23	0.18	0.44	0.23
4.65 mM	1	5.80	9.60	10.20	13.20	16.20
	2	5.20	8.80	10.60	13.40	16.80
	3	5.60	10.00	13.20	14.80	18.40
	เฉลี่ย	5.53	9.47	11.33	13.80	17.13
SE		0.18	0.35	0.94	0.50	0.66
6.20 mM	1	5.60	9.00	10.20	12.60	15.60
	2	5.60	10.40	11.40	12.40	16.20
	3	5.80	8.60	10.60	15.40	18.40
	เฉลี่ย	5.67	9.33	10.73	13.47	16.73
SE		0.07	0.55	0.35	0.97	0.85

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 5 ความหนาของใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมาร์ตีที่เคลือบคาร์บอนเนต ระดับ  
ต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 mM	1	0.12	1.12
	2	0.12	1.12
	3	0.10	1.12
	เฉลี่ย	0.11	1.12
SE		0.01	0.00
1.55 mM	1	0.11	1.11
	2	0.11	1.12
	3	0.11	1.10
	เฉลี่ย	0.11	1.11
SE		0.00	0.01
4.65 mM	1	0.11	1.42
	2	0.10	1.14
	3	0.11	1.13
	เฉลี่ย	0.11	1.13
SE		0.00	0.01
6.20 mM	1	0.10	1.13
	2	0.10	1.12
	3	0.11	1.13
	เฉลี่ย	0.10	1.13
SE		0.00	0.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 6 น้ำหนักของพรรณไม้ น้ำอมน้ำอมนมาร์ตีที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 mM	1	0.69	25.88
	2	0.62	27.65
	3	0.65	22.55
	เฉลี่ย	0.65	25.36
	SE	0.02	1.50
1.55 mM	1	0.67	20.04
	2	0.68	20.97
	3	0.66	16.26
	เฉลี่ย	0.67	19.09
	SE	0.01	1.44
4.65 mM	1	0.64	15.53
	2	0.97	26.35
	3	0.63	28.93
	เฉลี่ย	0.74	23.60
	SE	0.01	4.10
6.20 mM	1	0.69	23.29
	2	0.65	16.72
	3	0.72	30.78
	เฉลี่ย	0.68	23.57
	SE	0.02	4.06

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 7 ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืชที่แคลเซียมคาร์บอเนต ระดับต่างๆ เป็น เวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	0.69	0.66	1.03	1.21	1.14
	2	0.70	0.65	1.02	1.22	1.13
	3	0.69	0.68	1.04	1.21	1.13
	เฉลี่ย	0.69	0.66	1.03	1.21	1.13
SE		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
1.55 mM	1	0.69	0.67	1.03	1.03	1.00
	2	0.71	0.67	1.04	1.02	0.99
	3	0.70	0.66	1.03	1.03	1.01
	เฉลี่ย	0.70	0.67	1.03	1.03	1.00
SE		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4.65 mM	1	0.69	0.65	1.03	1.52	1.46
	2	0.71	0.66	1.02	1.51	1.43
	3	0.69	0.65	1.02	1.52	1.41
	เฉลี่ย	0.70	0.65	1.02	1.52	1.43
SE		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6.20 mM	1	0.69	0.65	1.03	1.78	1.69
	2	0.70	0.65	1.04	1.76	1.68
	3	0.70	0.66	1.02	1.76	1.66
	เฉลี่ย	0.70	0.65	1.03	1.77	1.68
SE		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 8 ความยาวใบของพรรณไม้หน้าอเมซอนมารีตี้ที่แคลเซียมอีดีทีเอ ระดับต่างๆ กัน  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	1.80	2.16	2.34	2.68	3.74
	2	1.80	2.18	2.34	2.74	3.72
	3	1.80	2.18	2.30	2.68	3.72
	เฉลี่ย	1.80	2.17	2.33	2.70	3.73
SE		0.00	0.01	0.01	0.02	0.01
1.55 mM	1	1.80	2.18	2.28	2.74	3.86
	2	1.80	2.18	2.28	2.76	3.90
	3	1.82	2.20	2.30	2.78	3.86
	เฉลี่ย	1.81	2.19	2.29	2.76	3.87
SE		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4.65 mM	1	1.82	2.16	2.28	2.72	3.74
	2	1.80	2.16	2.34	2.74	3.66
	3	1.82	2.18	2.28	2.74	3.68
	เฉลี่ย	1.81	2.17	2.30	2.73	3.69
SE		0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
6.20 mM	1	1.80	2.16	2.26	2.76	3.66
	2	1.80	2.18	2.32	2.74	3.72
	3	1.78	2.18	2.34	2.74	3.74
	เฉลี่ย	1.79	2.17	2.31	2.75	3.71
SE		0.01	0.01	0.02	0.01	0.02

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 9 ความสูงของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีทีเอ ระดับต่างๆ กันเป็น  
เวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	2.18	2.38	2.76	3.72	4.72
	2	2.16	2.38	2.78	3.72	4.70
	3	2.16	2.28	2.70	3.80	4.74
	เฉลี่ย	2.17	2.35	2.75	3.75	4.72
SE		0.01	0.03	0.02	0.03	0.01
1.55 mM	1	2.14	2.32	2.82	3.90	4.82
	2	2.16	2.24	2.80	3.96	4.78
	3	2.16	2.30	2.80	3.92	4.80
	เฉลี่ย	2.15	2.29	2.81	3.93	4.80
SE		0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
4.65 mM	1	2.12	2.30	2.76	3.78	4.68
	2	2.18	2.30	2.78	3.82	4.70
	3	2.16	2.28	2.74	3.76	4.72
	เฉลี่ย	2.15	2.29	2.76	3.79	4.70
SE		0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
6.20 mM	1	2.18	2.26	2.76	3.80	4.72
	2	2.14	2.30	2.76	3.82	4.74
	3	2.18	2.34	2.78	3.76	4.74
	เฉลี่ย	2.17	2.30	2.77	3.79	4.73
SE		0.01	0.02	0.01	0.02	0.01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 10 ความกว้างโบของพรรณไม้้น้ำอเมซอนมารตีที่แคลเซียมอีตีทีเอ ระดับต่างๆ กัน  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	0.76	0.90	1.18	1.32	1.38
	2	0.76	0.90	1.20	1.30	1.32
	3	0.76	0.90	1.12	1.28	1.36
	เฉลี่ย	0.76	0.90	1.17	1.30	1.35
SE		0.00	0.00	0.02	0.01	0.02
1.55 mM	1	0.76	0.88	1.08	1.26	1.32
	2	0.78	0.90	1.18	1.30	1.36
	3	0.74	0.86	1.08	1.30	1.38
	เฉลี่ย	0.76	0.88	1.11	1.29	1.35
SE		0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
4.65 mM	1	0.76	0.92	1.06	1.28	1.30
	2	0.74	0.96	1.12	1.26	1.32
	3	0.76	0.86	1.16	1.30	1.32
	เฉลี่ย	0.75	0.91	1.11	1.28	1.31
SE		0.01	0.03	0.03	0.01	0.01
6.20 mM	1	0.76	0.90	1.16	1.24	1.32
	2	0.78	0.88	1.12	1.24	1.30
	3	0.76	0.88	1.12	1.32	1.34
	เฉลี่ย	0.77	0.89	1.13	1.27	1.32
SE		0.01	0.01	0.01	0.03	0.01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 11 จำนวนใบของพรรณไม้หน้าเมซอนมาร์ตีที่แคลเซียมอิตีทีเอ ระดับต่างๆ กัน  
เป็น เวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	6.60	7.60	9.00	11.00	12.60
	2	6.40	7.40	9.00	11.60	13.00
	3	6.40	7.40	8.80	10.80	12.20
	เฉลี่ย	6.47	7.47	8.93	11.13	12.60
SE		0.07	0.07	0.07	0.24	0.23
1.55 mM	1	6.40	7.40	8.80	10.80	12.40
	2	6.40	7.60	9.20	11.00	12.40
	3	6.60	7.60	9.40	11.60	13.20
	เฉลี่ย	6.47	7.53	9.13	11.13	12.67
SE		0.07	0.07	0.18	0.24	0.27
4.65 mM	1	6.40	7.40	8.60	10.60	12.60
	2	6.60	7.80	9.20	10.80	12.20
	3	6.40	7.40	8.80	10.80	12.20
	เฉลี่ย	6.47	7.53	8.87	10.73	12.27
SE		0.07	0.13	0.18	0.07	0.18
6.20 mM	1	6.20	7.60	8.80	10.60	12.20
	2	6.60	7.60	9.20	11.20	12.60
	3	6.40	7.60	9.20	11.20	12.40
	เฉลี่ย	6.40	7.60	9.07	11.00	12.40
SE		0.12	0.00	0.13	0.20	0.12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 12 ความหนาใบของพรรณไม้ น้ำอเมซอนมารีตี้ที่แคลเซียมอีดีทีเอ ระดับต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 mM	1	0.07	0.09
	2	0.07	0.09
	3	0.07	0.08
	เฉลี่ย	0.07	0.09
	SE	0.00	0.00
1.55 mM	1	0.07	0.08
	2	0.07	0.08
	3	0.07	0.09
	เฉลี่ย	0.07	0.08
	SE	0.00	0.00
4.65 mM	1	0.07	0.09
	2	0.07	0.08
	3	0.07	0.09
	เฉลี่ย	0.07	0.09
	SE	0.00	0.00
6.20 mM	1	0.07	0.08
	2	0.07	0.08
	3	0.08	0.09
	เฉลี่ย	0.07	0.08
	SE	0.00	0.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 13 น้ำหนักของพรรณไม้เนื้ออ่อนมะรุมที่เคลือบซีดีทีเอ ระดับต่างๆ กัน

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	เริ่มการทดลอง	สิ้นสุดการทดลอง
3.10 mM	1	0.65	2.33
	2	0.65	2.34
	3	0.64	2.34
	เฉลี่ย	0.65	2.34
	SE	0.00	0.00
1.55 mM	1	0.64	2.36
	2	0.65	2.35
	3	0.65	2.34
	เฉลี่ย	0.65	2.35
	SE	0.00	0.01
4.65 mM	1	0.64	2.33
	2	0.64	2.35
	3	0.65	2.34
	เฉลี่ย	0.64	2.34
	SE	0.00	0.01
6.20 mM	1	0.67	2.33
	2	0.68	2.32
	3	0.68	2.34
	เฉลี่ย	0.68	2.33
	SE	0.00	0.01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 14 ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารพืชที่แคลเซียมอิตีทีเอ ระดับต่างๆ  
กันเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ระดับแคลเซียม	ซ้ำ	ระยะเวลา (สัปดาห์)				
		0	2	4	6	8
3.10 mM	1	0.69	0.67	1.01	1.20	1.17
	2	0.68	0.66	1.02	1.22	1.20
	3	0.69	0.65	1.01	1.23	1.19
	เฉลี่ย	0.69	0.66	1.01	1.22	1.19
SE		0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
1.55 mM	1	0.68	0.65	1.01	1.05	0.99
	2	0.69	0.66	1.03	1.06	0.98
	3	0.67	0.64	1.01	1.05	0.99
	เฉลี่ย	0.68	0.65	1.02	1.05	0.99
SE		0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4.65 mM	1	0.69	0.67	1.01	1.44	1.40
	2	0.97	0.65	1.02	1.43	1.39
	3	0.69	0.67	1.01	1.43	1.41
	เฉลี่ย	0.78	0.66	1.01	1.43	1.41
SE		0.09	0.01	0.00	0.00	0.01
6.20 mM	1	0.68	0.66	1.02	1.65	1.62
	2	0.68	0.66	1.03	1.64	1.60
	3	0.67	0.64	1.02	1.65	1.59
	เฉลี่ย	0.68	0.65	1.02	1.65	1.60
SE		0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้