

ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

เรื่อง

การศึกษาระยะเวลาพักตัวของเมล็ดข้าววัชพืชที่มีผลต่อการป้องกันกำจัดในกระบะทดลอง

The Study on Dormancy of Weedy Rice Control in Tray



เลขหมู่.....
 เลขทะเบียน **102678**
 วัน,เดือน,ปี **18 ส.ค. 2552**

เสนอ



ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

พุทธศักราช 2549

b.19043801.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใบรับรองปัญหาพิเศษปริญญาตรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เรื่อง

การศึกษาระยะเวลาพักตัวของเมล็ดข้าววัชพืชที่มีผลต่อการป้องกันกำจัดในกระบะทดลอง

The Study on Dormancy of Weedy Rice Control in Tray



(รศ.ดร.สมยศ เดชภีรัตน์มงคล)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันที่ ๒ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระยะเวลาพักตัวของเมล็ดข้าววัชพืชที่มีผลต่อการป้องกันกำจัด
ในกระบะทดลอง

โดย : นางสาวปนัดดา จันทรเทียน
นางสาวลาวัลย์ เสาวรส

ภาควิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วิรัช ลิ้มกาญจนะพงศ

บทคัดย่อ

การศึกษาระยะเวลาพักตัวของข้าววัชพืชในกระบะทดลองขนาดกว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร ที่เรือนเพาะชำ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) มี 4 ซ้ำ โดยมีสิ่งทดลองเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าววัชพืช 0 สัปดาห์, 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 3 สัปดาห์, 4 สัปดาห์, 5 สัปดาห์, 6 สัปดาห์ และ 7 สัปดาห์

ผลการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกในสัปดาห์ที่ 7 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชสูงที่สุด คือ 84.0% รองลงมาคือ สัปดาห์ที่ 6, 4, 3, 5, 2, 1, และ 0 สัปดาห์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าววัชพืชคือ 81.25%, 81.0%, 73.25%, 69.0%, 48.5%, 35.75%, และ 6.5% ตามลำดับจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

คำสำคัญ: ข้าววัชพืช, การพักตัวของเมล็ด, การงอกของเมล็ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title : The Study to Dormancy of Weedy Rice on Prevents and Control in Tray
Author : Miss. Panatda Chanthian
Miss. Lawan Saowaros
Department : Plant Production Technology
Faculty : Agricultural Technology
Advisor : Mr. Vichai Limkanchanaphong

ABSTRACT

Studied on weedy rice dormancy in tray (32x40x13 cm.) at Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok. The Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications was used in this study. The treatments consisted of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 weeks of percentage weedy rice germinated comparison.

The results indicated that the highest percentage of weedy rice germination was 7th week (84.0%), followed by 6th, 4th, 3rd, 5th, 2nd, 1st and 0th week, the percentage of weedy rice germination were 81.25, 69.0, 6.5, 35.75, 48.5, 73.25, 81.0, 69.0, 81.25, and 84.0%, respectively. From analysis of variance found that there was highly significance difference in percentage of weedy rice germination.

Keyword: weedy rice, seed dormancy, seed germination, temperature

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนิยาม

ปัญหาพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วิชัย ลีมกาญจนพงศ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษที่เคารพเป็นอย่างสูง ที่คอยให้คำแนะนำและตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้ปัญหาพิเศษฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกๆคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการศึกษาตลอดมาจนสำเร็จด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจและช่วยเหลือในการทำปัญหาพิเศษเรื่องนี้ให้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
คำนำ	1
ตรวจเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการ	21
ผลการทดลอง	24
วิจารณ์	26
สรุป	28
เอกสารอ้างอิง	29
ภาคผนวก	32
ประวัติผู้เขียน	38



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชแต่ละสัปดาห์จากการทำการทดลอง	24

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืช แต่ละสัปดาห์จากการทดลอง	25

ตารางผนวกที่	หน้า
1. ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล Analysis of variance (ANOVA)	32

ภาพผนวกที่	หน้า
1. ถุงตาข่ายสีฟ้าที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าววัชพืช	33
2. ลักษณะการหนวดเมล็ดข้าววัชพืชในสภาพดินที่แห้งในกระบะ	33
3. ลักษณะการวางกระบะทดลองที่เรือนเพาะชำที่ใช้ในการทดลอง	34
4. เมล็ดข้าววัชพืช 0 สัปดาห์ (control) อายุ 4 วัน หลังเพาะ	35
5. ที่วัดระดับอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองในเรือนเพาะชำ	36

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นคุณค่าและบุญคุณของข้าวที่มีต่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเอเชียและแอฟริกาบางส่วน ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชเป็นปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกคนต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง รวมทั้งเศษซากและเมล็ดของวัชพืชปะปนไปกับข้าวเปลือกทำให้ราคาตกต่ำอีกด้วย (สมชาย, ไม่ระบุปี) ปัจจุบันชานากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าววัชพืช (weedy rice) ข้าววัชพืชเหล่านี้ลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้า จะแยกออกก็ต่อเมื่อเห็นช่อดอกว่าปลายเมล็ดมีหางยาวบ้างสั้นบ้าง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นว่า ข้าวหาง ข้าวติด ข้าวแดง ข้าวนก ข้าวลาย หรือข้าวแดง ซึ่งข้าวเหล่านี้ถือว่าเป็นวัชพืชร้ายแรงชนิดหนึ่งในนาข้าว (จรรยา, 2547) หากไม่มีการกำจัดในระยะเวลาดำเนินการ 2-3 ฤดูเท่านั้น ข้าววัชพืชสามารถเพิ่มจำนวนเป็นหลายล้านต้นปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้าว ข้าววัชพืชระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม จังหวัดกาญจนบุรี และในนาหว่านน้ำตมแห่ง ในเขตจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี การระบาดเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนปีพ.ศ. 2548 ข้าววัชพืชกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่พบในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตมจำนวนมากหลายแห่งไป ทั้งในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง ทำให้ความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ตั้งแต่ 10-100% ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น (Maneechote et al., 2004) ข้าววัชพืช เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวป่าที่พบทั่วไปในธรรมชาติ กับข้าวปลูก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ข้าวป่าไม่ต้องการคือ เปลือกเมล็ดสีดำหรือลายน้ำตาลแดง เมล็ดข้าวสารมีสีแดง ปลายเมล็ดมีหางและเมื่อสุกแก่เมล็ดจะร่วงก็เช่นเดียวกับข้าวปลูก ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่หากข้าววัชพืชเป็นชนิดไม่ร่วง เช่น ข้าวแดง, เมล็ดสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่คุณภาพข้าวลดลงเพราะมีเมล็ดข้าวสีแดงปนอยู่ ชาวนาจะถูกรังสีด้วยความถี่ระหว่าง 200-500 นาฬิกาส่งความเสียหายนับพันล้าน (จรรยา, 2548) วิธีการจัดการปัญหาข้าววัชพืชที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปคือ ตัดรวงข้าวที่โผล่ขึ้นมาเหนือระดับต้นข้าวปลูกทิ้งไป ซึ่งเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองเวลาและแรงงานมาก ประสิทธิภาพในการควบคุมก็ไม่ได้ดี เพราะข้าววัชพืชสามารถแตกหน่อใหม่ขึ้นมาปกคลุมข้าวปลูกได้อีกภายในระยะเวลาเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ดังนั้นการกำจัดข้าววัชพืชโดยใช้สารเคมีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะข้าววัชพืชมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับข้าวปลูกมาก สารกำจัดวัชพืชที่ฆ่าข้าววัชพืชได้เป็นอันตรายต่อข้าวปลูกด้วยเช่นกัน การป้องกันทำได้ง่ายกว่าการกำจัด

ดังนั้นการศึกษาระยะพักตัวของข้าววัชพืชเพื่อปล่อยให้ข้าววัชพืชชอกและวิธีนี้ถือเป็นวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผลดีในระดับหนึ่ง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ดีอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการศึกษาระยะพัक्तัวเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืช
2. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเกษตรกรต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตรวจเอกสาร

การจำแนกอนุกรมวิธานของข้าว (สมชาย, ไม่ระบุปี)

Kingdom	Plantae
Subkingdom	Tracheobionta
Super division	Spermatophyta
Division	Magnoliophyta
Class	Monocotyledoneae
Subclass	Commelinidae
Oder	Cyperales
Family	Germinate

Genus *Oryza*

Species *Sativa*

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (2539) รายงานว่าในปัจจุบันข้าวที่ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ *Oryza sativa* ปลูกมากในทวีปเอเชีย และ *Oryza glaberrima* ปลูกมากในแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกา ซึ่งข้าว *Oryza sativa* ที่ปลูกมากในทวีปเอเชียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะพันธุ์ (sub-species) คือ

1. อินเดียกา (indica type) เป็นข้าวที่มีลักษณะของเมล็ดยาวเรียว เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 2.8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9-11 มิลลิเมตร และหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร มีความสามารถในการตอบสนองต่อปุ๋ยต่ำ ทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ ลำต้นสูงอ่อนแอ ทำให้ล้มง่าย ใบมีลักษณะกว้าง สีเขียวอ่อน แตกกอมาก เมล็ดร่วงยาก ปลูกมากในประเทศไทย อินเดีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

2. จาปอนิกา (japonica type) เป็นข้าวที่มีลักษณะของเมล็ดสั้นและกลม เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 3.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 7.2 มิลลิเมตร และหนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร มีความสามารถในการตอบสนองต่อปุ๋ยดี ทำให้ได้ผลผลิตสูง ลำต้นเตี้ยแข็งแรง ทำให้ล้มยาก ใบมีลักษณะแคบ สีเขียวแก่ แตกกอปานกลาง เมล็ดร่วงยาก ปลูกมากในประเทศไทย เกาหลีและจีน

3. จาวานิกา (javanica type) เป็นข้าวที่มีลักษณะของเมล็ดค่อนข้างอ้วนป้อม มีความสามารถในการตอบสนองต่อปุ๋ยต่ำ ให้ผลผลิตต่ำ ลำต้นสูงแข็งแรง ใบกว้างแข็ง สีเขียวอ่อน มีการแตกกอปานกลาง เมล็ดร่วงยาก ปลูกมากในประเทศพม่า และอินโดนีเซีย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว (ทรงเสาว์, 2531)

1. ราก (root) ข้าวมีระบบรากฝอย (fibrous root system) มีการเจริญของรากเป็น 2 ส่วน คือ รากปฐมภูมิ (primary root หรือ first seedling root) ซึ่งเป็นรากที่งอกออกมาจากเอ็มบริโอ (embryo) โดยพัฒนามาจากเรดิเคิล (radicle) รากชนิดนี้จะมีสีน้ำตาล โคนโต และเรียวยาวปลายจะเจริญเติบโตลงดินในแนวตั้งและที่รากปฐมภูมิ (primary root) จะมีรากอีกชนิดหนึ่งที่แตกแขนงออกมาเรียกว่ารากชุดแรก (seminal root) ซึ่งจะเจริญเติบโตโดยออกเฉียงลงไปในดินในแนวราบเกือบจะขนานกับระดับของผิวดิน แต่ทั้งราก primary root และ seminal root นั้นเป็นรากชั่วคราวจะเจริญเติบโตและตายไปในขณะที่ต้นข้าวยังเป็นต้นกล้าอยู่ ส่วนรากที่จะเจริญเติบโต ดูดน้ำ แร่ธาตุ เลี้ยงต้นข้าว นั้นจะเจริญมาจากส่วนข้อของลำต้น ซึ่งเป็นปุ่มกำเนิดราก (root primordium) จากนั้นจะมีรากชุดที่สอง (secondary root) เรียกว่า รากเสริม adventitious root ซึ่งรากเสริม (adventitious root) นี้จะเจริญมาจากข้อแรกของลำต้นข้าว เรียกว่า coleoptiles root

เมื่อต้นข้าวมีอายุประมาณ 15 วัน ลักษณะของรากชนิดนี้จะมีสีขาวนํ้านม อวบและสั้น ในระยะแรก แต่จะเจริญเติบโตทั้งความยาวและแตกรากแขนงจำนวนมากออกมา สีจะเปลี่ยนจากขาวนํ้านมเป็นสีเหลือง สีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลเข้มไป ความอายุที่มากขึ้น ยกเว้นที่ปลายรากจะมีสีขาว ตั้งแต่ต้นข้าวมีอายุ 40 วัน จนถึงวันที่แตกกอออกมามากที่สุดในช่วงการแตกรวงการดูดและลำเลียงน้ำและธาตุไปยังส่วนต่างๆ ของข้าวนั้นจะมีรากขนอ่อน (root hairs) ซึ่งเป็นส่วนของเซลล์ผิวราก (epidermal cell) ที่เปลี่ยนรูปร่างยื่นออกมาดูดซึมแร่ธาตุและน้ำได้มากที่สุดโดยปกติ รากขนอ่อนจะมีอายุอยู่ได้นานประมาณ 7 วัน เมื่อต้นข้าวมีอายุมากขึ้นอาจเกิดรากเสริมค้ำจุน (adventitious prop root) ขึ้นบริเวณข้อเหนือผิวดินหรือฝังลงในพื้นถ้าข้าวขึ้นน้ำได้

2. ลำต้น (stem หรือ culms) ลำต้นของข้าวมีลักษณะทรงกลม ส่วนกลางจะกลวงไม่มีแกน ยกเว้นส่วนของข้อ (node) ลำต้นตั้งตรงประกอบด้วยข้อ (node) และปล้อง (internodes) ที่เรียงสลับกันอยู่บนลำต้น ส่วนของข้อมีลักษณะพองโตเรียกว่า (pulvinus) อาจมีสีม่วงอ่อนจนถึงม่วงแก่ หรืออาจมีสีเหมือนสีของกาบใบประกอบด้วยวงเยื่อเจริญ (growth ring) ปุ่มกำเนิดราก (root primordium) ตา (bud) และรอยกาบใบ (leaf scar) ซึ่งส่วนของตาที่อยู่บริเวณส่วนกลางของลำต้นสามารถเจริญเติบโตเป็นหน่อ (tiller) ได้เมื่อต้นข้าวมีอายุได้ประมาณ 30 วัน จะเจริญเติบโตไปในด้านความสูงซึ่งเรียกว่า ย่างปล้อง ปล้องที่อยู่ด้านล่างๆ โดยเฉพาะปล้องที่อยู่ใต้ดินจะมีขนาดสั้นมาก แต่เมื่อเจริญเติบโตพื้นดินปล้องก็จะมีขนาดยาวขึ้นซึ่งปล้องสุดท้ายของลำต้นจะมีขนาดยาวที่สุดข้าว 1 ต้นจะมีปล้องตั้งแต่ 10-20 ปล้อง ขึ้นอยู่กับพันธุ์และที่ปล้องจะมีส่วนของข้อ (node) ซึ่งจะทำหน้าที่แบ่งส่วนของลำต้นออกเป็นปล้องๆ และที่บริเวณข้อนี้จะมีตา (bud) เกิดขึ้นข้อละ 1 ตา ซึ่งจะเกิดขึ้นที่บริเวณรากใบสลับกันไปในแต่ละใบของแต่ละข้อ ลำต้นของข้าวจะสูงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตและการดูแลรักษา โดยทั่วไปข้าวที่ปลูกเพื่อการค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนข้าวพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยจะมีลำต้นสูงประมาณ 120-160 เซนติเมตร ยกเว้นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำจะมีความสูงขึ้นอยู่กับระดับน้ำ บางครั้งอาจมีลำต้นสูงถึง 7-8 เมตร ลำต้นของข้าวที่เจริญมาจากเมล็ด เรียกว่า ลำต้นหลัก (main culms) และหน่อที่เจริญมาจากตาบน main culms เรียกว่า หน่อลำดับที่ 1 (primary tiller) หน่อที่เจริญมาจากตาบน primary tiller เรียกว่า หน่อลำดับที่ 2 (secondary tiller) และหน่อที่เจริญมาจากตาบนจะเรียกว่า หน่อลำดับที่ 3 (tertiary tiller) ซึ่งตาที่บริเวณโคนต้นจะเจริญเป็นหน่อ tiller ข้าวหนึ่งต้นอาจมีจำนวนหน่อมากถึง 70-80 หน่อ แต่โดยทั่วไปข้าวพันธุ์พื้นเมืองจะมีหน่อประมาณ 5-20 หน่อต่อต้น ส่วนข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จะมีหน่อประมาณ 25-30 หน่อต่อต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม รวมถึงวิธีการปลูก เช่น การหว่าน ความลึกในการดำ ระยะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การให้น้ำและปริมาณน้ำ

3. ใบ (leaf) ข้าวจัดเป็นพืชใบแท้ (foliage leaf) ชนิดใบเดี่ยว (simple leaf) เพราะข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) แผ่นใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน บาง ยาว แฉก ลักษณะคล้ายหอกมีลักษณะโค้งหรือตั้งตรงก็ได้ ใบของข้าวจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตัวใบ (leaf blade) และกาบใบหรือก้านใบ (leaf sheath) โดยมีข้อใบ (leaf collar) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยพับเป็นตัวแบ่งกาบใบออกจากตัวใบ และบริเวณข้อต่อนี้จะมีเยื่อเกี่ยวพันน้ำฝนหรือลิ้นใบ (ligules) ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ อาจมีหรือไม่มีก็ได้ รูปสามเหลี่ยมมีปลายเป็นแฉก 2 แฉก ซึ่งพู่อ่อนถึงม่วงอ่อนและที่ใกล้ๆ กันจะมีเยื่อใบหรือเยื่อเกี่ยวพันแฉก (auricles) 2 อัน ซึ่งเกิดจากส่วนฐานของแผ่นใบมีลักษณะเป็นเส้นมีรูปร่างโค้งคล้ายเคียวที่ยาวชิดติดอยู่ที่ข้อต่อนี้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งเยื่อเกี่ยวพันน้ำฝนและเยื่อใบ อาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปเมื่อกาบใบต้นข้าวเริ่มอายุมากขึ้น การที่ใบข้าวมีทั้งเยื่อเกี่ยวพันน้ำฝนและเยื่อใบอยู่ด้วยกันนี้ทำให้ข้าวแตกต่างจากหญ้า เพราะใบหญ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ภายในเซลล์ของใบจะมีเยื่อเกี่ยวพันน้ำฝนเดี่ยวตระกูลหนึ่งทั่วไป แผ่นใบของข้าวจะยื่นออกจากลำต้นทำมุมพียงกับลำต้น ซึ่งจะมองศาในการทำมุมไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ หากทำมุมน้อยก็จะทำให้ใบตั้งตรงแสงแดดสามารถส่องผ่านเข้าใบในกอข้าวได้มากกว่าใบที่ทำมุมแผ่นใบมีเส้นใบที่ขนานกันตั้งแต่ส่วนโคนจนถึงปลายใบ มีเส้นกลางใบ (midrib) เป็นเส้นแบ่งแผ่นใบออกเป็นซีกซ้ายและขวาเท่าๆ กันและที่บนแผ่นใบส่วนใหญ่จะมีขนอ่อน (pubescence) อยู่ ส่วนใบสุดท้ายบนลำต้นจะเรียกว่า ใบธง (flag leaf) ซึ่งกาบใบของใบธงจะทำหน้าที่ห่อหุ้มรวงอ่อนไว้ ใบธงจะเป็นใบที่อยู่ยอดสุดของต้นทำให้ไม่ถูกใบอื่นๆ บังแสงแดดจึงสามารถปรุงอาหารและลำเลียงอาหารไปเลี้ยงช่อดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กาบใบจะทำหน้าที่ห่อหุ้มข้อและปล้อง ช่วยในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่ส่งมาจากรากและลำต้นเพื่อส่งไปยังใบเพื่อปรุงอาหารและนำอาหารที่ใบปรุงแล้วไปยังส่วนต่างๆ ของลำต้น อีกทั้งกาบใบยังช่วยในการสะสมอาหารไว้ เพื่อส่งไปยังรวงข้าวอีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ดอกและช่อดอก (spikelet และ panicle) ดอก (spikelet) ดอกของข้าวเกิดรวมกันเป็นกลุ่ม หรือช่อ (inflorescence) เป็นแบบ panicle ซึ่งเจริญมาจากปล้องสุดท้ายของลำต้น เป็นก้านช่อดอก (peduncle) โดยช่อดอกจะรวมกันเป็นช่อติดอยู่บนระแนง (rachis) ที่แตกออกจากแกนกลางช่อดอก ระแนงที่แตกออกจากแกนกลางช่อดอกแรกเรียกว่าระแนงแรก (primary branch) และระแนงที่แตกออกจากระแนงแรกเรียกว่าระแนงที่ 2 (secondary branch) และระแนงที่ 3 (tertiary branch) จะแตกออกมาจากระแนงที่สอง ตามลำดับ ซึ่งดอกข้าวจะเกิดขึ้นที่ปลายของระแนงที่สอง และระแนงที่สาม โดยมีก้านดอกย่อย (pedicles) รองรับดอกไว้ซึ่งโดยปกติแล้ว 1 ฐานรวงจะเกิดระแนงแรกเพียงระแนงเดียว ดอกจะเกิดบนก้านดอกย่อยซึ่งในดอกหนึ่งจะมี 3 floret แต่ 2 floret ที่อยู่ด้านล่างจะไม่เจริญเติบโต แต่กลายเป็น sterile lemma ส่วน floret บนสุดจะเจริญประกอบด้วย flowering glumes 2 กลีบ ภายในของดอกประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมียและเยื่อรองรับไข่ (lodicules) โดยมีเยื่อรองรับไข่ (lodicules) เป็นแผ่นบางๆ 2 แผ่น อยู่บนหัวดอกและมีกลีบรองดอก (sterile lemmas) 2 แผ่นติดอยู่ มีกลีบฝ่อ (rudimentary glumes) 2 ช้าง รองรับอยู่อีกชั้นหนึ่ง ส่วนเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจะอยู่ในดอกมีกลีบดอกใหญ่และกลีบดอกเล็กห่อหุ้มไว้ในแต่ละดอกของข้าวจะมีเกสรตัวผู้ 6 อัน ตั้งปลายสุดของเกสรตัวผู้จะมีกระเปาะอับเรณู (anther) ซึ่งเป็นที่เก็บละอองเกสร (pollen grains) อับเรณูจะติดอยู่ที่ปลายสุดของก้านชูเกสรตัวผู้ (filament) ซึ่งจะเชื่อมติดอยู่กับฐานดอก ส่วนฐานดอกของเกสรตัวเมียก็จะอยู่ที่ฐานดอกด้านใน เกสรตัวเมียจะประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย (stigma) มีลักษณะคล้ายขนนก 2 อัน เป็นตัวรองรับละอองเกสรตัวผู้ อยู่บนปลายสุดของสรของเกสรตัวเมีย (style) ที่ติดอยู่กับรังไข่ (ovary) ภายในรังไข่มีออวูล (ovule) อยู่ 1 ovule มีเยื่อรองรับไข่ (lodicules) 2 อัน มีขนาดเล็กอยู่ด้านฐานของรังไข่ เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วจะกลายเป็นเมล็ดข้าวในที่สุด

ดอกข้าวส่วนใหญ่จะบานตอนเช้า โดยจะเริ่มบานจากปลายช่อดอกลงมายังโคนช่อดอก ซึ่งช่อดอกหนึ่งจะใช้ระยะเวลาบานครบทุกดอกประมาณ 5-7 วัน ดอกแต่ละดอกจะบานนานประมาณ 5-6 นาที หากแสงแดดไม่จัดอากาศไม่ร้อน มีความชื้นสูงอาจบานได้นานถึง 1 ชั่วโมง และเมื่อดอกข้าวได้รับการผสมแล้วจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน จึงเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) ที่ผสมตัวเอง (self-pollination) มีน้อยมากที่ผสมข้ามดอก (cross-pollination) (เฉลิมพล, 2542)

5. ผลและเมล็ด (caryopsis) ผลหรือเมล็ดของข้าวเปลือกจัดเป็นผลแบบ caryopsis คือ เยื่อหุ้มชั้นใน (seed coat) ติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มผลหรือเยื่อหุ้มชั้นนอก (pericarp layer) เมล็ดข้าวที่สุกแก่เต็มที่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะเรียกว่าข้าวเปลือก (hulled grain) ซึ่งเปลือกนี้มี 2 ส่วนคือ กลีบดอกใหญ่หรือเปลือกใหญ่ (lemma) ซึ่งอาจมีหาง (awn) หรือไม่มีก็ได้จะหุ้มเนื้อผลด้านท้อง

(dorsal side) และกลีบดอกเล็กหรือเปลือกใหญ่ (pelea) ซึ่งจะหุ้มเนื้อผลด้านหลัง (ventral side) กลีบดอกใหญ่และกลีบดอกเล็กจะประกบเข้าด้วยกันโดยจะห่อหุ้มส่วนภายใน เมื่อแกะส่วนเปลือก ออกจะพบส่วนของเมล็ดข้าวกล้อง (brown rice grain หรือ kernel) อยู่ภายในเยื่อหุ้มผล (pericarp layer) และเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นใน (seed coat หรือ testa) สีน้ำตาลอ่อน ทำให้มองเห็นข้าว กล้องมีสีน้ำตาลอ่อนๆ ถัดเข้าไปจะเป็น nucellus และ aleurone layer ซึ่งจะห่อหุ้มแบ่งและเมล็ด ข้าวเอาไว้ จมูกข้าวคือส่วนของคัพภะ (embryo) ประกอบไปด้วยเรติเคิล (radicle) พลูมูล (plumule) ใบเลี้ยงที่ไม่พัฒนา (epiblast) เนื้อเยื่อ scutellum ซึ่งกันระหว่างคัพภะกับเอนโดสเปิร์มรอบๆ เอนโดสเปิร์มจะมีเยื่อหุ้มอยู่เรียกว่า เยื่อหุ้มชั้นใน (aleurone layer) ซึ่งเมื่อนำ เมล็ดข้าวกล้องไปขัดส่วนสีน้ำตาลที่เป็นเยื่อหุ้มออกจะทำให้เมล็ดมีสีขาวเรียกว่า ข้าวสาร kernel ซึ่งคัพภะหรือจมูกข้าวนั้นจะมีสีขาวขุ่นจะเจริญเป็นต้นและราก ส่วนเอนโดสเปิร์มหรือส่วนแบ่งซึ่ง มนุษย์ใช้บริโภคนั้นเป็นส่วนสะสมอาหารที่นำไปใช้เลี้ยงต้นอ่อนของข้าวในระยะแรกที่เจริญเติบโต เมล็ดข้าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ (1) ส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวหรือผล เรียกว่า แกลบ (hull หรือ husk) และ (2) ส่วนเนื้อผลหรือผลแท้ (true fruit หรือ caryopsis grain) หรือข้าวกล้อง (caryopsis หรือ brown rice) โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้ (เครือวัลย์, 2536)

1. แกลบ ประกอบด้วย เปลือกใหญ่ (lemma) เปลือกเล็ก (pelea) ขน, หาง, ข้าวเมล็ด (rachilla) และกลีบรวงเมล็ด (sterile lemmas) ซึ่งเชื่อมต่อกันกับก้าน (pedicel)

1.1 เปลือกใหญ่ห่อหุ้มเนื้อผลด้านท้อง (dorsal side) มีหลอดใหญ่อาจมีหางหรือไม่มีก็ได้ ลักษณะของเปลือกใหญ่จะเป็นรอยเส้น (nemes) ตามความยาวของเปลือกประมาณ 5 เส้น เปลือกใหญ่จะห่อหุ้มเปลือกเล็กไว้ทั้ง 2 ด้านเป็นลักษณะแบนอยู่ข้างบนอย่างแนบสนิทประมาณ 2/3 ของเปลือกทั้งหมดตามแนวยาวของเมล็ด

1.2 เปลือกเล็ก เป็นเปลือกหุ้มเนื้อผลด้านหลัง (ventral side) ที่มีขนาดเล็กกว่า เปลือกใหญ่ประมาณ 1/3 ของเปลือกทั้งหมด จะขบอยู่ใต้เปลือกใหญ่ตามแนวยาว ทำให้เปลือกทั้ง 2 ติดกันสนิท บนผิวเปลือกเล็กจะเป็นรอยเส้นตรงตามความยาวของเปลือกประมาณ 3 เส้น รอยเส้น บนเปลือกใหญ่และเปลือกเล็กอาจทำให้ข้าวกล้องเป็นรอยเส้นตามไปด้วย ในข้าวบางพันธุ์ถึงแม้ จะผ่านกระบวนการขัดข้าว (polishing) แล้วยังคงมีรอยเส้นค้างอยู่บนข้าวสาร (milled rice) เรียกว่าสาแทรกข้าว

1.3 ขน จะขึ้นอยู่บนเปลือกและเปลือกใหญ่เป็นส่วนใหญ่ อาจมีบางพันธุ์ที่ไม่มีขนแต่ เป็นส่วนน้อย ขนนี้คือ ส่วนของเซลล์ผิวหนัง (epidermal cell) ที่เจริญกลายเป็นขน เพื่อทำหน้าที่ ลดการระเหยของน้ำ ป้องกันอันตรายต่อเมล็ดจากสภาวะภายนอกเมล็ดและเพื่อการกระจายพันธุ์ ตามธรรมชาติโดยช่วยให้เมล็ดติดไปกับคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสเมล็ดจนทำให้ เมล็ดหลุดติดไปด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 หาง เป็นส่วนปลายของเปลือกใหญ่ยาวออกมาเกินส่วนของยอดดอก (apiculus) ในบางพันธุ์อาจสั้นหรือยาวหรือไม่มี ทำหน้าที่ในการกระจายพันธุ์คล้ายขน

1.5 ขั้วเมล็ด เป็นก้านสั้นระหว่างกลีบรองเมล็ดกับเปลือกใหญ่และยังติดอยู่กับเมล็ด ขั้วเปลือก

1.6 กลีบรองเมล็ด เป็นกลีบเล็ก 2 กลีบ อยู่ตรงกันข้ามได้สุดของเมล็ด

2. ขั้วกัณฐ์หรือเนื้อผลประกอบด้วย

2.1 เยื่อหุ้มผล เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกห่อหุ้มผลอยู่ภายใน มีลักษณะเป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์เส้นใย 6 ชั้น มีสารสีหรือรงควัตถุปนอยู่ทำให้ขั้วกัณฐ์มีสีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโปรตีน เฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสำคัญในชั้นเยื่อหุ้มผลนี้แบ่งย่อยได้เป็น 3 ชั้นย่อย คือ

2.1.1 เอพิคาร์พหรือเอกโซคาร์พ (epicarp หรือ exocarp) เปลือกที่อยู่นอกสุดมีลักษณะเรียบ เหนียวและเป็นมันประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว

2.1.2 เมโซคาร์พ (mesocarp หรือ hypoderm) เป็นผนังผลชั้นกลาง

2.1.3 เอนโดคาร์พ (endocarp) เป็นเยื่อชั้นใน

2.2 เยื่อหุ้มเมล็ด อยู่ถัดจากเยื่อหุ้มผลเข้ามาประกอบด้วยเซลล์ 2 ชั้น รูปยาว เรียงตามขวาง และมีผนังบางกัน ภายในเซลล์มีไขมันและสารสี

2.3 นิวเคลียส (nucellus) เป็นเซลล์ชั้นที่ติดกับเยื่อหุ้มเมล็ด แต่ผนังระหว่างนิวเคลียสกับเยื่อหุ้มเมล็ดนี้ติดแน่นจึงแยกจากกันได้ง่าย

2.4 เยื่อชั้นแอลิวโรน (aleurone layer) เป็นเยื่อชั้นถัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดประกอบด้วยเซลล์ 1-7 เซลล์และมีลักษณะของเยื่อหุ้มชั้นหลังของเมล็ดจะหนากว่าเยื่อหุ้มด้านท้อง ซึ่งความหนาจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ข้าว แบ่งลักษณะของเซลล์แอลิวโรนเป็น 2 ลักษณะ คือ เซลล์ที่ห่อหุ้มรอบเนื้อของเมล็ดจะมีรูปร่างเป็นลูกบาศก์และมีไซโทพลาซึม (cytoplasm) อยู่หนาแน่น ในเซลล์ยังมีกลุ่มโปรตีนที่มีรูปร่าง (protein bodies) กลุ่มไขมัน (lipid bodies) และสารอื่นๆ ส่วนเซลล์แอลิวโรนที่ห่อหุ้มคัพจะบาง มีไซโทพลาซึมน้อย รูปร่างยาว มีกลุ่มไขมันและกลุ่มโปรตีนน้อย มีแวลิเคิลมาก เป็นต้น

2.4.1 คัพกะหรือเชอซีวิต จะอยู่ที่โคนเมล็ดด้านเปลือกใหญ่ ส่วนท้องของเมล็ดมีส่วนประกอบเป็นรากอ่อน (radicle) ต้นอ่อน (plumule) เยื่อหุ้มรากอ่อน (coleorhiza) เยื่อหุ้มต้นอ่อน (coleoptile) ห่อน้ำห่ออาหาร (epiblast) และใบเลี้ยง (scutellum) ซึ่งเป็นใบเดี่ยว คัพกะเป็นแหล่งสะสมอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนจึงอุดมด้วยโปรตีนและไขมันในส่วนต่างๆ

2.4.2 เนื้อเมล็ด (endosperm) มีมากที่สุด ในเมล็ดข้าวประมาณ 80% ของน้ำหนักเมล็ดทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนชั้นซับแอลิวโรน (subaleurone layer) เป็นเซลล์ 2 ชั้นอยู่ถัดจากชั้นแอลิวโรนและส่วนที่เป็นสตาร์ชในเนื้อของเมล็ด (starchy endosperm) ในชั้นซับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แอลิวโรนจะมีกลุ่มโปรตีนอยู่ภายใน 3 ลักษณะคือ ลักษณะกลมใหญ่ (1-2 ไมครอน) กลมเล็ก (0.5-0.75 ไมครอน) และเป็นผลึกติดกันขนาด 2-3.5 ไมครอน แต่ในส่วนเนื้อของเมล็ดจะมีกลุ่มโปรตีนลักษณะกลมใหญ่เท่านั้นแทรกอยู่ในระหว่างเม็ดสตาร์ช (starch granules) มีขนาด 2-9 ไมครอน ที่มีอยู่มากอัดแน่นรวมเป็นกลุ่มเม็ดสตาร์ช (compound granules) อยู่ในพาราไคนมา (parenchyma cells) ที่มีผนังเซลล์บาง มีรูปร่างรีหรือสี่เหลี่ยม เข้าสู่ใจกลางเมล็ดโดยด้านนอกของเมล็ดจะรีและยาวมากกว่าด้านในของเมล็ด

การเกิดผลและเมล็ด (ประภาส, 2517)

เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้ว โยวูลแต่ละอันเจริญไปเป็นเมล็ด (seed) ซึ่งจะมีอาหารสะสมอยู่ด้วย ส่วนของรังไข่เจริญไปเป็นผล (fruit) เพื่อห่อหุ้มเมล็ดไว้ภายในและช่วยกระจายพันธุ์ ผลของพืชบางชนิดอาจมีส่วนอื่นๆ ของดอก เช่น กลีบเลี้ยงติดมาด้วย หรือส่วนของฐานรองดอกที่หุ้มรังไข่แบบอินพีเรียอยู่เจริญมาด้วย ความหมายของผลที่สมบูรณ์คือ รังไข่ที่สุกแล้วและอาจมีส่วนอื่นของดอกหรือฐานรองดอกเจริญตามมาด้วย ยังมีผลบางชนิดที่เจริญมาโดยไม่มีการผสมเกสรเรียกผลแบบนี้ว่าผลเทียม ผลหรือเมล็ดของข้าวเปลือกจัดเป็นผลแบบ caryopsis

การจำแนกชนิดของผล (สมบูรณ์, 2537)

1. ผลเดี่ยว (simple fruit) คือผลที่เกิดจากรังไข่เดี่ยวภายในดอกๆ เดียว โดยถ้าในรังไข่นั้นมีคาร์เพลเดี่ยวหรือหลายคาร์เพลเชื่อมร่วมกัน ดอกเป็นชนิดเดี่ยวหรือชนิดดอกช่อก็ได้ เช่น ดอกมะละกอ 1 ดอก เจริญเป็น 1 ผล หรือดอกช่อรูป มะม่วง กระท้อน ตะแบก แต่ละดอกย่อย 1 ดอก ในช่อดอกก็ต่างมีคามสามารถเจริญเป็นผลได้เช่นกัน ผลเดี่ยวนี้สามารถจำแนกตามลักษณะของเพริคาร์พที่เป็นเนื้อนุ่มหรือแข็งได้

1.1 ผลสด (fleshy fruit) เมื่อเจริญเต็มที่แล้วมีเนื้ออ่อนนุ่มและสด จะแบ่งย่อยได้เป็น

1.1.1 ตรีฟ (drupe) เป็นผลสดชนิดที่มีเพริคาร์พแบ่งเป็น 3 ชั้น เอนโดคาร์พแข็ง

มากอาจเรียกว่า สโตนฟรุต มักติดกับเมล็ดหรือหุ้มเมล็ดซึ่งมีเมล็ดเดี่ยว ชั้นถัดออกมาเป็นชั้นมีโซคาร์พลักษณะเป็นเนื้อนุ่มหรือเป็นเส้นเหนียวๆ ส่วนเอกโซคาร์พเรียบเป็นมัน มี 1 คาร์เพลหรือมากกว่า ได้แก่ พุทรา มะม่วง มะกอก ตาล มะพร้าว เชอร์รี่ และท้อ เป็นต้น

1.1.2 เบอร์รี่ (berry) จะเป็นผลสดชนิดที่มีเพริคาร์พอ่อนนุ่ม เอกโซคาร์พเป็นผิวบางๆ มีมีโซคาร์พและเอนโดคาร์พรวมกันแบ่งได้ไม่ชัดเจน ได้แก่ มะเขือ มะเขือเทศ ฝรั่ง พริก องุ่น กัลย เป็นต้น

1.1.3 เปโป (pepo) เป็นผลสดมีลักษณะคล้ายเบอร์รี่แต่มีเปลือกนอกหนาเหนียว และแข็งเจริญมาจากฐานรองดอกเชื่อมรวมกันกับเอกโซคาร์พ ชั้นมีโซคาร์พและเอนโดคาร์พเป็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื้อนุ่ม ผลชนิดมักเป็นผลที่เจริญมาจากดอกที่มีรังไข่แบบอินฟีเรีย ได้แก่ พัก แพง แดง แดงกวน้ำเต้า บวบ มะตูม และแคนตาลูป เป็นต้น

1.1.4 เฮสเพริเดียม (hesperidium) ผลสดประเภทนี้มีมีเอกโซคาร์พค่อนข้างแข็งและเหนียวมีต่อมน้ำมันมากและมักมีสีเขียว เปลือกสามารถดึงลอกเป็นแผ่นได้เป็นส่วนเอกโซคาร์พ และมีโซคาร์พซึ่งอยู่ติดกับเกือบมองไม่เห็นรอยแยก แต่ชั้นมีโซคาร์พจะอยู่ด้านในมีสีขาวและไม่ค่อยมีต่อมน้ำมัน เอ็นโดคาร์พเป็นเนื้อเยื่อบางๆ หุ้มเนื้อ บางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็นขนหรืออุ้งสำหรับเก็บน้ำซึ่งเป็นเนื้อที่เรารับประทาน ผลชนิดนี้มีเมล็ดมาก เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด เป็นต้น

1.1.5 โปม (pome) ผลชนิดนี้จะเจริญมาจากดอกที่มีรังไข่แบบอินฟีเรียมีเกสรตัวเมียแบบประกอบซึ่งมีหลายคาร์เพล เนื้อของผลส่วนใหญ่เจริญมาจากฐานรองดอกหรือส่วนฐานของกลีบดอก กลีบเลี้ยงและก้านชูเกสรตัวผู้ซึ่งเชื่อมติดกันโอบล้อมผนังรังไข่ เนื้อส่วนน้อยที่ที่อยู่ด้านในเกิดจากเพริคาร์พ สำหรับเอ็นโดคาร์พจะบางหรือมีลักษณะเป็นกรูบๆ คล้ายกระดูกอ่อนผลชนิดนี้ได้แก่ แอปเปิล สาลี่ ชมพู เป็นต้น

1.1.6 เอริส (aris) เป็นผลสดซึ่งเนื้อรับประทานได้เรียกว่าเอริส เจริญมาจากส่วนของเมล็ดซึ่งเติบโตออกมาหุ้มเมล็ดและมีเพริคาร์พเป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่ชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งซึ่งสามารถลอกออกได้ เช่น เงาะ ลำไย ฝรั่ง และทุเรียน

1.2 ผลแห้ง (dry fruit) คือผลที่เจริญเต็มที่แล้วเพริคาร์พจะแห้ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1.2.1 ผลแห้งแตกเองได้ (dry dehiscent fruit) ผลชนิดนี้เมื่อแก่เพริคาร์พจะแห้งและแตกออกได้ มักมีเมล็ดมาก จำนวนออกเป็นชนิดย่อยได้อีก ดังนี้

- พอลลิเคิล (follicle) เป็นผลที่เกิดจากดอกที่มีเกสรตัวเมียแบบธรรมดา 1 คาร์เพลเมื่อแก่จะแตกตามรอยตะเข็บเพียงด้านเดียว ได้แก่ ฝรั่ง ขจร ยี่หุบ ลั่นทม แพงพวย เป็นต้น

- เลกูม (legume) เป็นผลที่เกิดจากดอกที่มีเกสรตัวเมียแบบธรรมดา 1 คาร์เพลแตกได้ตามรอยตะเข็บทั้ง 2 ด้าน เช่น ถั่ว แดง กระถิน ชงโค กาหลง เป็นต้น

- แคปซูล (Capsule) เป็นผลที่เกิดจากดอกที่มีเกสรตัวเมียแบบประกอบหลายคาร์เพลซึ่งเชื่อมติดกัน เมื่อผลแก่จะแตกตามรอยหรือมีช่องเปิดให้เมล็ดออกตามรอยแตก

- ซิลิก (silique) เป็นผลที่เกิดจากดอกที่มีเกสรตัวเมียแบบประกอบมี 2 คาร์เพลติดกันเมื่อผลแก่เพริคาร์พจะแตกตรงกลางตะเข็บโดยเริ่มต้นจากก้านขึ้นไปทางปลายเป็น 2 ซีก เหลือผนังบางๆ ติดก้านอยู่ เช่น ผักกาด ผักเสี้ยน และต้อยติ่ง เป็นต้น

- ซิสโซคาร์พ (schizocarp) เป็นผลที่เกิดจากดอกที่มีเกสรตัวเมียแบบประกอบหลายคาร์เพล เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก แต่ละซีกเรียกว่า เมริคาร์พและมีเมล็ดภายในซีกละ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมล็ด มีแกนต่อกจากก้านชูดอกหรือก้านผลขึ้นไปเรียกว่า คาร์โพฟอร์ ซึ่งเป็นส่วนของฐานรองดอกที่อยู่ระหว่างคาร์เพลนั้นเอง ผลชนิดนี้ ได้แก่ ผักชี ยี่ห่วย คื่นช่ายและแคระอท เป็นต้น

- โลมেন্টัม (lomentum) เป็นผลที่มีคาร์เพลเดี่ยวคล้ายเลกุ่มแต่หักเป็นข้อๆ ได้ตามขวางของผล แต่ละข้อมี 1 เมล็ด ผลชนิดนี้มีฝักยาว ได้แก่ จามจุรี คุนและไมยราพ เป็นต้น

1.2.2 ผลแห้งแล้วไม่แตกออก (indehiscent dry fruit) ผลชนิดนี้เมื่อแก่ และเจริญเต็มที่แล้วเพริคาร์พจะแห้งแต่ไม่แตกออกโดยมีเมล็ดน้อย 1-2 เมล็ดเท่านั้น จำแนกออกเป็น

- เอคีน (achene) เป็นผลที่มีขนาดเล็กมี 1 เมล็ด เพริคาร์พบางและเหนียว ไม่เชื่อมรวมกับเปลือกหุ้มเมล็ดนอกจากตรงก้านพันนิคูลัสเท่านั้น ได้แก่ ทานตะวัน ดาวเรือง บานชื่นและดาวกระจาย เป็นต้น

- คาริออปซิส (caryopsis) เป็นผลที่มีขนาดเล็กมี 1 เมล็ดคล้ายเอคีนแต่เพริคาร์พเชื่อมรวมกันแน่นกับเปลือกหุ้มเมล็ดโดยตลอด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี

- ซามารา (samara) เป็นผลที่มีส่วนของเพริคาร์พแผ่ออกเป็นปีกแบนๆ บางๆ เพื่อให้ลอยลมได้มี 1-2 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมี 1 เมล็ด ได้แก่ ประดู่ ตะเคียน

- ซามารอยด์ (samaroid) เป็นผลซึ่งมีความเป็นผลมาจากส่วนของกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก ได้แก่ ยางนา

นัท (nut) เป็นผลที่เกิดจากเกสรตัวเมียแบบประกอบมีเปลือกหนาและแข็ง โดยส่วนมากมีเมล็ดเดียว ได้แก่ กระจับปี่ คือ เกาลัด บวหลาง มะม่วงหิมพานต์

2. ผลกลุ่ม (aggregate fruit) ผลกลุ่มเป็นผลที่เกิดดอกเดี่ยวที่มีรังไข่หลายรังไข่เจริญอยู่ในดอกเดี่ยว รังไข่แต่ละอันจะเจริญเป็นผลย่อยๆ ผลบนพวงหนึ่งรังไข่แต่ละอันอยู่อัดกันแน่นแต่จะไม่เชื่อมรวมกัน ได้แก่ ลูกจาก นอกจากนี้ผลกลุ่มบางชนิดจะแยกเป็นผลเล็กๆ หลายผลบนฐานรองดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า กระจับปี่ จำปี จำเริญ กระเวก นมแมว สำหรับสตรอเบอร์รี่ซึ่งเป็นผลกลุ่มชนิดหนึ่ง เนื้อนุ่มๆ ส่วนที่รับประทานเจริญมาจากฐานรองดอกซึ่งเชื่อมรวมกันแล้วมีผลย่อยๆ ซึ่งมีผลแบบเอคีนติดอยู่ใกล้กับผิวนอก

3. ผลรวม (multiple fruit) ผลรวมเป็นผลที่เกิดจากดอกหลายๆ ดอกที่อยู่ชิดกัน เช่น ลูกยอ สับปะรด สาเก มะเดื่อ ลูกหม่อน ขนุน ผลบ๊วย เป็นต้น

เมล็ด (seed) (อารมย์, 2524)

คือส่วนของโอวูลที่เจริญเต็มที่ภายหลังการปฏิสนธิประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด เอ็มบริโอหรือต้นอ่อนและเอนโดสเปิร์ม พืชแต่ละชนิดเมล็ดจะมีรูปร่าง ขนาด สีแตกต่างกันไป เมล็ดเป็นส่วนสำคัญของพืชที่มีดอกใช้ในการดำรงพันธุ์ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างเมล็ดส่วนสำคัญคือ

1. เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) เป็นส่วนที่อยู่บนสุดมักมีลักษณะหนาและเหนียวหรือแข็ง เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายใน นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำภายใน เมล็ดดอกออกไปด้วย เปลือกหุ้มเมล็ดมี 2 ชั้น เปลือกชั้นนอกเรียกว่า เทสทา (testa) มักหนาและแข็ง ส่วนชั้นในเรียกว่า เทกเมน (tegmen) เป็นชั้นเยื่อบางๆ ที่ผิวของเปลือกมักมีรอยแผลเป็นเล็กๆ ซึ่งเกิดจากก้านเมล็ดหลุดออกไปเรียกรอยแผลนี้ว่า ไฮลัม (hilum) ใกล้ๆ ไฮลัมมีรูเล็กๆ เรียกว่า ไมโครไพล์ (micropyle) ซึ่งเป็นทางเข้าของหลอดละอองเรณูนั่นเอง

2. เอนโดสเปิร์ม (endosperm) เกิดจากการผสมของสเปิร์มนิวเคลียสกับโพลาร์นิวคลีอิกทำหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน ไขมันให้แก่เอมบริโอ เมล็ดพืชบางชนิด เช่น ถั่วแขก ถั่วลิสง จะไม่พบเอนโดสเปิร์มเลย เนื่องจากใบเลี้ยงย่อยและดูดอาหารจากเอนโดสเปิร์มไปเก็บไว้ทำให้ใบเลี้ยงหนามากในบางชนิด เช่น มะพร้าว ตาล จะมีเอนโดสเปิร์มที่เป็นน้ำและเป็นเนื้อส่วนที่เป็นน้ำ เรียกว่า ลิกวิดเอนโดสเปิร์ม (liquid endosperm) ส่วนที่เป็นเนื้อเรียกว่า เฟลชี่เอนโดสเปิร์ม (fleshy endosperm) เอนโดสเปิร์มของพืชบางชนิดจะแข็ง เช่น เมล็ดข้าวโพด เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว แต่เอนโดสเปิร์มของพืชบางชนิด เช่น มะพร้าว จะมีทั้งแข็งและเหลว เช่น เนื้อมะพร้าวเป็นเอนโดสเปิร์มที่แข็ง (fleshy endosperm) ส่วนน้ำมะพร้าวเป็นเอนโดสเปิร์มที่เหลว (liquid endosperm) สำหรับจาวมะพร้าวเป็นใบเลี้ยงเปลือกหุ้มเมล็ดคือ เยื่อสีน้ำตาลที่ติดกับเนื้อมะพร้าว เปลือกนอกสุดของผลมะพร้าวเป็นเปลือกผลชั้นนอก (exocarp) (กามมะพร้าวที่เป็นเส้นใยเป็นเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarp) ส่วนกษณะมะพร้าวเป็นเปลือกผลชั้นใน (endocarp)จาว)

3. เอมบริโอ (embryo) เป็นส่วนของเมล็ดที่เจริญมาจากไซโกต ซึ่งการเจริญของเอมบริโอเริ่มต้นด้วยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสครั้งแรกได้ 2 เซลล์ คือ เซลล์ที่อยู่ด้านล่างอยู่ติดกับไมโครไพล์ (micropyle) เรียกว่า เบซัลเซลล์ (basal cell) และเซลล์ที่อยู่ด้านบนเรียกว่า แอปิคัลเซลล์ (apical cell) เซลล์ที่อยู่ด้านล่างจะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเซลล์ขึ้นเรียกว่า ซัสเพนเซอร์ (suspensor) ทำหน้าที่ยึดเอมบริโอ ส่วนเซลล์ที่อยู่ด้านบนจะแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วและอยู่ทางด้านบนของซัสเพนเซอร์ ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงของเอมบริโอเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆ ของเอมบริโอดังนี้

3.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) พืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยงสองใบ ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงใบเดียวและมักจะเรียกว่า สคูลเลตัม (scutellum) ใบเลี้ยงมีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารจากเอนโดสเปิร์มเพื่อนำไปเลี้ยงเอมบริโอในพืชบางชนิด เช่น ถั่ว ใบเลี้ยงจะดูดอาหารจากเอนโดสเปิร์มมาเก็บไว้ทำให้ใบเลี้ยงมีขนาดหนาและใหญ่และไม่มีเอนโดสเปิร์ม แต่ในพืชบางชนิดอาหารถูกสะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์ม เนื่องจากใบเลี้ยงไม่ได้ย่อยมาเก็บไว้ ใบเลี้ยงจึงมีลักษณะแบนและบาง ใบเลี้ยงนอกจากจะช่วยในการสะสมและให้อาหารแก่เอมบริโอแล้วใบเลี้ยงยังช่วยป้องกันไม่ให้เอมบริโอที่อยู่ข้างในบวมสลายเมื่อมีการงอกของเมล็ดเกิดขึ้น

3.2 ลำต้นอ่อน (caulicle) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. เอพิคอติล (epicotyl) เป็นส่วนของเอมบริโอที่อยู่เหนือใบเลี้ยงขึ้นไปบริเวณที่ส่วนปลายของเอพิคอติลจะมียอดอ่อน (plumule) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (apical meristem) เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนี้จะแบ่งตัวและเจริญต่อไปเป็นยอด ใบ ดอกและลำต้นของพืช
2. ไฮโพคอติล (hypocotyl) เป็นส่วนของเอมบริโอที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงลงมา
3. แรดิเคิล (radicle) เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของไฮโพคอติล ส่วนปลายของแรดิเคิลจะอยู่ที่รูไมโครไพล์ เมื่อเมล็ดงอกแรดิเคิลจะเจริญไปเป็นรากแก้ว (tap root) หรือรากสามัญ (primary root)

การงอกของเมล็ด (seed germination) (สมบุญ, 2548)

การงอกของเมล็ด เมื่อเมล็ดอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นพืชใหม่เมล็ดพืชบางชนิดจะงอกได้ทันทีเมื่อแก่เต็มที่และสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกเหมาะสมแต่มีเมล็ดบางชนิดถึงแม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะเหมาะสมแต่ก็ยังงอกไม่ได้ จะต้องรอระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงจะงอกได้ ระยะเวลาที่ต้องรอนี้เรียกว่า ระยะเวลาพักตัว (dormancy)

ปัจจัยที่สำคัญต่อการงอกของเมล็ด

1. น้ำ โดยปกติแล้วเมล็ดต้องการความชื้นสูงถึง 30-60% จึงจะงอกทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวและช่วยกระตุ้นให้ปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ภายในเมล็ด ได้แก่ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนต่างๆ ของเมล็ด น้ำช่วยให้เปลือกหุ้มเมล็ดยุบตัวให้แรดิเคิลและยอดอ่อนของเอมบริโอโผล่ออกมาได้ ทำให้เมล็ดขยายขนาดขึ้นทำให้โพรงในเมล็ดมีเชื้อจุลินทรีย์แต่มีปฏิกิริยาต่างๆ มากขึ้น น้ำช่วยให้เกิดออกซิเจนผ่านทางรูเซลล์ของเอมบริโอได้ง่ายขึ้น น้ำช่วยในการละลายอาหารที่สะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์มหรือใบเลี้ยง เพื่อนำอาหารไปเลี้ยงเอมบริโอทำให้เอมบริโอแบ่งเซลล์และเจริญเติบโตขึ้น

2. ออกซิเจน ออกซิเจนมีความสำคัญต่อการสร้างพลังงานของเอมบริโอในขณะที่เมล็ดงอก จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากเพราะต่อน้ำหนักของเมล็ดออกซิเจนจะสูง การหายใจก่อให้เกิดพลังงาน ซึ่งจะนำไปใช้ในการแบ่งเซลล์ลำเลียงสารสร้างส่วนต่างๆ ที่จำเป็นด้วย เมล็ดจะงอกดีถ้ามีออกซิเจนเท่ากับหรือมากกว่า 20%

3. อุณหภูมิพอเหมาะ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดนั้นแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช เมล็ดพืชโดยทั่วไปจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส พืชเมืองหนาวงอกได้ดีที่อุณหภูมิ 10-20 องศาเซลเซียส แต่ก็มีพืชอีกหลายชนิดที่ต้องการอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้ เช่น ข้าวบาร์เลย์จะงอกได้เมื่ออุณหภูมิต่ำใกล้จุดน้ำแข็ง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับข้าวมากที่สุดประมาณ 25-33 องศาเซลเซียส (สมชาย, ไม่ระบุปี)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. แสง แสงจำเป็นสำหรับพืชบางชนิดเท่านั้น เช่น ยาสูบ กาฝาก ไทรจำเป็นต้องได้รับแสง จึงจะงอกได้ แต่ในพวกหอมหัวใหญ่ถ้ามีแสงมากเกินไปจะยับยั้งไม่ให้เกิดการงอกเมล็ดพืชบางชนิดงอกได้ง่ายโดยไม่ปรากฏระยะพักตัวเลยเมื่อเมล็ดตกถึงพื้นก็สามารถงอกได้เลย เมล็ดขุ่นและเมล็ดมะละกอสามารถงอกได้เมื่ออยู่ในผล ซึ่งยังไม่หล่นจากต้น การงอกเมล็ดของพืชต้องการแสงพบว่ามีไฟโตโครมเป็นตัวชักนำทำให้เกิดตัวชักนำการงอกของเมล็ด

กระบวนการงอกของเมล็ด (วัลลภ, 2538)

การงอกของเมล็ดหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยาของพืชโดยเริ่มจากที่เรติคูลัมแห่งต้นเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา ในสภาพที่เมล็ดได้รับความชื้นที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีเกิดขึ้นดังนี้

1. การดูดน้ำของเมล็ด (imbibition) เมล็ดแก่จะมีน้ำอยู่น้อย โดยมีความชื้นประมาณ 10-15% หรือต่ำกว่า ซึ่งสภาพความชื้นที่ค่อนข้างต่ำนี้เมล็ดจะไม่งอกเมื่อเมล็ดได้รับความชื้นจากภายนอกเพียงพอ เปลือกหุ้มเมล็ดจะอ่อนตัวลง เมล็ดจะเกิดการดูดน้ำทำให้เมล็ดพองตัวขยายขนาดและเพิ่มน้ำหนัก มีผลทำให้เปลือกและเมล็ดแตกในเวลาต่อมาได้ ซึ่งจะทำให้น้ำและออกซิเจนผ่านเข้าไปในเมล็ดได้มากขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างเซลล์ ภายหลังจากดูดน้ำของเมล็ดน้ำจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ภายใต้อิทธิพลของการกระตุ้นการสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายอาหารที่สะสมในเมล็ดอัตราการหายใจเพิ่มสูงขึ้นในขั้นตอนแรกพอจะมีทางกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเลิบบอกินภายหลังการดูดน้ำของเมล็ด ฮอรโมนนี้จะควบคุมการสร้างเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในชั้นอะเลอโรน (aleurone layer) ซึ่งจะถูกแป้งเอนโดสเปิร์มเพื่อย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล นอกจากนี้มีการสร้างเอนไซม์อื่นๆ ได้แก่ นิวคลีเอส โปรตีเอส ฯลฯ เพื่อย่อยสลายอาหารสะสมไว้ เช่น โปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต สารอาหารที่ถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กลง เช่น น้ำตาล กรดอะมิโน จะถูกลำเลียงไปยังส่วนที่กำลังเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้จากการทำงานของเอนไซม์นิวคลีอิกและโปรตีเอสจะกระตุ้นการสร้างฮอรโมนไซโทไคนินและออกซิเจนที่เอนโดสเปิร์ม ฮอรโมนเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปยังคัพภะเร่งการแบ่งเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์ได้

3. การเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ ภายหลังจากสังเคราะห์ของเอนไซม์ ฮอรโมนและการย่อยสลายสารต่างๆ ให้มีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งจะถูกลำเลียงไปในส่วนของคัพภะแล้วคัพภะจะมีการแบ่งตัวและขยายขนาดจนกระทั่งรากอ่อนแทงทะลุเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา ในขั้นสุดท้ายปลายยอดก็จะแทงพ้นเปลือกหุ้มเมล็ดและเมื่อส่วนยอดโผล่พ้นดินแล้วต้นกล้าจะมีการเจริญส่วนใบแท้ซึ่งมีสีเขียว ต้นอ่อนจะมีการสังเคราะห์แสงและเจริญเป็นต้นพืชปกติต่อไป ในขณะที่ใบเลี้ยงและเอนโดสเปิร์มจะมีขนาดเล็กลงและอาจหลุดร่วงไปในที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การงอกของเมล็ดมีลักษณะที่ต่างกัน 2 แบบ คือ

1. งอกโดยการงอใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน (epigeal germination) ได้แก่ พวกเมล็ดถั่วแขก ละหุ่ง มะขาม การงอกแบบนี้เมื่อเรติคูลอกโผล่ออกทางรูไมโครโพทลงสู่พื้นดินแล้ว ส่วนของไฮโคทิลจะงอกตามอย่างรวดเร็วทำให้โค้งขึ้นและดึงส่วนของใบเลี้ยงกับเอพิคอติลขึ้นเหนือดิน

2. งอกโดยใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน (hypogeal germination) ได้แก่ การงอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว หญ้า ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี มะพร้าว ตาลและพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ถั่วลันเตา ส้ม พืชพวกนี้มีไฮโคทิลสั้น แต่ เอพิคอติลและยอดอ่อนยาวและเจริญได้รวดเร็ว เมื่อเริ่มงอกยอดอ่อนและเอพิคอติลจะโผล่ขึ้นเหนือดินและไม่ดึงให้ใบเลี้ยงกับไฮโคทิลขึ้นมาด้วยใบเลี้ยงและไฮโคทิลจึงยังคงจมอยู่ใต้ดิน พืชที่มีวิธีงอกแบบนี้มักเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมากกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น มะละกอ ขนุน งอกได้ทันที ไม่มีระยะพักตัว (วันชัย, 2537)

การพักตัวของเมล็ด (สมบุญ, 2537)

หมายถึง ระยะเวลาของวัฏจักรการดำรงชีวิตของพืชที่ส่วนของพืชหรืออวัยวะของพืชหยุดการเจริญชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากสภาวะภายในของพืชเองหรือทั้งสองอย่างพร้อมๆ กัน เพื่อกำรอดหรือค้ำคงพืช

พืชเมืองหนาวบางชนิดจะมีระยะพักตัวตลอดฤดูหนาว แล้วจึงงอกในฤดูใบไม้ผลิเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้นและมีความชื้นในดินเพียงพอ สำหรับพืชเมืองร้อนในทะเลทรายพืชบางชนิดจะมีระยะพักตัวตลอดฤดูแล้งอันเป็นผลดีต่อพวกที่อยู่รอดในสภาพที่อากาศร้อนแห้งแล้ง และขาดน้ำ เมื่อถึงฤดูที่มีน้ำในดินเพียงพอสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมแก่สมเมล็ดพืชจะงอกและเจริญเติบโตต่อไปได้ ระยะพักตัวของเมล็ดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกัน คือ

1. เมล็ดอกหุ้มเมล็ดแข็งและหนาเกินไป จึงทำให้น้ำและแก๊สออกซิเจนผ่านเข้าไปไม่ได้ เช่น พุทรา มะขาม ฝรั่ง ดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะธรรมชาติจะยังให้เกิดการงอกของเมล็ดกลวง น้ำและแก๊สออกซิเจนผ่านเข้าไปถึงเอมบริโอได้ เอมบริโอจึงแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้ต่อไป
2. เมล็ดบางชนิดมีตัวรับแสงการงอก เช่น สะเม็เอเทค พัก เมล็ดของพืช พวกนี้จะมีสารที่ยับยั้งการงอกเคลือบอยู่ที่ผิวด้านนอกเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดน้ำ จะไม่มีการงอกของเมล็ดเกิดขึ้น เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะช่วยชะล้างสารเหล่านี้ออกไปเมล็ดจึงจะงอกได้และสภาพอันนี้จะเหมาะสมต่อการงอกและการรอดของต้นอ่อนที่งอกออกมาด้วย
3. เอมบริโอในเมล็ดยังเจริญไม่เต็มที่ ถึงแม้ว่าเมล็ดนั้นจะแก่แล้วก็ตามจึงต้องรอให้เอมบริโอเจริญเติบโตจนเต็มที่เสียก่อนจึงจะงอกได้ เช่น เมล็ดแป๊ะก๊วย กล้วยไม้หลายชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การใช้สารเคมี สารเคมีบางชนิดรวมทั้งฮอร์โมนพืชต่างๆ ได้แก่ โฟลทสซีเอ็มในเตรท ไทโลยูเรีย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จิบเบอเรลลิน จะช่วยทำลายการพักตัวของเมล็ดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิบเบอเรลลินสามารถทดแทนอุณหภูมิต่ำในการงอกของแอปเปิล พืชและสาส์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยชะล้างสารที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดทำให้เมล็ดพ้นจากการพักตัวได้

การพักตัวของเมล็ดข้าว (seed dormancy in rice) (ศรีสุตาและคณะ, 2536)

เมล็ดข้าวพันธุ์ปลูกที่มีอยู่ในปัจจุบันมีทั้งพวกที่มีและไม่มีการพักตัว สำหรับพวกที่มีการพักตัวส่วนมากเป็นข้าวที่อยู่เขตร้อน (tropical region) การพักตัวเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของพืชที่จะรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้โดยควบคุมไม่ให้เมล็ดที่ร่วงลงดินงอกพร้อมกันหมด กล่าวคือ เมล็ดที่ไม่มี การพักตัวเมื่อร่วงลงดินหากได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะงอกทันที ส่วนเมล็ดที่มีการพักตัว จะไม่งอกและจะถูกฝังอยู่ในดินจนกว่าจะหมดระยะพักตัว การพักตัวทำให้เมล็ดสามารถรอดพ้นอันตรายอันเกิดจากโรคและแมลงความแห้งแล้งและความหนาวเย็นหรือสภาวะต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อกาเจริญเติบโตในแต่ละฤดูกาล ซึ่งสภาวะดังกล่าวทำให้ต้นอ่อนตายได้ ดังนั้นการพักตัวของเมล็ดจึงเป็นกลไกเพื่อความอยู่รอดของพืชตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เมล็ดพ้นจากช่วงวิกฤติต่างๆ ทำให้สามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกในช่วงเวลาที่ต้องการได้

ข้าวที่มีการพักตัวนับว่าเป็นลักษณะที่มีประโยชน์สำหรับชาวนาในเขตร้อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวในฤดูกาลที่เกี่ยวเกี่ยวจะมีฝนตกและความชื้นสูงเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด ดังนั้นหากเมล็ดไม่มีการพักตัวจะทำให้เมล็ดได้รับความเสียหายกล่าวคือ ทำให้ได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากเมล็ดงอกคางง ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ในทางตรงข้ามหากเมล็ดมีการพักตัว แม้จะมีสภาพที่เหมาะสมต่อการงอก เมล็ดก็จะไม่งอกทำให้ชาวนาได้ผลผลิตเต็มตามที่เก็บเกี่ยวได้ (ประภาส, 2517) ในกรณีที่เกษตรกรมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง การพักตัวของเมล็ดเป็นลักษณะที่เกษตรกรไม่พึงปรารถนา ทั้งนี้เพราะต้องทำให้เมล็ดงอกพร้อมกันทั้งหมดเมื่อทำการหว่านหรือแช่ข้าว การพักตัวของเมล็ดทำให้เกษตรกรต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้การพักตัวก่อนนำไปปลูกการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกมากกว่าปกติเพื่อชดเชยเมล็ดพันธุ์ส่วนที่ไม่งอก

สำหรับระยะเวลาในการพักตัวของข้าวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ ฤดูกาลและสภาพแวดล้อมของต้นแม่ ส่วนการนับระยะเวลาพักตัวของข้าวโดยทั่วไปเริ่มนับหลังจากเก็บเกี่ยว 1 วัน นำเมล็ดไปเพาะหาเปอร์เซ็นต์ความงอก จนกระทั่งเมล็ดมีความงอกถึง 80 เปอร์เซ็นต์จึงถือว่าเมล็ดหมดระยะพักตัว (ไพฑูริย์, 2535)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สาเหตุการพักรงตัวของเมล็ดข้าว (อัณฐลีและคณะ, 2540)

เมล็ดข้าว คือ ผลที่มีผนังรังไข่บางๆ (ovary wall) เชื่อมติดอยู่กับรังไข่ (ovary) ยากที่จะแยกทั้ง 2 ส่วนนี้ออกจากกัน ผลที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่า caryopsis โดยมีส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเรียกว่า แกลบ (hull) ประกอบด้วยกลีบดอกใหญ่ (lemma) หุ้มอยู่ทางด้านหลังเมล็ดและกลีบดอกเล็ก (pelea) หุ้มอยู่ทางด้านหน้าทั้งสองเปลือกหุ้มซ้อนกันอยู่อย่างหลวมๆ มีเพียงส่วนปลายด้านล่างของ lemma และ pelea เท่านั้นที่ประสานกันแน่นอยู่บนก้าน ดอกสั้นๆ เรียกว่า rechilla เมื่อแกะเอาส่วนของ lemma และ pelea ออกแล้วเรียกว่า ข้าวกล้อง (brown rice) โดยมีส่วนที่ห่อหุ้มภายนอกเรียกว่า pericarp มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ได้แก่ epicarp, mesocarp และ endocarp ทั้งหมดนี้มีลักษณะเป็นเยื่อใย (fibrous) มีสารประกอบพวก protein cellulose และ hemicellulose สะสมอยู่ถัดจากชั้นนี้เข้าไปเป็นชั้นของเยื่อหุ้มเมล็ด (integument หรือ seed coat) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น โดยมีไขมัน (fatty material) สะสมอยู่และเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นในสุดเรียกว่า ชั้นaleurone (aleurone) เป็นส่วนที่ห่อหุ้มข้าวสาร (starchy endosperm) และคัพภะ (embryo) ในชั้นนี้มี protein เป็นองค์ประกอบอยู่มากและมีพวก oil cellulose และ hemicellulose อยู่บ้าง โครงสร้างของเมล็ดทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการซึมผ่านของน้ำและแก๊สออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่เมล็ด (เกริกวณิช, 2536)

Mikkesen และ Sinah (1961) รายงานว่า น้ำที่ได้จากการแช่เปลือกหุ้มเมล็ดข้าว (water soluble substances) เมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดจะยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวและทำให้การงอกของเมล็ดข้าวช้าลงและข้าวฟ่างช้าลงด้วย เมื่อแช่เมล็ดในสารละลายคลอรีน (sodium hypochlorite) หรือสารละลายเกลือ (certain salt solutions) ทำให้ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการงอกลดลงเมล็ดสามารถงอกได้มากขึ้น

Sikder (1967) รายงานว่า การล้างเมล็ดข้าวด้วยน้ำหรือแช่ในน้ำแล้วเขย่า จะทำให้ความงอกของเมล็ดเพิ่มขึ้นจาก 36 เป็น 66 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้คาดว่าเนื่องมาจากน้ำได้ช่วยชะล้างสารยับยั้งการงอกที่มีอยู่ในส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดออกไปเมล็ดจึงสามารถงอกได้ดีขึ้น

Seshu และ Dadlani (1991) ยังได้รายงานอีกว่า ในส่วนของเปลือกและเยื่อหุ้มเมล็ดมีสารประกอบชื่อ nonanoic acid ซึ่งเป็นไซลิโนล ของกรดไขมันอิ่มตัว (SCSFA) สะสมอยู่ เพื่อเพาะเมล็ดที่ไม่มีการพักรงตัวกับส่วนของเปลือกและเยื่อหุ้มเมล็ดพบว่าเมล็ดเกิดการพักรงตัวและเมื่อนำเมล็ดไปแช่ในกรด nonanoic acid หรือ ABA พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ amylase ลดลงอย่างมากชี้ให้เห็นว่าสารดังกล่าวขัดขวางการงอกของเมล็ด การอบเมล็ดด้วยความร้อนหรือแช่ในโปรแตสเซียมไนเตรท 0.01 M หรือแช่ในกรดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.1 N ทำให้ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการงอกลดลงเมล็ดสามารถงอกได้ตามปกติ การพักรงตัวของคัพภะอาจจะเป็นอีกสาเหตุ

102678

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนึ่งที่ทำให้เมล็ดข้าวมีการพักตัว ทั้งนี้เนื่องจากการพักตัวเป็นปฏิกริยาร่วมกันระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่ต้นแม่ได้รับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพักตัวของเมล็ดข้าว

1. ชนิดและพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์หรือฤดูปลูกหรือแม่จะเป็นพันธุ์เดียวกันก็มีโอกาสที่จะมีระยะพักตัวแตกต่างกัน (อัญชลีและคณะ, 2540) ศรีสุดาและคณะ (2537) ได้ศึกษาระยะพักตัวข้าวสายพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จำนวน 45 สายพันธุ์ ในระหว่างปี 2532- 2534 พบว่าข้าวสายพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มีระยะพักตัวแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์และระยะพักตัวจะอยู่ในช่วง 2-10 สัปดาห์

2. เปลือกหุ้มเมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพักตัวของเมล็ดข้าวที่เพาะ ทั้งเปลือกไม่สามารถงอกได้ แต่เมื่อแกะเอาส่วนของเปลือกออกแล้วเมล็ดสามารถงอกได้ตามปกติ (อัญชลีและคณะ, 2540; Sikder, 1967)

3. ความชื้นของเมล็ด ข้าวที่เก็บใหม่ ๆ เมื่อเข้ามาเพาะเมล็ดจะไม่งอก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากเมล็ดยังมีความชื้นสูง ทำให้ lemma และ colea ประสานกันแน่นเมื่อนำเมล็ดไปอบด้วยความร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน สามารถจะทำให้ตายการพักตัวของเมล็ดได้ (จรัส, 2534)

4. อุณหภูมิ สภาพที่มีอุณหภูมิสูงเมล็ดที่กักมีระยะการพักตัวสั้น ส่วนสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำทำให้ข้าวมีระยะพักตัวนาน อุณหภูมิในระหว่างที่เก็บรักษามีผลต่อการพักตัวของข้าว ซึ่งในปีที่มีอุณหภูมิต่ำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 60 มีระยะพักตัวนาน (9 สัปดาห์) สภาพปีที่ที่มีอุณหภูมิสูง เมล็ดจะมีระยะการพักตัวสั้น (7 สัปดาห์) สภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้ง อาจจะทำให้เมล็ดเกิดจากการพักตัวซึ่งถือเป็นกลไกเพื่อความอยู่รอดของชีวิตอย่างหนึ่ง (ศรีสุดาและคณะ, 2537)

การแก้การพักตัวของเมล็ดข้าว (dormancy breaking of rice seed) (ประพาส, 2517)

1. การใช้อุณหภูมิสูง เป็นวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดที่มีเปลือกหนาซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเร่งขบวนการ oxidation ทำให้ permeability ของเปลือกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้ทั้งการอบด้วยความร้อนและแช่ในน้ำร้อน สำหรับการอบด้วยความร้อน เช่น การนำเมล็ดข้าวไปตากไว้ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-5 วัน สามารถแก้การพักของเมล็ดข้าวได้ Umaldi และคณะ (1960) พบว่าการแช่เมล็ดในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที ทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มขึ้น

2. การเร่งอายุ (accelerated aging) ของเมล็ดโดยใช้อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และ ความชื้นสัมพัทธ์ 80% พบว่าสามารถแก้การพักตัวในเมล็ดข้าวประเภทจาปอนิกาที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ ได้ โดยใช้เวลาเพียง 1 วัน สำหรับพันธุ์ที่มีระยะการพักตัวสั้นและ 2-3 วัน สำหรับพันธุ์ที่มีระยะการพักตัวนาน (Koide และ Shaku, 1988)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. การใช้สารเคมี ในการทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการแก้การพักตัวของเมล็ดที่มีเปลือกหนาอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกและรวดเร็ว Delouch และ Nguyen (1964) รายงานว่าการแช่เมล็ดข้าวใน ethylene chlorohydrin ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์และ sodium hypochlorite ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงสามารถแก้การพักตัวของเมล็ดข้าวได้ การพักตัวของเมล็ดข้าวโดยการนำเมล็ดไปแช่ในกรดไนตริก ความเข้มข้น 0.1 M เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปแช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 0.25 M เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ทั้ง 2 วิธีนี้ใช้อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) แล้วนำไปเพาะในสารละลาย 2-mercaptoethanal ความเข้มข้น 0.01 M ที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง สลับกับอุณหภูมิ 11 องศาเซลเซียส อีก 8 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้สามารถแก้การพักตัวของเมล็ดข้าวชนิดที่มีจีโนม AA ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในข้าวป่าและข้าวปลูกและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดสำหรับวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดข้าวตามกฎสากลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แนะนำให้ใช้วิธีนำเมล็ดไปแช่ในน้ำหรือไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง หรือแช่ในกรดไนตริก (HNO₃) นาน 24 ชั่วโมงแล้วนำมาเพาะที่อุณหภูมิห้อง

ประวัติข้าววัชพืช (สงกรานต์, 2537)

ข้าววัชพืชที่ศึกษาค้นคว้าโดยข้าวนานาชาติ *Oryza rufipogon* กับข้าวปลูก *Oryza sativa* เกิดเป็นลูกผสมที่มีการกระจายตัวของลูกหลานออกเป็นหลายลักษณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ข้าวไม่ต้องการ คือ เปลือกเมล็ดมีสีดงหรือลายน้ำตาลแดง เมล็ดข้าวสารมีสีแดง ปลายเมล็ดมีหางและเมื่อปลูกเมล็ดจะงอกก่อนเก็บเกี่ยวมีระยะพักตัวนาน

ข้าววัชพืชสามารถจำแนกตามความแตกต่างทางลักษณะภายนอกเป็น 3 ชนิด คือ ข้าวหาง ข้าวดีด และข้าวแดง ชนิดที่เป็นปัญหาร้ายแรงของชาวนา คือ ข้าวหางและข้าวดีด เพราะเป็นข้าววัชพืชชนิดที่งอกก่อนเก็บเกี่ยวจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วและสูงงวมข้าวปลูกในระยะแตกกอ ข้าวหางและข้าวดีดจะออกดอกและเมล็ดจะสุกแก่ก่อนข้าวปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะเมล็ดร่วงเกือบหมดทำให้ผลผลิตข้าวเสียหาย ระดับความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของข้าวหางและข้าวดีด บางแปลงที่มีความหนาแน่นมาก ใน 1 ตารางเมตรมีข้าวหาง 800 ต้น เหลือต้นข้าวจริงเพียง 2 ต้น ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทำให้ผลผลิตเสียหาย 100 % ส่วนข้าวแดงนั้นเป็นข้าววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตจึงมีเสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลงเพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงที่ปนอยู่ ชาวนาถูกโรงสีตัดราคาเกียนละ 200-500 บาท ตามความมายน้อยของข้าวแดงที่ปนเพื่อเป็นการชดเชยผลผลิตที่จะต้องเสียไปบางส่วนเพื่อจะขัดเยื่อหุ้มเมล็ดแดงออกให้เป็นเมล็ดข้าวสารสีขาว (จรรยา, 2548)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การแพร่ระบาดของข้าววัชพืช

ข้าววัชพืช มีรายงานการแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย ไทย พม่า และเวียดนาม ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ในอเมริกาเรียกว่า red rice ญี่ปุ่นเรียกว่า Aka Mai จีนเรียกว่า Lutao เกาหลีเรียกว่า Sha Rei หรือ Sai Peh ลาวเรียกว่าข้าวป่า มาเลเซียเรียกว่า Pedi Hantu และไทยเรียกว่าข้าวนก (Smith, 1981; Moody, 1994)

สำหรับประเทศไทยพบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม ที่ตำบลเขาสามลือหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในนาหว่านข้าวแห้งในเขตจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี การระบาดเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2548 ข้าววัชพืชกลายเป็นปัญหาที่พบในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตมจำนวนหลายแสนไร่ ทั้งในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี ชัยนาท นนทบุรี สิงห์บุรี นครนายก ปราจีนบุรี อ่างทอง ออุธรยา และพิษณุโลก ทำความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ตั้งแต่ 1-100% (จรรยา, 2548)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

1. เมล็ดข้าววัชพืช
2. ดินชุดลาดกระบัง
3. กระบะขนาด กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร จำนวน 32 ใบ
4. บัวรดน้ำ
5. เครื่องวัดอุณหภูมิ
6. เทปกาว
7. กล้องถ่ายรูป
8. ปากกาเคมี
9. ที่ตัดหญ้า และ กจวเห็นยอดตัดหญ้า
10. ปากกา สุ่มดบันทึก
11. จอบ
12. ตาชั่งตักปลา
13. บั้งกัก
14. ไม้ไฟ
15. ถาด

หมายเหตุ 1. ตาชั่งตักปลา มีไว้สำหรับบ่งชี้หนักที่จะมาทำลายเมล็ดข้าววัชพืช
2. ตัวอย่างข้าววัชพืชที่ใช้ในงานทดลอง เป็นข้าววัชพืชที่เก็บจากแปลงนาในเขตลาดกระบัง โดยขึ้นในแปลงข้าวสุวรรณบุรี (สุวรรณบุรี มีระยะพักตัวของเมล็ด 3 สัปดาห์ อายุการเก็บเกี่ยว 120-130 วัน; ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 2539) เก็บตัวอย่างก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน

วิธีการ

ศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดข้าววัชพืชในกระบะทดลองขนาด กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (รวม control) โดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 8 สัปดาห์ (treatment)

Treatment ที่ 1 (control) หลังจากหว่านเมล็ดข้าววัชพืชแล้วให้น้ำตามทันที

Treatment ที่ 2 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 1 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

Treatment ที่ 3 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 2 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

Treatment ที่ 4 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 3 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Treatment ที่ 5 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 4 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

Treatment ที่ 6 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 5 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

Treatment ที่ 7 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 6 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

Treatment ที่ 8 ทิ้งเมล็ดข้าววัชพืชไว้ในกระบะ 7 สัปดาห์แล้วทำการให้น้ำ

1. แบ่งกระบะทดลองออกเป็น block มีขนาดเท่ากับกับจำนวนซ้ำ จะได้ 4 block
2. ในแต่ละ block แบ่งกระบะย่อยเท่ากับกับ treatment (สัปดาห์) ที่ทำการทดลอง ดังนั้น

ในแต่ละ block จะแบ่งออกเป็น 8 กระบะ

3. ในแต่ละ block สุ่ม Treatment ลงใน กระบะย่อยได้ดังนี้

Block ซ้ำ	Treatment (สัปดาห์)							
	0	1	2	3	4	5	6	7
I	0	1	2	3	4	5	6	7
II	0	3	6	1	4	7	2	5
III	1	4	7	2	5	0	3	6
IV	2	5	0	3	6	1	4	7

1. ทำการหว่านเมล็ดข้าววัชพืชในกระบะทดลองกระบะละ 100 เมล็ด ที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้ว หว่านเมล็ดในสภาพดินที่แห้ง โดยมีปริมาณของดิน $1/3$ ของกระบะโดยหว่านเมล็ดข้าววัชพืชพร้อมกันทั้ง 32 กระบะ

2. การให้น้ำ ให้น้ำครั้งแรกที่ 0 (control) สัปดาห์ แล้วค่อยให้น้ำสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สัปดาห์ตามลำดับ ถึงเวลาต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเป็นการจำลองสภาพธรรมชาติที่ข้าวตกลงไปในแปลงนา

การปฏิบัติดูแลรักษา

1. การให้น้ำ เป็นการให้น้ำด้วยบัวรดน้ำเนื่องจากขนาดของกระบะมีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยให้น้ำทุก 2 วัน
2. การป้องกันหนู คือ ใช้น้ำที่ดักหนู , กาวเหนียวดักหนู และตาข่ายดักปลาล้อมรอบกระบะที่ทำการทดลองเพื่อป้องกันนกและหนูที่จะมาทำลายข้าว

การบันทึกข้อมูล

1. บันทึกผลโดยการนับจำนวนเมล็ดที่งอกหลังการให้น้ำทุก 4 วัน คือในวันที่ 8, 12 และนับครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 ของการให้น้ำ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หมายเหตุ

1. หลังจากเก็บเมล็ดข้าววัชพืชมาจากแปลงแล้วรีบหว่านทันทีเป็นการจำลองตามสภาพธรรมชาติของข้าววัชพืชที่ร่วงจากต้นลงสู่แปลงนาโดยตรง

สถานที่และระยะเวลา

- ทำการทดลองที่เรือนเพาะชำ ชั้น 4 ตึก L สาขาวิชาพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เริ่มทำการทดลอง 13 ธันวาคม 2549
- สิ้นสุดการทดลองวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลอง

การหาเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืช

จากการนำเมล็ดข้าววัชพืชไปหว่านในกระบะทดลองขนาด กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร ในแต่ละสัปดาห์ โดยหว่านในสภาพดินที่แห้ง หลังจากหว่านเมล็ดข้าววัชพืชจะให้น้ำครั้งแรกที่ 0 (control) สัปดาห์ แล้วค่อยให้น้ำสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สัปดาห์ตามลำดับ จากผลการทดลองในกระบะปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชในแต่ละสัปดาห์ (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1) พบว่าสัปดาห์ที่ 7 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุด 84.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 6, 4, 3, 2, 1 และ 0 สัปดาห์ ที่ 81.25, 81.0, 73.25, 48.5, 37.75, 6.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ในสัปดาห์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชได้ลดลงเหลือเพียง 69.0 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิจริงเป็น 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นทำให้เมล็ดงอกช้า

ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืช แต่ละสัปดาห์จากการนำการทดลอง

จำนวนสัปดาห์ (treatment)	1	2	3	4	ผลรวม	ค่าเฉลี่ย
T1	3	9	4	10	26	6.5 d
T2	22	42	36	43	143	35.75 c
T3	44	52	45	53	194	48.5 bc
T4	76	59	73	81	293	73.25 a
T5	81	82	64	97	324	81.0 a
T6	60	90	79	47	276	69.0 ab
T7	89	66	76	94	325	81.25 a
T8	87	83	71	95	36	84.0 a
LSD (0.05)						16.87
LSD (0.01)						22.96

หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง

กลุ่ม a เป็นกลุ่มสัปดาห์ที่ 3, 4, 6, และ 7 โดยมีจำนวนเมล็ดข้าววัชพืชที่งอกในผืนดินเฉลี่ย 73.25, 81.0, 81.25, และ 84.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


กลุ่ม b เป็นกลุ่มสัปดาห์ที่ 5 โดยมีจำนวนเมล็ดข้าววัชพืชที่งอกใฝ่ดินเฉลี่ย 69.0 เปอร์เซ็นต์

กลุ่ม bc เป็นกลุ่มสัปดาห์ที่ 2 โดยมีจำนวนเมล็ดข้าววัชพืชที่งอกใฝ่ดินเฉลี่ย 48.5 เปอร์เซ็นต์

กลุ่ม c เป็นกลุ่มสัปดาห์ที่ 1 โดยมีจำนวนเมล็ดข้าววัชพืชที่งอกใฝ่ดินเฉลี่ย 35.75 เปอร์เซ็นต์

กลุ่ม d เป็นกลุ่ม 0 สัปดาห์ (control) โดยมีจำนวนเมล็ดข้าววัชพืชที่งอกใฝ่ดินเฉลี่ย 6.5 เปอร์เซ็นต์

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชในกระบะแต่ละสัปดาห์แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มเมล็ดข้าววัชพืชที่ไม่กระทบอากาศหนาวเย็น 0, 1, 2, 3, 4, 6, และ 7 สัปดาห์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 6.5, 35.75, 48.5, 73.25, 81.0, 81.25, และ 84.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ กลุ่มเมล็ดข้าววัชพืชที่กระทบอากาศหนาวเย็นในสัปดาห์ที่ 5 มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 69.0 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่กระทบอากาศเย็น คาดว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืช 5-7 สัปดาห์ อาจสูงขึ้นไปกว่า 90.0 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิจารณ์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองในกระบะขนาด กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่า ข้าววัชพืชมีเปอร์เซ็นต์ความงอกตั้งแต่ 0 สัปดาห์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกคือ 6.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเป็นไปได้จากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม กล่าวอีกอย่างคือ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการนั่นเอง (พรรณี, 2541) หลังจากนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 81.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ตกกล้าต้องมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (ไพฑูรย์, 2535; ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, 2539) และเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 84.0 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงสัปดาห์ที่ 7 แต่สัปดาห์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าววัชพืชได้ลดลงเหลือ 69.0 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิจริงเป็น 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นทำให้เมล็ดข้าววัชพืชงอกช้า เพราะข้าวชอบอุณหภูมิสูง

บุญหงษ์ (2547) รายงานว่าอุณหภูมิที่ต่ำอากาศเย็นและสภาพของน้ำที่เย็นทำให้เกิดการพักตัวมีผลต่อการงอกของเมล็ด การงอกพันดินชั้นเมล็ดลึก การผสมไม่ติดและดอกเป็นหมัน เฉลิมพล (2542) ได้รายงานหาว่า ข้าวเป็นพืชที่ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำ การเจริญเติบโตจะได้รับผลกระทบถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโต เช่น ทำให้เมล็ดไม่งอก งอกพันดินช้า การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ยืนต้นตายลงปลายของรวงจะเสียหาย ในสภาพแปลงนาของเกษตรกรจริง เมล็ดข้าววัชพืชที่เป็นปัญหาร้ายแรงของเกษตรกรคือ ข้าวหางและข้าวดีด เพราะเป็นข้าววัชพืชชนิดตรงกันข้ามเกี่ยวและมีการเจริญเติบโตเร็วจะออกรวงก่อนข้าวปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ (จรรยา, 2548) ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและเกษตรกรเองไม่ค่อยมีเวลาในการถอนข้าววัชพืชออกเพราะเสียเวลาในการจัดการรวมทั้งตัวเกษตรกรเองไม่มีความรู้เพียงพอหรือมีความเข้าใจที่ผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการเผาตอซังข้าวแล้วไถและปล่อยน้ำเข้าแปลงนา ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ข้าววัชพืชที่ร่วงถูกพลิกตัวฝังลงไปดิน แล้วทำให้ข้าววัชพืชที่อยู่ในดินชั้นล่างถูกพลิกตัวกลับขึ้นมาเมื่อได้รับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกและเจริญเติบโตได้อีก ทำให้มีการระบาดของข้าววัชพืชไม่รู้จบสิ้น

ดังนั้นเพื่อการป้องกันกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพควรปล่อยให้ข้าววัชพืชงอกก่อนโดยการปล่อยแปลงนาทิ้งไว้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นค่อยปล่อยน้ำเข้าแปลงข้าววัชพืชจะงอกประมาณ 3-4 วัน (สมชาย ไม่ระบุปี) ถ้าเกษตรกรมีเวลามากพอควรปล่อยแปลงนาทิ้งไว้มากกว่า 4 สัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพื่อล่อให้ข้าววัชพืชงอกมากที่สุด แล้วทำการป้องกันกำจัดโดยการไถและคราดทำลายและกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ ต่อเนื่อง เพื่อลดการระบาดของข้าววัชพืชในฤดูต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาระยะพักตัวของข้าววัชพืชโดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกใน กระบะขนาด กว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร ผลการทดลองสรุปได้ว่า ข้าววัชพืชจะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ความงอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 81.0 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่ 7 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ 84.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (ตารางผนวกที่1) แต่สัปดาห์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกของ ข้าววัชพืชได้ลดลงเหลือ 69.0 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิจริงเป็น 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นทำให้เมล็ดข้าววัชพืชงอกช้า เพราะข้าวชอบอุณหภูมิสูง

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 4 ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง และเป็นระยะเวลาที่ สั้นที่สุดสำหรับแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติและทดลองในแปลงนาต่อไปวิธีการกระตุ้นให้ข้าววัชพืช ออกก่อนควรทำได้โดยการปล่อยแปลงนาทิ้งไว้ประมาณ 4 สัปดาห์ หากเกษตรกรมีเวลา มากพอควรปล่อยแปลงนาทิ้งไว้มากกว่า 4 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นการปล่อยให้ข้าววัชพืชงอกเพิ่มมากขึ้น ควรมีการวางแผนการปลูกให้ดูแลการเก็บเกี่ยวไม่ให้กระทบกับช่วงอากาศเย็น เพราะจะทำให้เมล็ด ข้าววัชพืชมีระยะพักตัวที่ยาวนานขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- เครือวัลย์ อัดตะวีริยะสุข. 2536. คุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพและการแปรสภาพเมล็ด. เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว. หน้า 1-53.
- จรรยา มณีโชติ. 2547. ข้าวหาง ข้าวแดง ข้าวดีด ภัยคุกคามของชาวนา. กสิกร. 77 (5) : 6-15.
- จรรยา มณีโชติ. 2548. ข้าววัชพืช: ปัญหาและการจัดการ. เอกสารวิชาการ กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์อ้วนน้ำ พรินติ้ง จำกัด, กรุงเทพฯ. 24 หน้า.
- จรัส โปร่งศิริวัฒนา. 2534. ความรู้เรื่องข้าว. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 210 หน้า.
- จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2529. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน. กรุงเทพฯ. 24 หน้า.
- เฉลิมพล แซมเพชร. 2542. ข้าว. สรีรวิทยาการผลิพืชไร่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 262-271.
- ทรงเชาว์ อินลัมพันธ์. 2531. ข้าว. พืชไร่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 1-64.
- บุญหงษ์ จงคิด. (2547) ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 32-42.
- ประพาส วีระแพทย์. 2517. ความรู้เรื่องข้าว. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 42 หน้า.
- ไพฑูริย์ ปานแปร. 2535. เอกสารประกอบการสอน วิทยุการเมล็ดพันธุ์พืชไร่. สถาบันราชมนูญวิทยาเขตสุรินทร์. 106 หน้า.
- วัลลภ สันติประชา. 2538. การฟักตัวของเมล็ด. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. หน้า 75-87.
- วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2537. การงอกของเมล็ด. สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, กรุงเทพฯ. หน้า 58-120.
- ศรีสุตา อนุสรณ์พานิช, อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, อ่วม คงชู, วารินทร์ ศรีถัด และ อุดลย์ กฤษะวดี. 2526. การศึกษาระยะพักตัวของข้าวสายพันธุ์ดี. ผลงานวิจัยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. หน้า 454-461.
- ศรีสุตา อนุสรณ์พานิช, อ่วม คงชู, วารินทร์ ศรีถัด และ อุดลย์ กฤษะวดี. 2537. การศึกษาระยะพักตัวของข้าวสายพันธุ์ดี. ผลงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล (อ.วช 1) ของนางสาวศรีสุตา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- อนุสรณ์พานิช. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. หน้า 34-41
- ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2539. ข้าว: ความรู้คู่ชาวนา. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 191 หน้า.
- สุเทพ ลิ้มทองกุล, นิพนธ์ มาฆทาน, อุดลย์ กฤษวะดี, อ่วม คงชู, พิทยากร ภางาม และกัมมาท มุขดี. 2533. การศึกษาวิธีการทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ในระดับเกษตรกร. ผลงานวิจัยปี 2533 เล่ม 2. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. หน้า 242-249.
- สงกรานต์ จิตรากร. 2537. ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 74 หน้า.
- สมชาย ชดตระกูล. ไม่ระบุปี. ข้าว. ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 41-98.
- สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2537. ผลเมล็ดและต้นกล้า. พฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพฯ. หน้า 92-107.
- สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548. สรรพวิทยาของการเจริญด้านเมล็ดพันธุ์. สรรพวิทยาของพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพฯ. หน้า 228-240.
- อารมย์ ศรีพิจิตต์. 2524. ผลและเมล็ด. เมล็ดพันธุ์เบื้องต้น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. หน้า 26-34.
- อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, ณัฐนัย เภพานิช, อ่วม คงชู, วารินทร์ ศรีถัด และ อุดลย์ กฤษวะดี. 2540. การศึกษาระยะพักตัวของข้าวสายพันธุ์. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 22 หน้า.
- อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, อ่วม คงชู, วารินทร์ ศรีถัด และ อุดลย์ กฤษวะดี. 2548. การประชุมวิชาการ "ข้าววัยพีช" 21 ตุลาคม 2548. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. หน้า 43-47.
- อรอนงค์ นัยวิกุล. 2547. การเจริญเติบโต โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของข้าว. ข้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 35-47.
- Koide, T., Ogino, I. and I. Shaku. 1988. Applying the accelerated aging treatment to break seed dormancy of rice. Research Bulletin of the Aichi Ken Agricultural Research Center 20 : 77-82.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Maneechote C., S. Jamjod and B. Rerkasem 2004. Invasion of weedy rice in the fields in Thailand. International Rice Research Newsletters (IRRN) 29 (2) : 14-16.
- Moody, K. 1994. Weedy forms of rice in Southeast Asia. Paper Presented at MARDI Workshop on Padi Angin 18 May 1994 Kepaiabatas Perai, Malaysia. 5 pp.
- Seshu, D.V. and M. Dadlani. 1991. Mechanism of seed dormancy in rice. Seed Sci. Research 1 (3) : 187-194.
- Sikder , H.P. 1967. Dormancy of paddy seed in relation to different seed treatments. Experimental Agriculture 3 : 249-255.
- Smith,R.J. 1981. Control of red rice (*Oryza sativa*) and water-seed (*Oryza sativa*). Weed Sci 29: 663-666.
- Umalidi, D.L.,Barker M.B. and R.C Dumlao. 1960. A preliminary study on the cancellation of the dormancy period of rice seed. Philippine Agri. 44: 279-289.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางผนวกที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนจำนวนเมล็ดที่ออกทั้งหมดของข้าววัชพืชใน 8 สัปดาห์ Analysis of variance (ANOVA)

Source of Variation	degree of freedom	sum of square	Mean square	F-ratio	F-table	
					5%	1%
Block	3	339.3438	113.1146	0.86 ns	3.07	4.87
Treatment	7	21230.4688	3032.9241	23.05**	2.49	3.61
Experimental error	24	2762.9063	131.5670			
Total	31	24332.7188	784.9264			

C.V = 19.1470 %

LSD.05 = 16.87

LSD.01 = 22.96

** แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 1 ถุงตางโดยสีฟ้าที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าววัชพืช

ภาพผนวกที่ 2 ลักษณะการหว่านเมล็ดข้าววัชพืชในกระบะในสภาพดินที่แห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะการวางกระเบาะทดลองในเรือนเพาะชำที่ใช้ในการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 4 เมล็ดข้าวสารพืช 0 สัปดาห์(Control) อายุ 4 วัน หลังการให้น้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพผนวกที่ 5 เครื่องวัดระดับอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดที่ใช้ในการทดลองในเรือนเพาะชำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ- นามสกุล : นางสาว ปันดดา จันทร์เทียน
 วันเดือนปีเกิด : 28 พฤศจิกายน 2527
 ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ 157 หมู่ 4 ต. บ้านโกชน์ อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 67140
 โทรศัพท์ : 087-4996257
 ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 157 หมู่ 4 ต. บ้านโกชน์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 67140
 โทรศัพท์ : 087-4996257
 การศึกษา : พ.ศ. 2534-2539 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองกะโปน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 พ.ศ. 2540-2542 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านโกชน์
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 พ.ศ. 2543-2545 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพชรละครวิทยา
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 พ.ศ. 2546-2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 เพชรบูรณ์
 พ.ศ. 2548-2549 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์
 (พืชไร่) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
 ทหารลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อ- นามสกุล : นางสาว ลาวัลย์ เสาวรส
 วันเดือนปีเกิด : 27 ธันวาคม 2526
 ที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ 9 ต. วังลึก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 72130
 โทรศัพท์ : 086-5354853
 ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ 9 ต. วังลึก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 72130
 โทรศัพท์ : 086-5354853
 การศึกษา : พ.ศ. 2533-2538 ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดนางพิมพ์

จังหวัด สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2539-2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดนางพิมพ์

จังหวัด สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2542-2544 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2545-2546 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2548-2549 ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช

(พืชไร่) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้