



949

14150

ใบรับรองวิทยานิพนธ์  
ภาควิชาปฐพีวิทยา

เรื่อง

ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

Anabaena siamensis TISTR 0625 และ

Anabaena siamensis TISTR 0906

The Effect of Pesticides on the Growth of Blue-green Algae

Anabaena siamensis TISTR 0625 และ

Anabaena siamensis TISTR 0906

โดย

นางสาวนิศารัตน์ ดำรงรัตน์



T099702

ได้รับพิจารณาเห็นชอบจาก

(ผศ. ดร. สมิตรา กุ์โรตม)  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปพ.  
๙๖๘๙๗  
๒๕๓๔

ภาควิชารับรองแล้ว

.....  
(ผศ. ดร. สมิตรา กุ์โรตม)

หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา

วันที่...เดือน.....พ.ศ.....

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน..... 99702  
วัน,เดือน,ปี..... 10/06/34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เรื่อง : ผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

Anabaena siamensis TISTR 0625 และ

Anabaena siamensis TISTR 0906

โดย : นางสาว นิคาร์ตัน คำรงรัตน์

ระดับ : ปริญญาตรี (ปฐพีวิทยา)

อาจารย์ที่ปรึกษา : .....

(ผศ.ดร. สมิตรา กวโรดม)

จากการทดลอง เปรียบเทียบความเป็นพิษ ของยาปราบศัตรูพืช 7 ชนิด (ยากำจัด  
เชื้อรา 6 ชนิด ยากำจัดแมลง 1 ชนิด) ที่มีผลต่อ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena  
siamensis TISTR 0906 และ A. siamensis TISTR 0625 พบว่า ยาปราบ  
ศัตรูพืชทั้ง 7 ชนิด มีผลต่อการเจริญเติบโตของ A. siamensis ทั้ง 2 หมายเลข  
การจัดอันดับความร้ายแรงโดยใช้ความเข้มข้นในระดับ LC<sub>50</sub> เป็นมาตรฐานของยาปราบ  
ศัตรูพืชทั้ง 7 ชนิด เป็นดังนี้ A. siamensis TISTR 0906 สามารถเจริญ  
เติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในยาปราบศัตรูพืช PRONTO 40, T-ZIM และ FUNDAZOL มีอัตรา  
การเจริญลดลงใน BAVISAN ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 225 ppm ขึ้นไปและไม่มีการเจริญ  
เติบโตในยา SAPROL, S-85 และ VITAVAX สำหรับ A. siamensis TISTR 0625  
สามารถเจริญเติบโตได้ในยาปราบศัตรูพืช PRONTO 40, T-ZIM มีอัตราการเจริญลดลง  
ในยา BAVISAN, VITAVAX, FUNDAZOL ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 150 ppm, 250 ppm  
และ 150 ppm ขึ้นไปตามลำดับ และไม่มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายในยา SAPROL  
และ S-85 ที่ทุกระดับความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Abstract



Title : The Effect of Pesticides on the Growth of Blue-green Algae  
Anabaena siamensis TISTR 0625 and  
Anabaena siamensis TISTR 0906

By : Miss Nisarat Damrongrat

Degree : Bachelor of Science (Agriculture)

Major : Soil Science

Advisor : .....  
*Sumitra P.*

( Dr. Sumitra Poovarodom)

The toxic effects of 7 pesticides ( 6 fungicides and 1 insecticide ) on the growth of algae , Anabaena siamensis TISTR 0906 and Anabaena siamensis TISTR 0625 , was carried out in the laboratorys . The results showed that these algae were diversely sensitive to the pesticides . The toxicity of these pesticides as indicated by their median lethal concentration (LC<sub>50</sub>) as follow , Anabaena siamensis TISTR 0906 could grow and survive in PRONTO 40 , T-ZIM and FUNDAZOL . The growth of algal was decreased in solution of BAVISAN from 225 ppm concentration but could not grow in SAPROL , S-85 and VITAVAX . Anabaena siamensis TISTR 0625 could growth only in PRONTO 40 and T-ZIM . The growth was decreased in BAVISAN , VITAVAX and FUNDAZOL from 150 , 250 and 150 ppm concentration , respectively . This algal could not grow in SAPROL , S-85 at all concentration

## คำนิยม

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิตรา กู้โรตม อาจารย์ภาค  
วิชาปรัชญศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร  
ลาดกระบัง และ นางสาว บุษกร อารยางกูร นักวิทยาศาสตร์ ประจำสถาบันวิจัย  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ได้ตรวจตราแก้ไข รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ  
ทุกอย่างจนปัญหาพิเศษนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปรัชญศึกษา นางสาว นุจรี นุญแปลง ภาควิชา  
ปรัชญศึกษา นาย ภูริสิทธิ์ ศรีนาง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรคนิช ภาควิชาเทคโนโลยี  
การจัดการศัตรูพืชและเจ้าหน้าที่ของ สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สหรัย  
ที่ใช้ในการทดลอง

ขอขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ที่ได้ให้คำ  
ปรึกษาและช่วยเหลือในงานทดลอง


นายชัยยศ ลิขิตสารวิทย์

นางสาวนิศารัตน์ ดำรงรัตน์

25 / 3 / 2534

## สารบัญ

สารบัญตาราง	(1)
สารบัญรูป	(2)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	2
ตรวจเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	10
ผลการทดลอง	12
สรุปผลการทดลอง	23
วิจารณ์ผลการทดลอง	24



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แสดงความร้ายแรงของยาปราบศัตรูพืชต่อ  
สำหรับสีน้ำเงินแกมเขียว โดยใช้อัตรา  
ความเข้มข้นระดับ  $LC_{50}$  (ppm) เป็นดัชนี  
ในการเปรียบเทียบ

15



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้  
(1)

## สารบัญรูป

รูปที่ 1	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช BAVISAN	16
รูปที่ 2	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช FUNDAZOL	17
รูปที่ 3	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช SAPROL	18
รูปที่ 4	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช S-85	19
รูปที่ 5	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช VITAVAX	20
รูปที่ 6	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช T-ZIM	21
รูปที่ 7	แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย สีน้ำตาลเงินแกมเขียวในยาปราบศัตรูพืช PRONTO 40	22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน (2) การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## คำนำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นอาชีพหลักของประชาชน ดังนั้นฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่จึงขึ้นกับผลผลิตของข้าวเป็นสำคัญ ดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ ประการ และปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การใส่ปุ๋ย ปัจจุบันนี้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการทำการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเราต้องสั่งปุ๋ยเคมีไนโตรเจนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเสียเงินตราและการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาี้ โดยการเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดินและพืช โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้สูง มาใช้เป็นปุ๋ย (ปุ๋ยชีวภาพ) และจุลินทรีย์ที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งก็คือ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (blue-green algae) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไชยาโนแบคทีเรีย นั่นเอง

ปัจจัยที่สำคัญ อีกประการหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าวก็คือ การใช้ยาปราบศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารพิษปราบศัตรูพืช มักจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่พวกจุลินทรีย์ในดิน แมลงที่มีประโยชน์ต่อพืช สัตว์น้ำ ตลอดจนมนุษย์ ดังนั้นการใช้ยาปราบศัตรูพืชอาจจะมีผลต่อการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ได้เช่นกันการแก้ปัญหานี้อาจทำได้ โดยการหาสายพันธุ์สาหร่ายที่ทนต่อยาปราบศัตรูพืช และ อีกแนวหนึ่งคือการใช้สาหร่ายหลายสายพันธุ์ ร่วมกันในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพราะสาหร่ายแต่ละพันธุ์ จะทนต่อยาปราบศัตรูพืชได้ต่างชนิดและต่างปริมาณกัน

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของยาปราบศัตรูพืช ที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้
2. เพื่อศึกษาความทน และ การเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้ง 2 หมายเลข ในยาปราบศัตรูพืชชนิดต่างๆ



## ตรวจเอกสาร

สาหร่าย (Algae) เป็นพืชชั้นต่ำที่โครงสร้างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นลำต้น ราก และใบ ที่มีต่อลำเลียงอย่างแท้จริงเหมือนพืชชั้นสูงทั่วไป ด้วยเหตุนี้โครงสร้างของสาหร่ายจึงได้ชื่อว่า ทัลลัส (Thallus) นอกจากโครงสร้างโดยทั่วไปแล้ว การเจริญเติบโตของสาหร่ายยังแตกต่างจากพืชแบบมีต่อลำเลียงทั้งหลาย กล่าวคือ ไซโกต จะพัฒนาไปเป็นทัลลัสโดยตรงเลย ไม่ต้องมีการพัฒนาไปเป็นคัพภะเลียงก่อนยังมีพืชอื่นๆ ที่โครงสร้างมีลักษณะเป็นทัลลัสเช่นเดียวกับสาหร่าย เช่น บักเตรี รา และเห็ด เป็นต้น แต่พืชเหล่านี้ไม่มีรงควัตถุ (pigment) ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงเหมือนสาหร่าย รงควัตถุเหล่านี้ ได้แก่ คลอโรฟิล (chlorophyll) คาโรทีนอยด์ (Carotenoids) และ ไฟโคบิลิน (Phycobillins) (กาญจนภาชน์, 2527)

นักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษ ค.ศ. 1880 ได้จัดสาหร่ายไว้ในดิวิชันเดียวกับพวก เห็ด รา เนื่องจากว่าโครงสร้างของพืชสองชนิดนี้มีลักษณะเป็นทัลลัสเหมือนกัน ต่อมาในราว ค.ศ. 1920 นักวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดพืชสองชนิดดังกล่าว รวมกันไว้ใน ดิวิชัน ทัลโลไฟตา (Thallophyta) ไม่สมควรด้วยเหตุและผล เนื่องจากว่าการจัดนั้นจะต้องคำนึงถึงวิวัฒนาการ ลักษณะการสืบสายพันธุ์ โครงสร้างของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของเซลล์ที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา ก็คือ ชนิดของรงควัตถุ องค์ประกอบของผนังเซลล์ อาหารสะสม จำนวน ชนิด ตำแหน่งและขนาดความยาวของแฟลกเจลลา (flagella) โครงสร้างของเซลล์สืบพันธุ์ และนิวเคลียส เป็นต้น ดังนั้นจึงจัดสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวไว้ใน ดิวิชัน Myxophyta (หงษ์เทพ และ สมถวิล, 2530)

### ความสำคัญของสาหร่าย

(หงษ์เทพ และ คณะ, 2530) สาหร่ายเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมากทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีทั้งเป็นประโยชน์และเป็นโทษ

## ประโยชน์ของสาหร่าย อาจจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

### : ด้านนิเวศวิทยา

1. สาหร่ายเป็นผู้ผลิตอาหารเบื้องต้นที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อาหาร เพราะสามารถสังเคราะห์แสงได้ปริมาณมากกว่า 90% ของการสังเคราะห์แสงที่มีทั้งหมดในโลก
2. สาหร่ายเป็นผู้ผลิตก๊าซออกซิเจนสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (Chapman, 1987)
3. สาหร่ายใช้เป็นดัชนีบอกคุณภาพของน้ำได้ เช่น *Euglena* sp.
4. ใช้ทำให้น้ำบริสุทธิ์ โดยใช้สาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อย (Halogen algae) ช่วยกำจัดเกลือในแหล่งน้ำที่ขุ่นมัว (ทิพวรรณ, 2530)
5. ใช้กำจัดน้ำเสีย โดยช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำโดยธรรมชาติ

### : ด้านอาหาร

1. ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ เช่น จี๋ดำ
2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น สาหร่ายสีน้ำตาลและสีแดงเช่น *Alaria*

### : ด้านการเกษตร

1. ใช้ทำปุ๋ย สาหร่ายทะเลสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี เพราะมีธาตุไนโตรเจนและโปรแตสเซียมสูง ใช้ปรับปรุงคุณภาพ ดินทราย ซึ่งมีขาดธาตุโปแตสเซียม นอกจากนี้ ในสาหร่ายยังมีแร่ธาตุปริมาณน้อย (Trace element) ที่จำเป็นต่อพืชอย่างมาก เช่น ไอโอดีน โบรอน ทองแดง (Volesky et al., 1970)
2. ให้ปุ๋ยไนโตรเจนโดยการตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวพวกที่มี Heterocyst ประมาณ 50 ชนิด สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ เช่น *Anabaena* sp. ซึ่ง

อาศัยอยู่ในแหวนแดง จึงมีการทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวหรือแหวนแดงในนาข้าว เพื่อช่วยเพิ่มไนโตรเจนโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และพบว่า นอกจากประหยัดเงินแล้วยังทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. ใช้ปรับสภาพของดิน มีการทดลองใช้สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว เช่น *Anabaena* , *Nostoc* ใส่ในดินที่เป็นด่าง pH 9 พบว่าทำให้ pH ของดิน ลดลงเป็น 6-7 ได้ (ศูนย์วิจัยการอารักขานาข้าว, 2530)

4. ใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้น้ำสกัดจากสาหร่ายทะเลฉีดพ่นตามต้นพืชพวกแตง หัวผักกาดหวาน มันฝรั่ง พบว่า ป้องกันเพลี้ย และเชื้อราได้ และยังป้องกันการสูญเสียของผลไม้ในขณะอากาศหนาวจัดได้ด้วย (สิริวัฒน์, 2519)

๖. ด้านการแพทย์

1. ใช้เป็นยารักษาโรคได้ เช่น ใช้ *Sargassum* รักษาโรคคอพอก

2. ใช้สกัดสารปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งเรียกว่า *Cynophycin* หรือ *Marinamycin* (Desikachary, 1959)

๗. ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๘. ด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ

### โทษของสาหร่าย

1. ทำให้น้ำมีกลิ่น สี และรส เปลี่ยนไป โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ที่ใช้สำหรับบริโภค ถ้าแหล่งน้ำนั้นมีธาตุอาหารมาก จะทำให้สาหร่ายเจริญและทวีจำนวนอย่างรวดเร็วจนเต็มผิวน้ำ ทำให้เกิดผลเสียคือ น้ำจะมีกลิ่น สี และ รสเปลี่ยนไป และทำให้ท่อน้ำอุดตัน

2. เป็นอันตรายต่อสัตว์และคน การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วของสาหร่าย ในแหล่งน้ำอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่ตมน้ำ ที่มีสาหร่ายปนอยู่ได้ เช่น *Anabaena* ทำให้กบ แกษ ม้า วัว ตายได้
3. ทำให้อาคาร ลิ่งก่อสร้าง และเรือ คุสกปรกและผุกร่อนเร็ว
4. สาหร่ายบางชนิดเป็น parasite ของพืชเศรษฐกิจเช่น ชา

### สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

ลักษณะสำคัญของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว มีลักษณะประจำไฟลัม 5 ประการดังนี้

1. เซลล์ของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว เป็นแบบ prokaryotic cell คือ นิวเคลียสไม่มีผนังหุ้ม และ นิวเคลียสไม่ได้แบ่งตัวแบบ mitosis นอกจากนี้ photosynthetic pigment ไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อน อยู่ใน cytoplasm (อักษร, 2527)
2. สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวทุกชนิดไม่มีหนวด (flagellum)
3. ชนิดที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวจะเป็นแบบหมุนรอบแกนยาว (gliding)
4. Photosynthetic pigments chlorophyll a,  $\beta$ -carotene และ biliprotien สองชนิดที่สำคัญคือ C-phyocyanin, C-phycoerythrin
5. อาหารสะสม เป็นประเภทโปรตีน คือ cyanophycin

รูปร่างของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวส่วนมากเป็นเส้น (filament) แต่อาจเป็นเซลล์เดี่ยว ๆ (unicellular) และเป็นกลุ่มก้อน (colony) พวกที่รูปร่างเป็นเส้น ก็ยังแยกออกเป็นพวกแตกแขนง (branch) และพวกที่ไม่แตกแขนง (unbranch) ซึ่งไม่แบ่งออกเป็นฐานและเป็นยอด ประเภทของการแตกแขนงมี 2 แบบ คือ อาจเป็นแบบ true หรือ false

การสืบพันธุ์ของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว แบบ vegetative ก็โดยวิธีการแตกขาดหรือการแตกของ trichome การสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศเป็นแบบวิธีสรางสปอร์ สปอร์ที่สร้างมีหลายแบบคือ

1. Akinetes มีขนาดใหญ่ ผนังหนาภายในสปอร์มีสีเข้ม
2. Endospore สปอร์แบบนี้จะงอกเป็นต้นใหม่ทันทีไม่ต้องมีระยะพัก (resting stage)
3. Nannocytes เป็นสปอร์ขนาดเล็กที่ไม่มีผนังหุ้ม สปอร์ต่างจากชนิดที่ 2 คือก่อนการแบ่งตัวขนาดของ vegetative cell ไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้น
4. Exospores เป็น Endospores ที่เปลี่ยนรูปไปเช่นเดียวกับแบบ 3 เหมือนกัน เกิดขึ้นโดยผนังเซลล์แตกออกเป็นจุด ๆ หนึ่ง และ protoplast ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยออกมาและกลายเป็น exospore ไปในที่สุด

สำหรับสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวมีเซลล์พิเศษชนิดหนึ่งเรียกว่า heterocyst ลักษณะของเซลล์แบบนี้ที่สังเกตได้ง่ายคือ มักมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือถ้าอยู่ในน้ำอาจจะมียูเรียมากกว่าเซลล์อื่น ๆ ตำแหน่งของ heterocyst อาจอยู่กลาง trichome หรืออยู่ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้

### Heterocyst

เป็นเซลล์ธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง metamorphosis คือ เซลล์นั้นเกิดมีขนาดใหญ่ขึ้นมา ผนังเซลล์หนาขึ้น อาจจะไม่มียูเรียหรือมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือสีน้ำตาลก็ได้ ทั้งนี้ภายใน heterocyst จะมีไซโทพลาสซึมพวก centropiasm อยู่เข้าใจว่า heterocyst จะทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่สูญพันธุ์ที่สูญเสียน้ำที่ไป

ตำแหน่งของ heterocyte มีดังนี้

1. เกิดภายในสายระหว่างเซลล์เป็นแบบ intercalary heterocyst

2. เกิดที่ปลายใดปลายหนึ่งของสาย เรียกว่า *terminal heterocyst*  
ในเซลล์ *heterocyst* จะมีปมอื่นเข้ามา 1 หรือ 2 ปม ตรงบริเวณที่ติดเซลล์อื่น  
ปมนี้เรียก *Polar nodule*

*Heterocyst* อาจจะมีเกิดเดี่ยว ๆ ภายในสายเซลล์ แต่จะมีมากกว่า 1 เซลล์ก็ได้  
เช่น *Anabaenaopsis* มี *heterocyst* 2 เซลล์ที่ปลายทั้งสองข้างของสายเซลล์

### หน้าที่ของ heterocyst

1. เป็นจุดอ่อน ทำให้สายเซลล์ขาด เกิดเซลล์ใหม่ได้
2. เซลล์ของ *heterocyst* อาจหลุดออกจากสายเซลล์ และสามารถทนต่อสภาพ  
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้มากกว่าเซลล์ธรรมดา และ จะคงมีชีวิตอยู่จนกว่าสภาพแวดล้อมจะ  
เหมาะสม *heterocyst* นั้นก็จะงอกเป็นสายเซลล์ใหม่ได้
3. *heterocyst* อาจจะมีแบ่งตัวเป็นสปอร์ขนาดเล็ก ๆ เรียกว่า *endospore* ก็ได้  
แล้ว *endospore* เหล่านี้ก็จะงอกเป็นสายเซลล์ใหม่ได้หลายเซลล์
4. การตรึงไนโตรเจน โดยใช้เอนไซม์ไนโตรจีเนส (สุมิตรา, 2532)

### Anabaena

เป็นสาหร่ายในวงศ์ *Nostocaceae* ซึ่งสาหร่ายในวงศ์นี้ไม่แตกกิ่งเรียงแถวเดียว  
เซลล์ปลายสายไม่ขาง สายเซลล์อาจจะตรงหรือบิดเป็นเกลียว หรือบิดงอ ไม่สม่ำเสมอ มี  
เมือกหุ้ม สายเซลล์จะอยู่อย่างอิสระหรือรวมกันอยู่ในเมือก

สายเซลล์ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างกลมคล้ายลูกบิดหรือคล้ายถังเบียร์ คือ ตรงกลาง  
ป่อง เรียกว่า *barrel-shaped* มี *heterocyst* สกุล *Anabaena* มีอยู่หลายชนิด บาง  
ชนิดก็อยู่เดี่ยว ๆ บางชนิดก็อยู่แบบเป็นกลุ่มใหญ่ มีรูปร่างของกลุ่มไม่ก้ำจืด ลักษณะของสาย  
เซลล์คล้ายคลึงกับ *Nostoc* แต่ *trichome* ของ *Anabaena* มักจะตรง มีบางที่บิดงอ

heterocyst มีลักษณะเด่นชัด skinete มีขนาดใหญ่ ในบางชนิดมี pseudovacule ทำให้ลอยน้ำได้ อาจอยู่ปะปนกับสาหร่ายอื่นๆ ในที่ที่มีน้ำตื้นๆ หรือ ตามดินแฉะๆ

หงษ์เทพ และ บุขกร (2532) ได้ทำการสำรวจการแพร่กระจาย และเก็บรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายจากดินนาทั่วประเทศไทยมาแยกเชื้อสาหร่ายให้บริสุทธิ์ และจัดจำแนกเข้าหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบันสามารถรวบรวมและเก็บรักษาสาหร่ายสายพันธุ์สาหร่ายได้ทั้งหมด 203 สายพันธุ์ 11 สกุล

หงษ์เทพ และ คณะ (2530) ได้ทำการศึกษาผลของยาปราบศัตรูพืช ที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ โดยทดลองเปรียบเทียบความเป็นพิษของยาปราบศัตรูพืช 7 ชนิด คือ propanyl , edifenphos , parathion-methyl piperophos + 2,4-D , 2,4-D , isoprocarb , omethoate ที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว Anabaena siamensis TISTR 8012 และ Anabaena lutea TISTR 8009 จัดอันดับความร้ายแรงโดยใช้ความเข้มข้นในระดับ LC<sub>50</sub> เป็นมาตรฐาน และสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ สาหร่ายต่างสายพันธุ์ มีความทนต่อชนิดและความเข้มข้นของยาต่างกัน เช่น ยา omethoate (Folimat 800 SL) และ 2,4-D เป็นยาปราบศัตรูพืชที่มีความเป็นพิษต่อสาหร่ายทั้งสองชนิดนี้น้อยที่สุด แต่ยา omethoate จะแสดงความเป็นพิษต่อสาหร่าย Anabaena lutea TISTR 8009 มากกว่า A. siamensis TISTR 8012 และ ยา 2,4-D จะแสดงความเป็นพิษต่อสาหร่าย Anabaena siamensis TISTR 8012 มากกว่า A. lutea TISTR 8009

หงษ์เทพ และ นวรัตน์ (2531) ศึกษาอิทธิพลของ Propanyl ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ จากการทดลองนี้ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง

Burgman และ Hallbom (1981) ศึกษาแยกเชื้อ Nostoc ชนิดหนึ่งจากไลเคนส์ Peltigera canina

## อุปกรณ์และวิธีการ

### อุปกรณ์

1. สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ได้แก่  
Anabaena stamensis TISTR 0906  
Anabaena stamensis TISTR 0625
2. เครื่องเขย่าแบบเหวี่ยง (orbital shaker) ติดตั้งหลอดไฟเรืองแสงแบบ  
ธรรมชาติ (Starr, 1973)
3. ขวดบรรจุอาหารเหลวที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ปราศจากสาร  
ประกอบไนโตรเจน (Anterikanda, 1980)
4. จานอาหารวุ้นและหลอดอาหารวุ้นเอียง (agar slant) บรรจุอาหารเดิมที่เดิม  
วุ้นผง 1.0 % และปราศจากเชื้อ
5. Spectrophotometer (Spectronic 21)
6. ที่บดสาหร่าย
7. กล้องจุลทรรศน์
8. จุกสำลี
9. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแยกเชื้อจุลินทรีย์
10. ยาสีฟันคาร์บูทิล 7 ชนิด (ใช้ความเข้มข้นตามที่กำหนดที่ฉลากข้างขวด)

### วิธีการ

1. นำสาหร่ายมาทำการเพิ่มจำนวน โดยนำมาใส่ในขวดบรรจุอาหารเหลว นำ  
ไปวางบนเครื่องเขย่าแบบเหวี่ยง ประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จะปรากฏโคโลนี  
ของสาหร่ายขึ้นอย่างหนาแน่น นำสาหร่ายเหล่านี้เขี่ยลงบนจานอาหารวุ้น โดยวิธี

- Streak plating นำไปเพาะเลี้ยงในชั้นมีแสงของหลอดเรืองแสงชนิดธรรมดา 2 - 3 ลังปาด์ แล้วแยกสาหร่ายไปเลี้ยงในหลอดอาหารเอียง (agar slant)
2. นำสาหร่ายที่เตรียมไว้ นำมาเลี้ยงในขวดบรรจุอาหารเหลวบนเครื่องเขย่าเลี้ยงจนสาหร่ายมีความเข้มข้นที่สามารถวัดความขุ่นด้วยเครื่อง Spectronic 21 ที่ความยาวคลื่น 1,000 นาโนเมตร ได้ค่าความขุ่นเท่ากับ 0.1
  3. นำสาหร่ายจากข้อ 2 นำมาถ่ายลงใน flask ขนาด 125 ml ในปริมาณขวดละ 50 ml.
  4. เตรียมสารละลายของยาปราบศัตรูพืช ที่จะทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่าย ลงในขวดอาหารจากข้อ 3 ตามความเข้มข้นต่าง ๆ
  5. นำขวดเลี้ยงเชื้อเหล่านี้ไปตั้งบนเครื่องเหวี่ยงแบบแกว่งด้วยอัตราเร็ว 200 รอบต่อนาที ให้แสงอ่อน ภายใต้อุณหภูมิห้อง ( $28^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ )
  6. วัดอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยวัดทุก ๆ 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่อง Spectronic 21 ที่ความยาวคลื่น 1,000 นาโนเมตร เป็นเวลา 7 วัน
  7. นำผลที่ได้ผล plot กราฟหาค่า  $LC_{50}$  ต่อไป
- การเปรียบเทียบความร้ายแรงของยาปราบศัตรูพืช ต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ใช้ค่า  $LC_{50}$  (median lethal concentration) เป็นตัวดัชนีในการเปรียบเทียบ

#### หมายเหตุ

1. ค่า  $LC_{50}$  คือ ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเป็น 50 % ของ Control
2. การวัดความขุ่นของสาหร่ายทุกครั้ง จะต้องนำมาบดด้วยที่บดสาหร่ายก่อนที่จะทำการวัด เพื่อให้เกิดการแตกตัวไม่จับเป็นก้อนของสาหร่าย

## ผลการทดลอง

ข้อมูลที่แสดงผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ( $N_2$ -fixing-blue-green algae) แสดงไว้ในรูปที่ 1-7 จากผลการทดลอง ปรากฏว่าสาหร่ายทั้ง 2 หมายเลขมีความทนต่อสารพิษ แตกต่างกันซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ (ตารางที่ 1)

### สารเคมี BAVISAN

- TISTR 0906 : จากรูปที่ 1 พบว่า เมื่อความเข้มข้นของ BAVISAN มีค่าสูงขึ้นอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายลดลงตามลำดับ และ ที่ความเข้มข้นของ BAVISAN 225 ppm เป็นความเข้มข้นที่ทำให้สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเป็น 50% ของความเข้มข้น 0 ppm
- TISTR 0625 : จากรูปที่ 1 พบว่า ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0 จนถึง 200 ppm นั้น อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายมีค่าลดลงตามลำดับ ส่วนความเข้มข้นที่สูงกว่า 200 ppm ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายค่อนข้างจะคงที่ และที่ความเข้มข้นของ BAVISAN ที่ 145 ppm จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายลดลง 50% ของความเข้มข้น 0 ppm

### สารเคมี FUNDAZOL 50

- TISTR 0906 : จากรูปที่ 2 จะพบว่าที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-150 ppm อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายมีค่าคงที่ ส่วนระดับความเข้มข้นที่สูงกว่า 150 ppm ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายลดลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม FUNDAZOL 50 ไม่สามารถทำให้อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายลดลงถึง 50%

**TISTR 0625 :** จากรูปที่ 2 จะพบว่า ความเข้มข้นของ FUNDAZOL ตั้งแต่ 0-50 ppm ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายแต่เมื่อความเข้มข้นเพิ่มเป็น 150 ppm จะทำให้ อัตราการเจริญเติบโตลดลงเหลือ 46.67% และ จะลดลงไปตามความเข้มข้นของ FUNDAZOL ที่เพิ่มขึ้น ที่ความเข้มข้น 145 ppm เป็นความเข้มข้นเริ่มที่ทำให้สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 50% ของความเข้มข้น 0 ppm

**สารเคมี SAPROL และ สารเคมี S-85**

**TISTR 0906 และ TISTR 0625 :**

จากรูปที่ 3 และรูปที่ 4 จะพบว่าสาหร่ายทั้ง 2 หมายเลข ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกระดับความเข้มข้นของ SAPROL และ S-85 ที่ศึกษา

**สารเคมี VITAVAX**

**TISTR 0906 และ TISTR 0625 :**

ผลของยา VITAVAX ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย TISTR 0906 และ TISTR 0625 ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5 จะพบว่าที่ระดับความเข้มข้นของ VITAVAX 0 ppm จนถึง 160 ppm อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ที่ความเข้มข้นที่ 160 ppm ถึง 240 ppm อัตราการเจริญเติบโตมีค่าคงที่ หลังจากนั้น จากรูปจะพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้ง 2 หมายเลขจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อใส่ VITAVAX 160 ppm และ อัตราการเจริญเติบโตจะคงที่จนถึงความเข้มข้น 240 ppm หลังจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะลดลงอีกครั้งหนึ่ง ความเข้มข้นที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง 50%

สำหรับหมายเลข TISTR 0906 เท่ากับประมาณ 160 ppm และ TISTR 0625 เท่ากับประมาณ 260 ppm

#### สารเคมี T-ZIM

TISTR 0906 และ TISTR 0625 :

สารเคมี T-ZIM มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้ง 2 หมายเลขค่อนข้างน้อย กล่าวคือ อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะลดลงเหลือ 80% และ 72% สำหรับหมายเลข TISTR 0906 และ TISTR 0625 ตามลำดับ ที่ระดับความเข้มข้นสูงสุด (950 ppm) ที่ใช้การศึกษาครั้งนี้

#### สารเคมี PRONTO 40


TISTR 0906 : จากรูปที่ 7 จะพบว่าที่ความเข้มข้นของ PRONTO 40 ตั้งแต่ 0 ppm จนถึง 850 ppm อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายมีค่าคงที่ ส่วนความเข้มข้นที่สูงกว่า 850 ppm ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะลดลง

TISTR 0625 : จากรูปที่ 7 ที่ความเข้มข้น 0 ppm จนถึง 600 ppm อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะลดลง ส่วนความเข้มข้นที่ 600 ppm ถึง 850 ppm อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายมีค่าคงที่ ส่วนความเข้มข้นที่สูงกว่า 850 ppm ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะลดลง

ตารางที่ 1 : แสดงความร้ายแรงของยาปราบศัตรูพืชต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว โดย  
ใช้อัตราความเข้มข้นระดับ LC<sub>50</sub> (ppm) เป็นดัชนีในการเปรียบเทียบ


Chemical	LC <sub>50</sub>	
	TISTR 0906	TISTR 0625
VITAVAX	< 160	> 240
PRONTO 40	> 900	> 900
T - ZIM	> 350	> 350
BAVISAN	> 225	> 145
FUNDAZOL	> 300	> 245
SAPROL	< 80	< 80
S-85	< 600	< 600

# BAVISAN



**รูปที่ 1** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในยาปราบศัตรูพืช Bavisan


# FUNDAZOL



**รูปที่ 2** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในยาปราบศัตรูพืช Fundazol


99702

# SAPROL




**รูปที่ 3** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในยาปราบศัตรูพืช Saprol

## S-85



**รูปที่ 4** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช S-85


## VITAVAX



**รูปที่ 5** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในยาปราบศัตรูพืช Vitavax



T-ZIM




**รูปที่ 6** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช T-ZIM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ จากเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

## PRONTO\*40



**รูปที่ 7** แสดงผลของอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในสภาพปราศจาก Pronto 40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้-22-การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองสามารถที่จะสรุปผลของยาปราบศัตรูพืชที่มีต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ดังนี้

### A. siamensis TISTR 0906 :

- สามารถเจริญเติบโตได้ในยา PRONTO 40, T-ZIM, FUNDAZOL
- มีอัตราการเจริญลดลงที่ความเข้มข้นสูงในยา BAVIZAN ที่ความเข้มข้น 225 ppm ขึ้นไป
- ไม่มีการเจริญเติบโตที่ทุกความเข้มข้นในยา SAPROL, S-85 และ VITAVAX

### A. siamensis TISTR 0625 :

- สามารถเจริญเติบโตได้ในยา PRONTO 40, T-ZIM
- มีอัตราการเจริญลดลงที่ความเข้มข้นสูงในยา BAVIZAN, VITAVAX และ FUNDAZOL ที่ความเข้มข้น 150 ppm, 250 ppm, 150 ppm ขึ้นไปตามลำดับ
- ไม่มีการเจริญเติบโตที่ทุกความเข้มข้นในยา SAPROL, S-85

จากการทดลองพบว่า PRONTO 40 และ T-ZIM เป็นยาปราบศัตรูพืชที่มีพิษต่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสายพันธุ์ที่ทดลองน้อยที่สุด และ SAPROL และ S-85 มีความเป็นพิษต่อสาหร่ายสายพันธุ์ที่ทดลองมากที่สุด และสาหร่ายทั้งสองนี้สามารถเจริญเติบโตในยาปราบศัตรูพืชได้ต่างกัน โดย Anabaene siamensis TISTR 0906 สามารถเจริญได้ดีกว่า A. siamensis TISTR 0625 ที่ความเข้มข้นของยาปราบศัตรูพืชชนิดเดียวกัน

## วิจารณ์ผลการทดลอง

จากผลการทดลองเป็นข้อยืนยันว่าสาหร่ายที่มีสาหร่ายพันธุ์เดียวกัน แต่คนละหม้อ เลขกันนั้นมีความแตกต่างของการเจริญเติบโตในสภาพปราศศัตรูพืชได้ต่างกัน สามารถทนทานต่อสภาพปราศศัตรูพืชได้ต่างชนิด และ อัตราของยาที่ต่างกัน ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองของ พงษ์เทพ และ คณะ (2530) ที่พบว่าสาหร่ายต่างสายพันธุ์มีความทนต่อชนิด และ ความเข้มข้นของสภาพปราศศัตรูพืชต่างกัน เมื่อให้สภาพปราศศัตรูพืช ในอัตราที่เกษตรกรใช้ในการปราศศัตรูพืชโดยทั่วไป ยานางชนิดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดหนึ่ง แต่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดอีกชนิดหนึ่งได้ ดังนั้น การคัดเลือกสายพันธุ์ของสาหร่าย ที่ทนต่อสภาพปราศศัตรูพืชชนิดต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ควรใช้สาหร่ายหลายสายพันธุ์ร่วมกันแต่ในการทดลองความเป็นพิษของสภาพปราศศัตรูพืชต่อสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ จะแสดงความเป็นพิษสูงกว่าในสภาพนาข้าวเนื่องจากมีจุลินทรีย์อื่นๆ ที่ช่วยย่อยสลายสารพิษได้ และ สารพิษบางชนิดมีความคงทน (persistence) ต่ำ จะมีพิษในช่วงสั้นๆ ดังนั้นหลังจากพิษสลายตัวสาหร่ายก็สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตต่อไปได้ อย่างไรก็ตามถ้ามีการใช้สภาพปราศศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องในเวลานานๆ อาจทำให้สาหร่ายไม่สามารถปรับตัวซึ่งจะทำให้สาหร่ายนั้นตายอย่างถาวร (บรรณต, 2524)

## เอกสารอ้างอิง

1. กัญจนภาชน์ ลีวมนิพนธ์. 2527. สาทราษฎร์. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 231 หน้า
2. ปกรณ์ สุเมธานุรักษ์กุล. 2524. สารฆ่าแมลง กับ ภัยต่อสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 121 หน้า
3. ทิพนวรรณ แม้วสกุล. 2530. การนำสาหร่ายมาใช้ในการรักษาคุณภาพน้ำในระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับเลี้ยงปลานิล วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นงศ์เทพ อันตะริการนนท์ นรทิพย์ ตันท์เจริญรัตน์ และ อภาวรัตน์ เชษฐสุนทร. 2530. การสร้างและปลดปล่อยสารปฏิชีวนะจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้าที่ 69-79
5. นงศ์เทพ อันตะริการนนท์ และ สมถวิล วัลลิสุต. 2530. การศึกษาการแพร่กระจายของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจน. รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นงศ์เทพ อันตะริการนนท์ และ นวรัตน์ เหล่าชวลิตกุล. 2531. อีทธิพลของ Propanil ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ รายงานผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 26 สาขาวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร
7. นงศ์เทพ อันตะริการนนท์ และ บุษกร อารยางกูร. 2532. คลังเก็บรักษาสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27
8. บรรพต ณ ป้อมเพชร. 2524. หลักการควบคุมแมลง ศัตรูพืช ความรู้พื้นฐาน และความปลอดภัยเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืช. ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 231 หน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. สมิตรา กุวโรดม. 2532. ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 179 หน้า
10. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ. 2519. ฮาฆ่าแมลง. แผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 175 หน้า
11. ศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว. 2530. กรมการข้าว กระทรวงเกษตร. โรคข้าว และแมลงศัตรูข้าว. 188 หน้า
12. อักษร ศรีเปล่ง. 2527. สำหรับตอนที่ 1. สำหรับสีน้ำเงินแกมเขียว
13. Antarikanonda, P. 1980. Morphological, Physiological, Biochemical Studies with effectively,  $N_2$ -fixing blue-green algae, Anabaena sp.
14. Bergman, B and Hallbom, L, 1981. Nostoc of Peltogera canina when lichenized and isolated. Can. J. Bot. Vol.60, pp.2092-2098
15. Desikachary, T.V. 1959. Cyanophyta. Indian Agricultural Research Council, New Delhi. pp. 185-616
16. Starr, R.C. 1973. Handbook of Phycological Methods Culture Methods and Growth Measurements (Stein, J.R. editor) Cambridge University Press. pp.172-179
17. Volesky, B., Zajic, J.E., and Knetting, .E. 1970. Properties and products of Algae. New York p.49
18. Chapman, V.J. 1987. Cranbrook Institute of Science and Auckland Uni. 498 p.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก

### N-FREE MEDIUM (Antarikenonda, 1980)


NaCl	0.07	g/l
MgSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	0.38	"
CaCl <sub>2</sub>	0.08	"
K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	0.60	"
Fe(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	0.01	"
Titriplex III (EDTA)	0.027	"
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	0.003	"
MnSO <sub>4</sub> · 4H <sub>2</sub> O	0.002	"
NaMoO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O	0.008	"
ZnSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	0.003	"
CuSO <sub>4</sub> · 5H <sub>2</sub> O	0.00008	"
CoCl <sub>2</sub>	0.00002	"

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 1 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช Bavisan

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช Fundazol

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช Saprool

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช S-85

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 5 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช Vitavax

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 6 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช T-ZIM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 7 แสดงผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  
ในยาปราบศัตรูพืช Pronto 40

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**คุณสมบัติของยาปราบศัตรูพืชที่ใช้ในการทดลองนี้ (คัดลอกจากปรณ , 2524)**

**Bavisan : carbendazim 50 % W.P.**

**Active Ingredient : methy benzimidazol-2-ylcarbamate 50 % W.P.**

**ประโยชน์ :** เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราของโรคข้าว คือ โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดค่าง

**วิธีใช้ :** ใช้ในอัตรา 10 -20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 1-2 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ไร่ ป่นให้ทั่วต้น

**คำเตือน :** คาร์เบนดาซิม เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระมัดระวังอย่าให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง
- ห้ามผสมคาร์เบนดาซิมกับปูนขาว กำมะถัน สารบอร์โดซ์มิกเจอร์
- หลังจากพ่นวัตถุพิษครั้งสุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์จึงจะเก็บกินได้

**การเกิดพิษ :** ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

- การแก้ไขเบื้องต้น :**
1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ
  2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Fundazol 50 : benomyl 50 % W.P.

Active Ingredient : methy 1-(butylcarbamoyl)-2-Ylcarbamate

ประโยชน์ : เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราของโรคข้าว คือ โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า โรคใบจุดสีน้ำตาล

วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา 30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร(ประมาณ 3 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปีบ พ่นเมื่อพบโรครยะขาด

คำเตือน : เบนโนไมล เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระมัดระวังอย่าให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่มาก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง
- หลังจากพ่นวัตถุพิษครั้งสุดท้ายแล้ว 3 สัปดาห์จึงจะเก็บกินได้

การเกิดพิษ : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

- การแก้ไขเบื้องต้น :
1. ถูถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ
  2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

PRONTO 40 : thiabendazole 40 % W.P.

Active Ingredient : 2-(4-thiazolyl)-benzimidazole 40% W.P.

ประโยชน์ : เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อรา สามารถดูดซึมเข้าทางราก ใบ และกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ จึงออกฤทธิ์คงทนในต้นพืชได้นานวัน

วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา 30-45 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร(ประมาณ 2-3 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปีบ น่นทุก 7-10 วัน

คำเตือน : ไทอะเบนดาโซลเป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระมัดระวังอย่าให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง

การเกิดพิษ : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

การแก้ไขเบื้องต้น : 1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ

2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

**SAPROL : triforine**

**19 % W/V EC.**

**Active Ingredient : 1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-formamidoethyl)  
piperazine**

**ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อ  
ราของโรคข้าว คือ โรคใบไหม้**

**วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา 15-20 cc.ผสมน้ำ 20 ลิตร(ประมาณ 2-10 ซ่อนแกง ต่อน้ำ  
1 ไร่ )พ่นเมื่อพบโรคระบาด**

**คำเตือน : triforine เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกัน  
มิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้**

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระวังอย่าให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง

**การเกิดพิษ : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา**

- การแก้พิษเบื้องต้น :**
1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ
  2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

S-85 : carbaryl 85 % W.P.

Active ingredient : 1-naphthyl methylcarbamate

ประโยชน์ : เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูสัตว์  
แมลงศัตรูในโรงเก็บของข้าว คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา 40-60 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร(ประมาณ 4-6 ช้อนแกง) ต่อน้ำ  
1 บิบ พ่นเมื่อพบแมลงระบาด

คำเตือน : คาร์บาริล เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกัน  
มิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระมัดระวังไม่ให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง
- หลังจากพ่นวัตถุพิษครั้งสุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์จึงจะเก็บกินได้

การเกิดพิษ : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

การแก้ไขเบื้องต้น : 1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ  
2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

**T-ZIM : carbendazim 50 % W.P.**

**Active Ingredient : methy benzimidazol-2-ylcarbamate 50 % W.P.**

**ประโยชน์ :** เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราของโรคข้าว คือ โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดต่าง

**วิธีใช้ :** ใช้ในอัตรา 10 -20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร(ประมาณ 1-2 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 1 ไร่ ป่นให้ทั่วต้น

**คำเตือน :** คาร์เบนดาซิม เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ขณะพ่นยาต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระวังอย่าให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง
- ห้ามผสมคาร์เบนดาซิมกับปูนขาว กำมะถัน สารบอร์โดซ์มิกเจอร์
- หลังจากพ่นวัตถุพิษครั้งสุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์จึงจะเก็บกินได้

**การเกิดพิษ :** ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

**การแก้ไขเบื้องต้น :** 1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ

2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

VITAVAX : carboxin 75 % W.P.

Active Ingredient : 5,6-dihydro-2-methy-1,4-oxathi-ine-3-carboxenilide

ประโยชน์ : เป็นวัตถุพิษชนิดดูดซึม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราของโรคข้าวสาลี คือโรคกล้าแห้ง

วิธีใช้ : ใช้ในอัตรา 0.5 กรัม คลุกเมล็ด 1 กก. ก่อนปลูก

คำเตือน : คาร์บอกซิน เป็นวัตถุพิษที่มีอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ขณะคลุกเมล็ดควรสวมถุงมือเสมอ
- ระมัดระวังไม่ให้วัตถุพิษเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
- หลังการพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องพ่นวัตถุพิษ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง

การเกิดพิษ : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และตา

- การแก้ไขเบื้องต้น :
1. ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ
  2. หากกลืนเข้าไป ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้