

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
ภาควิชาพืชสวน

เรื่อง

ผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวานในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน
Influence of Temperature Levels on Quality and Storage Life of *Sauropus androgynus*
Stored in Polyethylene Bag

โดย
นาย นันทพงศ์ นานอน

ได้รับพิจารณาเห็นชอบโดย



(รศ.ดร. สมชาย กล้าหาญ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 18 เดือน 12 พ.ศ. ๕๐๙

ภาควิชารับรองแล้ว



(รศ.ดร. สมชาย กล้าหาญ)

หัวหน้าภาควิชาพืชสวน

วันที่ 18 เดือน 12 พ.ศ. ๕๐๙

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัญหาพิเศษปริญาตรี

เรื่อง

ผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวานในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน
Influence of Temperature Levels on Quality and Storage Life of *Sauropus androgynus*
Stored in Polyethylene Bag



โดย
นาย นันทพงศ์ นานอน
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย กกล้าหาญ

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 73471
วัน,เดือน,ปี ๑๐ ก.ค. 2550

เสนอ

b 112 98 12 x
i.....

ภาควิชา พืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง	ผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวาน ในถุงพลาสติก โพลีเอทิลีน
โดย	นาย นันทพงษ์ นานอน
สาขาวิชา	พืชสวน
ภาควิชา	พืชสวน
คณะ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร. สมชาย กล้าหาญ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวานในถุงพลาสติก โพลีเอทิลีน โดยการวางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย 10 วิธีการ ๆ ละ 3 ซ้ำ โดยทำการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ดังนี้ เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง แบบเปิดปากถุง, รักษาที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, รักษาที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, เก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, เก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, เก็บที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ผลปรากฏว่า ผักหวานที่มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นมีค่าระหว่าง 0.23-14.29 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ TSS ของผักหวานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งมีค่าระหว่าง 4.50-6.25 brix ส่วนเปอร์เซ็นต์ TA ลดลงมีค่าระหว่าง 1.66 - 5.80 เปอร์เซ็นต์ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก PE ที่อุณหภูมิห้อง แบบเปิดปากถุง มีอายุการเก็บรักษาน้อยที่สุดคือ 4 วัน ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก PE ที่อุณหภูมิ 5, 10 และ 15 องศาเซลเซียส แบบปิดปากถุงและผักหวานที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก PE ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ร่วมกันกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีอายุการเก็บรักษายาวนานที่สุดคือ 12 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title Influence of Temperature Levels on Quality and Storage Life of *Sauropus androgynus* Stored in Polyethylene Bag

By Mr.Nantapong Nanon

Department Horticulture

Faculty Agricultural Technology

Advisor Assoc.Prof.Dr.Somchai Glahan

Abstract

Study on influence of temperature levels on quality and storage life of *Sauropus androgynus* stored in polyethylene (PE) . The statistical model was completely randomized design, comprised of 10 treatment and 3 replications as followed at room temperature close packaging, stored at 5°C close packaging, stored at 10 °C close packaging , stored at 20 °C close packaging, stored at 5°C with CO₂:O₂ 5:0 PSI close packaging, 10°C with CO₂:O₂ 5:0 PSI close packaging, 15°C with CO₂:O₂ 5:0 PSI close packaging, 20°C with CO₂:O₂ 5:0 PSI close packaging. The result showed that fresh weight lost of *Sauropus androgynus* increased according to storage time at the range of 0.23-14.29 percentage. TSS content of all treatment slightly decreased according to storage time increased with range of 4.50-6.25 brix . TA content of all treatment slightly decreased according to storage time increased with range of 1.66-5.80 percen. *Sauropus androgynus* stored in PE at room temperature open packaging had the shortest storage life with 4 day , and those stored in PE at 5, 10 and 15 °C close packaging and *Sauropus androgynus* stored in PE at 5 °C and CO₂:O₂ 5:0 PSI close packaging had the longest storage life with 12 days.

คำนิยม

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สมชาย กล้าหาญ ที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการทำปัญหาพิเศษพร้อมทั้งเอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งปัญหาพิเศษฉบับนี้สามารถสำเร็จลงได้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มความสามารถ

ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้มาศึกษาต่อจนประสบความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้โอกาสทางการศึกษาจนกระทั่งข้าพเจ้าสามารถบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังไว้

ขอขอบคุณ พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามาโดยตลอด

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นาย นันทพงศ์ นานอน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	I
Abstract	II
คำนิยาม	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	V
สารบัญภาพ	VI
สารบัญภาพผนวก	VII
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	2
ตรวจสอบเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	11
การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล	13
ผลการทดลอง	15
สรุปผลการทดลอง	39
วิจารณ์ผลการทดลอง	41
เอกสารอ้างอิง	42
ภาคผนวก	43

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวาน ภายหลังการเก็บรักษา 2,4, 6,8 และ 10 วัน	18
2. แสดงค่าเฉลี่ยเจือปริมาณ total soluble solid (TSS) ของผักหวาน ก่อนและหลังการเก็บรักษา 2,4, 6,8 และ 10 วัน	23
3. แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณ titrable acidity (TA) ของผักหวาน ก่อนการเก็บและหลังการเก็บรักษา 2,4, 6,7,8 และ 10 วัน	28
4. แสดงลักษณะการเปลี่ยนสีของผักหวานก่อนและ หลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน	34
5. แสดงคุณภาพทางกลิ่นของผักหวานก่อนและ ภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน	36
6. แสดงอายุการเก็บรักษาผักหวานในแต่ละวิธีการ	37

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวาน ภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8 และ 10 วัน	19
2. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณ total soluble solid (TSS) ของผักหวาน ภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8 และ 10 วัน	24
3. กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ titrable acidity (TA) ของผักหวาน ก่อนและหลังการ เก็บรักษา 2,4,6,7,8 และ 10 วัน	29



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพผนวก

ภาพผนวกที่	หน้า
1. แสดงถึงลักษณะผักหวานก่อนการเก็บรักษา	44
2. แสดงถึงลักษณะผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน	45
3. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 3 วัน	46
4. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน	47
5. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 5 วัน	48
6. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 6 วัน	49
7. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 7 วัน	50
8. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 9 วัน	51
9. แสดงถึงลักษณะของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา 13 วัน	52
10. แสดง ถึงลักษณะของผักหวานที่นำหลังจากการทำการเก็บรักษา	53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ผักหวาน (*Sauropus androgynus* (L.) Merr.) เป็นพืชที่คนไทยรู้จักมาช้านานในชื่อที่แตกต่างกันไป ผักหวานมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ผักหวานบ้าน ผักหวาน (ทั่วไป) ก้านคงจ้ำ ผักหวาน ผักหลน (ทางภาคเหนือ) โดหฺลฺยฺกะนิเตาะ (กะเหรี่ยง ; แม่ฮ่องสอน) นานาเซียม (มาเลเซีย) ผักหวานไค้ใบ (สตูล) มะขมป่า (ประจวบคีรีขันธ์) ผักหวานเป็นพืชที่คุณค่าทางอาหารสูงและทรงคุณค่ามาก เนื่องจากมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน รวมถึงแคลเซียม ฟอสฟอรัส ที่ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนี้ผักหวานสดยังมีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งวิตามินซีเป็นแอนติออกซิเดนต์ที่ช่วยให้เนื้อเยื่อหรือเซลล์ภายในร่างกาย ถูกทำลายจากมลพิษทางอากาศ และรังสีจากแสงแดดที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าการแก่ก่อนวัย รวมถึงผิวหนังที่เยียวคันด้วย ที่สำคัญผักหวานยังมีเบต้า-แคโรทีน ที่มีอยู่ในผักใบเขียวทั่ว ๆ ไปซึ่งจัดเป็นแอนติออกซิเดนต์ตัวหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอแล้ว จะช่วยให้สามารถเห็นได้ดีในที่มืดและยังเพิ่มความแข็งแรงให้ภูมิคุ้มกันเอาไว้ต่อสู้กับโรคติดเชื้อ

ผักหวานที่นำมาทำการเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องปกติอายุที่สั้นที่สุด คือประมาณ 3 วัน ดังนั้นเพื่อให้ผักหวานมีอายุการวางจำหน่ายในท้องตลาดยาวนานขึ้น เราควรรักษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งในปัจจุบันได้มีวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษา การทดลองนี้ได้นำวิธีการเก็บรักษาแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงมาใช้ โดยใช้การเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณของก๊าซออกซิเจนลงโดยใช้อัตราส่วนของก๊าซเป็น 5:0 PSI แล้วนำมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ โดยมีจุดหมายว่าการทดลองครั้งนี้จะสามารถเป็นวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผักหวาน ให้ยาวนานขึ้นกว่าการเก็บรักษาแบบธรรมดา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของระดับอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผักหวาน
2. เพื่อศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาผักหวานที่เหมาะสมก่อนจำหน่าย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตรวจเอกสาร

ผักหวานบ้าน

ชื่อ วิทยาศาสตร์ : *Sauropus androgynus* (L.) Merr

วงศ์ : Euphorbiaceae

ชื่อตามท้องถิ่น : ผักหวานบ้าน ผักหวาน (ทั่วไป)
บ้านตง จ้าผักหวาน ผักหลน (ทางภาคเหนือ)

โถงลุ่มกะนิเตาะ (กะเหรี่ยง ; แม่ฮ่องสอน)

นานาเขียม (มาเลเซีย)

ผักหวานใต้ใบ (สตูล)

มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์)

ถิ่นกำเนิด : ประเทศมาเลเซีย และปลูกทั่วไปในประเทศทางเอเชีย
(เพ็ญญา, 2542)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นตั้งตรงเปลือกขรุขระ สีน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียวเข้มผิวมันเรียบ

ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ก้านใบกว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.6 เซนติเมตร มีหูใบเล็กๆ ที่โคนก้านใบ ด้านบนสีเขียวเข้ม

ดอก ดอกช่อเป็นกระจุกที่ซอกใบ มีดอกตัวเมีย 1-3 ดอก และดอกตัวผู้จำนวนมากไม่มีกลีบดอกดอกตัวเมียงกลีบเลี้ยงสีแดงเข้มหรือสีแดงเข้ม ช่อดอกยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร

ผล จะมีลักษณะกลมเป็นฉ่ำน้ำ ภายในแบ่งเป็น 6 พู พูละ 1 เมล็ด ผลสีเขียวอ่อนและเมื่อผลแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลือง ผลแห้งแตกได้ เมล็ดมีขนาดเล็กสีดำ

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง สามารถเก็บส่วนต่างๆ มาขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตคือดินร่วนมีความชุ่มชื้นระบายน้ำดีสามารถขึ้นเองได้ตามป่าละเมาะที่กรังว่างเปล่าต่างๆ ปลูกตามบ้านเรือนและสวนไรรักษา (เพ็ญญา, 2542)

การใช้ประโยชน์

ทางอาหาร ยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อน ใช้ต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริก แกงจืด แกงปลาอย่างทางยา ใบและต้น ปรุงเป็นยาเขียว มีรสหวานมีรสหวานเย็น น้ำยางใช้หยอดเป็นยาแก้ไอเสบ รักษาแผลในจมูก ชาวกะเหรี่ยง มูเซอ ใช้ทั้งใบคั้นคั้นน้ำอาบ เทียบกินสดๆ แก้ปวดมั่วยตามร่างกาย เป็นยาบำรุงสุขภาพสำหรับสตรีหลังคลอด สรรพคุณจากใบและลำต้นด้วยแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลเห็นใบใช้ประโยชน์ตามการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIV-1 reverse transcriptase เล็กน้อย ใบบ่มสาร Papaverine กินมากจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และท้องผูกจึงห้ามรับประทานสด ราก คำให้ละเอียดใช้ฝอยฝี คั้นเป็นยาแก้ไอ ถอนพิษไข้ รักษา คางทูม (เพ็ญภา, 2542)

การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง

1. การเก็บรักษาผลผลิตภายใต้บรรยากาศภายใต้สภาพที่มีชนิด และ/หรือ ความเข้มข้นของ ก๊าซแตกต่างกันไปจากสภาพบรรยากาศปกติ โดยทั่วไปจะเน้นความสำคัญอย่างยิ่งต่อขบวนการเมตาบอลิซึมของผลจริง (จริงแท้, 2541)

การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง เป็นการปรับองค์ประกอบก๊าซเป็นเพียง ช่วงกว้างๆ เท่านั้นไม่ต้องควบคุมให้อยู่ที่ระดับ หรือจุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่นอนตลอดการเก็บรักษา (Zagory and Kader, 1998)

หลักการเบื้องต้นของการเก็บรักษาในบรรยากาศดัดแปลงคือการเก็บรักษาในสภาพ บรรยากาศดัดแปลง คือการเก็บรักษาผลผลิตในสภาพบรรยากาศที่มีปริมาณ O_2 ต่ำและ/หรือมี ปริมาณ CO_2 มากกว่าปกติการเก็บรักษาผลผลิตในถุงพลาสติกปิดสนิทเป็นการเก็บรักษาภายใต้ สภาพบรรยากาศดัดแปลงโดยทำให้ O_2 ลดต่ำมาก ๆ และปริมาณ CO_2 เพิ่มขึ้นมากจนทำให้เกิด การหายใจแบบไม่ใช้ O_2 ดังนั้นการบรรจุหีบห่อจึงเป็นการดัดแปลงบรรยากาศรอบๆ ผลผลิตด้วย โดยถุงพลาสติกจะเป็นตัวจำกัดการแลกเปลี่ยนก๊าซ O_2 และก๊าซ CO_2 ระหว่างบรรยากาศนอก ถุงพลาสติก ทำให้บรรยากาศภายในถุงพลาสติกมี O_2 น้อย และมี CO_2 มาก ในสภาพดังกล่าวจะทำให้ สามารถชะลอการสุกได้ (จริงแท้, 2524)

การเก็บรักษาผลผลิตโดยการควบคุมสภาพของบรรยากาศนั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดีได้นาน โดยมีหลักการของการเก็บรักษา คือ ควบคุมปริมาณ ก๊าซ CO_2 กับ O_2 ซึ่งจัดควบคุมให้มีปริมาณก๊าซ O_2 ต่ำกว่าปกติและเพิ่มปริมาณก๊าซ CO_2 ให้สูงขึ้น กว่าสภาพบรรยากาศปกติ การเก็บรักษาผลผลิตด้วยวิธีนี้ จะยับยั้งขบวนการสุกการ senescence หรือ ชะลอขบวนการดังกล่าวให้เกิดขึ้นน้อยหรือให้ช้า ๆ ได้ (สมชาย, 2545)

การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว

หลังการเก็บเกี่ยวแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่อไปนี้

1. การหายใจหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้อุดมกับการหายใจตลอดเวลา เช่นเดียวกับเซลล์ที่มีชีวิตอยู่บน ดินไม้ การหายใจเป็นกระบวนการเผาผลาญอาหารสะสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ำตาล หรือแป้งไปเป็น พลังงาน ทำให้อาหารที่มีสะสมอยู่ในผลผลิตลดลง ส่งผลให้คุณภาพในการบริโภคลดต่ำลง นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาด้วย ซึ่งมีผลให้ผลผลิตมีอุณหภูมิ

ลดลง นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาด้วย ซึ่งมีผลให้ผลผลิตมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการหายใจ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ

1.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุของการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของการหายใจมีอยู่ในช่วงเวลาระหว่างการพัฒนาของพืช คือ ผลไม้ขณะที่ยังมีขนาดเล็กจะมีอัตราการหายใจสูงกว่าเมื่อมีขนาดใหญ่ ขนาดของพืชมีผลต่ออัตราการหายใจ เช่น หัวมันที่มีขนาดเล็กจะมีอัตราการหายใจสูงกว่าขนาดใหญ่ สารธรรมชาติที่เคลือบสารผิวผลไม้นี้ด้วยไขมันอย่างดี เป็นตัวจำกัดการแลกเปลี่ยนก๊าซ ทำให้มีอัตราการหายใจน้อย ชนิดของเนื้อเยื่อ พืชเนื้อเยื่อที่ยังมีอายุน้อยกำลังเจริญเติบโตมีอัตราการหายใจมากกว่าเนื้อเยื่อที่หยุดการเจริญเติบโต (จริงแท้, 2541)

1.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิระหว่าง 32-39 องศาฟาเรนไฮด์ ทำให้อัตราการหายใจของผักผลไม้เพิ่มขึ้น สารเอธิลีนสามารถกระตุ้นให้ผักผลไม้หายใจเพิ่มมากขึ้น (สมชาย, 2545)

2. การคายน้ำ ผักผลไม้ต่าง ๆ ต้องคายน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหายใจในขณะเดียวกัน ปริมาณความชื้นภายในมักจะมีอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และสูงกว่าความชื้นภายนอก ดังนั้นน้ำภายในผลจะพยายามเคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกผลตลอดเวลาถึงแม้ผลไม้จะมีโครงสร้างต่างๆ เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ เช่น ชั้นของไข และคอร์กที่ปกคลุมผิวอยู่ แต่ผลไม้ก็มีช่องเปิดต่างๆ ที่ยอมให้น้ำผ่านเข้าออกทำให้ผลไม้สูญเสียน้ำตลอดเวลา

3. เกิดการสุกของผลไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการหลายอย่างทั้งกระบวนการสร้าง และที่เป็น การสลาย ซึ่ง กระบวนการสุกของผลไม้ได้แก่ การเปลี่ยนสี การหายใจ การอ่อนตัวของเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์เอธิลีน การสังเคราะห์

4. การสร้างสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (กลิ่นและรส) ในผลไม้แต่ละชนิดมีกลิ่นไม่เหมือนกันมีกาสร้างกลิ่นไม่เท่ากัน และยังทำให้ผลไม้มีรสชาติหรือเอนไซม์

5. การสร้างก๊าซเอธิลีนที่ระเหยได้ ในผลไม้ประเภท จะมีการสร้างก๊าซเอธิลีน จากขบวนการสุก และยังมีกาสร้างก๊าซเอธิลีนจากการกระตุ้นของบาดแผล ก๊าซเอธิลีนจะเป็นตัวส่งเสริมให้ผลไม้สุกและเน่าเสีย

การเก็บรักษาผลผลิตในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

เทคนิค MAP (modified atmosphere packaging) เป็นวิธีการเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ ดัดแปลงมาจากวิธี MA จะมีข้อดีต่างกันตรงที่วิธี MA จะเป็นการเก็บรักษาผลผลิตภายในถุงพลาสติกหรือฟิล์มชนิดพิเศษ (อรทัย, 2543)

Kader (1986) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพทางประสาทสัมผัส เช่น สีกลิ่นรส และคุณค่าทางอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเก็บรักษาภายใต้ MAP สามารถสรุปได้ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. การเปลี่ยนแปลงสี ในสภาพบรรยากาศที่มีปริมาณ O_2 น้อยกว่าและ CO_2 มากจะช่วยการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ และลดการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์และแอนโทไซยานินซึ่งรงควัตถุ 2 ชนิดนี้จะทำให้เกิดสีเหลือง ส้ม และแดงน้ำเงินแก่พืชตามลำดับตัวอย่างเช่นปริมาณ ที่ 2 เปอร์เซ็นต์และปริมาณ CO_2 ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยลดการสร้างแอนโทไซยานินซึ่งรงควัตถุ 2 ชนิดนี้จะทำให้เกิดสีเหลือง - ส้ม และแดงน้ำเงินแก่พืชตามลำดับตัวอย่างเช่นปริมาณ O_2 ที่ 2 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณ CO_2 ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยลดการสร้างแอนโทไซยานินของลูกพลับสคได้ อย่างไรก็ตามก็ควรคำนึงถึงการใช้ CO_2 ไม่ควรให้มากเกินไปเพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผักและผลไม้

2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส (texture change) CO_2 มีผลต่อการอ่อนนุ่มของผลไม้มากกว่า O_2 แต่กลไกการเกิดปรากฏการณ์นี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ตัวอย่างเช่น ปริมาณ CO_2 ที่ 10 เปอร์เซ็นต์สามารถป้องกันมิให้เนื้อของบร็อคโคลี่เหี่ยวแต่กลับอ่อนนุ่มพอดี (tender) และนุ่มกว่าตอนเก็บเกี่ยวใหม่ๆและเมื่อความเข้มข้นของ CO_2 ไม่ควรให้มากเกินไปเพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผักและผลไม้ได้

3. การเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส (flavor change) สารที่ให้กลิ่นรสของผักและผลไม้ ได้มาจากการหายใจและเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ในพืชตัวอย่างเช่น O_2 ปริมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์จะช่วยลดการสูญเสียของกรดในแอปเปิ้ลพันธุ์ต่าง ๆ Golden Delicious สิ่งที่ดีควรระวังคือถ้า O_2 และ CO_2 มีความเข้มข้นในช่วงที่พืชทนทานไม่ได้ จะเกิดกลิ่นรสผิดปกติ เนื่องจากการสะสมแอลกอฮอล์และอัลดีไฮด์ ที่ได้จากการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน

4. การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางอาหาร (Nutritional change) โดยทั่วไป MAP จะช่วยรักษาปริมาณแอสคอร์บิก (nutritional change) หรือวิตามิน C ในผักผลไม้ นั้น ได้ดีกว่าการเก็บรักษาในบรรยากาศปกติ ตัวอย่างเช่น ในบรรยากาศปกติ ตัวอย่างเช่น ในบรรยากาศที่มี O_2 เปอร์เซ็นต์ CO_2 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดการสลายตัวของวิตามิน C ในผักขมได้ถึงร้อยละ 50 เทียบกับการเก็บรักษาในบรรยากาศปกติ

ในสภาพที่มีความเข้มข้นของ O_2 และ CO_2 หรือมีความเข้มข้นของ CO_2 สูงกว่าปกติ กระบวนการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมชราจะถูกยับยั้งหรือเกิดช้าลง กระบวนการเหล่านี้ได้แก่การเน่า การสูญเสียคลอโรฟิลล์หรือเกิดสีเหลือง การสูญเสียกรด การเกิดกลิ่น และรวมไปถึงการยับยั้งการหายใจ (Kader, 1980)

ความเข้มข้นของก๊าซที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ คือ CO_2 และ O_2 เพราะในการหายใจของผลผลิตสดจะให้ CO_2 และ O_2 จะต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสม สามารถทำให้อัตราการหายใจของผลผลิตต่ำลงมากที่สุด โดยเกิดการเสื่อมสภาพของผลผลิตสดนั้น

บทบาทที่สำคัญของคาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศปกติจะมีเพียงร้อยละ 0.003 แต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูง ๆ จะมีบทบาทสำคัญมากต่อการเก็บรักษาผลผลิต คุณสมบัติที่สำคัญของ CO₂ คือ

1. ชะลออัตราการหายใจของพืช โดยทั่วไปเมื่อมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอัตราการหายใจของพืชจะลดลง ให้อายุการเก็บรักษาของผักและผลไม้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดพืช การลดอัตราการหายใจของพืชอาจจะได้ผลน้อยเมื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำเกินไป ขณะที่ความเข้มข้นสูงเกินไปอาจทำให้เซลล์ได้รับอันตรายอาจทำให้เกิดการเน่าเสียเร็วยิ่งขึ้น

2. ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด จึงเรียกคาร์บอนไดออกไซด์ ว่า bacteriostatic หรือ fungi static agent คือจะยับยั้งการเจริญเติบโตเท่านั้นมิได้ทำลายหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยทั่วไปจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อยละ 20 ณ สมดุลในบรรยากาศ

3. การตอบสนองของเอธิลีน คาร์บอนไดออกไซด์จะป้องกันการตอบสนองต่อเอธิลีนของพืชได้หรือในบางกรณีอาจทำให้ได้ช้าลง แต่ประสิทธิภาพการระงับการทำงานของเอธิลีนจะดีเมื่อปริมาณของเอธิลีนต่ำในผลไม้หลายชนิดมีการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ภายในช่องว่างระหว่างเซลล์และทำหน้าที่เป็นสารยับยั้งการทำงานของเอธิลีนในผลไม้ดังกล่าว (งามทิพย์, 2538)

4. การผิดปกติทางสรีระวิทยา ในสภาพที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะช่วยลดความอ่อนแอของผลต่อการเกิดอาการสะพานหนาวได้ ซึ่งพบได้ในผลมะม่วงและอโวคาโด (คณีย์, 2540)

บทบาทที่สำคัญของออกซิเจน

ในอากาศมีออกซิเจนสูงประมาณร้อยละ 21 คุณสมบัติคือจำเป็นต่อการหายใจของพืชผักและผลไม้ แม้จะเก็บเกี่ยวจากต้นแล้วก็ตาม ยังมีการหายใจตลอดเวลาจนกว่าเซลล์จะตาย (งามทิพย์, 2538)

1. การสังเคราะห์เอธิลีน ถ้าดับสุดท้ายของการสังเคราะห์เอธิลีนของพืช จะต้องใช้ออกซิเจน การลดปริมาณออกซิเจนลงจะยับยั้งหรือลดการผลิตเอธิลีนลงการทำงานของเอธิลีนก็เช่นเดียวกันพบว่าต้องการออกซิเจน

2. บรรยากาศปกติมีออกซิเจนเป็นตัวประกอบ ซึ่งจำเป็นสำหรับการหายใจของผลผลิต โดยเฉพาะกับผลผลิตที่กำลังเจริญเติบโต ในการเก็บรักษาถ้ามีปริมาณออกซิเจนต่ำ จะช่วยลดอัตรา

การหายใจ และยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้ แต่ถ้าน้อยเกินไปอาจทำให้ผลไม้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้ผลผลิต

การลดปริมาณออกซิเจนจะยับยั้งหรือลดการผลิตเอธิลีนการเก็บรักษาภายใต้สภาพบรรยากาศที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำสามารถชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ได้ง่ายและจะยับยั้งการเปลี่ยนสีของเปลือกเป็นสีน้ำตาลออกซิเจนแรงให้เกิดการสูญเสียกรดแอสคอร์บิกเร็วขึ้นออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 20 การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ไม่มากนัก แต่เมื่อความเข้มข้นลดลงเหลือร้อยละ 2 หรือต่ำกว่าจึงเห็นผล แต่ความเข้มข้นระดับนี้ผลิตผลหลายชนิดไม่อาจทนอยู่ได้ออกซิเจนต่ำยังไปขัดขวางการสร้างเพอร์ซิเคียมในขบวนการสภาวะแวดล้อม

ปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศ มีผลต่อการสุกของผลไม้ การเพิ่มปริมาณของออกซิเจนให้สูงกว่าบรรยากาศปกติ อาจเร่งหรือไม่มีผลต่อการสุกของผลไม้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ การลดปริมาณของออกซิเจนในอากาศสูง เพราะอัตราหายใจและเมตาบอลิซึมภายในเซลล์เกิดช้าลงการสังเคราะห์เอธิลีนลดน้อยลง และความไวของของผลไม้ต่อการทำลายของเอธิลีนให้ช้าลงด้วย ปริมาณออกซิเจนต่ำสุดที่ยับยั้งการสุกจะไม่มีผลต่อสรีรวิทยาที่สำคัญต่อผลไม้

บทบาทของเอธิลีน

เอธิลีน เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัวที่มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปรกติ มีสูตรโมเลกุลคือ C_2H_4 และมีน้ำหนักโมเลกุล 28 เอธิลีนจัดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่การเจริญเติบโต การพัฒนา การแก่ การสุก และการเสื่อมสภาพในผลไม้ ขณะการเจริญเติบโตในช่วงของการแบ่งเซลล์จะมีการสังเคราะห์เอธิลีนสูงมาก การให้เอธิลีนจากภายนอกแก่ผลไม้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทั้งการเปลี่ยนสีผิวและการอ่อนตัวตัวของผลไม้ (softening) เมื่อผลไม้มีระยะแก่เต็มที่จะมีอัตราการสังเคราะห์เอธิลีนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเนื้อเยื่อของผลไม้มีความไวในการตอบสนองต่อเอธิลีนเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการกระตุ้นของเอธิลีน เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการสุกของผลไม้ และเอธิลีนทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดกระบวนการสุกของผลไม้

การสังเคราะห์เอธิลีนในเซลล์พืชมีสารเริ่มต้นจากกรดอะมิโนเมทไธโอนีน (methionine) และอาจจะมีการสังเคราะห์เอธิลีนเพียงเล็กน้อย จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดคลิโนเลอิคเมทไธโอนีนเป็นสารเริ่มต้นในปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอธิลีนซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเอธิลีนได้อย่างรวดเร็วและต้องการ O_2 ในการสังเคราะห์ด้วย (คณัย, 2540)

การผลิตเอธิลีน เนื้อเยื่อทุกชนิดสร้างเอธิลีนได้ โดยปกติปริมาณการผลิตเอธิลีนจะมีน้อย แต่เมื่อผลสุกหรือผลิตผลถูกกระทบกระเทือนด้วยอะไรก็ตาม จะมีการสร้างเอธิลีนเกิดขึ้นเป็นอันมาก และเอธิลีนจะไปกระตุ้นการกระบวนการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ เช่น การกระบวนการสุกการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ เอธิลีนจะเกิดขึ้นจากการแหล่งอื่น ๆ อีก เช่น จากเชื้อรา จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

เอกลีกรีนเป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ญาติเห็นใบเขียวประเขินต้นการคำ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่าง ๆ เอธิลีนจากภายนอกสามารถกระตุ้นให้ผลไม้ผลิตเอธิลีนในปริมาณที่สูงขึ้นได้ หากให้เอธิลีนก่อนกระบวนการสุกจะเริ่มขึ้น (จริงแท้, 2541)

ประโยชน์ของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง

นอกจากจะชะลอกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในผลผลิตให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้แล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่อื่น ๆ ดังนี้

1. ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีความสมบูรณ์มากมีรสชาติคุณภาพในการบริโภคดีกว่าผลผลิตที่มีความสมบูรณ์น้อยแต่มักเก็บรักษาได้ไม่นานขนส่งไปไม่ได้ไกลการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงสามารถแก้ปัญหานี้ได้
2. ทัศนสภาพไว (sensitivity) ของผลผลิตต่อเอธิลีน ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กระตุ้นโดยเอธิลีนเกิดขึ้นได้ช้าลง ทั้งนี้เพราะคาร์บอนไดออกไซด์มีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับเอธิลีนสามารถนำไปแย่ง active site ของเอธิลีน
3. ลดการเหม็นหืน (rancidity) ในการเก็บรักษาที่มีไขมันมาก เช่น พวกเมล็ดเคี้ยวมัน ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์รวมทั้งเมล็ดถั่วชนิดต่างๆที่เคยอยู่ใน compartment แยกต่างหากจะเล็ดลอดออกมาโดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลทำให้ถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนและทำให้เกิดอาการผิดปกติสีน้ำตาลขึ้น
4. ลดอาการผิดปกติ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการเก็บรักษา เช่น อาการสะท้อนหนาว (chilling injury) ในเซลล์ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เคยอยู่ใน compartment แยกต่างหากจะเล็ดลอดออกมาโดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลทำให้ถูกออกซิเจนและทำให้เกิดอาการผิดปกติสีน้ำตาลขึ้น
5. ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์ที่เจริญได้บนผักผลไม้ส่วนใหญ่เป็น aerobic microorganism เมื่อมีออกซิเจนต่ำทำให้การเจริญเติบโตของผลผลิตลดลงด้วย
6. ลดการเจริญเติบโตของแมลงที่ติดมากับผลผลิตในท่านองเดียวกันกับเชื้อจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นที่จะควบคุมแมลงได้ผล มักเป็นอันตรายต่อผักและผลไม้
7. เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ผลผลิตบางอย่างมีการเจริญเกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยว เช่น หน่อไม้ฝรั่งปริมาณเส้นใยเพิ่มสูงขึ้นระหว่างการเก็บรักษา สภาพบรรยากาศดัดแปลงช่วยชะลอการสร้างเส้นใยในหน่อไม้ฝรั่งได้ (จริงแท้, 2541)

ลักษณะบรรจุ

การใช้บรรจุภัณฑ์นอกจากมีประโยชน์ในการใช้ระบบ MA อาจทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น การทำให้เพิ่มมูลค่า ลดการทำลายด้วยแรงกล ผู้ซื้อขนย้ายได้สะดวก สามารถพิมพ์หรือแสดงรายละเอียดและงูใจผู้ซื้อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำจากสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ ตัวอย่างวัสดุที่ใช้เป็นลักษณะบรรจุแบบ MA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้เพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

polyethylene (PE) ชื่อทางการค้า polyethylene เป็น โพลีเมอร์ของแก๊ซเอทิลีน สมบัติของโพลีเอทิลีนขึ้นอยู่กับความหนาแน่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. low density polyethythyylene (LDPE) ความหนาแน่น 0.915-0.925 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

2. hight density polyethythyylene (HDPE) ความหนาแน่น 0.94-0.961 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

LDPE มีคุณสมบัติเด่นคือ ป้องกันความชื้นได้ดี กันออกซิเจนได้ไม่ดี มีความอ่อน ยืดหยุ่นดี มีความใสอยู่ในระดับดี ไม่มีกลิ่นปะปน จะทำทำปฏิกิริยากับกรดและด่าง ปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ด้านทานทานได้สูง จึงนิยมใช้กับผักและผลไม้ แต่ไม่นิยมใช้กับพวกไขมัน

HDPE มีคุณสมบัติเด่นคือ มีความแข็งแรงและเหนียวกว่า LDPE ทำให้อัตราการซึมผ่านของออกซิเจนลดลง ขอมให้น้ำซึมผ่านได้ต่ำกว่ามาก เหมาะกับอาหารที่เก็บแห้งที่ต้องการดูดซับไอน้ำ เช่นคุกกี้

นอกจากนี้พลาสติกชนิดอื่นๆ อีก เช่น polyolefin film, polyvinylchloride (PVC) polyolefin film อีกด้วย ซึ่งการแพร่ผ่านของก๊าซผ่าน plastic film ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพลาสติกฟิล์ม ความสามารถในการซึมผ่านก๊าซผ่านแผ่นฟิล์มของก๊าซแต่ละชนิด ความหนา พื้นที่ความเข้มข้น ก๊าซ อุณหภูมิ ความแตกต่างของความดัน ประสิทธิภาพในการบรรจุ และความเร็วของอากาศรอบภาชนะบรรจุ

การเลือกชนิดพลาสติกฟิล์มขึ้นอยู่กับอัตราการหายใจของผักและผลไม้ที่ต้องการอุณหภูมิ (Tungjaroenchai, 1980)

อุปกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง

อุปกรณ์

1. ผักหวาน
2. เครื่องชั่งน้ำหนัก
3. เครื่องมือ hand refractometer
4. ถุงพลาสติก polyethylene
5. micropipette
6. สาร NaOH 0.1 N (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
7. สาร phenolphthalein 1 %
8. beaker
9. สารดูดซับเอทิลีน (ethylene absorbent:EA)
10. แผ่นเทียบสี
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
12. ก๊าซออกซิเจน
13. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
14. เครื่องผนึกสุญญากาศ (vacuum sealer)
15. berette
16. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น มีดตะกร้า กระดาษทิชชู

วิธีการทดลอง

การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD)

ประกอบด้วย 10 treatment แต่ละ treatment มี 3 replication แต่ละ replication มี 1 ถุง ถุงละ 50 กรัม

ขั้นตอนการทดลอง

1. ทำการตัดผักหวานที่ปราศจากโรคและแมลง
2. ทำความสะอาดผักหวาน
3. ชั่งน้ำหนักผักหวานครั้งละ 50 กรัม
4. นำผักหวานบรรจุถุงพลาสติก polyethylene (PE) ถุงละ 50 กรัม
5. บรรจุสารดูดซับ (ethylene absorbent:EA) 2 %, 4 % และ 6 % ของน้ำหนักสดผักหวาน
6. ติด label บอกปริมาณน้ำหนัก, EA และ treatment ไว้ที่ถุง

เอกสารนี้เป็นเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. นำเข้าเครื่องศนิกสูญอากาศ และทำการเติม $\text{CO}_2:\text{O}_2$ ตามกำหนดไว้ในแต่ละวิธีการ คือ
- Treatment ที่ 1 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้อง แบบเปิดปากถุง
- Treatment ที่ 2 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 3 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 4 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 5 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 6 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 7 การเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 8 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 9 เก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง
- Treatment ที่ 10 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง
8. ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 2 วัน โดยที่ ทำการประเมินเปอร์เซ็นต์การทำสูญเสียน้ำหนักสด, การเปลี่ยนแปลงสี, ปริมาณ TSS, ปริมาณ TA, เปอร์เซ็นต์การเน่า และคุณภาพทางกลิ่น

การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล

การบันทึกข้อ

ก่อนการเก็บรักษาได้ทำการบันทึกข้อมูลดังนี้

1. น้ำหนักสด
2. คุณภาพกลิ่น
3. คุณภาพสี
4. ปริมาณ TSS
5. ปริมาณ TA

ระหว่างการเก็บรักษา และตรวจสอบผลทุก ๆ 2 วัน บันทึกข้อมูลต่อไปนี้

1. อายุการเก็บรักษา
2. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด
3. คุณภาพสี
4. คุณภาพกลิ่น
5. คุณภาพปากลิ้น
6. ปริมาณ TSS
7. ปริมาณ TA

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด คัด โดยการชั่งน้ำหนักเริ่มผักหวาน ก่อนการเก็บรักษา หลังจากนั้นทุก ๆ 2 วัน แล้วบันทึกผล นำน้ำหนักที่ได้มาคิดเป็นร้อยละของการสูญเสีย น้ำหนักสด และคำนวณตามสมการ

$$\text{เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด} = \frac{\text{นน.สดก่อนการเก็บรักษา} - \text{นน.สดหลังการเก็บรักษา}}{\text{นน.สดก่อนการเก็บรักษา}} \times 100$$

2. ปริมาณ total soluble solid (TSS) ทุกๆ 3 วันหลังการเก็บรักษา ผักหวานมาวัด ปริมาณ TSS โดยการนำน้ำคั้นจากผักหวานมาวัดด้วย hand refractometer มีหน่วยเป็น brix

3. ปริมาณ titratable acidity (TA) ทำการบันทึกผลทุกๆ 2 วัน โดยการนำน้ำคั้น จากผักหวานปริมาตร 5 มิลลิลิตร มาเติมสารละลาย phenolphthalein ความเข้มข้น 1% จำนวน 3-4 หยด เพื่อใช้เป็น indicator จากนั้นไปไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐาน (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 N จนกระทั่งถึง end point (น้ำคั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนอย่างถาวร) บันทึกปริมาตรค่าที่ใช้

เพื่อใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์กรดมาลิกจากสูตร
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{เปอร์เซ็นต์กรดมาลิก} = \frac{N \text{ base} \times \text{ml. Base} \times \text{meq.wt. ของกรดมาลิก} \times 100}{\text{ml. ของน้ำคั้นที่ใช้}}$$

โดย N base = normality ของ NaOH

ml. base = จำนวนมิลลิลิตรของ NaOH ที่ใช้ไตเตรต

meq.wt. ของกรดมาลิก = 0.06705

4. การเปลี่ยนแปลงสีเนื้อ โดยบันทึกผลทุกๆ 2 วัน ทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสีของผักหวานก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แผ่นเทียบสีมาตรฐานของ royal horticultural society โดยวัดตั้งแต่เริ่มทำการทดลองจนถึงสิ้นสุดการทดลอง

5. คุณภาพกลิ่น ทุก 2 วัน หลังการเก็บรักษาผักหวานมาดมกลิ่น โดยใช้ผู้ดม 5 คน แบ่งคะแนนตามความชอบเป็น 5 ระดับคือ

ระดับคะแนน	5	คือ กลิ่นดีมากเช่นเดียวกับผักหวานสด
ระดับคะแนน	4	คือ กลิ่นดีใกล้เคียงกับผักหวานสด
ระดับคะแนน	3	คือ กลิ่นผิดปกติเล็กน้อยเป็นที่ยอมรับได้
ระดับคะแนน	2	คือ กลิ่นผิดปกติไม่เป็นที่ยอมรับได้
ระดับคะแนน	1	คือ มีกลิ่นผิดปกติมากไม่เป็นที่ยอมรับ

6. อายุการเก็บรักษา

7. เปอร์เซ็นต์การเน่า

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

นำข้อมูลที่ได้อามาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ตาราง Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan's New Multiple Range test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

สถานที่ทำการทดลอง

ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะเวลาในการทำการทดลอง

เริ่มการทดลอง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

สิ้นสุดการทดลอง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวานในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนผลปรากฏดังนี้

1. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากการเก็บรักษาผักหวาน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยพบว่า

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสด โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดน้อยได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง จะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 16.84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.47, 1.05, 0.97, 0.77, 0.64, 0.61, 0.59, 0.54 และผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์สูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.47 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสด โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 14.32 รองลงมา ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10°C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำ

การเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสด 4.06, 2.81, 1.38, 1.22, 1.01, 0.80, 0.79, 0.77 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.57 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 6 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.56 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.51, 1.44, 0.96, 0.86, 0.82, 0.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.72 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของ ผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 8 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.56 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.51, 1.44, 0.96, 0.86, 0.82, 0.77, ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.72 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ผู้ใดเห็นมาเบี่ยงเบนหรือใช้ในทางที่ผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 10 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.51 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.41, 1.35, 1.27 ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 1.19 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)


ภายหลังจากการเก็บรักษา 12 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.27 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.20, 1.19 ตามลำดับ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 1.40 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

73471

ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

Treatment	เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6,8, และ 10 วัน					
	2	4	6	8	10	12
Tr1	16.84 a	14.32 a	-	-	-	-
Tr2	1.47 b	2.81 b	-	-	-	-
Tr3	0.61 c	0.57 e	0.82 b	0.82 b	1.27 a	1.27 a
Tr4	0.59 c	4.06e	0.72 b	0.72 b	1.35 a	1.19 a
Tr5	0.54 c	0.79 a	0.77 b	0.77 b	1.19 a	1.20 a
Tr6	0.64 c	1.38 c	1.56 a	1.56 a	-	-
Tr7	0.97 bc	0.77de	0.86 b	0.86 b	1.51 a	1.40 a
Tr8	0.47 c	1.01 de	1.51 a	1.51 a	1.41 a	-
Tr9	1.05 bc	0.80 de	0.96 b	0.96 b	-	-
Tr10	0.77 c	1.22cd	1.44 a	1.44 a	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำการทดลอง ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความเปรียบเทียบแบบ DNMRT ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายใต้การเก็บรักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ปริมาณ total soluble solid (TSS)

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากการเก็บรักษาผักหวานมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง TSS เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณน้ำตาลที่วัดได้จากปริมาณน้ำตาลมากไปหาปริมาณน้ำตาลน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.00 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 10.66, 10.66, 10.50, 10.33, 10.16, 10.00, 9.66, 8.33 brix ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 8.83 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TSS ของผักหวาน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองแบบจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.50 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 11.33, 11.30, 11.00, 10.96, 10.93, 10.83, 10.83, 10.83, 5.41 brix ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้เอาต์เห็นไปใช้ประโยชน์ทางการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.50 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษาไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 6 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวาน ที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บ รักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำ การเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมี ปริมาณ TSS 10.83, 10.80, 10.73, 10.33, 9.76, 9.50 brix ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาใน ถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อย ที่สุดคือ 9.20 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามี ความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 8 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวาน ที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มาก ที่สุดคือ 11.23 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่ง มีปริมาณ TSS 11.06, 10.83, 10.80, 10.66, 10.66, 10.60 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุด คือ 10.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความ แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 10 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ 5 ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ผ่านการคัด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีปริมาณ TSS 10.83, 10.33, 10.16, 10.6 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.16 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)


ภายหลังการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 11.00, 10.60 ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณ total soluble solid TSS (brix) ของผักหวานก่อนและหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อนเก็บรักษา	ปริมาณ TSS ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	10.00a	10.00a	11.30a	-	-	-	-
Tr2	10.48a	10.50a	11.33a	-	-	-	-
Tr3	10.52a	10.66a	11.50a	10.33ab	10.80ab	10.33b	10.33c
Tr4	10.15a	10.16a	11.00a	10.83a	10.66ab	10.83a	11.00ab
Tr5	10.30a	10.33a	10.93a	11.16a	11.06ab	11.16a	11.16a
Tr6	11.01a	11.00a	10.50a	10.73a	11.23a	-	-
Tr7	8.82a	8.83a	10.83a	9.20bc	10.60ab	10.16b	10.6bc
Tr8	8.81a	8.83a	10.96a	9.50a	10.83ab	10.16b	-
Tr9	9.52a	9.66a	10.83a	10.80a	10.33b	-	-
Tr10	10.50a	10.66a	10.83a	9.76bc	10.66ab	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำการทดลอง
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความ
เปรียบเทียบแบบ DNMRT ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย TSS (brix) ของคั๊กหวานภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ปริมาณ titratable acidity (TA)

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นดังนี้

ก่อนการเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA อยู่ระหว่าง 11.45-7.12 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 10.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 10.13, 9.53, 9.43, 8.73, 8.63, 8.16, 8.03, 7.46 ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยสุด 6.00 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากเปอร์เซ็นต์ TA มากไปหาเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 7.96 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 7.91, 7.20, 6.95, 6.65, 6.53, 6.43, 6.41, 6.35 ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาเอกสารนี้มีการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้อยที่สุดคือ 6.21 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 6. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 4.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.36, 4.30, 3.56, 3.56, 3.56, 3.43 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ผักหวานที่เก็บรักษาอุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.33 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 8. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 5.43 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 5.33, 5.26, 4.86, 4.5, 3.73, 3.73 ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.58 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 10. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 4.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


(PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาอุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.36, 3.93, 3.86 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริมาณจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ(ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 12. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 5.43 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.50, 4.03 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.83 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ titrable acidity (TA) ของผักหวานก่อนการเก็บรักษา และหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8 และ 10 วัน

Treatment	ก่อนการเก็บ	เปอร์เซ็นต์ TA ภายหลังจากการเก็บรักษา(วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	11.45 a	10.50a	7.20b	-	-	-	-
Tr2	11.03ab	10.13ab	7.96a	-	-	-	-
Tr3	10.42abc	9.43abc	6.43cd	3.56a	3.56a	4.36a	4.50b
Tr4	10.52abc	9.53abc	6.41d	3.56 a	3.56 a	4.46ab	4.03c
Tr5	9.10cd	8.03cd	6.21d	3.56 a	3.56 a	3.83c	3.83c
Tr6	8.54de	7.46de	7.91a	4.30b	4.30b	-	-
Tr7	9.62bcd	8.63bcd	6.35d	3.33 a	3.33 a	3.86c	5.43a
Tr8	9.78bcd	8.73bcd	6.65cd	3.43 a	3.43 a	3.93bc	-
Tr9	9.52cd	8.16cd	6.53cd	4.46 b	4.46 b	-	-
Tr10	7.12 e	6.00e	6.95bc	4.36 b	4.36 b	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำกรทดลอง
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความ
เปรียบเทียบแบบ DNMRT ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 3 กราฟ แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ TA ของผักหวานก่อนการเก็บรักษาและหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10, และ 12 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การเปลี่ยนแปลงสีของผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาผักหวาน มีสีเขียว จัดอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a Green group 143 c, Green group 143 b

ภายหลังการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้อง แบบเปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a (ตารางที่ 4, ภาพที่ 4)

ภายหลังการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาใน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 c, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ

เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วย ทดลอง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วย ทดลอง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วยทดลอง (ตารางที่ 4)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะการเปลี่ยนสีของผักหวานก่อนและหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อนการเก็บรักษา	สีของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 A				
Tr2	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C			
Tr3	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr4	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr5	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr6	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C		
Tr7	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr8	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	
Tr9	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 B	GG 143 C		
Tr10	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 B	GG 143 C		

หมายเหตุ Green Group 143 A แทนด้วย GG 143 A
 Green Group 143 B แทนด้วย GG 143 B
 Green Group 143 C แทนด้วย GG 143 C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. คุณภาพทางกลิ่นของผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาพบว่า ผักหวานที่เก็บไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดคือมีระดับคะแนน 5.0 คะแนน

ภายหลังการเก็บรักษาพบว่า ผักหวานมีคุณภาพทางกลิ่นลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นดังนี้ (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือมีระดับคะแนน 5.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA), และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือมีระดับ คะแนน 4.5 - 5.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 6 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีระดับ คะแนน 3.5 - 4.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 8 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือมีระดับคะแนน 3.5 -4.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 10 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือมีระดับคะแนน 3.0 - 2.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์พอใช้คือมีระดับคะแนน 2.0 - 1.5 คะแนน (ตารางที่ 5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพทางกลิ่นของผักหวาน ก่อนและภายหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อนการเก็บรักษา	ภายหลังการเก็บรักษา (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	5	5	4.5	-	-	-	-
Tr2	5	5	4.5	-	-	-	-
Tr3	5	5	5	3.5	3	2	1.5
Tr4	5	5	5	3.5	3	-	-
Tr5	5	5	5	4	3.5	2.5	2
Tr6	5	5	5	3.5	3	-	-
Tr7	5	5	5	3.5	3	2	2
Tr8	5	5	5	4	3.5	2.5	-
Tr9	5	5	5	4	3.5	-	-
Tr10	5	5	5	4	3.5	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. อายุการเก็บรักษา

การพิจารณาอายุในการเก็บรักษาผักหวาน โดยใช้ผลประเมิน จากลักษณะสีของ ผักหวาน ภายหลังจากการทดลอง พบว่า จำนวนวันที่ทำการเก็บรักษาได้มากที่สุดคือ 12 วัน และจำนวนวันที่ทำการเก็บรักษาได้น้อยที่สุดคือ 5 วัน

ตารางที่ 6 แสดงอายุการเก็บรักษาผักหวานภายในแต่ละวิธีการ

Treatment	อายุการเก็บรักษา (วัน)
Tr1	4
Tr2	6
Tr3	12
Tr4	12
Tr5	12
Tr6	8
Tr7	12
Tr8	10
Tr9	8
Tr10	8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. เปอร์เซ็นต์การนำเสีย

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากเก็บรักษาผักหวาน มีเปอร์เซ็นต์การนำเสียเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น พบว่า

ภายหลังจากเก็บรักษา 2. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 0 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากเก็บรักษา 4. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 0 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากเก็บรักษา 6. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1 และ Treatment 2

ภายหลังจากเก็บรักษา 8. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1 และ Treatment 2

ภายหลังจากเก็บรักษา 10. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 60 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1, Treatment 2, Treatment 4, Treatment 6, Treatment 9 และ Treatment 10

ภายหลังจากเก็บรักษา 12. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 70 เปอร์เซ็นต์ Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1, Treatment 2, Treatment 4, Treatment 6, Treatment 8, Treatment 9 และ Treatment 10

สรุปผลการทดลอง

1. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด

ระหว่างการทำกรทดลองมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ภายหลังจากเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานแห้งที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment ที่ 1 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุด คือ 16.84 ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment ที่ 8 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุด คือ 0.47 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ

2. ปริมาณ total soluble solid (TSS)

เมื่อศึกษาผักหวานตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ผักหวานมีปริมาณ TSS เพิ่มขึ้นภายหลังจากเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานแห้งที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 2 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.33 brix ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 8 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10°C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 8.81 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณ TSS ของผักหวาน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

3. ปริมาณ titratable acidity (TA)

ระหว่างการทำกรเก็บรักษาผักหวานมีปริมาณ TA ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นเมื่อเก็บรักษาผักหวาน 12 วัน พบว่าผักหวานที่เก็บรักษาใน Treatment 1 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TA มากที่สุดคือ 11.45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 5 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TA น้อยที่สุดคือ 7.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณ TSS ของผักหวาน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

4. การเปลี่ยนแปลงของสีผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาผักหวาน ผักหวานจะมีสีเขียวซึ่งทำการวัดค่าของสีออกมาได้คือ Green Group 143a (GG 143 a) ภายหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 12 วัน สีของผักหวาน ได้เปลี่ยนสีโดยที่จะมีสีอ่อนลงจากเดิม โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ Green Group 143 b (GG 143 b), Green Group 143c (GG 143 c)

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. คุณภาพทางกลิ่นของผักหวาน

ก่อนการทำการเก็บรักษา ผักหวานที่จะทำการเก็บรักษาใน Treatment ต่าง ๆ มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดคืออยู่ในระดับคะแนน 5.0 คะแนน ภายหลังจากการทำการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงและผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงนั้นมีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์พอใช้คือ 2.0 – 1.5 คะแนน

6. อายุการเก็บรักษา

จากการทำการเก็บรักษา ผักหวานที่จะทำการเก็บรักษาใน Treatment ต่าง ๆ พบว่า ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงและผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 12 วัน คือยังคงมีสีอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่ยอมรับได้และมีสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด

7. เปอร์เซ็นต์การเน่า

ระหว่างการเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่มากขึ้น ภายหลังจากการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาใน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียมากที่สุด ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง จะมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียน้อยที่สุด

วิจารณ์ผลการทดลอง

การเก็บรักษาโดยวิธีควบคุมสภาพของบรรยากาศ (controlled atmosphere storage ; CA storage) ซึ่งการเก็บรักษาวิธีนี้จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพได้นาน โดยมีหลักการของการเก็บรักษาคือควบคุมปริมาณแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจน ซึ่งควบคุมให้มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำกว่าปกติและเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจน ซึ่งควบคุมให้มีปริมาณแก๊สต่ำกว่าปกติและเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงขึ้นกว่าสภาพบรรยากาศปกติ การเก็บรักษาวิธีนี้จะสามารถยับยั้งขบวนการสุก การ senescence หรือ ชะลอขบวนการให้เกิดขบวนการนั้นช้าลง รวมทั้งการอ่อนตัวของเนื้อเยื่อ การสูญเสีย chlorophyll การเกิดกลิ่น การสูญเสียกรด รวมถึงกระบวนการหายใจให้เกิดขึ้นช้าลง (สมชาย, 2547)

จากการทดลองพบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักหวานได้ 12 วัน โดยผักหวานที่เก็บในแบบการทดลองที่ 7 ซึ่งเป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถเก็บผักหวานได้นานและมีคุณภาพมากที่สุดในการทำการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งในการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้ช่วยลดกระบวนการหายใจ ลดการคายน้ำ รักษาความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษา และที่สำคัญเป็นการลดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษา ส่วนในเรื่องของสัดส่วนของก๊าซ CO₂ : O₂ นั้นมีผลต่อการเก็บรักษาโดย สัดส่วนของ O₂ สูงจะมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์เอธิลีน เพราะลำดับสุดท้ายของการสังเคราะห์เอธิลีนของพืชจะต้องใช้ O₂ การลดปริมาณ O₂ จะยับยั้งหรือลดการผลิตเอธิลีนลง (งามทิพย์, 2538)

ภายหลังการเก็บรักษาผักหวาน ในทุกวิธีการจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตยังมีชีวิตและยังหายใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดขบวนการเผาผลาญอาหารสะสม อีกทั้งยังมีการคายน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหายใจทำให้การเก็บรักษาสั้นลง ดังนั้นเราจึงควรลดการสูญเสียน้ำหนักสดของผลผลิตให้ได้มากที่สุดจึงจะทำให้ผลผลิตสูญเสียน้ำหนักสดช้าลงและเก็บรักษาผลผลิต ได้นานยิ่งขึ้น (สมชาย, 2547)

ผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของระดับอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักหวานในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนผลปรากฏดังนี้

1. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากการเก็บรักษาผักหวาน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยพบว่า

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสด โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดน้อยได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง จะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 16.84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.47, 1.05, 0.97, 0.77, 0.64, 0.61, 0.59, 0.54 และผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์สูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.47 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสด โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 14.32 รองลงมา ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10°C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำ

การเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสด 4.06, 2.81, 1.38, 1.22, 1.01, 0.80, 0.79, 0.77 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.57 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย น้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 6 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้

ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.56 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.51, 1.44, 0.96, 0.86, 0.82, 0.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.72 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 8 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้

ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.56 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.51, 1.44, 0.96, 0.86, 0.82, 0.77, ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 0.72 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่อผู้ผู้ใดเห็นมาเบี่ยงเบนหรือใช้ในทางที่ผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 10 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.51 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.41, 1.35, 1.27 ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 1.19 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)


ภายหลังจากการเก็บรักษา 12 วัน พบว่า อัตราการสูญเสียน้ำหนักสดลดลงดังนี้ โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียน้ำหนักสดมากไปหาอัตราการสูญเสียน้ำหนักน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุดคือ 1.27 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด 1.20, 1.19 ตามลำดับ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 1.40 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)

73471

ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

Treatment	เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6,8,และ 10 วัน					
	2	4	6	8	10	12
Tr1	16.84 a	14.32 a	-	-	-	-
Tr2	1.47 b	2.81 b	-	-	-	-
Tr3	0.61 c	0.57 e	0.82 b	0.82 b	1.27 a	1.27 a
Tr4	0.59 c	4.06e	0.72 b	0.72 b	1.35 a	1.19 a
Tr5	0.54 c	0.79 a	0.77 b	0.77 b	1.19 a	1.20 a
Tr6	0.64 c	1.38 c	1.56 a	1.56 a	-	-
Tr7	0.97 bc	0.77de	0.86 b	0.86 b	1.51 a	1.40 a
Tr8	0.47 c	1.01 de	1.51 a	1.51 a	1.41 a	-
Tr9	1.05 bc	0.80 de	0.96 b	0.96 b	-	-
Tr10	0.77 c	1.22cd	1.44 a	1.44 a	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำการทดลอง ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความเปรียบเทียบแบบ DNMRT ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 1 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานภายหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ปริมาณ total soluble solid (TSS)

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากการเก็บรักษาผักหวานมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง TSS เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณน้ำตาลที่วัดได้จากปริมาณน้ำตาลมากไปหาปริมาณน้ำตาลน้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.00 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 10.66, 10.66, 10.50, 10.33, 10.16, 10.00, 9.66, 8.33 brix ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 8.83 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TSS ของผักหวาน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองแบบจากรปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.50 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 11.33, 11.30, 11.00, 10.96, 10.93, 10.83, 10.83, 10.83, 5.41 brix ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้เอาต์เห็นไปใช้ประโยชน์ทางการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.50 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษาไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 6 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวาน ที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บ รักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำ การเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมี ปริมาณ TSS 10.83, 10.80, 10.73, 10.33, 9.76, 9.50 brix ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาใน ถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อย ที่สุดคือ 9.20 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามี ความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 8 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวาน ที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มาก ที่สุดคือ 11.23 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ ปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่ง มีปริมาณ TSS 11.06, 10.83, 10.80, 10.66, 10.66, 10.60 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุด คือ 10.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความ แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ภายหลังจากเก็บรักษา 10 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับ ปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ 5 ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ผ่านการคัด

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีปริมาณ TSS 10.83, 10.33, 10.16, 10.6 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.16 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)


ภายหลังการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) โดยเรียงลำดับปริมาณ TSS ที่วัดได้จากการทดลองจากปริมาณ TSS มากไปหาปริมาณ TSS น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง มีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.16 brix รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS 11.00, 10.60 ตามลำดับ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 10.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TSS ของผักหวานที่เก็บรักษามีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณ total soluble solid TSS (brix) ของผักหวานก่อนและหลังการเก็บรักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อนเก็บรักษา	ปริมาณ TSS ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	10.00a	10.00a	11.30a	-	-	-	-
Tr2	10.48a	10.50a	11.33a	-	-	-	-
Tr3	10.52a	10.66a	11.50a	10.33ab	10.80ab	10.33b	10.33c
Tr4	10.15a	10.16a	11.00a	10.83a	10.66ab	10.83a	11.00ab
Tr5	10.30a	10.33a	10.93a	11.16a	11.06ab	11.16a	11.16a
Tr6	11.01a	11.00a	10.50a	10.73a	11.23a	-	-
Tr7	8.82a	8.83a	10.83a	9.20bc	10.60ab	10.16b	10.6bc
Tr8	8.81a	8.83a	10.96a	9.50a	10.83ab	10.16b	-
Tr9	9.52a	9.66a	10.83a	10.80a	10.33b	-	-
Tr10	10.50a	10.66a	10.83a	9.76bc	10.66ab	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำการทดลอง
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความ
เปรียบเทียบแบบ DNMR ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย TSS (brix) ของคั๊กหวานภายหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ปริมาณ titratable acidity (TA)

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นดังนี้

ก่อนการเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA อยู่ระหว่าง 11.45-7.12 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 10.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 10.13, 9.53, 9.43, 8.73, 8.63, 8.16, 8.03, 7.46 ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยสุด 6.00 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 4 วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากเปอร์เซ็นต์ TA มากไปหาเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 7.96 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 7.91, 7.20, 6.95, 6.65, 6.53, 6.43, 6.41, 6.35 ตามลำดับ ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์จะอัปเดตเนื้อหาการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

น้อยที่สุดคือ 6.21 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 6. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 4.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.36, 4.30, 3.56, 3.56, 3.56, 3.43 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ผักหวานที่เก็บรักษาอุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.33 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 8. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 5.43 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 5.33, 5.26, 4.86, 4.5, 3.73, 3.73 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.58 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 10. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 4.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


(PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาอุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.36, 3.93, 3.86 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริมาณจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานมีความแตกต่างทางสถิติ(ตารางที่ 3)

ภายหลังจากการเก็บรักษา 12. วัน พบว่า ผักหวานมีเปอร์เซ็นต์ TA โดยเรียงลำดับจากอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA จากมากไปหาอัตราการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ TA น้อย ได้ดังนี้ ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C + CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง มีเปอร์เซ็นต์ TA มากที่สุดคือ 5.43 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ TA 4.50, 4.03 ตามลำดับ ส่วน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์ TA น้อยที่สุดคือ 3.83 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณของ TA ของผักหวานไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ titrable acidity (TA) ของผักหวานก่อนการเก็บรักษา และหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8 และ 10 วัน

Treatment	ก่อนการเก็บ	เปอร์เซ็นต์ TA ภายหลังจากการเก็บรักษา(วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	11.45 a	10.50a	7.20b	-	-	-	-
Tr2	11.03ab	10.13ab	7.96a	-	-	-	-
Tr3	10.42abc	9.43abc	6.43cd	3.56a	3.56a	4.36a	4.50b
Tr4	10.52abc	9.53abc	6.41d	3.56 a	3.56 a	4.46ab	4.03c
Tr5	9.10cd	8.03cd	6.21d	3.56 a	3.56 a	3.83c	3.83c
Tr6	8.54de	7.46de	7.91a	4.30b	4.30b	-	-
Tr7	9.62bcd	8.63bcd	6.35d	3.33 a	3.33 a	3.86c	5.43a
Tr8	9.78bcd	8.73bcd	6.65cd	3.43 a	3.43 a	3.93bc	-
Tr9	9.52cd	8.16cd	6.53cd	4.46 b	4.46 b	-	-
Tr10	7.12 e	6.00e	6.95bc	4.36 b	4.36 b	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของผักที่ทำกรทดลอง
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ ตามความ
เปรียบเทียบแบบ DNMRT ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 3 กราฟ แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ TA ของผักหวานก่อนการเก็บรักษาและหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10, และ 12 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การเปลี่ยนแปลงสีของผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาผักหวาน มีสีเขียว จัดอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a Green group 143 c, Green group 143 b

ภายหลังการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้อง แบบเปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a (ตารางที่ 4, ภาพที่ 4)

ภายหลังการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาใน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 a, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 c, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C แบบปิดปากถุงสามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถจัดกลุ่มของสีอยู่ในกลุ่ม Green group 143 b, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ผู้ใดเห็นชอบใช้เอกสารนี้ในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง ไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วย ทดลอง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วย ทดลอง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 20 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงไม่สามารถวัดผลได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของหน่วยทดลอง (ตารางที่ 4)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะการเปลี่ยนสีของผักหวานก่อนและหลังการเก็บรักษา 2,4,6,8,10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อนการเก็บรักษา	สีของผักหวานภายหลังจากการเก็บรักษา (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 A				
Tr2	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C			
Tr3	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr4	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr5	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr6	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C		
Tr7	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C
Tr8	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 C	GG 143 C	GG 143 C	
Tr9	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 B	GG 143 C		
Tr10	GG 143 A	GG 143 A	GG 143 B	GG 143 B	GG 143 C		

หมายเหตุ Green Group 143 A แทนด้วย GG 143 A
 Green Group 143 B แทนด้วย GG 143 B
 Green Group 143 C แทนด้วย GG 143 C

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. คุณภาพทางกลิ่นของผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาพบว่า ผักหวานที่เก็บไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดคือมีระดับคะแนน 5.0 คะแนน

ภายหลังการเก็บรักษาพบว่า ผักหวานมีคุณภาพทางกลิ่นลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นดังนี้ (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 2 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือมีระดับคะแนน 5.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 4 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA), และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีมากคือมีระดับคะแนน 4.5 - 5.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 6 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีระดับคะแนน 3.5 - 4.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 8 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือมีระดับคะแนน 3.5 -4.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 10 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือมีระดับคะแนน 3.0 - 2.0 คะแนน (ตารางที่ 5)

ภายหลังการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาไว้ในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ 5,10,15 และ 20 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารดูดซับ ethylene (EA) และก๊าซ $\text{CO}_2:\text{O}_2$ 5:0 PSI มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์พอใช้คือมีระดับคะแนน 2.0 - 1.5 คะแนน (ตารางที่ 5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพทางกลันของฝักหวาน ก่อนและภายหลังการเก็บ
รักษา 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 วัน

Treatment	ก่อน การเก็บ รักษา	ภายหลังการเก็บรักษา (วัน)					
		2	4	6	8	10	12
Tr1	5	5	4.5	-	-	-	-
Tr2	5	5	4.5	-	-	-	-
Tr3	5	5	5	3.5	3	2	1.5
Tr4	5	5	5	3.5	3	-	-
Tr5	5	5	5	4	3.5	2.5	2
Tr6	5	5	5	3.5	3	-	-
Tr7	5	5	5	3.5	3	2	2
Tr8	5	5	5	4	3.5	2.5	-
Tr9	5	5	5	4	3.5	-	-
Tr10	5	5	5	4	3.5	-	-

- คือ ผลการทดลองที่ไม่สามารถแสดงค่าได้เนื่องจากเกิดการเน่าเสียของฝักที่ทำการทดลอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. อายุการเก็บรักษา

การพิจารณาอายุในการเก็บรักษาผักหวาน โดยใช้ผลประเมิน จากลักษณะสีของ ผักหวาน ภายหลังจากการทดลอง พบว่า จำนวนวันที่ทำการเก็บรักษาได้มากที่สุดคือ 12 วัน และจำนวนวันที่ทำการเก็บรักษาได้น้อยที่สุดคือ 5 วัน

ตารางที่ 6 แสดงอายุการเก็บรักษาผักหวานภายในแต่ละวิธีการ

Treatment	อายุการเก็บรักษา (วัน)
Tr1	4
Tr2	6
Tr3	12
Tr4	12
Tr5	12
Tr6	8
Tr7	12
Tr8	10
Tr9	8
Tr10	8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. เปอร์เซ็นต์การนำเสีย

จากการทดลองพบว่า ภายหลังจากเก็บรักษาผักหวาน มีเปอร์เซ็นต์การนำเสียเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น พบว่า

ภายหลังจากเก็บรักษา 2. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 0 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากเก็บรักษา 4. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 0 เปอร์เซ็นต์

ภายหลังจากเก็บรักษา 6. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1 และ Treatment 2

ภายหลังจากเก็บรักษา 8. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1 และ Treatment 2

ภายหลังจากเก็บรักษา 10. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 60 เปอร์เซ็นต์ พบว่า Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1, Treatment 2, Treatment 4, Treatment 6, Treatment 9 และ Treatment 10

ภายหลังจากเก็บรักษา 12. วัน ผักหวานในแต่ละ Treatment ที่ได้ทำการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การนำเสีย = 70 เปอร์เซ็นต์ Treatment ที่มีการนำเกิดขึ้นคือ Treatment 1, Treatment 2, Treatment 4, Treatment 6, Treatment 8, Treatment 9 และ Treatment 10

สรุปผลการทดลอง

1. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสด

ระหว่างการทำการทดลองมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ภายหลังจากเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานแห้งที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment ที่ 1 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุด คือ 16.84 ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment ที่ 8 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากที่สุด คือ 0.47 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดของผักหวานมีความแตกต่างกันทางสถิติ

2. ปริมาณ total soluble solid (TSS)

เมื่อศึกษาผักหวานตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ผักหวานมีปริมาณ TSS เพิ่มขึ้นภายหลังจากเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานแห้งที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 2 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TSS มากที่สุดคือ 11.33 brix ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 8 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10°C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TSS น้อยที่สุดคือ 8.81 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณ TSS ของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

3. ปริมาณ titratable acidity (TA)

ระหว่างการทำการเก็บรักษาผักหวานมีปริมาณ TA ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นเมื่อเก็บรักษาผักหวาน 12 วัน พบว่าผักหวานที่เก็บรักษาใน Treatment 1 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TA มากที่สุดคือ 11.45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักหวานที่เก็บรักษาไว้ใน Treatment 5 เป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง โดยมีปริมาณ TA น้อยที่สุดคือ 7.33 brix จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปริมาณ TSS ของผักหวานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

4. การเปลี่ยนแปลงของสีผักหวาน

ก่อนการเก็บรักษาผักหวาน ผักหวานจะมีสีเขียวซึ่งทำการวัดค่าของสีออกมาได้คือ Green Group 143a (GG 143 a) ภายหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 12 วัน สีของผักหวานได้เปลี่ยนสีโดยที่จะมีสีอ่อนลงจากเดิม โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ Green Group 143 b (GG 143 b), Green Group 143c (GG 143 c)

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. คุณภาพทางกลิ่นของผักหวาน

ก่อนการทำการเก็บรักษา ผักหวานที่จะทำการเก็บรักษาใน Treatment ต่าง ๆ มีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดคืออยู่ในระดับคะแนน 5.0 คะแนน ภายหลังจากการทำการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุงและผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุงนั้นมีคุณภาพทางกลิ่นอยู่ในเกณฑ์พอใช้คือ 2.0 – 1.5 คะแนน

6. อายุการเก็บรักษา

จากการทำการเก็บรักษา ผักหวานที่จะทำการเก็บรักษาใน Treatment ต่าง ๆ พบว่า ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับ ก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 15 °C แบบปิดปากถุง, ผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 10 °C แบบปิดปากถุงและผักหวานที่เก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C แบบปิดปากถุง มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 12 วัน คือยังคงมีสีอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่ยอมรับได้และมีสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด

7. เปอร์เซ็นต์การเน่า

ระหว่างการเก็บรักษาผักหวานมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่มากขึ้น ภายหลังจากการเก็บรักษา 12 วัน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาใน ผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิห้องแบบเปิดปากถุงมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียมากที่สุด ส่วนผักหวานที่ทำการเก็บรักษาในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง จะมีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียน้อยที่สุด

วิจารณ์ผลการทดลอง

การเก็บรักษาโดยวิธีควบคุมสภาพของบรรยากาศ (controlled atmosphere storage ; CA storage) ซึ่งการเก็บรักษาวิธีนี้จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพได้นาน โดยมีหลักการของการเก็บรักษาคือควบคุมปริมาณแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจน ซึ่งควบคุมให้มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำกว่าปกติและเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจน ซึ่งควบคุมให้มีปริมาณแก๊สต่ำกว่าปกติและเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงขึ้นกว่าสภาพบรรยากาศปกติ การเก็บรักษาวิธีนี้จะสามารถยับยั้งขบวนการสุก การ senescence หรือ ชะลอขบวนการให้เกิดขบวนการนั้นช้าลง รวมทั้งการอ่อนตัวของเนื้อเยื่อ การสูญเสีย chlorophyll การเกิดกลิ่น การสูญเสียกรด รวมถึงกระบวนการหายใจให้เกิดขึ้นช้าลง (สมชาย, 2547)

จากการทดลองพบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักหวานได้ 12 วัน โดยผักหวานที่เก็บในแบบการทดลองที่ 7 ซึ่งเป็นการเก็บรักษาผักหวานในถุง polyethylene (PE) ที่อุณหภูมิ 5 °C ร่วมกับก๊าซ CO₂:O₂ 5:0 PSI แบบปิดปากถุง สามารถเก็บผักหวานได้นานและมีคุณภาพมากที่สุดในการทำการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งในการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้ช่วยลดกระบวนการหายใจ ลดการคายน้ำ รักษาความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษา และที่สำคัญเป็นการลดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษา ส่วนในเรื่องของสัดส่วนของก๊าซ CO₂ : O₂ นั้นมีผลต่อการเก็บรักษาโดย สัดส่วนของ O₂ สูงจะมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์เอธิลีน เพราะลำดับสุดท้ายของการสังเคราะห์เอธิลีนของพืชจะต้องใช้ O₂ การลดปริมาณ O₂ จะยับยั้งหรือลดการผลิตเอธิลีนลง (งามทิพย์, 2538)

ภายหลังการเก็บรักษาผักหวาน ในทุกวิธีการจะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักสดมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตยังมีชีวิตและยังหายใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดขบวนการเผาผลาญอาหารสะสม อีกทั้งยังมีการคายน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากการหายใจทำให้การเก็บรักษาลดลง ดังนั้นเราจึงควรลดการสูญเสียน้ำหนักสดของผลผลิตให้ได้มากที่สุดจึงจะทำให้ผลผลิตสูญเสียน้ำหนักสดช้าลงและเก็บรักษาผลผลิต ได้นานยิ่งขึ้น (สมชาย, 2547)