

ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

เรื่อง

ผลของการให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน
Effect of Irrigation Amount on Growth and Yield of Turmeric (*Curcuma longa*.)

โดย

นายธานี บันพิพัฒน์

นายอาวุธ เทียนบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. สมยศ เศษภีร์ตนมงคล

รฟ.
ค 517๗
2550

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน...102753
วัน,เดือน,ปี... 18 ส.ค. 2552

เสนอ



ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พืชไร่)
พุทธศักราช 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไป
ใช้ประโยชน์ทางอื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุก
ครั้งที่มีการนำไปใช้

b.12036730

ใบรับรองปัญหาพิเศษปริญญาตรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เรื่อง

ผลของการให้น้ำในปริมาณที่ต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน
Effect of Irrigation Amount on Growth and Yield of Turmeric (*Curcuma longa*L.)

โดย

นายธานี บันพิพัฒน์

นายอาวุธ เทียนบุญ

ได้รับพิจารณาเห็นชอบจาก

(รศ.ดร. สมยศ เดชภีรัตนมงคล)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชารับรอง

รศ.ดร. สมยศ เดชภีรัตนมงคล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันที่ ๒๕ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง : ผลของการขาดน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของขมิ้นชัน
โดย : นาย ธาณี ปั้นพิพัฒน์
: นาย อาวุธ เทียนบุญ
ภาควิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. สมยศ เดชภักดีมงคล

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ในการดำเนินการทดลองครั้งนี้ เพื่อต้องการศึกษาถึงการใช้น้ำชลประทานในปริมาณที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขมิ้นชัน ซึ่งได้ทำการศึกษาในแปลงทดลองในสภาพไร่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block desing (RCBD) มีจำนวน 4 ซ้ำ สิ่งทดลองประกอบด้วย การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน 5 ระดับ ซึ่งให้น้ำแก่ขมิ้นชันโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณน้ำที่ให้ต่อการระเหย (Irrigation water to evaporation, IW/E) 0.1 , 0.3 , 0.5 , 0.7 และ 1.0 ผลจากการทดลองพบว่า ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณน้อยจะมีค่าอุณหภูมิใบเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการคายน้ำจากใบและ Total stomata conductance มีค่าลดลง การเจริญเติบโตทางลำต้นและน้ำหนักแห้งรวมของขมิ้นชันมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณการให้น้ำชลประทานเพิ่มมากขึ้นจาก IW/E 0.1 ถึง IW/E 1.0 ผลผลิตน้ำหนักแห้งของขมิ้นชันมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่ออัตราส่วนของ IW/E มีค่าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการให้น้ำของขมิ้นชันมีค่าลดลงจาก 0.31 กิโลกรัมต่อไร่ต่อมิลลิเมตร เมื่อให้น้ำในปริมาณเท่ากับ IW/E 0.1 เป็น 0.13 กิโลกรัมต่อไร่ต่อมิลลิเมตร เมื่อให้น้ำในปริมาณ IW/E 1.0

คำสำคัญ : ปริมาณน้ำ การเจริญเติบโต ผลผลิต ขมิ้นชัน

Title : Effect of Irrigation Amount on Growth and Yield of
Turmeric (*Curcuma longa* L.)

Author : Mr. Thani Punpiput
: Mr. Arwut Thianboon

Department : Plant Production Technology

Faculty : Agricultural Technology

Advisor : Assoc.Prof. Dr. Somyot Detpiratmongkoi

ABSTRACT

The aims of this study are to determine the effect of irrigation amount on growth and yield of turmeric (*Curcuma longa* L.). The experiment was conducted under field condition at the Faculty to Agricultural Technology, KMITL, during June, 2007 to January, 2008. A randomized complete block design with four replications was employed. Five irrigation regimes based on the ratios of irrigation amount (IW) to cumulative evaporation (E) (ie. 0.1 , 0.3 , 0.5 , 0.7 and 1.0) . The results shown that the lower irrigation regimes increased leaf temperature and transpiration rate and Total stomata conductance were reduced. Growth and total dry weight of turmeric significantly increased with increasing irrigation amounts from IW/E 0.1 to 1.0 . Corm dry weight yield favored higher ratios of IW/E . However , water use efficiency (WUE) decreased from 0.31 kg/rai/mm in the treatment of IW/E 0.1 to 0.13 kg/rai/mm in treatment of IW/E 1.0.

Key word : water amount , growth , yield , turmeric.

คำนิยม

ปัญหาพิเศษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. สมยศ เดชภีรัตนมงคล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆตลอดทั้งตรวจและแก้ไขปัญหาพิเศษจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยดี

ขอขอบคุณ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำปัญหาพิเศษ

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาผู้ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา และเพื่อนๆ น้องๆ ที่ช่วยเหลือและคอยเป็นกำลังใจในการทำปัญหาพิเศษในครั้งนี้

ธานี บันพิพัฒน์
อาวุธ เทียนบุญ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการ	11
ผลการทดลอง	15
วิจารณ์	33
สรุปผลการทดลอง	35
เอกสารอ้างอิง	36
ประวัติผู้เขียน	40



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ปริมาณน้ำในใบ (Relative water content) (เปอร์เซ็นต์) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	18
2	อุณหภูมิใบ (Leaf temperature) (องศาเซลเซียส) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	19
3	อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate) (ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	20
4	Total stomata conductance (มิลลิโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	21
5	ความสูง (เซนติเมตร) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	22
6	จำนวนต้น (ต้นต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	23
7	ดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf area index) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	24
8	น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	25
9	น้ำหนักต้นแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	26
10	จำนวนเหง้า (เหง้าต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	27
11	น้ำหนักเหง้าสด (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	28
12	น้ำหนักเหง้าแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	29
13	น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	30
14	อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	31
15	เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน	32

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ (A) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ (B) และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (C) ในช่วงที่ทำการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2551	16
2 ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในช่วงที่ทำการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2551	17



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ขมิ้นชัน (*Curcuma longa* L.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความสำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย เดิมการปลูกขมิ้นชันของเกษตรกรสวนใหญ่มีการปลูกไม่มากนักและมักปลูกจำกัดอยู่ตามบ้านเรือนเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการนำขมิ้นชันเข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านอาหาร คือนำขมิ้นชันมาใช้ในการปรุงแต่งกลิ่น สี และรสชาติ และทางด้านเภสัชกรรมใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆมากมาย ซึ่งในปัจจุบันทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนก็ได้ให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรกันเพิ่มขึ้น โดยขมิ้นชันมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรคได้หลายชนิด เช่น เป็นยาลดกรด ขับลมและแก้ปวดท้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมโดยนำขมิ้นชันใช้เป็นสีย้อมผ้า เครื่องสำอาง และอื่นๆอีกมากมาย (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2531 ; เกษม, 2525) เมื่อความต้องการขมิ้นชันมีมากจึงทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่พบอยู่เสมอของเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นชันก็คือ ขมิ้นชันได้รับน้ำไม่เพียงพอตลอดฤดูกาลปลูกและเกิดการขาดน้ำขึ้นในช่วงต่างๆ ของการเจริญเติบโตอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าขมิ้นชันจะเป็นพืชที่มีความสามารถในการทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีก็ตาม แต่เมื่อได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นลดลง และมีผลกระทบไปถึงผลผลิตเหง้าที่นำมาใช้ทำสมุนไพรลดลงได้ ตามปกติขมิ้นชันต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตประมาณ 1,250 – 2,250 มิลลิเมตรต่อปี (รุ่งรัตน์, 2540) ซึ่งเป็นปริมาณที่ต้องการใช้ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ตามปกติโดยทั่วไปขมิ้นชันจะให้ผลผลิตประมาณ 320 – 350 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับการปลูกในเขตชลประทาน แต่ถ้ามีการปลูกนอกเขตชลประทานแล้วจะให้ผลผลิตลดลงต่ำกว่านี้มาก (รุ่งรัตน์, 2540)

อย่างไรก็ตามถ้าขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน เพราะถ้ารดน้ำมากหรือแฉะจนเกินไปจะมีผลทำให้เหง้าเน่าเสียหายได้ (พเยาว์, 2529) แต่ถ้าได้รับน้ำปริมาณที่น้อยจนเกินไปโดยเฉพาะหลังจากการปลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่ขมิ้นชันกำลังจะออกก็จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกในแปลงปลูกค่อนข้างต่ำ (วันดี, 2538 ; สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขชั้นพื้นฐาน, 2541) ดังนั้น การจัดการให้น้ำแก่ขมิ้นชันอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตของขมิ้นชันได้ จึงได้ทำการศึกษาการให้น้ำในปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้ขมิ้นชันมีการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งงานทดลองในด้านนี้ยังมีการศึกษากันน้อยมาก ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันให้มีการจัดการให้น้ำชลประทานแก่ขมิ้นชันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ขมิ้นชันให้มากขึ้นได้

ในอนาคต

เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการทราบว่า เมื่อขมิ้นชันที่ปลูกในสภาพไร่เมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกันจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นอย่างไร
2. เพื่อต้องการทราบว่า การปลูกขมิ้นชันในสภาพไร่ ขมิ้นชันมีความต้องการน้ำตลอดฤดูปลูกเท่าใดจึงจะให้ผลผลิตสูงสุด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การตรวจเอกสาร

ขมิ้นชันเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและเขตอบอุ่น (เต็ม, 2523) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Curcuma longa* L. จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae (พเยาว์, 2537 ; เต็ม, 2523) มีชื่อท้องถิ่นทั่วไปหลายชื่อได้แก่ ขมิ้น (กลาง) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขมิ้น ขมิ้น (ใต้) ตายอ (กะเหรี่ยง – กำแพงเพชร) สยะอ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) (รุ่งรัตน์, 2540 ; นิจศิริ และ พะยอม, 2534 ; พเยาว์, 2537 ; สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของขมิ้นชันมีดังต่อไปนี้

ลำต้น ขมิ้นชันจัดว่าเป็นพืชล้มลุกข้ามปีที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ซึ่งจัดแบ่งการเจริญเติบโตได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ติดกับโคนกาบใบหรือส่วนเหนือดิน เรียก หัว (Tuber) จะมีรูปร่างแบนแบบรูปไข่ ขนาด 5×2.5 เซนติเมตร ส่วนนี้จะเป็นจุดกำเนิดของ ใบ ดอก เหง้า และราก ส่วนที่สองคือส่วนที่เราเรียกว่าเหง้า (Rhizome) จะเกิดส่วนของหัวมีลักษณะเจริญเติบโตเป็นท่อน ขนานไปกับผิวดินขนาด 1.5×5.8 เซนติเมตร จากเหง้าชุดแรกแล้วจะมีเหง้าชุดที่สองเจริญแตกแยกสาขาอีกเป็นสองแถวมีลักษณะเป็นแงงคล้ายนิ้วมือ และจากเหง้าชุดที่สองจะแตกแยกออกมาอีก โดยเหง้าทั้งหมดจะเกาะรวมตัวกันเป็นกระจุกแน่นไม่แยกออกจากกัน ลำต้นมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544 ; ปราณี และคณะ, 2544 ; รุ่งรัตน์, 2535 ; เต็ม, 2523)

ราก มีลักษณะอวบน้ำ มีขนาดไม่ยาวมาก บริเวณปลายรากมักจะพองอกกลายเป็นหัว (Tuber) ขนาดประมาณ 4×2 เซนติเมตร (ทิพญา, 2529)

ใบ ขมิ้นชันเมื่อโตเต็มที่จะมีใบประมาณ 6 – 10 ใบ ดอกออกเป็นช่อรูปทรงกระบอก มีก้านช่อดอกแทงออกจากเหง้าโดยตรง ก้านช่อดอกยาว 5 - 10 เซนติเมตร มีใบประดับช่อดอกสีเขียวอ่อน หรือสีขาว รูปหอกเรียงซ้อนกัน ใบประดับ 1 ใบมี ดอก 2 ดอก มีใบประดับย่อยรูปขอบขนานยาว 3 – 3.5 เซนติเมตร (สถาบันการแพทย์ไทย, 2540)

ดอก ออกเป็นทรงช่อรูปทรงกระบอก มีก้านช่อดอกแทงออกจากเหง้าโดยตรงก้านช่อดอกยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร มีใบประดับช่อดอกสีเขียวอ่อนๆหรือสีขาวรูปหอกเรียงซ้อนกัน ใบประดับ 1 ใบ มี ดอก 2 ดอก มีใบประดับรูปขอบขนานยาวประมาณ 3 – 3.5 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนกลีบดอกสีขาวโดยเชื่อมติดกันเป็นท่อนยาว ส่วนปลายแยกออกเป็น 3 ส่วน เกสรตัวผู้คล้ายกลีบดอก มีขน มีอับเรณูอยู่ที่ใกล้ๆ ปลายท่อเกสรตัวเมีย ซึ่งเกสรตัวผู้มีทั้งสมบูรณ์และเป็นหมัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ยอดเกสรตัวเมียมีรูปร่างคล้ายปากแตรเกลี้ยง รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 ใบ (Burt and Smith, 1983) ไขมันชั้นที่ปลูกในประเทศไทย จะมีดอก ออกราวเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ถนนศรี, 2538)

ชนิดและพันธุ์ของไขมันชั้น

ไขมันชั้นที่ปลูกมีหลายพันธุ์ อาจจำแนกตามแหล่งผลิตหรือจำแนกตามเหง้าไขมันชั้นก็ได้ กล่าวคือ การจำแนกพันธุ์ตามแหล่งผลิตหรือแหล่งปลูกอย่างเช่นในแคว้นอัลสสัม ประเทศอินเดีย มีพันธุ์ที่สำคัญ 4 พันธุ์คือ พันธุ์เดชิ(Deshi) พันธุ์ไชนานาดาน(China nadan) พันธุ์ปัตตานี (Patani)และพันธุ์เปอร์รัม นาดาน(Perrum nadan) ส่วนการจำแนกพันธุ์ตามลักษณะของเหง้าแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พวกแรกมีแ่งกลมรี รูปไข่ และแ่งที่เป็นแบบแ่งหลักจะมีเนื้อนิ่ม อีกพวกหนึ่งจะมีแ่งยาวเป็นรูปทรงกระบอก เมื่อปลูกจะแตกแขนงที่สองและสามต่อไป (เอกสารวิชาการ วนาคารสิกรไทย, 2530)

ไขมันชั้นที่ดีมีมากกว่า 50 สายพันธุ์ ส่วนมากมาจากอินเดีย มีทั้งสายพันธุ์ที่อายุพร้อมเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 7-9 เดือน สายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสารสำคัญในเหง้าสูง เช่น Savarma PCT-8 ของอินเดีย ให้ผลผลิต 6.4- 6.8 ตันต่อไร่และมีสารเคอร์คูมินอยด์ 8.7 เปอร์เซ็นต์ (นพมาศ, 2544)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

รุ่งรัตน์ (2535) กล่าวว่า ไขมันชั้นเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างร้อนและต้องการความชื้นสูง เช่นเดียวกับขิงและข่า อาจปลูกโดยอาศัยน้ำฝน หรือใช้การชลประทานเข้าช่วยด้วยก็ได้

ดิน ไขมันชั้นชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดี พื้นที่ที่มีน้ำขังหรือมีความชื้นสูงเกินไปหรือมีการระบายน้ำไม่ดี จะทำให้เหง้าไขมันชั้นเน่าเสียหายได้ ดังนั้น ดินเหนียวหรือดินที่เป็นกรดหรือดินที่เป็นลูกรังและพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง จึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกไขมันชั้น ไขมันชั้นสามารถปลูกบนพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนกระทั่งความสูงประมาณ 1,350 เมตร

น้ำ ไขมันชั้นชอบพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ต้องการน้ำฝนเพื่อการเจริญเติบโตประมาณปีละประมาณ 1,125 – 2,225 มิลลิเมตร

การเตรียมดินและการปลูก

การเตรียมดิน

ไขมันชั้นควรขุดหรือไถให้ดินร่วนซุยไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง คือไถครั้งแรกเพื่อกำจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย แล้วตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วจึงไถแปรเพื่อกลับหน้าดินทำให้ดินร่วนซุยและ ละเอียดขึ้น ในกรณีที่ดินเหนียวจัดควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ควรไถพรวนดินก่อนต้นฤดูฝนเพื่อทำการปลูกในต้นฤดูฝน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) การเตรียมแปลงปลูกนั้นในเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรณีที่ดินที่ระบายน้ำได้ดีควรเตรียมแปลงปลูกในสภาพพื้นที่ราบและถ้าพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ดีควรเตรียมแปลงปลูกแบบยกสันร่องหรือยกแปลงให้สูงจากระดับดินเดิมและทำร่องระบายน้ำไว้ด้วย โดยให้สันร่องสูง 20 - 30 เซนติเมตร กว้าง 45-50 เซนติเมตร และควรเว้นช่องว่างระหว่างแปลงย่อย 30-50 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไปดูแลรักษา (กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2533)

วิธีการปลูก

วิธีปลูกจะใช้เหง้าขมิ้นชันแก่ที่มีอายุ 11 – 12 เดือน นำมาตัดเป็นท่อนๆ ให้มีตาท่อนละ 1-2 ตา ผึ่งท่อนพันธุ์ขมิ้นชันลงไปบนดินลึก 5 - 7 เซนติเมตร ระยะปลูกที่ใช้คือ 20 x 20 เซนติเมตร หรือ 30 x 30 เซนติเมตร หรือ 35 x 35 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของขมิ้นชัน พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 250 – 400 กิโลกรัม ท่อนพันธุ์ชนิดแง่มหรือหัวซึ่งตัดเป็นท่อนๆ จะให้ผลผลิตสูงกว่าส่วนอื่นๆ (รุ่งรัตน์, 2535) ในบางท้องถิ่นที่ซึ่งเป็นป่าเปิดใหม่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว หลังจากถางป่าทำลายพวงวั้นพืช ก็จะทำกรไถพรวนดินสองครั้ง การปลูกของเกษตรกรมักจะมีการปลูกโดยไม่ยกดินเป็นร่องสูง ใช้ระยะปลูกตามที่กล่าวข้างต้น หลังจากปลูกประมาณ 5 - 7 วัน ขมิ้นชันจะเริ่มงอก หากฝนไม่ตกควรมีการรดน้ำเพิ่มเติม (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน, 2541)

การดูแลรักษา

การคลุมแปลง (กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร, 2533) หลังจากปลูกแล้วควรใช้ฟางข้าวหรือใบหญ้าคาคลุมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมาคลุมแปลงปลูก เพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน และช่วยรักษาความชื้นในดินซึ่งจะมีผลดีต่อการงอกของขมิ้นชันเป็นการประหยัดการใช้น้ำและแรงงาน ส่วนในเรื่องของการให้น้ำแก่ขมิ้นชันกล่าวคือหลังจากปลูกเหง้าพันธุ์แล้วควรรดน้ำให้ชุ่มเพื่อรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมต่อการงอก และทำอย่างต่อเนื่องในระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะที่ต้นยังมีขนาดเล็ก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหรือให้เมื่อดินแห้ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดผลทิ้งช่วง (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน, 2541) ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความชื้นในอากาศเมื่อพืชเริ่มโตการให้น้ำควรลดลงหรือให้ตามความเหมาะสม โดยทั่วไปในฤดูฝนที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำเพิ่มและควรระมัดระวังไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงปลูกนานๆ เพราะจะทำให้ต้นเน่าเสียหายได้และจะหยุดให้น้ำในระยะที่ ต้นเริ่มมีใบสีเขียวในฤดูแล้งซึ่งเป็นระยะพักตัว (กองวิจัยพืชสมุนไพร, 2533 และองอาจ และคณะ, 2539)

การใส่ปุ๋ย

ขมิ้นชันที่ปลูกควรมีการให้ปุ๋ย ซึ่งได้แก่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ,16-16-16 หรือ 13-13-21 โดยควรใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อขมิ้นชันมีอายุ 1-2 เดือน ในอัตรา 15 กรัมต่อต้น หรือ 50 กิโลกรัมต่อไร่ และเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ครั้งที่ 2 เมื่อขมิ้นชันอายุประมาณ 2-4 เดือนในอัตราประมาณ 30 กรัมต่อต้นหรือ 100 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยควรใส่ทางโคนต้น 8-15 เซนติเมตร โดยการขุดหลุมฝังหรือหว่านระหว่างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบและควรให้น้ำทันทีหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง (กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร, 2533 และราเชนทร์ และคณะ, 2536)

การเก็บเกี่ยว

หลังจากปลูกขมิ้นชันได้ประมาณ 7 เดือน ใบบางๆ ของขมิ้นชันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าขมิ้นชันเริ่มแก่แล้ว ให้ปล่อยให้ขมิ้นชันไว้ในแปลงจนมีอายุ 9-10 เดือน แล้วจึงเริ่มขุดซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม การขุดต้องพยายามไม่ให้จอบโดนเหง้าเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราในขณะเก็บรักษา จากนั้นจึงตัดใบ รากและนำมาล้างน้ำให้สะอาด ขมิ้นชันกอหนึ่งๆ จะมีหัวประมาณ 2-8 อัน และมีแง่นิ้วมือประมาณ 10-40 อัน ให้ผลผลิตประมาณ 3,200-3,500 กิโลกรัมต่อไร่ (รุ่งรัตน์, 2540)

การทำให้แห้ง ทำโดยการนำขมิ้นชันไปต้ม ใช้เวลาดำประมาณ 1-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณขมิ้นชัน การต้มมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เซลล์ของขมิ้นชันตายและป้องกันการระเหยของน้ำ จากนั้นจึงนำไปตากเมื่อแห้งแล้วแงงของขมิ้นชันจะมีลักษณะตึงสวยและเก็บไว้ได้นาน ขมิ้นชันเมื่อต้มเสร็จแล้วจะมีเนื้ออ่อนนุ่ม สีเหลืองเข้ม บางพื้นที่นิยมแช่ขมิ้นชันในน้ำปูนใสก่อนที่จะนำไปตากแห้งเพื่อช่วยให้มีความแห้งอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องใช้เวลาตากพอสมควร ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับลักษณะแงงของขมิ้นชันด้วย แแงงหัวจะแห้งช้ากว่าแงงนิ้วมือเนื่องจากแงงหัวมีขนาดใหญ่กว่าและหนากว่า แแงงขมิ้นชันที่แห้งดีแล้วจะมีลักษณะแห้งเปราะ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย หลังจากนั้นจึงนำไปขัดเปลือกหรือลอกเปลือกออกเพื่อให้แงงขมิ้นชันดูสวยขึ้น (นิจศิริ, 2542 ; ชยันต์ และ วิเชียร, 2545)

การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันโดยการเก็บรวบรวมพันธุ์ปลูกทดของและคัดเลือกสายพันธุ์

1. ทำการเก็บรวบรวมพันธุ์ขมิ้นทั้งหมด 86 สายพันธุ์จากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะทางเกษตรดี (Good agronomic characters) กล่าวคือ มีความสูงของลำต้นตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป มีความกว้างของใบตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ้นไป มีความยาวของใบตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป มีเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นตั้งแต่ 6 เซนติเมตร ขึ้นไปให้ผลผลิตน้ำหนักสดของเหง้าต่อต้นตั้งแต่ 175 กรัมขึ้นไป พื้นที่ใบเสียหายเนื่องจากโรคแอนแทรกคโนส (*Colletotrichum capsici*) ในสภาพไร่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยหาค่าเฉลี่ยรวมจากทุกใบ และมีพื้นที่ใบเสียหายเนื่องจากหนอนกัดกินใบในสภาพไร่ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยหาค่าเฉลี่ยจากทุกใบ (บุญหงส์, 2548)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. นำสายพันธุ์มันชั้นที่คัดเลือกได้ตามคุณสมบัติในข้อ 1 ไปปลูกทดสอบและคัดเลือกซ้ำในแปลงทดลองของเกษตรกรที่ตำบลหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เหง้าขนาดเดียวกันที่มี 2 ตาปลูกแบบฝังลงในหลุม ๆ ละ 1 เหง้า ให้มีระยะห่างระหว่างหลุม และระหว่างแถวเป็น 30×50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยขี้วัวหมักแห้งอัตรา 1 ตันต่อไร่และปุ๋ยมาร์ล 305 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมการเตรียมดิน ให้น้ำแก่ขมิ้นชั้นหลังปลูกและเฉพาะในวันที่มีฝนตกจนดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกโดยการถอนวัชพืชซึ่งไม่มีการใช้สารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูใดๆ ทั้งสิ้น เก็บข้อมูลโดยการบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตทางลำต้นและปฏิกิริยาความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและหนอนกักกินใบตั้งแต่ระยะหลังออกจนถึงระยะการเก็บเกี่ยว ทำการสุ่มวัดความสูงของต้น ความกว้างและความยาวของใบเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น เปอร์เซ็นต์พื้นที่ใบเสียหายเนื่องจากโรคแอนแทรคโนสและหนอนกักกินใบเมื่อขมิ้นชั้นอยู่ในช่วงการออกดอก (อายุประมาณ 5 เดือน) ทำการสุ่มชั่งน้ำหนักสดของเหง้าสดของแต่ละสายพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว นำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกสายพันธุ์ (บุญหงส์, 2548)

3. นำผงบดแห้งของเหง้าขมิ้นชั้นของสายพันธุ์มันชั้นที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตควบคู่กับการลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสและหนอนกักกินใบดีที่สุดจำนวน 4 สายพันธุ์ไปวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกสายพันธุ์ที่รอดตายหลังการแช่เหง้าในสารละลายคอลลอยซิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ของสายพันธุ์ TU 04-9 และ TU 04-38 เป็น 28 และ 32 ต้นตามลำดับ ซึ่งจำนวนต้นรอดตายทั้งหมดจะถูกนำไปปลูกเป็นต้น M เพื่อคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่เกิดจากกลายพันธุ์ในช่วงอายุของฤดูกาลปลูกต่อไป (บุญหงส์, 2548)

ปริมาณการให้น้ำและการขาดน้ำที่มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช

น้ำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของเซลล์พืช น้ำช่วยละลายแร่ธาตุและอาหารต่างๆ ซึ่งใช้ในการเจริญเติบโต กระบวนการเมตาบอลิซึม ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์จะต้องอาศัยน้ำ โดยน้ำมีส่วนร่วมในปฏิกิริยานั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นยังช่วยรักษาอุณหภูมิของพืชมิให้เกิดความผันแปรมากด้วย (สมบุญ, 2544) Doorenbos and Pruitt (1977) ได้อธิบายถึงความหมายของความต้องการน้ำของพืชคือ ปริมาณน้ำที่ใช้ไปในการระเหยน้ำ (ET, Evapotranspiration) ซึ่งประกอบด้วย 2 กระบวนการได้แก่ การระเหยของน้ำจากผิวดิน (Evaporation) และการคายน้ำของพืช (Transpiration) หรืออาจเรียกว่า Water consumptive use of crop หรือ Crop water use (ธวัชชัย, 2526 ; วิบูลย์, 2526) การระเหยของน้ำในฤดูกาลหนึ่งๆ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำที่พืชได้รับ ชนิดของพืช ชนิดของดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยามให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดินเป็นต้น การระเหยน้ำจากผิวดินมักเกิดขึ้นควบคู่กับการคายน้ำของพืช การระเหยน้ำจากผิวดิน ในฤดูกาลหนึ่งๆ มีค่าโดยประมาณเท่ากับค่าการคายน้ำของพืช หรืออีกนัยหนึ่งค่าการระเหยของน้ำจากผิวดินจะมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าการระเหยน้ำ (นิภา, 2531) สมยศ และสมมารอด (2543) ได้ศึกษาถึงผลของการให้น้ำในระดับที่แตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ถั่วพุ่ม พบว่าถั่วพุ่มมีการตอบสนองต่อปริมาณน้ำที่ได้รับคือถั่วพุ่มที่ได้รับน้ำในระดับที่มากจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้น และผลผลิตแห้งรวมสูงกว่าถั่วพุ่มที่ได้รับน้ำในระดับที่น้อยลง

สำหรับขมิ้นชันเป็นพืชที่ต้องการความชื้นในดินสูง ปกติต้องการน้ำประมาณ 1,250 – 2,250 มิลลิเมตรต่อปี (รุ่งรัตน์, 2540) หรือมีปริมาณน้ำฝน 1,200 – 1,400 มิลลิเมตร ในเวลา 100 – 120 วัน หลังปลูก (ปราณี และ พิสิรี, 2544) แต่ไม่ต้องการสภาพชื้นแฉะเพราะจะทำให้เหง้าขมิ้นชันเน่าเสียหาย ดังนั้นหลังจากปลูกเหง้าขมิ้นชันแล้วควรรดน้ำให้ชุ่มเพื่อรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมต่อการงอก และทำอย่างต่อเนื่องในระยะเริ่มปลูกถึงระยะที่ต้นยังมีขนาดเล็ก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหรือให้เมื่อดินมีความชื้นน้อย โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน (พเยาว์, 2529) ปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความชื้นในอากาศ เมื่อขมิ้นชันเริ่มโตการให้น้ำควรให้ลดลงหรือให้ตามความเหมาะสม โดยทั่วไปในฤดูฝนที่มีฝนตกสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องมีการให้น้ำเพิ่ม และควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ำในแปลงปลูกเป็นระยะเวลานานๆ เพราะจะทำให้ต้นเน่าเสียหายได้ และจะหยุดให้น้ำในระยะที่ต้นเริ่มมีใบเหลืองในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ขมิ้นจะเข้าสู่ระยะพักตัวตามธรรมชาติ (พเยาว์, 2537)

ในสภาวะที่พืชขาดน้ำโดยพืชมีอัตราการคายน้ำมากกว่าอัตราการดูดน้ำ เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำในใบพืชลดลงจนมีผลต่อสรีรวิทยาของพืช ซึ่งการตอบสนองของกระบวนการทางสรีรวิทยาและกระบวนการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการขาดน้ำ และช่วงเวลาการขาดน้ำ (สายัณห์, 2537 ; อภิพรณ, 2544) อาการที่มองเห็นได้ชัดเจนคือ การเหี่ยวของใบ อาการที่เกิด มี 2 รูปแบบ คือ

1. อาการเหี่ยวระยะสั้นหรือชั่วคราว (Temporary wilting หรือ Transient wilting) อาการเหี่ยวลักษณะนี้มักเกิดกับพืชอวบน้ำ (Herbaceous plant) ที่เรียกว่าชั่วคราวเพราะว่าเกิดภายใต้สภาพอากาศที่มีแสงอาทิตย์ตลอดวันและอากาศร้อนหรือมีลมพัดแรง พอเวลาเย็นหรือกลางคืนอาการเหี่ยวจะหายไป ดังนั้นอาการเหี่ยวแบบนี้จึงเป็นอาการปกติที่มักจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าดินจะมีความชื้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโต (Kramer, 1969 ; Treshow, 1970 ; Greulach and Adams, 1976 ; Mingcai *et al.*, 2007 ; Guo *et al.*, 2007)

2. อาการเหี่ยวถาวร (Permanent wilting) เป็นอาการเหี่ยวที่เกิดนานกว่าชนิดแรก เป็นลักษณะการขาดน้ำอย่างรุนแรง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำในดินมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การดึงดูน้ำของ

รากลดลงทำให้ใบและลำต้นเกิดอาการเหี่ยวและพับตัวลง อาการนี้จะไม่หายไป ถึงแม้จะมีการให้น้ำแก่พืช (Kramer, 1969 ; Greulach and Adams, 1976 ; Sang-Hyun *et al.*, 2006 ; Ergun *et al.*, 2007)

อาการเหี่ยวของพืช ไม่ว่าจะ เป็นแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ตามถ้าเกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิด Physiological stress กิจกรรมของ Metabolism ถูกจำกัด เกิดการผิดปกติของโครงสร้าง (Anatomy) และรูปร่าง (Morphology) (Kramer, 1969 ; Treshow, 1970) สมยศ (2544) พบว่า ตะไคร้ที่ขาดน้ำจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นลดลง ลำต้นแคระแกรน ความสูงลดลง มีการแตกกออ่อนโยม รวมไปถึงการสะสมน้ำหนักแห้งมีค่าลดลงมาก ผลในลักษณะนี้ยังพบในพืชอื่นอีกหลายชนิดเช่น ถั่วเหลือง (สมยศ และ ธวัชชัย, 2542) กก (สมยศ และคณะ, 2541) งา (สมยศ, 2542) และถั่วพุ่ม (สมยศ และสมมารด, 2543) เป็นต้น กระบวนการ Metabolism และการเจริญเติบโตระหว่างที่เกิด Water stress ขึ้นในพืช ในส่วนของ Protoplasm จะเกิดการหดตัว (Protoplasmic dehydration) ทำให้มีการลดกิจกรรมต่างๆ ทางสรีรวิทยาของเซลล์ เช่น การหายใจลดลง การขยายตัวของเซลล์ลดลง ทำให้ขนาดใบลดลง การยึดตัวของส่วนยอดและรากลดลง การสังเคราะห์แสงลดลง ทำให้พืชเจริญเติบโตลดลง (Treshow, 1970 ; Pereyra *et al.*, 2006 ; Qiang *et al.*, 2006 ; Galmes *et al.*, 2007 ; Zobayed *et al.*, 2007)

อิทธิพลและความต้องการน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เมื่อพืชขาดน้ำการเจริญเติบโตทางลำต้นและการสะสมน้ำหนักแห้งจะมีค่าลดลง (สุทธิพร, 2524) เช่น จากการทดลองของ สมยศ (2542) พบว่าความถี่ของการให้น้ำแก่งามีผลต่อการเจริญเติบโตของงา ซึ่งงาที่ได้รับน้ำบ่อยครั้งกว่า คือ ทุก 3 วัน จะมีน้ำหนักแห้งรวมมากกว่างาที่ได้รับน้ำนานครั้ง คือ ทุก 7 วัน และเมื่อให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่า การให้น้ำในปริมาณที่มาก คือ ครั้งละ 30 และ 40 มิลลิเมตร น้ำหนักแห้งรวมของงามีค่ามากกว่าการได้รับน้ำในปริมาณน้อย คือ 30 และ 20 มิลลิเมตร ตามลำดับและเมื่อพิจารณาน้ำหนักแห้งรวมและผลผลิตเมล็ด พบว่าทั้งความถี่และปริมาณในการให้น้ำมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับน้ำหนักแห้งรวมและผลผลิตเมล็ด

พืชที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ลดลงจะมีผลทำให้พืชเกิดการขาดน้ำขึ้นได้ ในพืชหัวบางชนิดที่ขาดน้ำดังเช่น รายงานของ สมยศ (2542) พบว่า มันเทศที่ขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิตหัวเป็นอย่างมาก โดยผลผลิตหัวจะมีค่าลดลงเมื่อเกิดการขาดน้ำขึ้นในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโต

วรวิทย์ (2531) รายงานว่าต้นกาแฟที่ปลูกอยู่ในสภาวะขาดน้ำเป็นเวลานานในช่วงฤดูแล้งมีผลทำให้พฤติกรรมของปากใบได้รับความกระทบกระเทือนในขณะที่ผลกำลังเจริญเติบโตและใช้

อาหารในปริมาณมากจึงทำให้การพัฒนาของผลกาแฟเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์และยังส่งผลไปถึงการเจริญเติบโตด้วย

Cannel (1985) ขณะมีการพัฒนาของผลกาแฟจะมีการดึงอาหารไปสร้างที่ใบเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อาหารไม่สามารถส่งไปยังรากได้เพียงพอและยังมีการนำเอาคาร์โบไฮเดรตซึ่งสะสมไว้ในกิ่งออกไปใช้ด้วยทำให้อาหารในส่วนของลำต้นเกิดความไม่สมดุลเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด อากาตายมากขึ้น

ในถั่วพุ่มที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ลดลงและและควมถี่ในการให้น้ำหนักแห้งของราก ลำต้น ใบ และผลผลิตลดลง และยังมีผลต่อ อุณหภูมิใบที่เพิ่มขึ้น แต่ค่า Total stomata conductance และค่า Transpiration rate ลดลง (สมยศ และสมมารต, 2543)ซึ่งการที่อุณหภูมิของใบสูงขึ้นเมื่อขาดน้ำ เกิดเมื่อพืชได้รับน้ำลดลงหรือขาดน้ำก็จะมีผลต่อศักยภาพของน้ำในใบที่ลดลง (Sivarkumar and Shaw, 1978) การคายน้ำจึงลดลง อุณหภูมิภายในใบจึงสูงขึ้น (Pandy et al., 1984) สำหรับค่า Total stomata conductance และค่า Transpiration rate ที่ลดลงนั้นเนื่องมาจากทั้ง 2 ค่านี้มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าของอุณหภูมิใบ (Lawn, 1982) ผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดยังพบได้ในพืชอีกหลายชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง (Turner and Burch, 1983) และทานตะวัน (Turner, 1986) เป็นต้น

สำหรับขม้นชั้นนั้นการปลูกในพื้นที่ชลประทานซึ่งได้รับปริมาณ และควมถี่ในการให้น้ำที่สม่ำเสมอจะใช้ระยะเวลาออกเพียง 15 วัน แต่ถ้าปลูกแต่ในพื้นที่ที่อาศัยแต่น้ำฝนเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความถี่และปริมาณการให้น้ำที่ไม่แน่นอนหรือมีน้อย จะใช้ระยะเวลาในการงอกถึง 30 วัน (รุ่งรัตน์ , 2540) และถ้าได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไป โดยเฉพาะหลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่ขม้นชั้นกำลังงอก ก็จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกในแปลงปลูกต่ำ (วันดี, 2538 ; สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541) อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับขม้นชั้นยังมีน้อยมาก และการศึกษาถึงการตอบสนองของขม้นชั้นที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อการให้น้ำยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนั้นจึงทำการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

- 1) จอบ เสียม
- 2) บัวรดน้ำ
- 3) ช้อนปลูก
- 4) กรรไกร
- 5) ถุงพลาสติกสีดำ
- 6) มีด
- 7) ถุงกระดาษเก็บตัวอย่าง

2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์

- 1) ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ยี่ห้อ WTB binder รุ่น 7200 Tuttlingen
- 2) เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Adam รุ่น AFP-3100L
- 3) เครื่องวัดพื้นที่ใบ (Leaf area meter) ยี่ห้อ Li – COR รุ่น LI – 3100
- 4) โพรมิเตอร์ (Porometer) LI – COR รุ่น LI-1600 Steady state
- 5) ถาดวัดการระเหยของน้ำ (American class A pan)
- 6) เครื่องมือวัดข้อมูลอุณหภูมิมิถุนวิทยา ยี่ห้อ Delta – T Logger รุ่น DL2e
- 7) กระป๋องเก็บตัวอย่างดิน (Soil moisture can)

สถานที่ทำการทดลอง

แผนการทดลองเป็นการศึกษาถึงผลของปริมาณการให้น้ำชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design มีจำนวน 4 ซ้ำ สิ่งทดลองได้แก่ ปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณน้ำที่ให้ต่อการระเหย (Irrigation water to evaporation, IW/E) 5 อัตราดังนี้คือ

1. IW/E 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ให้ต่อครั้งเท่ากับ 3 มิลลิเมตร
2. IW/E 0.3 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ให้ต่อครั้งเท่ากับ 9 มิลลิเมตร
3. IW/E 0.5 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ให้ต่อครั้งเท่ากับ 15 มิลลิเมตร
4. IW/E 0.7 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ให้ต่อครั้งเท่ากับ 21 มิลลิเมตร
5. IW/E 1.0 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ให้ต่อครั้งเท่ากับ 30 มิลลิเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการทดลอง

ปลูกขมิ้นชันลงในแต่ละแปลงย่อย ขนาด 2×3 เมตร จำนวนทั้งหมด 20 แปลง แปลงละ 150 ต้น ขมิ้นชันที่นำมาใช้ปลูกคัดเลือกเอาเหง้าแก่ที่มีอายุ 11-12 เดือน และตัดเป็นท่อนๆ ให้มีความยาวของเหง้าประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งจะมีตาบนท่อนพันธุ์ประมาณ 2-3 ตา ปลูกลงในแปลงโดยมีความลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร ระยะปลูกที่ใช้คือ 20×20 เซนติเมตร หลังจากการปลูกในช่วงแรกต้องให้น้ำแก่ขมิ้นชันอย่างสม่ำเสมอทุก 2 วัน โดยควบคุมการให้น้ำในปริมาณที่จำกัด ครั้งละ 10 มิลลิเมตร การให้น้ำในปริมาณที่มากกว่านี้ ไม่ควรกระทำเพราะจะทำให้ท่อนพันธุ์เน่าได้ เมื่อขมิ้นชันอายุได้ 30 วัน ก็จะให้ปริมาณน้ำตามกำหนดไว้ในสิ่งทดลอง ช่วงเวลาของการให้น้ำคือให้น้ำในตอนเช้าที่มีลมสงบ ซึ่งการให้น้ำคือใช้บัวรดน้ำโดยมีการตวงน้ำตามปริมาณที่กำหนดและทำการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอในทุกแปลงย่อย ปริมาณที่ให้ในแต่ละครั้งมีการบันทึกไว้ตั้งแต่หลังการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยปริมาณน้ำที่ให้ได้จากค่าการระเหยของน้ำจากภาชนะ American class A pan ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแปลงทดลอง ประมาณ 20 เมตร เป็นตัวกำหนดปริมาณและระยะเวลาการให้น้ำในแต่ละครั้ง ซึ่งวิธีการให้น้ำทุกวิธีการ เมื่อค่าการระเหยของน้ำจากภาชนะที่ระเหยครบ 30 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งขมิ้นชันมีอายุก่อนการเก็บเกี่ยว 30 วัน จึงหยุดให้น้ำชลประทานซึ่งข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการคำนวณหาค่า ปริมาณการใช้น้ำของขมิ้นชัน และประสิทธิภาพการใช้น้ำของขมิ้นชัน

การเก็บข้อมูล

- 1) ตรวจวัดความสูงของลำต้นขมิ้นชันทุกเดือน ตั้งแต่หลังจากปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวคือที่อายุ 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 วันหลังปลูก
- 2) ตรวจวัดจำนวนลำต้นต่อกระถาง น้ำหนักต้นแห้ง ใบแห้ง และดอกแห้ง และจำนวนหัวหรือเหง้าต่อกระถาง น้ำหนักเหง้าสดและแห้ง ของขมิ้นชันทุกเดือนตั้งแต่อายุ 30 วันหลังปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
- 3) ตรวจวัดหาค่าดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf area index) ทุกเดือนตั้งแต่อายุ 30 วันหลังจากปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยการนำใบของขมิ้นชันมาวัดพื้นที่ใบ ทำโดยใช้เครื่องมือวัดพื้นที่ใบชนิด Automatic area meter model LI – 3100 และคำนวณตามวิธีของ Ghosh (2004) โดยใช้สูตรดังนี้

$$\text{Leaf area index} = LA/GA$$

$$\text{เมื่อ } LA = \text{พื้นที่ใบทั้งหมด (Total leaf area)}$$

$$GA = \text{พื้นที่ดิน (Ground area)}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4) คำนวณหาค่าอัตราการเจริญเติบโตของขมิ้นชัน (Crop growth rate) ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 30 วันหลังปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวตามวิธีการของ Hunt (1978) โดยใช้สูตร

$$\text{Crop growth rate} = \frac{1}{GA} \times \frac{(W_2 - W_1)}{(T_2 - T_1)}$$

เมื่อ	GA	=	พื้นที่ดิน (Ground area)
	W_1	=	น้ำหนักแห้งทั้งหมดที่ระยะเวลา T_1
	W_2	=	น้ำหนักแห้งทั้งหมดที่ระยะเวลา T_2
	T_1	=	ระยะเวลาในการวัดน้ำหนักแห้งทั้งหมด ครั้งที่ 1
	T_2	=	ระยะเวลาในการวัดน้ำหนักแห้งทั้งหมด ครั้งที่ 2

5) ตรวจวัดอุณหภูมิใบ (Leaf temperature) อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate) และค่า Total conductance ของขมิ้นชัน เมื่อขมิ้นชันมีอายุได้ 30, 60, 90, 120, 150 และ 180 วันหลังปลูก โดยใช้เครื่องมือ LI - 1600 Steady state porometer โดยทำการสุ่มวัดใบ ที่มีการขยายตัวเต็มที่อยู่บริเวณตอนบนสุดของลำต้น วัดจำนวน 3 ใบ แล้วจึงนำมาหาค่าเฉลี่ย

6) คำนวณหาค่า Relative water content ของใบขมิ้นชัน เมื่อขมิ้นชันมีอายุ 60, 90, 120 และ 180 วันหลังปลูก โดยทำการตัดใบที่มีการขยายตัวเต็มที่และอยู่บริเวณบนสุดของลำต้นแล้วนำมาวัดหาจุดกึ่งกลางใบและทำเครื่องหมายไว้ และใช้ที่เจาะตาไก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ที่มีความคมตัดตรงบริเวณจุดกึ่งกลางใบที่ทำเครื่องหมายไว้ นำชิ้นส่วนตัวอย่างใบที่ได้ใส่ลงใน Capped micro-centrifuge tubes ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ทำการชั่งและจดบันทึกน้ำหนักสดของชิ้นส่วนตัวอย่างใบ (FW) แล้วนำชิ้นส่วนตัวอย่างใบออกมาใส่ลงใน Petri dish ที่ใส่น้ำกลั่นไว้ แช่ชิ้นส่วนตัวอย่างใบไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (Burrs and Weatherly, 1962) ภายใต้อุณหภูมิห้อง แสง Fluorescent 30 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที หลังจากนั้นจึงนำชิ้นส่วนตัวอย่างใบออกมาและซับด้วยกระดาษกรอง แล้วนำชิ้นส่วนตัวอย่างใบมาใส่ลงใน Capped micro-centrifuge tubes อีกครั้ง ทำการชั่งและจดบันทึกน้ำหนักชิ้นส่วนตัวอย่างใบเมื่ออิมด้วยน้ำ (TW) แล้วนำชิ้นส่วนตัวอย่างใบเข้าอบในตู้อบความร้อน ที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงชั่งหาน้ำหนักแห้งของชิ้นส่วนตัวอย่างใบ (DW) และนำค่าที่ได้ทั้งหมดหักลบกับน้ำหนักของ Capped micro-centrifuge tubes แล้วจึงนำค่าที่ได้ทั้งหมดคำนวณตามวิธีของ Turner (1981) โดยใช้สูตรดังนี้

$$\text{Relative water content (\%)} = \frac{FW - DW}{TW - DW} \times 100$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อ FW = น้ำหนักสดของใบที่ต้องการวัด
 DW = น้ำหนักแห้งของใบ
 TW = น้ำหนักของใบเมื่ออิมตัวไปด้วยน้ำ

7) เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน เมื่อขมิ้นชันมีอายุได้ 30,60, 90,120,150 และ 180 วันหลังปลูก และช่วยเก็บเกี่ยวโดยใช้สูตรดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน} = \frac{\text{ดินเปียก} - \text{ดินแห้ง}}{\text{ดินแห้ง}} \times 100$$

8) ตรวจวัดปริมาณน้ำที่ให้แก่ขมิ้นชันทั้งหมดในแต่ละครั้งและทุกๆ สิ่งทดลองเพื่อนำไปหาปริมาณน้ำที่ให้แก่ขมิ้นชันทั้งหมด

9) ข้อมูลอุณหภูมิจากสถานีตรวจอากาศของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำการตรวจวัดทุกวัน ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ความเร็วลม อุณหภูมิของอากาศ และการระเหยของน้ำจากภาควัดการระเหยของน้ำ (American class A pan) เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการคำนวณหา ปริมาณการใช้น้ำของขมิ้นชัน ตามวิธีการของ Doorenbos and Pruiit (1997)


ผลการทดลอง

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ทำการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ (ภาพที่ 1A) มีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีค่าอุณหภูมิ เท่ากับ 36.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีอุณหภูมิ เท่ากับ 18.00 องศาเซลเซียส สำหรับค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเฉลี่ย ในช่วง ระหว่างการทดลองเท่ากับ 23.20 ถึง 31.80 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1B)

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเฉลี่ย (ภาพที่ 1C) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 มีค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยประมาณ 71.69 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีค่าต่ำที่สุดในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมีค่าเท่ากับ 49 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีค่าสูงที่สุดในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยมีค่าเท่ากับ 92 เปอร์เซ็นต์


ปริมาณน้ำฝน (ภาพที่ 2) ที่ตกลงมาขณะทำการทดลอง ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 และช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นช่วงที่มีความถี่ในการตกของฝนน้อยมาก โดยมีปริมาณน้ำฝนที่ตกประมาณ 36.1 และ 42.8 มิลลิเมตร ตามลำดับ สำหรับในเดือนมิถุนายน เป็นช่วงกลางของฤดูปลูกซึ่งมีความถี่ในการตกของฝนบ่อยครั้ง โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกในเดือนนี้ประมาณ 360 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามตลอดช่วงฤดูปลูกมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดมีปริมาณมากถึง 1884.7 มิลลิเมตร



ภาพที่ 1 อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ (A) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ (B) และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (C) ในช่วงที่ทำการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2551

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(ระดับเฉลี่ย) ฝนน้ำบนบก



ภาพที่ 2 ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในช่วงที่ทำการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2551

ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตรวจวัดมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SAS เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งทดลองโดยใช้ค่า Least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (Thorsted *et al.*, 2006) หลังจากนั้นทำกราฟ ตาราง และรายงานผลการทดลอง

ลักษณะทางสรีรวิทยาของขมิ้นชันเมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

ปริมาณน้ำในใบ (Relative water content)

การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณน้ำภายในใบของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 1) ที่อายุ 180 วันหลังปลูกขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 จะมีปริมาณน้ำในใบมากที่สุดเท่ากับ 85.08 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อลดปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันลง (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ขมิ้นชันก็จะมีปริมาณน้ำในใบลดลง (84.62, 79.42 และ 74.50 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีปริมาณน้ำในใบมีค่าต่ำที่สุดเท่ากับ 73.21 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำในใบ (Relative water content) (เปอร์เซ็นต์) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	79.63	78.30	73.26	82.77	80.05	73.21
IW/E 0.3	79.65	77.21	74.32	89.28	84.81	74.50
IW/E 0.5	84.57	81.55	79.21	89.72	85.72	79.42
IW/E 0.7	79.61	85.25	85.42	90.21	87.51	84.62
IW/E 1.0	80.87	89.17	88.47	91.70	88.31	85.08
ค่าเฉลี่ย	80.87	82.29	80.136	88.74	85.28	79.37
LSD(0.05)	ns	10.96	9.63	3.97	7.32	14.44
CV(%)	4.88	8.64	9.63	12.38	5.57	11.81

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุณหภูมิใบ (Leaf temperature)

การให้น้ำในปริมาณที่ต่างกันมีผลต่ออุณหภูมิใบของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 2) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณน้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 ขมิ้นชันจะมีค่าอุณหภูมิใบสูงที่สุดเท่ากับ 35.60 องศาเซลเซียส และเมื่อเพิ่มปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันมากขึ้น (IW/E 0.3 , IW/E 0.5 และ IW/E 0.7) ขมิ้นชันก็จะมีอุณหภูมิใบลดลงตามลำดับ (34.47, 34.42 และ 33.92 เปอร์เซ็นต์) ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 อุณหภูมิใบจะมีค่าต่ำที่สุดเท่ากับ 33.57 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 2 อุณหภูมิใบ (Leaf temperature) (องศาเซลเซียส) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่หลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	37.27	35.72	35.97	35.32	37.52	35.60
IW/E 0.3	39.11	34.40	34.57	34.82	37.07	34.47
IW/E 0.5	39.17	34.12	34.40	33.62	35.80	34.42
IW/E 0.7	39.40	33.22	33.55	32.95	35.45	33.92
IW/E 1.0	38.07	32.65	33.07	32.82	35.07	33.57
ค่าเฉลี่ย	38.60	34.02	34.31	33.91	36.18	34.40
LSD(0.05)	ns	0.82	0.72	0.65	0.91	0.68
CV(%)	3.78	1.57	1.38	1.24	1.64	1.28

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

อัตราการคายน้ำจากใบ(Transpiration rate)

การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราการคายน้ำจากใบของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 3) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก ขมิ้นที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุดคือ IW/E 1.0 จะมีอัตราการคายน้ำจากใบมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 3.68 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที และเมื่อลดปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันลงขมิ้นชันขมิ้นชันก็จะมีอัตราการคายน้ำจากใบลดลงตามลำดับ (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ขมิ้นที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีอัตราการคายน้ำจากใบมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.49 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3 อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate) (ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	0.52	0.72	0.82	1.49	1.40	1.49
IW/E 0.3	0.72	1.63	1.71	2.75	2.95	1.85
IW/E 0.5	0.58	1.47	1.82	3.36	3.50	2.26
IW/E 0.7	0.65	2.11	2.16	3.51	3.57	3.03
IW/E 1.0	0.66	2.14	2.24	4.55	4.72	3.68
ค่าเฉลี่ย	0.62	1.62	1.64	3.13	3.23	2.46
LSD(0.05)	ns	1.21	1.22	1.78	1.72	1.38
CV(%)	31.99	32.83	31.65	36.98	34.70	36.46

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

Total stomata conductance

การให้น้ำในปริมาณที่ต่างกันมีผลต่อค่า Total stomata conductance ของขมิ้นชัน มีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต (ตารางที่ 4) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก ขมิ้นที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุดคือ IW/E 1.0 จะมีค่า Total stomata conductance สูงที่สุดเท่ากับ 11.63 มิลลิโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที และเมื่อลดปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันลง ขมิ้นชันก็จะมีค่า Total stomata conductance ลดลงตามลำดับ (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำน้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีค่า Total stomata conductance ต่ำที่สุดเท่ากับ 5.19 มิลลิโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที

ตารางที่ 4 Total stomata conductance (มิลลิโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	1.29	2.01	2.65	2.77	3.27	5.19
IW/E 0.3	1.40	7.01	7.32	7.45	8.81	5.38
IW/E 0.5	1.13	5.57	7.76	9.08	9.63	5.82
IW/E 0.7	1.20	7.10	8.60	9.27	9.75	8.09
IW/E 1.0	1.35	8.06	8.98	10.11	10.42	11.63
ค่าเฉลี่ย	1.27	5.95	7.06	7.74	8.37	7.22
LSD(0.05)	ns	3.05	2.18	2.35	2.55	4.91
CV(%)	33.14	33.34	20.02	19.73	19.80	44.11

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

การเจริญเติบโตทางลำต้นของขมิ้นชันเมื่อปลูกโดยได้รับน้ำปริมาณที่ต่างกัน

ความสูง (Plant height)

การให้น้ำในปริมาณที่ต่างกันมีผลต่อความสูงของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 5) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่สุด IW/E 1.0 จะมีความสูงมากที่สุดเท่ากับ 40.20 เซนติเมตร และเมื่อลดปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันลง (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ขมิ้นชันก็จะมีความสูงลดลงตามลำดับ (38.17, 35.77 และ 31.50 เซนติเมตร) ขมิ้นที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีความสูงน้อยที่สุดเท่ากับ 29.37 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกับความสูงของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณ IW/E 1.0

ตารางที่ 5 ความสูง (เซนติเมตร) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่ขหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	13.25	15.52	24.37	25.16	28.25	29.37
IW/E 0.3	14.50	21.25	29.12	30.00	30.75	31.50
IW/E 0.5	13.25	18.62	32.25	33.83	35.75	35.77
IW/E 0.7	13.75	23.50	32.62	34.00	37.50	38.17
IW/E 1.0	14.12	24.00	35.75	36.00	37.75	40.20
ค่าเฉลี่ย	13.77	18.46	30.82	31.80	34.00	35.00
LSD(0.05)	ns	6.62	8.32	9.02	5.28	3.38
CV(%)	13.53	20.96	17.53	10.60	10.09	6.26

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

จำนวนต้น (Corn let number)

ปริมาณน้ำที่แตกต่างกันมีผลต่อจำนวนต้นของขมิ้นชันซึ่งมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต (ตารางที่ 6) ยกเว้นช่วงแรกของการเจริญเติบโต (ที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูก) ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่อายุ 180 วันหลังปลูกพบว่าปริมาณน้ำที่ให้แก่ขมิ้นชันในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 ขมิ้นชันจะมีจำนวนต้นต่อหลุมเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.50 ต้นต่อหลุม และจำนวนต้นจะมีค่าลดลงเป็น (4.25, 3.50 และ 2.50 ต้นต่อหลุม) ตามปริมาณน้ำที่ลดลงคือ IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3 ตามลำดับ ส่วนที่ระดับปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 ที่ให้แก่ขมิ้นชันพบว่าขมิ้นชันมีจำนวนต้นต่อหลุมเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.00 ต้นต่อหลุม

ตารางที่ 6 จำนวนต้น (ต้นต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	1.25	1.50	1.50	1.50	1.75	2.00
IW/E 0.3	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
IW/E 0.5	1.00	1.50	2.75	3.00	3.25	3.50
IW/E 0.7	1.25	1.50	3.25	3.75	4.00	4.25
IW/E 1.0	1.00	1.25	3.75	4.00	4.25	4.50
ค่าเฉลี่ย	1.00	1.45	2.60	2.85	3.10	3.35
LSD(0.05)	ns	ns	0.97	1.40	1.08	1.05
CV(%)	29.92	34.48	24.32	32.03	22.80	20.39

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซนต์

ดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf area index)

ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าดัชนีพื้นที่ใบให้มีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต (ตารางที่ 7) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก พบว่าขมิ้นชันที่ได้รับปริมาณน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 มีค่าดัชนีพื้นที่ใบมากที่สุดเท่ากับ 11.17 และดัชนีพื้นที่ใบมีค่าลดลงเมื่อปริมาณการให้น้ำลดลงคือ IW/E 0.7 , IW/E 0.5 และ IW/E 0.3 ตามลำดับและดัชนีพื้นที่ใบจะมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 3.67 เมื่อขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่ากับ IW/E 0.1

ตารางที่ 7 ดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf area index) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	0.28	1.02	2.42	3.12	3.51	3.67
IW/E 0.3	0.28	1.17	3.71	4.77	6.90	7.14
IW/E 0.5	0.23	2.25	4.80	7.07	7.74	7.95
IW/E 0.7	0.22	2.50	5.41	9.39	9.40	9.73
IW/E 1.0	0.25	2.50	6.12	10.40	10.99	11.17
ค่าเฉลี่ย	0.25	1.71	4.49	6.95	7.71	7.93
LSD(0.05)	ns	1.09	1.83	2.43	1.84	1.73
CV(%)	20.14	41.45	26.49	18.59	15.57	14.14

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

น้ำหนักใบแห้ง (Leaf dry weight)

การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันแก่ขมิ้นชันมีผลต่อการสะสมน้ำหนักใบแห้งของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 8) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก การสะสมน้ำหนักใบแห้งของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุด คือ IW/E 1.0 มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 27.37 กรัมต่อหลุม และเมื่อขมิ้นได้รับน้ำในปริมาณที่ลดลง (IW/E 0.7 ,IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) การสะสมน้ำหนักใบแห้งของขมิ้นชันก็มีค่าลดลงตามลำดับ (20.94, 16.26 และ 12.99 กรัมต่อหลุม) ส่วนขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณน้อยที่สุด คือ IW/E 0.1 จะมีน้ำหนักใบแห้งที่น้อยที่สุดเท่ากับ 10.45 กรัมต่อหลุม เมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุด คือ IW/E 1.0

ตารางที่ 8 น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	0.46	2.29	4.53	6.43	9.92	10.45
IW/E 0.3	0.42	1.97	6.76	8.64	12.76	12.99
IW/E 0.5	0.33	2.83	8.35	12.22	14.67	16.26
IW/E 0.7	0.38	3.75	9.84	16.61	18.83	20.94
IW/E 1.0	0.39	4.30	11.50	18.35	22.89	27.37
ค่าเฉลี่ย	0.40	3.03	8.19	12.45	15.81	17.60
LSD(0.05)	ns	1.63	2.74	3.32	3.95	6.06
CV(%)	24.49	34.92	21.69	14.18	16.23	22.35

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

น้ำหนักต้นแห้ง (Stem dry weight)

การได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันของขมิ้นชันมีผลต่อการสะสมน้ำหนักต้นแห้งของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตารางที่ 9) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก การสะสมน้ำหนักต้นแห้งของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณสูงสุดคือ IW/E 1.0 ค่ามากที่สุดเท่ากับ 12.90 กรัมต่อหลุม และเมื่อขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณลดลง (IW/E 0.7 , IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) การสะสมน้ำหนักต้นแห้งของขมิ้นชันก็ลดลงตามลำดับ (11.86, 10.29 และ 7.61 กรัมต่อหลุม) ส่วนขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีน้ำหนักต้นแห้งที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 6.17 กรัมต่อหลุม เมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0

ตารางที่ 9 น้ำหนักต้นแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่ขหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	0.81	2.06	2.64	4.57	5.21	6.17
IW/E 0.3	0.61	2.13	4.42	5.94	7.54	7.61
IW/E 0.5	0.61	2.54	5.73	8.49	9.01	10.29
IW/E 0.7	0.48	3.73	6.45	11.69	11.74	11.86
IW/E 1.0	0.62	4.43	7.63	12.20	12.42	12.90
ค่าเฉลี่ย	0.62	2.98	5.37	8.58	9.18	9.76
LSD(0.05)	ns	1.78	2.09	2.48	2.65	2.25
CV(%)	34.83	38.96	25.33	15.37	18.73	14.99

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

จำนวนเหง้า

การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่อจำนวนเหง้าของขมิ้นชันซึ่งมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต (ตารางที่ 10) ยกเว้นช่วงแรกของการเจริญเติบโต (ที่อายุ 30 วัน หลังปลูก) ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่อายุ 180 วันหลังปลูก พบว่าปริมาณน้ำที่ให้แก่ขมิ้นชันในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 ขมิ้นชันจะมีจำนวนเหง้าต่อหลุมเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 26.25 เหง้าต่อหลุม และจำนวนเหง้าจะมีค่าลดลง (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ตามปริมาณน้ำที่ลดลงตามลำดับ (25.75, 24.75 และ 20.50 เหง้าต่อหลุม) ส่วนที่ปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 ที่ให้แก่ขมิ้นชันพบว่าขมิ้นชันจะมีจำนวนเหง้าต่อหลุมเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 15.75 เหง้าต่อหลุม

ตารางที่ 10 จำนวนเหง้า (เหง้าต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่ขหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	2.0	1.50	4.75	9.00	14.75	15.75
IW/E 0.3	2.25	2.75	5.75	12.25	19.50	20.50
IW/E 0.5	2.00	4.00	6.25	14.75	21.25	24.75
IW/E 0.7	1.75	4.00	7.00	16.25	22.75	25.75
IW/E 1.0	1.75	4.75	8.50	18.25	23.50	26.25
ค่าเฉลี่ย	1.95	3.40	6.45	14.10	20.35	22.60
LSD(0.05)	ns	1.46	1.68	3.28	3.16	3.73
CV(%)	32.76	28.03	16.92	15.10	10.08	10.71

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

น้ำหนักเหง้าสด

การให้น้ำในปริมาณที่ต่างกันแก่ขมิ้นชันมีผลต่อน้ำหนักเหง้าสดของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันในทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูก (ตารางที่ 11) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0 จะมีน้ำหนักเหง้าสดสูงที่สุดเท่ากับ 435.42 กรัมต่อหลุม และเมื่อขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณที่ลดลง (IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) น้ำหนักเหง้าสดของขมิ้นชันก็จะมีค่าลดลงตามลำดับ (322.56, 256.12 และ 222.88 กรัมต่อหลุม) ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 จะมีน้ำหนักเหง้าสดน้อยที่สุดเท่ากับ 180.32 กรัมต่อหลุม เมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุด IW/E 1.0

ตารางที่ 11 น้ำหนักเหง้าสด (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่ขหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	15.38	17.17	59.89	87.86	168.74	180.32
IW/E 0.3	10.75	11.53	71.77	137.97	177.75	222.88
IW/E 0.5	11.57	15.51	83.67	149.45	215.94	256.12
IW/E 0.7	16.17	16.96	96.13	208.51	240.24	322.56
IW/E 1.0	11.73	17.39	120.28	233.19	288.78	435.42
ค่าเฉลี่ย	13.12	15.71	86.34	163.39	218.29	283.45
LSD(0.05)	ns	ns	37.92	63.72	65.00	69.76
CV(%)	42.35	26.65	28.51	20.71	19.32	15.97

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

น้ำหนักเหง้าแห้ง

การให้น้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่อน้ำหนักเหง้าแห้งของขมิ้นชันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 และ 60 วันหลังปลูก (ตารางที่ 12) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก พบว่าเมื่อให้น้ำแก่ขมิ้นชันในปริมาณมากที่สุดคือ IW/E 1.0 ขมิ้นชันมีน้ำหนักเหง้าแห้งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 61.55 กรัมต่อหลุม และเมื่อให้น้ำแก่ขมิ้นชันในปริมาณที่ลดลงตั้งแต่ IW/E 0.7, IW/E 0.5 และ IW/E 0.3 พบว่าน้ำหนักเหง้าแห้งของขมิ้นชันมีค่าลดลงเท่ากับ 52.21 , 37.80 และ 26.15 กรัมต่อหลุม ตามลำดับและปริมาณน้ำที่ให้แก่ขมิ้นชันน้อยที่สุดคือ IW/E 0.1 ขมิ้นชันมีน้ำหนักเหง้าแห้งต่ำที่สุดเท่ากับ 25.10 กรัมต่อหลุม เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักเหง้าแห้งของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่มากที่สุดคือ IW/E 1.0

ตารางที่ 12 น้ำหนักเหง้าแห้ง (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	1.29	1.54	2.42	10.32	18.24	25.10
IW/E 0.3	1.38	1.63	3.71	15.76	20.37	26.15
IW/E 0.5	1.38	1.81	4.80	18.03	27.14	37.80
IW/E 0.7	1.67	1.81	5.42	27.57	29.79	52.21
IW/E 1.0	1.28	2.33	6.12	33.01	37.90	61.55
ค่าเฉลี่ย	1.40	1.82	4.49	20.94	26.69	40.56
LSD(0.05)	ns	ns	1.83	10.84	8.45	12.43
CV(%)	46.05	31.71	26.49	27.51	20.56	19.90

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

ผลผลิตน้ำหนักรวม

ผลผลิตน้ำหนักรวมของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีค่าที่แตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตาราง 13) ที่อายุ 180 วันหลังปลูก การสะสมน้ำหนักรวมของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุดคือ (IW/E 1.0) มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 101.83 กรัมต่อหลุม และมีค่าลดลง (IW/E 0.7 , IW/E 0.5 และ IW/E 0.3) ตามปริมาณน้ำที่ลดลงตามลำดับ (85.02, 64.35 และ 46.75 กรัมต่อหลุม) ส่วนที่ปริมาณน้ำน้อยที่สุดที่ขมิ้นชันได้รับ คือ IW/E 0.1 ผลผลิตน้ำหนักรวมมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 41.72 กรัมต่อหลุม

ตารางที่ 13 น้ำหนักรวม (กรัมต่อหลุม) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุที่ขหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	4.14	7.05	15.74	21.33	33.37	41.72
IW/E 0.3	3.11	6.96	21.30	30.35	40.67	46.75
IW/E 0.5	2.69	8.08	24.80	38.75	50.82	64.35
IW/E 0.7	2.86	10.63	29.54	55.88	60.37	85.02
IW/E 1.0	2.69	13.11	34.78	63.57	73.21	101.83
ค่าเฉลี่ย	3.10	9.17	25.23	41.98	51.69	67.93
LSD(0.05)	ns	3.57	8.22	14.29	11.12	17.60
CV(%)	32.87	25.33	21.16	18.08	13.96	16.81

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

อัตราการเจริญเติบโต

อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันในทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก (ตาราง ที่ 14) ขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุด (IW/E 1.0) มีอัตราเจริญเติบโตสูงที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่ลดลง ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุด (IW/E 0.1) จะมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำที่สุด โดยที่ช่วงอายุ 90 -120 วันหลังปลูก พบว่า ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุด (IW/E 1.0) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดเท่ากับ 21.78 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ในขณะที่ขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุด (IW/E 0.1) มีอัตราการเจริญเติบโตต่ำที่สุดเท่ากับ 3.97 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน

ตารางที่ 14 อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่ต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	0-30	30-60	60-90	90-120	120-150	150-180
IW/E 0.1	3.45	3.52	7.24	3.97	5.22	7.16
IW/E 0.3	2.59	3.21	11.95	7.72	6.33	8.19
IW/E 0.5	2.24	4.49	13.93	11.49	9.37	12.09
IW/E 0.7	2.38	6.47	15.76	16.70	10.71	18.01
IW/E 1.0	2.24	8.68	18.05	21.78	13.57	19.30
ค่าเฉลี่ย	2.58	5.27	13.38	12.33	9.04	12.95
LSD(0.05)	ns	3.56	9.07	6.33	6.22	11.64
CV(%)	32.87	45.74	43.97	33.35	44.68	28.34

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน

เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินของขมิ้นชัน (ตารางที่ 15) ปริมาณการให้น้ำแก่ขมิ้นชันในช่วงแรกที่ยังอายุ 30 วันหลังปลูกมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ให้ในช่วงอายุที่ 60, 90, 120, 150 และ 180 วันหลังปลูก ซึ่งในช่วงนี้เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นระยะต่างจากในช่วงที่ยังอายุ 30 วันหลังปลูก

ตารางที่ 15 เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินของขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืชหลังปลูก(วัน)					
	30	60	90	120	150	180
IW/E 0.1	27.88	22.33	26.36	23.73	24.85	22.00
IW/E 0.3	24.82	22.60	27.59	37.67	30.35	32.44
IW/E 0.5	25.36	23.38	28.46	40.38	33.02	39.30
IW/E 0.7	26.88	27.78	28.65	41.50	34.60	40.92
IW/E 1.0	25.14	28.80	28.97	44.13	41.22	42.22
ค่าเฉลี่ย	26.02	24.98	28.00	37.48	32.81	35.38
LSD(0.05)	ns	4.99	0.90	7.33	6.20	5.56
CV(%)	19.69	12.95	2.08	10.38	12.26	10.21

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์

วิจารณ์

ขมิ้นชันเมื่อได้รับน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันพบว่าขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยที่สุด (IW/E 0.1) จะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและมีการสะสมน้ำหนักแห้งรวมมีค่าต่ำที่สุด แต่เมื่อมีการให้น้ำชลประทานเพิ่มมากขึ้นเป็น IW/E 0.3, IW/E 0.5 และ IW/E 0.7 ก็มีผลทำให้ขมิ้นชันมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและมีการสะสมน้ำหนักแห้งรวมมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ส่วนขมิ้นชันที่ได้รับน้ำในปริมาณมากที่สุดคือ IW/E 1.0 นั้นขมิ้นชันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและมีการสะสมน้ำหนักแห้งรวมมีค่ามากที่สุด (ตารางที่ 13) สมยศ (2535) กล่าวว่า การสะสมน้ำหนักแห้งของพืชจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับปริมาณน้ำรวมทั้งหมดที่พืชได้รับ เมื่อพืชได้รับน้ำในปริมาณเพิ่มขึ้นพืชจะมีการสะสมน้ำหนักแห้งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณน้ำที่ให้แก่พืช ในปริมาณที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการเจริญเติบโตและการสะสมน้ำหนักแห้งของพืช พืชที่ได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยก็จะแสดงอาการขาดน้ำโดยมีผลต่อค่าศักยภาพของน้ำในใบพืชลดลง (นิภา, 2531 ; สมยศ, 2528) ความต้านทานของปากใบพืชมีค่าเพิ่มขึ้นหรือค่า Total stomata conductance มีค่าลดลงและอัตราการคายน้ำจากใบมีค่าลดลง (สมยศ, 2528) ซึ่งผลจากการทดลองนี้พบว่าเมื่อขมิ้นชันได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยขมิ้นชันจะแสดงอาการขาดน้ำเกิดขึ้น มีผลทำให้ค่า Total stomata conductance มีค่าลดลง (ตารางที่ 4) จึงส่งผลต่อเนื่องไปทำให้ปากใบปิดเพื่อลดการคายน้ำของพืช การขยายตัวของใบและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ใบจะหยุดชะงัก (Turk and Hall, 1980) โดยสังเกตได้จากค่าดัชนีพื้นที่ใบ (ตารางที่ 7) และน้ำหนักใบแห้ง (ตารางที่ 8) ที่มีค่าลดลง ซึ่งการลดลงนี้ทำให้พื้นที่ใบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงลดลง อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง เนื่องจากปากใบของขมิ้นชันมีแรงต้านมากขึ้นและเซลล์ชั้นมีโซฟิลล์มีแรงต้านไหลผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเข้าสู่ศูนย์กลางการสังเคราะห์แสงของใบขมิ้นชันได้ลดลง จึงทำให้การสังเคราะห์แสงของขมิ้นชันลดลง (Kramer, 1969) อัตราการเจริญเติบโตทางลำต้นลดลง (ตารางที่ 14) มีผลทำให้ลำต้นเตี้ย (ตารางที่ 5) แคระแกรน มีการแตกใบและแตกหน่อน้อย การสะสมน้ำหนักแห้งรวมน้อย (ตารางที่ 13) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผลผลิตของเหง้าขมิ้นชันสดและแห้งมีค่าลดลง (ตารางที่ 11 และ 12) ซึ่งผลจากการทดลองนี้สอดคล้องกันกับพืชชนิดอื่นที่ได้ทดลองไว้ก็คือ งาม (สมยศ และ คณะ, 2545), หญ้าปักกิ่ง (ณัฐภูมิ, 2546) และข้าว (Manette *et al.*, 1988) เป็นต้น

ดังนั้นผลจากการทดลองนี้พอที่จะนำไปแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ทราบว่าการปลูกมันสำปะหลังที่ดีเกษตรกรควรมีการจัดการน้ำแก่ขมมันสำปะหลังในปริมาณที่พอเพียงตลอดฤดูกาลและให้น้ำในปริมาณเท่าไรจึงจะทำให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตและให้ผลผลิตมากที่สุด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุป

ผลจากการทดลองนี้พอสรุปได้ว่า ชมันชั้นเมื่อได้รับน้ำที่ระดับความถี่และปริมาณที่ต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขม้นโดยตรง กล่าวคือ ชมันชั้นที่ได้รับน้ำในระดับความถี่ที่บ่อยครั้ง คือทุก 7 วัน และปริมาณน้ำที่ได้รับค่อนข้างมาก คือ 30 มิลลิเมตร ชมันชั้นจะมีการเจริญเติบโตของลำต้นที่ดี มีการสะสมน้ำหนักแห้งของลำต้นและให้ผลผลิตเหง้าขม้นชั้นสูงสุด ส่วนชมันชั้นที่ได้รับน้ำในระดับความถี่และปริมาณที่ลดน้อยลงมีผลทำให้ชมันชั้นมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิตลดลงตามลำดับ ส่วนชมันชั้นที่ได้รับน้ำในระดับความถี่น้อยที่สุด คือ ทุก 30 วัน และปริมาณน้ำที่ได้รับค่อนข้างน้อย คือ 20 มิลลิเมตร ชมันชั้นมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเหง้าขม้นชั้นต่ำสุด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วรวิทย์ ยิ่งสวัสดิ์ และ บัวบาง ยะอุป. 2536. การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ. หน้า 11-22. ใน รายงานการสัมมนาผลการดำเนินโครงการวิจัย KIP ประจำปี 2536. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

วันดี กฤษณพันธ์ 2538. สมุนไพรสารพัดประโยชน์. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 112-116.

วิบูลย์ บุญยธโรกุล. 2526. หลักการชลประทาน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

สายัณห์ สดุดี. 2537. สภาวะการขาดน้ำในการผลิตพืช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา.

สถาบันการแพทย์ไทย. 2540. การแพทย์ไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื่อเอดส์.

โรงพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ.

สมพร ภูติยานันต์. 2546. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย. โรงพิมพ์ตุลย์การพิมพ์. เชียงใหม่.

สมยศ เดชภีรัตนมงคล. 2528. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตงา 2 พันธุ์ ภายใต้การให้น้ำระดับต่างๆ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

สมยศ เดชภีรัตนมงคล. 2542. การตอบของมันเทศ 3 พันธุ์ต่อการขาดน้ำในสภาพไร่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 17(2) : 3-9.

สมยศ เดชภีรัตนมงคล และ สมมารอด อยู่สุขยิ่งสถาพร. 2543. ผลของการให้น้ำในระดับที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่ม. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543. หน้า 300-308.

สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน. 2541. มาตรฐานสมุนไพรไทย ขมิ้นชัน. โรงพิมพ์ ร.ส.พ. กรุงเทพฯ.

สุทธิพร อนันต์สุชาติกุล. 2542. สรีรวิทยาการผลิตพืช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.

องอาจ หาญชาญเลิศ และ ยิ่งยง ไพสุขานติวัฒนา. 2539. การศึกษาต้นทุนและผลผลิตสดของขมิ้นชัน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

อภิพรรณ ทุกภักดี. 2544. ระบบการปลูกพืชและการวิจัยพัฒนาระบบการทำฟาร์ม สุถาวรภาพของการเกษตรกรรม. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 165 น.

อรพินท์ เทพเสน. 2543. การระบุและจัดหมวดหมู่พืชสกุลขมิ้นโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เภสัชวิทยา และเซลล์วิทยา. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

Burt, B.L. and Smith, R.M. 1983. Zingiberaceae A Revised Handbook to the Flora and Ceylon Vol.4. A.A.Balkema. Rotterdam.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Doorenbos, J. and Pruitt, W.O. 1977. Crop water requirements. Food and agriculture Organization, Rome .
- Ergun, D. Halil, K. and Osman, C. 2007. Effect of seasonal water stress on soybean and sitespecific evaluation of crop growth-Soybean model under semi-arid climatic conditions. *Agri. water management*. 90 : 56 – 62.
- Galmes, J., Ribas-Carbo, M., Medrano, H. and Flexas, J. 2007. Response of leaf respiration to water stress in Mediterranean species with different growth forms. *J. of Arid Environments*. 68 : 206 - 222.
- Greulach, V.A. and Adams, J.E. 1976. *Plant: an introduction to modern botany*. 3rd edition. John Wiley and Sons. New York.
- Guo, W., Lia, B., Zhang, X. and Wang, R. 2007. Architectural plasticity and growth responses Of *Hippophae rhamnoides* and *Caragana intermedia* seedlings to simulated water stress. *J. of Arid Environments*. 69 : 385 - 399.
- Lawn, R.J. 1982. Response of four grain legumes to water stress southeastern Queensland. I. Physiological response mechanisms. *Aust. J. Agric. Res.* 33(1) : 511-521.
- Kramer, P.K. 1969. *Water relation of plant*. Academic Press. New York.
- Mingcai, Z., Liusheng, D., Xiaoli, T., Zhongpei, H., Jianmin, L., Baomin, W. and Zhaohu, L. 2007. Uniconazole-induced tolerance of soybean to water deficit stress in relation to changes in photosynthesis, hormones and antioxidant system. *J. of Plant Physio.* 164 : 709 - 717.
- Panneerselvam, R., Abdul, J.C. Somasundaram, R., Sridharan, R. and Gomathinayagam, M. 2007. Carbohydrate metabolism in *Dioscorea esculenta* (Lour.) Burk. tubers and *Curcuma longa* L. rhizomes during two phases of dormancy. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*. 59 : 59 - 66.
- Pereyra, M.A., Zalazar, C.A. and Barassia, C.A. 2006. Root phospholipids in *Azospirillum- inoculated* wheat seedlings exposed to water stress. *Plant Physio. and Biochemistry*. 44 : 873–879.
- Qiang, S.W., Ying, N.Z. ad Ren, X.X. 2006. Effects of water stress and arbuscular mycorrhizal fungi on reactive oxygen metabolism and antioxidant production by citrus (*Citrus tangerine*) roots. *European J. of Soil Bio.* 42 : 166–172.

Sang-Hyun, L., Jin-Ho, C., Wol-Soo, K., Tae-Ho H., Ong-Seo, P., and Gemma., H. 2006.

Effect of soil water stress on the development of stone cells in pear (*Pyrus pyrifolia* cv. 'Niiitaka') flesh. *Scientia Horticulturae*. 110: 247–253.

Schonfeld, M.A., Johnson, R.C., Carver, B.F. and Mornhiweg, D.W. 1988. Water relations in Winter wheat as drought resistance indicator. *Crop Sci*. 28(3): 526 – 531.

Threshow, M. 1970. Environment and plant response. McGraw Hill. New York.

Turner, F.T. and Burch, G.N. 1983. Crop-Water Relation, in Rice. John Willey & Sons. New York.

Turner, N.C. 1986. Adaptation to water deficits : A change in perspective. *Aust. J. Plant Physio*. 13 : 175-190.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-นามสกุล : นายธานี บันพิพัฒน์
- วันเดือนปีเกิด : 3 กรกฎาคม 2527
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 40/2 หมู่ 14 ต. เกษไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 60120
- โทรศัพท์ : 0-873177380 , 056-353119
- การศึกษา : พ.ศ.2534 – 2539 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเกษไชยเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ. 2540 – 2542 ระดับการศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ. 2543 – 2545 ระดับการศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ.2547– 2550 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชไร่)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
- ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ เทียนบุญ
- วันเดือนปีเกิด : 16 กรกฎาคม 2527
- ที่อยู่ปัจจุบัน : 12 หมู่ 6 ต. โทกธรรม อ. เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
- โทรศัพท์ : 0-891705290 , 036-523832
- การศึกษา : พ.ศ.2534 – 2539 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ.2540 – 2542 ระดับการศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ.2543 – 2545 ระดับการศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ.2547– 2550 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชไร่)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้