

ใบรับรองปัญหาพิเศษปริญญาตรี  
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

เรื่อง

การเลี้ยงปลาอุกอุย , Clarias macrocephalus Gunther,  
ในบ่อไฟเบอร์กลาส

Walking Catfish , Clarias macrocephalus Gunther,  
Culture in Fiber Glass Tanks

โดย

นายมนต์เชียร กองจำปา

ได้พิจารณาเห็นชอบ โดย .....

อาจารย์ที่ปรึกษา .....

กรรมการ .....

กรรมการ .....

กรรมการ .....

กรรมการ .....

๒๒ / ก.ค. 2531

ภาควิชารับรองแล้ว

*(Signature)*  
(นายทรงศักดิ์ ตันพิพัฒน์)

13547

20 พ.ย. 2530

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

วัน...!...เดือน... พ.ศ. ๒๕๓๑

๑๒พ.  
๘๑๒๓๗  
๒๕๓๐

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปัญหาพิเศษ

เรื่อง

การเลี้ยงปลาอุกกอย , Clarias macrocephalus Gunther,  
ในบ่อไฟเบอร์กลาส

Walking Catfish ; Clarias macrocephalus Gunther,  
Culture in Fiber Glass Tanks



T100768



โดย

นายมณฑิร กองจำปา

เสนอ

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

พ.ศ. 2531

ป/ศ.  
๑๑๑๓๓  
๑๕๑๑

เลขที่.....  
เลขทะเบียน 100768  
วันที่เดือนปี 21 JUN 2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทความวิจัยพิเศษ

## เรื่อง

การเลี้ยงปลาอุกอุย, Clarias macrocephalus Gunther,

ในบ่อไฟเบอร์กลาส

Walking Catfish, Clarias macrocephalus Gunther,

Culture in Fiber Glass Tanks

จากการศึกษาการเลี้ยงปลาอุกอุยในบ่อไฟเบอร์กลาสพบว่า ปลาอุกอุยที่ระดับการปล่อย 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.7432 กรัมต่อตัวต่อวัน รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 400, 300 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 0.65280, 0.65278 และ 0.62330 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ ( $P < 0.051$ ) ปลาอุกอุยที่ระดับการปล่อย 400 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 76.12 % รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 300, 600 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 74.54, 68.75 และ 62.75 % ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ปลาอุกอุยที่ระดับการปล่อย 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 68.45 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 500, 400 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 58.11, 51.68 และ 37.27 กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) ปลาอุกอุยที่ระดับการปล่อย 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.85 รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 600, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 3.06, 3.24 และ 3.27 ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

## คำนิยม

ในการทำบุญพิเศษครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์ธานี พูนดี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ได้ทำปรึกษา แนะนำ อย่างใกล้ชิดตลอดการทดลอง อาจารย์วีณา ถิวสวัสดิ์ ที่กรุณาช่วยตรวจโรคและอาการผิดปกติของปลา บริษัทแหลมทองจำกัด ที่อนุเคราะห์อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทุกมื้อ ตลอดการทดลอง และ คุณฉันทม จอนจวบทรง ผู้รวมโครงการเป็นอย่างมากที่คอยช่วยเหลือ และร่วมปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ เพื่อน ๆ น้อง ๆ และบุคคลที่ข้าพเจ้ามีไต่กลางไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความช่วยเหลือ จนสำเร็จตามความมุ่งหมาย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(๒)
สารบัญตารางภาคผนวก	(A)
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการ	10
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล	13
ขอเสนอแนะ	22
สรุป	23
เอกสารอ้างอิง	24
ภาคผนวก	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	17
2	อัตราการรอดตาย (%) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	19
3	ผลผลิต (ก.ก.) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	19
4	อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	20
5	ต้นทุนการผลิตต่อตัวของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	21
สารบัญภาพ		
ภาพที่		
1	การเจริญเติบโตค่าน้ำหนัก ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	18

## สารบัญตารางภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่		หน้า
1	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	29
2	อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	31
3	อัตราการอดตาย (%) ของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	33
4	ผลผลิตทั้งหมด (ก.ก.) ของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	33
5	ผลผลิตขนาดตาง ๆ (ก.ก.) ของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	34
6	อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของปลาทุกกุ่มที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	35
7	ปริมาณอาหาร (ก.ก.) ที่ใช้เลี้ยงปลาทุกกุ่มในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	36
8	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (ppm) ในบ่อเลี้ยงปลาทุกกุ่มที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	37
9	ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำ (ppm) ในบ่อเลี้ยงปลาทุกกุ่มที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	38
10	อุณหภูมิของน้ำ (°c) ในบ่อเลี้ยงปลาทุกกุ่ม ที่ระเคับการปลดอยตางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	39

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางภาคผนวกที่		หน้า
11	ความกระด้าง (Total Hardness) ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกอูยเฉลี่ย (ppm) ทุก 5 วัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	40
12	ความเป็นด่าง (Total alkalinity) ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกอูยเฉลี่ย (ppm) ทุก 5 วัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	41
13	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) ของอัตราการเจริญเติบโตของปลาทุกอูยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	42
14	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) ของอัตราการตายของปลาทุกอูยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	42
15	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) ของผลผลิตทั้งหมดของปลาทุกอูยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	43
16	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) ของอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของปลาทุกอูยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์	43
สารบัญภาพผนวก		
ภาพผนวกที่		
1	แผนผังการจัดบ่อทดลอง	44

การเลี้ยงปลาอุกอุย , Clarias macrocephalus Gunther,  
ในบ่อไฟเบอร์กลาส  
Walking Catfish , Clarias macrocephalus Gunther,  
Culture in Fiber Glass Tanks

บทนำ

ปลาอุกเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมาก เพราะเป็นปลาน้ำจืดที่ชาวไทยยกย่องว่ามีรสชาติอร่อย นุ่มหวาน แม้วามีขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่ซื้อขายกันในราคาสูง ปลาอุกเป็นปลาที่มีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี สามารถเลี้ยงรวมกันได้มาก ให้ผลผลิตสูง เลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน และบ่อคอนกรีต

ปลาอุกที่เลี้ยงในบ่อปัจจุบันมีสองชนิดคือ ปลาอุกคาน และปลาอุกอุย ปลาอุกอุยมีรสชาติดีกว่า ราคาสูงและความต้องการของตลาดมีมากกว่า โดยทั่วไปนิยมเลี้ยงปลาอุกคานมากกว่า ทั้งนี้เชื่อกันว่า ปลาอุกคานมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าปลาอุกอุย แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระหว่างปลาอุกคานกับปลาอุกอุย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยประสิทธิ์ (2524) พบว่า ผลผลิตและการเจริญเติบโต ระหว่างปลาอุกคานกับปลาอุกอุย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การเลี้ยงปลาอุกอุย ให้ผลตอบแทนสูงกว่าปลาอุกคาน

การเลี้ยงปลาอุกได้พัฒนาไปมาก จากการเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งควบคุมสภาพแวดล้อมและดูแลรักษายาก จนมาถึงการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด ทำให้การดูแลรักษาและการควบคุม สภาพแวดล้อมทำได้สะดวกขึ้น การใช้อยาและสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคหรือพยาธิ ง่ายขึ้น มีปริมาณถูกต้องและลดต้นทุนได้หลาย

การเลี้ยงปลาอุกในบ่อคอนกรีตนั้น ส่วนใหญ่แล้ว ขนาดของบ่อจะมีความจุประมาณ 10-15 ลูกบาศก์เมตร ต้องใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างและต้นทุนสูง ปริมาณปลาที่ปล่อยมีจำนวนมาก การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีเลี้ยงปลาอุกอุยในบ่อไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก มีความจุประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างนาน มีความแข็งแรงทนทาน หาซื้อได้สะดวก

ควยสาเหตุกั้กล่าวจึ้งไ้ท้ดลองเล็ยงปลาคุกคุยในบอไฟเบอร้กลาส ที่ระค้บการปลอยตางกัน เพือหาระค้บการปลอยที่เหมาะสมสำหรับการเล็ยงในบอไฟเบอร้กลาส โดยพิจารณา อ้ตราการเจริญเติบโต อ้ตราการรอดตาย อ้ตราการแลกเปล็ยนอาหารเป็นน้ำหนัก และค้นพุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอเกษตรกรในการพิจารณาถึงวิธีการเล็ยงปลาคุกคุยในบอไฟเบอร้กลาสตอไป

### วัตถุประสงค์

1. เพือศึกษาอ้ตราการเจริญเติบโตของปลาคุกคุยที่เล็ยงในบอไฟเบอร้กลาสที่ระค้บการปลอยตางกัน
2. เพือศึกษา อ้ตราการรอดตายของปลาคุกคุยที่เล็ยงในบอไฟเบอร้กลาส ที่ระค้บการปลอยตางกัน
3. เพือศึกษาคลลิตของปลาคุกคุยที่เล็ยงในบอไฟเบอร้กลาส ที่ระค้บการปลอยตางกัน
4. เพือศึกษา อ้ตราการแลกเปล็ยนอาหารเป็นน้ำหนักของปลาคุกคุยที่เล็ยงในบอไฟเบอร้กลาส ที่ระค้บการปลอยตางกัน

การตรวจเอกสาร

อนุกรมวิธานของปลาคูกอุย

Smith (1945) ได้จัดจำแนกลำดับชั้นของปลาคูกอุยดังนี้

Phylum	Chordata
Class	Pisces
Subclass	Teleostomi
Order	Cypriniformes (Ostariophysii)
Family	Clariidae
Genus	Clarias
Species	macrocephalus
Scientific name	<u>Clarias macrocephalus</u> Gunter

รูปร่าง ลักษณะ และการจำแนก

ปลาคูกอุย เป็นปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทย ไม่มีเกล็ด รูปร่างยาวเรียว มีหนวด 4 คู่ หนวดที่อยู่บนจงอยปากไกลจุกจมูกเรียกว่า Snouth barbels หรือ Nasal barbel หนวดที่อยู่บนขากรรไกรบนเรียกว่า maxillary barbels ที่ขากรรไกรล่างเรียกว่า manaible barbels และใต้คางเรียกว่า mental barbels หรือ Chin barbels ลำตัวมีสีเทาปนดำ และสีเหลือง มีจุดประตามคางของลำตัว คางทองขาวกว่าคางหลัง ปลายครีบต่าง ๆ มีสีแดงเรื่อ ๆ ครีบหลังกลมมน ครีบหางและครีบก้นไม่ติดกัน ระยะจากปลายกระดูกหายใจถึงจุดเริ่มต้นของครีบหลังประมาณ 1 ใน 5-7 ของความยาวจากปลายหูของจงอยปากถึงกระดูกหายใจ หอย ครีบหลังมีก้านครีบ 68-72 อัน ครีบก้นมีก้านครีบ 47-52 อัน จำนวนกระดูกซี่โครง (gill racker) ประมาณ 32 ซี่ ปลาย occipital proces โคนมน ความกว้างของฐานประมาณ 3-5 เท่าของความยาว (โสภา, 2513; ประเสริฐ, 2530; สุภาพและคณะ, 2529)

ปลาคูกอุยมีเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นทางคางปลายคางของกระดูกเหงือก และเก็บอยู่ในโพรงอากาศเหนือเหงือกทั้งสองข้าง อวัยวะนี้มีลักษณะเป็นช่อง มีก้านสั้น ๆ เป็นพุ่มพวงคล้ายดอกไม้เล็ก อวัยวะนี้เรียกว่า เคนไครท์ หรืออาร์บอเรสเซนต (dendrite or arborescent organ) (จินดา; 2506)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปนิสัยและการกินอาหาร

ปลาอุกมีนิสัยค่อนข้างดุ ไม่ชอบอยู่ที่มีแสงสว่างมากเกินไป เชื่องช้าในเวลากลางวัน กระฉับกระเฉงในเวลากลางคืน เป็นปลาที่หากินกลางคืน ปลาอุกขนาดเล็กในธรรมชาติจะกินอาหารพวกโปรโตซัว ไรน้ำขนาดเล็ก โรติเฟอร์ และแพลงตอนพืช เมื่อปลาอุกมีขนาดโตขึ้นจะกินอาหารพวก ตัวอ่อนของแมลง กูฏกุง หนอน และกิ้งกือวัยตัวที่ตกตามพื้นแทน เมื่อปลาอุกสามารถเลี้ยงได้หนาแน่นในพื้นที่แคบ ๆ ปรับตัวกินอาหารผสมที่มนุษย์ผลิตขึ้นได้ ปลาอุกสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายชั่วโมงเมื่อนำขึ้นมาจากน้ำ หรืออยู่ในที่ขาดออกซิเจน แมแต่โคลนที่เปียก ปลาอุกเคยเป็นปลาที่ออกทะเลและสะกดกในการขนส่ง (เวียง, \_\_\_\_; นิรนาม, 2529; Bardach, 1972; Hora และ Pillay, 1955) \*

ปลาขนาดเล็กจะกินอาหารมากกว่าปลาขนาดใหญ่ เมื่อเทียบปริมาณอาหารกับความยาวของลำตัวปลา เนื่องจากความยาวของลำตัวปลาที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับกระเพาะอาหาร คือปลาขนาดเล็กกระเพาะจะใหญ่ เมื่อเทียบกับความยาวของลำตัว และจะเล็กลงเมื่อโตขึ้น เมื่อปลามีขนาดกระเพาะใหญ่ ย่อมมีความต้องการอาหารในปริมาณมาก จึงให้อาหารปลาเล็กมากกว่าปลาใหญ่ (บุญ, 2516) และจำนวนครั้งที่ให้อาหารแก่ปลาในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา คือ การเจริญเติบโตของปลา จะแปรผันตามจำนวนครั้งที่ให้อาหาร ถ้าให้อาหารบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง ต้องให้ปลากินจนอิ่ม จะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น (Brow, 1951)

การเลี้ยงและการเจริญเติบโต

แนวว่าปลาอุกเคยจะเป็นปลาที่มีความอดทนต่อสภาพน้ำเสียได้ใกล้เคียงปลาอุกคาน ก็ไม่ควรปล่อยปลาลงเลี้ยงหนาแน่นเท่ากับปลาอุกคาน เนื่องจากพันธุ์ปลามีราคาสูงมาก อีกทั้งความต้องการพื้นที่ เพื่อการเจริญเติบโตของปลาอุกเคยสูงกว่าปลาอุกคาน ในบ่อกิน หากเป็นการปล่อยปลาขนาด 5-7 เซนติเมตร ควรปล่อยระหว่าง 15-20 ตัว ต่อพื้นที่ผืนน้ำ 1 ตารางเมตร (ประเสริฐ, 2530) สำหรับบ่อคอนกรีตกลม ควรปล่อยในอัตรา 200-400 ตัวต่อปริมาตรน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร (วิทย์ และคณะ, 2525)

เวียง (2513) ได้ทำการทดลองเลี้ยงปลาอุกเคยในบ่อคอนกรีต ขนาด 2.70 x 2.20 x 0.80 เมตร ในระยะเวลา 5 เดือน โดยใช้ปลาอุกเคยซึ่งเพาะได้ควยกรรมวิธีดิสคอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โบน อายุ 1 เดือน มีความยาวเฉลี่ย 2.25 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 250 มิลลิกรัม จำนวน 70 ตัว ใหลาหมอเทศคเป็นอาหารในอัตรา 20 ส่วนร้อยของน้ำหนักปลาต่อวัน ผลปรากฏว่า เมื่ออายุ 6 เดือน มีความยาวเฉลี่ย 14.09 เซนติเมตร หนัก 25.97 กรัม มีปลาเหลือรอด 68.57 ส่วนร้อย อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักอาหารที่ให้กับน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.9 : 1

จากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระหว่างปลาคูกกุ่มกับปลาคูกคาน โดย ปลอปลาคูกคานขนาด 0.75 กรัม ความยาวเฉลี่ย 4.7 เซนติเมตร และปลาคูกกุ่มขนาด 0.75 กรัม ความยาวเฉลี่ย 5.9 เซนติเมตร ในอัตรา 90 ทั่วต่อตารางเมตร ให้อาหารปลาสดบด ละเอียด และอาหารเม็ดเลี้ยงปลาทั้งสองนาน 6 เดือน ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเหลือรอด และการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของการเลี้ยงปลาคูกคานกับปลาคูกกุ่มที่เลี้ยง ควบอาหารชนิดเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และการเลี้ยงควบอาหารสดจะดีกว่าอาหาร เม็ด เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรและขาดทุน พบว่า การเลี้ยงปลาคูกกุ่มจะให้ผลดีกว่าการเลี้ยงปลา คูกคาน โดยจะให้ผลกำไรมากกว่าปลาคูกคานถึง 6.7 เท่าในเนื้อที่บอ 1 ตารางเมตร(ประเสริฐ, 2514)

### คุณสมบัติน้ำ

สัตว์น้ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในน้ำ ดังนั้นหากว่าคุณสมบัติของน้ำมีสภาพไม่เหมาะสมต่อ การดำรงชีพของสัตว์น้ำแล้ว ก็จะทำให้สัตว์น้ำเหล่านั้น ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือดำรงชีพได้ อย่างปกติสุข ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานั้น มีหลายประ การควบกัน เช่น น้ำมีสีเขียวเข้มมากเกินไป โดยมีปริมาณพืชพวกสาหร่ายสีเขียวมากเกินไป คุณภาพน้ำที่ไขประกอบกรวิจัยคานประมงสามารถแยกออกได้ดังนี้คือ ลักษณะทางกายภาพได้แก่ สี (colour) ความขุ่น (turbidity) อุณหภูมิ (temperature) ความนำไฟฟ้า (conductivity) และปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ลักษณะทางเคมีภาพ ได้แก่ ความ เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Hardness) ออกซิเจนที่ละลาย (DO) ไนเตรต (NO<sub>3</sub>) แอมโมเนีย (NH<sub>3</sub>) ฟอสเฟต (PO<sub>4</sub>) ลักษณะ ทางชีวภาพได้แก่ แพลงค์ตอน (Plankton) พืชน้ำ (Aquatic Macrophytes) แบคทีเรีย (Bacteria) และเชื้อโรคอื่น ๆ (Pathogens) เป็นต้น (ไมตรี, 2522; ชานูญทช, 2530)

### ออกซิเจน (oxygen)

แหล่งที่มาของออกซิเจนที่ละลายในน้ำนั้นก็คือ บรรยากาศโดยตรง โดยเกิดจากกระบวนการที่พืชผ่านผิวหนังโดยตรง หรือเกิดจากแรงกดของบรรยากาศ ทำให้ออกซิเจนละลายลงน้ำ แต่ปริมาณไม่มากนัก เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพวกแพลงค์ตอลพืช และพืชน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ออกซิเจนมากที่สุด เกิดจากกระบวนการเคมีต่าง ๆ ในน้ำ ซึ่งจะขึ้นกับสารประกอบหรือแร่ธาตุในแหล่งน้ำ (ชาญยุทธ, 2530)

ประเสริฐ (2511) รายงานว่า ปริมาณออกซิเจนในบ่อคินที่ใช้เลี้ยงปลาคูจะมีอยู่เพียง 1-2 เคียนของการเลี้ยง และเมื่อเลี้ยงได้ 3-4 เคียน พบว่าไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่

Tucker (1985) กล่าวว่า น้ำที่มีออกซิเจนละลายน้อย เป็นสาเหตุของอาการ Hypoxior ในปลา Channel catfish

สุพจน์ (2523) อ้างถึง David (1975) พบว่า เมื่อระดับออกซิเจนในน้ำลดลง อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนแปลงอาหารเป็นเนื้อปลา และกินอาหาร ของปลาจะลดลงด้วย

น้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อการเลี้ยงปลาคูควรมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำไม่ต่ำกว่า 2-3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี, 2522) Swingle (1969) ได้เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนในน้ำกับปลาที่เลี้ยงในบ่อและปลาที่อาศัยในลำธาร โดยแสดงว่า ปลาในบ่อต้องการออกซิเจน ประมาณ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป ส่วนปลาที่อาศัยในลำธารหรือแหล่งน้ำไหลจะต้องการออกซิเจนตั้งแต่ 5 มิลลิกรัมขึ้นไป ถ้าออกซิเจนมีเพียง 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือเป็นจุดอันตรายต่อปลาหลายชนิดที่อาศัยในน้ำไหล

### คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide)

คาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งน้ำได้จากบรรยากาศโดยตรง การหายใจของพืชและสัตว์ในน้ำ, ขบวนการที่มีมักเทร้ทำการสลายอินทรีย์สาร และน้ำใต้ดินซึ่งซึมเข้ามาปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์เป็น acid gas เพราะถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นจะทำให้ pH ลดลง เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์จะไปรวมกับน้ำเป็นกรดคาร์บอนิก ทำให้มีฤทธิ์เป็นกรด คาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้นมากเกินไปในน้ำนั้นสามารถทำอันตรายปลาได้ โดยที่ความเป็นพิษจะไปรบกวนการหายใจของปลา ทำให้การขับถ่ายของเสียที่เหงือกเป็นไปอย่างลำบาก และเลือดจะมีความเป็นกรด

สูง ทำให้ปลาตาย (ชาร์นค์, 2528; Pincher 1948) Brown (1957) กล่าวว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 100-200 ppm. จะทำให้ปลาจำนวนมากตายอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าในน้ำนั้นมีออกซิเจนเพียงพอ ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ 50-100 ppm. จะทำให้ปลามีอาการผิดปกติทันทีและจะตายในไม่ช้า ถ้าปล่อยไว้ในสภาพนั้นเนิ่นนานต่อไป จะทำให้การเจริญเติบโต จะทำให้การเจริญไม่เป็นปกติ ทั้งไปลดประสิทธิภาพการดึงออกซิเจนจากน้ำมาใช้ คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่า 20 ppm. มักไม่พบตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

### ความเป็นด่าง (Alkalinity)

ชาญุทธ (2530) กล่าวว่า ความเป็นด่างของน้ำ หมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบัติของน้ำที่ทำให้กรดเป็นกลาง ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอเนต ( $\text{CO}_3$ ) ไบคาร์บอเนต ( $\text{HCO}_3$ ) และไฮดรอกไซด์ ( $\text{OH}^-$ ) เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีพวกบอเรต (Borates) ซิลิเกต (Silicate) ฟอสเฟต (Phosphate) และสารอินทรีย์เป็นส่วนน้อย ความเป็นด่างของน้ำจะเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลง pH รวดเร็วเกินไป ความเป็นด่างของน้ำจะปรากฏได้ 5 แบบ คือ เกิดจากไฮดรอกไซด์ ( $\text{OH}^-$ ) เพียงอย่างเดียว เกิดจากคาร์บอเนต ( $\text{CO}_3$ ) เพียงอย่างเดียว เกิดจากไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตรวมกัน เกิดจากไบคาร์บอเนตเพียงอย่างเดียว ( $\text{HCO}_3$ ) เกิดจากคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตรวมกัน ระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำจะมีค่าระหว่าง 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่ควรถดจากค่าปกติเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ อุปลัมภ (2508) รายงานจากการสำรวจการเลี้ยงปลาในเขตรบนครไดซ์ให้เห็นว่าขยที่เลี้ยงปลาทุกไคผลผลิตสูงมีค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) สูงกว่าขยที่มีผลผลิตต่ำ

### ความกระดาง (Total hardness)

ความกระดางของน้ำหมายถึง ปริมาณของเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียม (Calcium and Magnesium salt) ที่ละลายอยู่ในน้ำ แต่อาจรวมถึงธาตุอื่น ๆ เช่น  $\text{Fe}^{++}$  และ  $\text{Mn}^{++}$ .. ความกระดางของน้ำแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันคือ Temporary Hardness หมายถึงความกระดางของน้ำที่ประกอบด้วย Calcium และ Magnesium bicarbonate ที่เรียกว่า Temporary เพราะปริมาณ bicarbonate สามารถแตกตัวและตกตะกอนได้, Pormanant Hardness หมายถึง ความกระดางของน้ำที่ประกอบด้วย Calcium และ Magnesium Carbonate และเกลือของ inorganic acids เช่น  $\text{CaSO}_4$  ซึ่งเกลือพวกนี้ไม่สามารถทำให้แตกตัวได้ควยวิธี

ธรรมชาติ หรือคงตัวมากที่สุด (ชาญุเทศ, 2530; Swingle 1969) การวิเคราะห์หาค่าของ แคลเซียมไอออน ( $Ca^{++}$ ) ซึ่งบอกในรูปมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ( $CaCO_3$ ) เป็นการบอกความกระด้างน้ำ โดยแบ่งความกระด้างน้ำออกดังนี้ น้ำคอมมีความกระด้าง 0-75 มิลลิกรัมต่อลิตรของ  $CaCO_3$  น้ำคอนขางกระด้าง 75-100 มิลลิกรัมต่อลิตรของ  $CaCO_3$  น้ำกระด้าง 150-300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ  $CaCO_3$  และน้ำกระด้างมาก มากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ  $CaCO_3$  (กรรณิการ์, 2525) น้ำที่มีความกระด้างตั้งแต่ 15 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตไม่จำเป็นต้องเติมปูนขาวลงไป (เมฆ, 2522)

### อุณหภูมิ (Temperature)

ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น (poikilotherms) ซึ่งอุณหภูมิของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ำที่แวดล้อม ชาร์งค์ (2528; อ้างถึง Phinney และ MC Intive, 1965) ที่ว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราการหายใจของอินทรีย์พวกที่แขวนลอยในน้ำ (periphyton) สูงขึ้น และนอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลต่ออัตราการเผาผลาญของร่างกายสัตว์น้ำอีกด้วย สุพจน์ (2523, อ้างถึง Lagler และคณะ, 1962) ที่กล่าวว่า ปลาจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำในช่วงจำกัดอันหนึ่ง และอ้างถึง วิทซ์ (2517) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อย่างรวดเร็วจะทำให้ปลาตายได้ ถ้าเราเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นช่วง ๆ ละ 3 °C. จะเป็นไปได้ในทางต่ำหรือสูงก็ตามจะไม่ทำให้ปลาตาย ชัยเชษฐ (2511; อ้างตาม Revaves และคณะ, 1968) กล่าวว่าอาการเครียดหรือหมดสติของปลาอันเนื่องมาจากการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้ plasma sodium และคลอไรด์ (chloride) ในเซลล์ลดลง น้ำในเซลล์ของก้าม และของเหลวระหว่างเซลล์จะเพิ่มขึ้น

### ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

สิ่งที่มีผลถึงความเป็นกรด คือ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ( $H^+$ ) และสิ่งที่มีผลถึงความเป็นด่าง คือ ความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน ( $OH^+$ ) ชัยเชษฐ (2511) อ้างถึง Swingle (1963) ที่ได้เขียนแผนภาพไว้ว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อโดยทั่ว ๆ ไป จะตายเมื่อ pH มีค่า 4 ซึ่งเรียกว่า acid death point ส่วนน้ำที่มี pH ถึง 9.0 จะเป็นอันตรายต่อปลาจำพวกปลาตะเพียน น้ำที่มี pH ระหว่าง 4.8-6.0 แม้ว่าจะไม่มีความเป็นพิษต่อปลา แต่ก็ให้ผลผลิตต่ำ น้ำที่มี pH ระหว่าง 4.5-5.5 ในตอนเที่ยงวัน อัตราการเจริญเติบโตของแพลงค์ตอนพืช

(phytoplankton) จะมีมาก แต่จะไม่พบแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) และจุลินทรีย์น้ำ (bottom organism) สำหรับน้ำที่มี pH 9.5-10.5 ทอรร่งอรุณจะให้ผลผลิตต่ำเช่นกัน เหตุเพราะว่าที่  $\text{CO}_2$  ไม่เพียงพอให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แพลงก์ตมพืชสามารถใช้พวก  $\text{CO}_2$  อิสระ (Free  $\text{CO}_2$ ) และไบคาร์บอเนตอิสระ (Free bicarbonate) ได้ แต่ไม่สามารถใช้  $\text{CO}_2$  ในรูปของคาร์บอเนต เกือบจะไม่มี  $\text{CO}_2$  ในรูปของไบคาร์บอเนตเลยที่ 9.5 และเมื่อ pH เกิน 10.0  $\text{CO}_2$  ที่มีจะเปลี่ยนเป็นในรูปคาร์บอเนตทั้งหมด pH ที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรอยู่ในช่วงระหว่าง 6.5-9.0 (สมศักดิ์, 2509; ชานบุญข, 2530)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

### ก. อุปกรณ์

1. ปลาตุ๊กตุ๊ก อายุ 45 วัน จำนวน 7200 ตัว มีความยาวเฉลี่ย 7.76 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 4.79 กรัม
2. บ่อไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร บรรจุน้ำขดละ 2 ลูกบาศก์เมตร ทรงกลางมีท่อเจาะรูพุน เพื่อระบายของเสีย จำนวน 8 บ่อ
3. อุปกรณ์สำหรับการส่งถ่ายน้ำ
  - เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
  - สายยางอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 20 เมตร
  - ท่อน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว
  - หัวฉีด
4. อาหารที่ใช้เลี้ยง
  - อาหารสำเร็จรูปชนิดผง โปรตีน 38 %
  - อาหารสำเร็จรูปชนิดจมน้ำ โปรตีน 32 %

### ข. วิธีการศึกษา

#### 1. การเลี้ยงปลา

เลี้ยงปลาตุ๊กตุ๊กขนาดน้ำหนัก 4.79 กรัม ความยาวเฉลี่ย 7.76 เซนติเมตรในบ่อไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร บรรจุน้ำ 2 ลูกบาศก์เมตร โดยปล่อยปลาในระดั้มความแตกต่าง 300, 400, 500 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จำนวนขดละ 2 บ่อ เลี้ยงปลาโดยให้น้ำไหลผ่านประมาณ 20 ลิตร/นาที หรือ 28.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การให้อาหาร แบ่งเป็น 3 ระยะเวลาคือ

ระยะที่ 1 เดือนแรก ให้อาหารสำเร็จรูปชนิดผง โปรตีนร้อยละ 38 ให้อิน ร้อยละ 10 ส่วนของน้ำหนักตัว ทุกวัน นำมาแช่แล้วปั่นให้ปลากินวันละ 3 เวลา คือ 06.00, 12.00 และ 18.00 น. ปรับปริมาณการให้อาหารทุก 14 วัน

ระยะที่ 2 เดือนที่ 2-3 ให้อาหารสำเร็จรูปชนิดจมน้ำ โปรตีนร้อยละ 32 ส่วน ให้อินร้อยละ 5 ส่วนของน้ำหนักตัว ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ 06.00 และ 18.00 น. ปรับ

ปริมาณการให้อาหารทุก 14 วัน

ระยะที่ 3 เดือนที่ 4 ให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ำ โปรตีนร้อยละ 32 ส่วน ให้อีกร้อยละ 3 ส่วนของน้ำที่กักตัวทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ 06.00 และ 18.00 น. ปริมาณการให้อาหารทุก 14 วัน

การทำความสะอาดและการถ่ายน้ำ ทำความสะอาดบ่อโดยใช้แปรงขัดตะไคร่น้ำข้างบ่อ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ถ่ายน้ำก้นบ่อทิ้งทุกวัน เวลา 05.30 น. และ 17.30 น.

## 2. การวางแผนการทดลอง

จัดการวางแผนการทดลองแบบสุ่มทดลอง (Completely Randomized Design) โดยแบ่งเป็น 4 พวก พวกละ 2 ซ้ำ ดังนี้

- |          |                            |                       |
|----------|----------------------------|-----------------------|
| พวกที่ 1 | ระดับการปล่อย 300 ตัว/ลบม. | ไซบอทดลองหมายเลข 2, 7 |
| พวกที่ 2 | ระดับการปล่อย 400 ตัว/ลบม. | ไซบอทดลองหมายเลข 3, 8 |
| พวกที่ 3 | ระดับการปล่อย 500 ตัว/ลบม. | ไซบอทดลองหมายเลข 4, 5 |
| พวกที่ 4 | ระดับการปล่อย 600 ตัว/ลบม. | ไซบอทดลองหมายเลข 1, 6 |

## 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ

1. ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คุณภูมิ ในรอบวันของน้ำในบ่อทดลอง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
2. ตรวจวัด ความกระต้างน้ำ ปริมาณความเป็นกรด และความเป็นเบสเป็นค่าของน้ำในบ่อทดลอง เวลา 16.00 น. ทุก 5 วัน

## ค. การบันทึกข้อมูล

1. บันทึก น้ำหนักและความยาวของปลาทุกตัว โดยสุ่มบ่อละ 30 ตัว มาชั่งและวัดขนาดทุก 14 วัน
2. บันทึกอัตราการตายของปลาทุกตัวทุกวัน
3. บันทึกปริมาณอาหารที่บริโภคปลาทุกวัน

ง. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อัตรารอด ผลผลิต อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก โดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test

จ. สถานที่และเวลาการทดลอง

ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2530 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2530



## ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

### 1. อัตราการเจริญเติบโต

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาคูกที่อยู่ในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 550 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.7432 กรัมต่อตัวต่อวัน รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 400, 300 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 0.65280, 0.65278 และ 0.62330 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางภาคผนวกที่ 14)

จากผลการทดลอง กล่าวได้ว่า ระดับการปล่อยปลาและจำนวนปลาที่เหลือรอด ยังมีระดับที่เหมาะสมไม่เพียงพอที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน และในสัปดาห์ที่ 14 นั้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาคูกลดลง คาดว่าเนื่องจากปลาเกิดโรค ทำให้การกินอาหารหยุดชงัก ปลาที่สุขภาพไม่ดี จะกินอาหารน้อยลง หรือหยุดกินอาหาร (ศักดิ์ชัย, 2530) อัตราการเจริญเติบโตของปลาคูกทุกระดับการปล่อย สูงกว่า การทดลองของเวียง (2513) ซึ่งรายงานว่าปลาคูกที่อยู่ในบ่อคอนกรีต มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 0.17 กรัมต่อตัวต่อวัน

### 2. อัตราการรอดตาย

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาคูกที่อยู่ในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 400 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 76.12 % รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 300, 600 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 74.54, 68.75 และ 62.75 % ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางภาคผนวกที่ 15)

จากการสังเกต พบว่าที่ระดับการปล่อย 300 และ 400 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปลาจะมีสุขภาพแข็งแรง และสภาพแวดล้อมภายในบ่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าระดับการปล่อย 500 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และในสัปดาห์ที่ 14 คุณสมบัติน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา คือ น้ำที่สูบขึ้นมาใช้มีอินทรีย์วัตถุสูง และในบ่อพักน้ำมีโคลนสะสมอยู่มาก ประกอบกับปริมาณน้ำในบ่อพักน้ำไหลลงมาก อาจเกิดสารพิษต่าง ๆ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ ปลาในบ่อพักน้ำค่อนข้างจะลอยหัว มีปลาขนาดใหญ่ตายเป็นจำนวนมากติดกันหลายวัน ทำให้มีผลกระทบต่อปลาที่อยู่กันอย่างหนาแน่น คือ ที่ระดับการปล่อย 500 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยปลาจะเครียด ไม่กิน

อาหาร เกิดแผลข้างลำตัว ปลากัดกินเองทำให้แผลขยายกว้างออกไป เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย และตายเป็นจำนวนมาก การปล่อยปลาหนาแน่นเกินไป มีโอกาสติดโรคและแพร่โรคได้ง่าย เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะขยายตัวรวดเร็ว ทำให้อัตราการสูญเสียมีมาก (เมฆ, 2530) อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาคูอกุ่ยที่ระดับการปล่อย 400, 300 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงกว่าการทดลองของเวียง (2513) ซึ่งรายงานว่ปลาคูอกุ่ยมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 68.57 % แต่ที่ระดับการปล่อย 500 มีค่าต่ำกว่า

### 3. ผลผลิต

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลผลิตเฉลี่ยของปลาคูอกุ่ยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลผลิตเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 68.45 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 500, 400 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 58.11, 51.68 และ 37.27 กิโลกรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางภาคผนวกที่ 16)

เมื่อพิจารณาอัตราการรอดตายและระดับการปล่อยพบว่าที่ระดับการปล่อยสูง แม้อัตราการรอดตายต่ำกว่าระดับการปล่อยที่ต่ำกว่า แต่มีจำนวนตัวเหลือรอดมากกว่า คือที่ระดับการปล่อย 600 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอด 68.75 และ 62.75 % มีจำนวนตัวเหลือรอดเท่ากับ 412 และ 312 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และที่ระดับการปล่อย 400 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอด 76.12 และ 74.58 % มีจำนวนตัวเหลือรอดเท่ากับ 304 และ 223 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ดังนั้นจึงทำให้ระดับการปล่อยที่สูงกว่า มีผลผลิตสูงกว่าระดับการปล่อยที่ต่ำกว่าเพราะมีจำนวนปลามากกว่า

### 4. อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักเฉลี่ยของปลาคูอกุ่ยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักต่ำสุด เท่ากับ 2.85 รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 600, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 3.06, 3.24 และ 3.27 ตามลำดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ ) (ตารางภาคผนวกที่ 16)

อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของปลาทุกอายุที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสเฉลี่ย ทุกระดั้มการปล่อยเท่ากับ 3.10 ซึ่งสูงกว่า อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของการเลี้ยง ปลาทุกค้ำในบ่อคอนกรีตกลม ระบบน้ำหมุนเวียน ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสริมชนิดเม็ดลอยน้ำ โปรตีน 30 % ในช่วง 45 วันแรก และโปรตีน 25 % ในช่วง 45 วันสุดท้าย มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักเท่ากับ 1.37 (วิทย์และคณะ, 2524)

อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักเฉลี่ยที่ระดั้ม 300 หัวต่อลูกบาศก์เมตรมีค่าต่ำสุดนั้น จากการสังเกตการกินอาหาร และเศษอาหารที่เหลือเวลาถ่ายน้ำทิ้ง พบว่าขณะที่ให้อาหาร ปลาจะเข้ามากินอาหารกันมาก ซึ่งดูได้จาก ฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากผิวน้ำ และมีเศษอาหาร เหลือออกมาเล็กน้อย ทำให้มีอาหารเหลือทิ้งน้อยกวาระดั้มการปล่อยอื่น ๆ ส่วนสาเหตุที่อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของปลาทุกอายุทั้งหมดเฉลี่ย สูงมากนั้น คาดว่าอาจเนื่องมาจากคุณภาพของอาหาร การเปลี่ยนแปลงอาหารหรือรูปแบบการให้อาหารบ่อยเกินไป คือในช่วงแรกที่ให้อาหารในรูปกะป็นั้น ปลากินดีมาก แต่มีการสูญเสียมาก เนื่องจากละลายน้ำมาก ต่อมาช่วงที่ 2 เปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จชนิดผง ซึ่งผสมเข้ากับน้ำให้อยู่ในรูปกะป็นได้ยาก และมีการสูญเสียสูง และต่อมา เปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ำ ในช่วงแรก ๆ ที่ให้อาหารชนิดนี้ ปลาไม่ค่อยกิน อาหารเหลือปนมากกับน้ำทิ้งมาก และต่อมาในช่วงหลังไม่สามารถสังเกตการกินอาหารของปลาได้แน่นอน เพราะน้ำขุ่นมากและไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากผิวน้ำ ประกอบกับไม่ทราบจำนวนตัวตายที่แท้จริง ทำให้การกำหนดปริมาณอาหารที่ให้ ผิดไปจากความจริงมาก มีการสูญเสียมาก

##### 5. คุณสมบัติน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

จากการตรวจสอบคุณสมบัติน้ำในบ่อปลาพบว่า มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำอยู่ระหว่าง 1.4-4.09 ppm. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ระหว่าง 1.55-3.19 ppm. อุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 28.2-31.2 องศาเซลเซียส ความเป็นด่างของน้ำอยู่ระหว่าง 20.0-47.98 ppm. ความกระด้างของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 82.63-221.75 ppm. และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเท่ากับ 6.5

##### 6. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

จากผลการทดลองเลี้ยงปลาทูในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดั้มการปล่อยต่างกันในระยะ


เวลา 20 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ที่ระดับการปล่อย 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนการผลิตต่อตัวต่ำสุดเท่ากับ 2.88 บาท รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 400, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 3.18, 3.32 และ 3.51 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตต่อตัวคำนวณได้จากต้นทุนค่าอาหาร ค่าพันธุ์ ค่ายาและสารเคมีต่อจำนวนปลาที่รอดตาย ที่ระดับการปล่อย 600 ตัว มีต้นทุนค่าอาหารและค่าพันธุ์สูงกว่าทุกระดับการปล่อย แต่ก็มีจำนวนปลารอดตายสูงเช่นกัน ทำให้เมื่อคิดต้นทุนการผลิตต่อตัวแล้ว จะมีค่าต่ำสุด ที่ระดับการปล่อย 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนการผลิตต่อตัวสูงที่สุดนั้น เนื่องจาก มีต้นทุนค่าอาหารสูง เพราะมีการสูญเสียมาก

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงปลาดุกกุ่มในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อยต่างกัน พบว่า ที่ระดับการปล่อย 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรให้กำไรสูงสุดเท่ากับ 427.98 บาทต่อบ่อ ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับ คิดจากรายได้ที่ขายผลผลิตขนาดตลาดต้องการเท่านั้น คือขนาด 100 กรัมขึ้นไป ซึ่งที่ระดับการปล่อยนี้มีผลผลิตขนาดที่ตลาดต้องการสูงสุด ส่วนที่ระดับการปล่อย 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรนั้น แม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตต่อตัวต่ำสุดก็ตาม แต่มีจำนวนปลาที่ไม่ได้ขนาดมาก ทำให้มีรายได้จากการขายผลผลิตขนาดตลาดต้องการต่ำ จึงมีผลให้ได้กำไรต่อบ่อต่ำกว่า ทั้งนี้ไม่ได้นำรายได้จากการขายผลผลิตขนาดที่ต่ำกว่าความต้องการของตลาดมาคำนวณด้วย (ตารางที่ 5, ตารางภาคผนวกที่ 5)

ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ของปลาอุกที่อยู่ในเลี้ยงในบ่อไฟเบอร์ ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมน.)	อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)											
	สัปดาห์ที่	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	เฉลี่ย
300		0.1640	0.5954	0.9765	0.9925	1.2497	0.6907	0.4164	0.5243	0.8986	0.1550	0.65278
400		0.2414	0.6193	1.1311	0.8868	1.1608	1.8097	-0.4643	-0.0832	1.5357	-0.3093	0.6528
500		0.2768	0.4464	1.0718	1.006	1.1179	1.6811	-0.5607	0.5118	0.6071	1.2736	0.74318
600		0.1518	0.5954	1.2132	0.3811	1.1711	1.5490	-0.5954	0.5061	0.1659	1.0954	0.62336
เฉลี่ย		0.2085	0.5641	1.0981	0.799	1.1686	1.4326	-0.3173	0.3647	0.8065	0.5537	0.66803

100768



ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตค่าน้ำหนักของปลาทุกชนิดที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์ ระบบปิดที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางที่ 2** อัตรารอดตาย (%) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมนม.)	อัตรารอดตาย (%)
300	74.58
400	76.12
500	62.5
600	68.75

**ตารางที่ 3** ผลผลิตเฉลี่ย (กก.) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมนม.)	ผลผลิตเฉลี่ย (กก.)
300	37.27
400	51.68
500	58.11
600	68.45

ตารางที่ 4 อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก ของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่  
ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลณม.)	อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก
300	2.85
400	3.24
500	3.27
600	3.06

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิต (บาท) ของปลาถูกกึ่งที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย	ต้นทุน ค่าอาหาร (บาท)	ต้นทุน ค่าพันธุ์ (บาท)	ต้นทุนคยา และสารเคมี (บาท)	จำนวนปลา ที่เหลือรอด (ตัว)	ต้นทุน ทอดัว (บาท)	จำนวนปลา ที่ขายได้ (บาท)	ต้นทุนปลา ที่ขายได้ (บาท)	ณ.ปลาที่ ขายได้ (บาท)	รายได้ของปลา ที่ขายได้ (บาท)	กำไร (บาท)
300	730.525	210	543.5	447.5	3.32	240	796.8	26.03	1041.20	244.4
400	1111.948	280	543.5	609	3.18	265	814.08	30.00	1200	385.92
500	1312.03	350	543.5	629	3.51	462	1621.62	51.24	2049.6	427.98
600	1410.607	420	543.5	825	2.88	346	996.48	35.11	1404.4	407.92

หมายเหตุ รายได้คำนวณจากน้ำหนักผลผลิตปลาที่ขายได้

ขอเสนอแนะ

1. เมื่อปลาถูกอุยแสดงอาการป่วย โดยมีการตกเลือดที่ครีบหู ครีบหลัง และบริเวณท้อง ต่อมาแสดงอาการตกเลือดที่โคนหนวด มีแผลลักษณะ บริเวณรอยต่อกระดูกโครงกระดูก โทลคยุม บางตัวโคนหนวด บางตัวมีลำตัวคดงอเป็นคลื่น คาดว่าปลาเป็นโรคกระดูกโครงกระดูก เนื่องจากขาดวิตามิน ซี การรักษา ใช้วิตามิน ซี ผสมอาหารให้กิน 3 วัน เว้น 3 วัน นาน 2 สัปดาห์ ในอัตราส่วนดังนี้ วิตามิน ซี 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารให้กินในช่วงที่เว้น 3 วัน แทนวิตามิน ซี พร้อมกับใส่เกลือ ในบ่อที่ปลาแสดงอาการอ่อนแอ ความเข้มข้น 0.2 % ประมาณ 2 สัปดาห์ ปลาจะหายป่วย

2. ถ้าปลาถูกเริ่มแสดงอาการผิดปกติ มีอาการตกเลือดตามครีบ มีแผลคัน ๆ คลายรอยกัดกิน มีช่องเหลวปนเลือดคั่งในช่องท้อง ปลาตายอย่างรวดเร็ว ควรใช้ยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline หรือ tetracycline 20 มิลลิกรัมต่อลิตรแช่ปลา พร้อมกับใส่เกลือแกง 1 % (วรมณ, 2527)

## สรุป

## 1. อัตราการเจริญเติบโต

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.7432 กรัมต่อตัวต่อวัน รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 400, 300 และ 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรคือ 0.65280, 0.65278 และ 0.62330 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

## 2. อัตราการรอดตาย

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 400 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 76.12 % รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 300, 600 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 74.54, 68.75 และ 62.75 % ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่าง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

## 3. ผลผลิต

ผลผลิตเฉลี่ยของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อย 600 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 68.45 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 500, 400 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 58.11, 51.68 และ 37.27 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P < 0.05$ )

## 4. อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนัก

อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อย 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นน้ำหนักเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 2.85 รองลงมาได้แก่ที่ระดับการปล่อย 600, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร คือ 3.06, 3.24 และ 3.27 ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

การเลี้ยงปลาอุกในบ่อไฟเบอร์กลาสที่ระดับการปล่อย 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระดับการปล่อยที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นระดับที่ให้กำไรต่อตัวสูงสุดเท่ากับ 427.98 บาท ทั้งนี้ โดยคิดจากผลผลิตขนาดที่ตลาดต้องการ เท่านั้น

## เอกสารอ้างอิง

- กมลพร ทองอุไร. 2510. การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาอุก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง. ใน รายงานประจำปีแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง, น.61-69
- กวรรณิการ์ สีวิสิงห์. 2526. เหมียงของน้ำใส่โถรวมและการวิเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 387 น.
- เกรียงศักดิ์ สายชน และโชติรส ชลารักษ์. 2526. โรคแผลในปลาอุกค้ำ : วิธีการรักษาวารสารโรคสัตว์น้ำ, 6(1) : น. 9-17
- จินดา เทียมเมฆ. 2506. มีนวิทยา. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 125 น.
- ชลดิมสุวรรณ, ศักดิ์ชัย ชูโชติ, สุปราณี ชินบุตร, กมลพร ทองอุไร และวิทย์ ชารชลาณกิจ. 2529. โรคของปลาอุกค้ำที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตกลม. น. 217-218 ใน รายงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ชาญบุษย คงภิรมย์ชน. 2530. คุณภาพน้ำเบื้องต้นทางด้านการประมง. วารสารเกษตรอุตสาหกรรม 2(22) : 40-42
- ชัยเชษฐ เล้าจินดาศรี. 2511. การศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาอุกค้ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ชำรงค์ อมรสกุล. 2528. คุณสมบัติน้ำในบ่อคอนกรีตกลม ระบบน้ำหมุนเวียนที่เลี้ยงปลาอุกค้ำในระดัับการปล่อยที่แตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ประเสริฐ สีทะสิทธิ์. 2511. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอุกในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ. ใน รายงานประจำปีแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง. หน้า 160-176

- \_\_\_\_\_ . 2514. การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตระหว่าง ปลาอุกค้ำกับปลา  
อุกค้ำ. ใน รายงานประจำปีแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรม  
ประมง. หน้า 133-148.
- \_\_\_\_\_ . 2530. การเพาะเลี้ยงปลาอุกค้ำโดยวิธีผสมเทียม. เอกสารคำแนะนำ  
กรมประมง, กรุงเทพฯ. 32 น.
- มยุ โปธารส และมาโนช สุภชสิทธิ์. 2516. การเลี้ยงปลาอุกค้ำด้วยอาหารเม็ด. น. 77-79  
ใน รายงานประจำปี แผนกทดลองและเพาะเลี้ยง, กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง.  
กรุงเทพฯ.
- เมฆ บุญพรานนท์. 2530. การเลี้ยงปลา. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัย  
สัตยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 135 น.
- ไมตรี ดวงสวัสดิ์. 2522. คุณสมบัติน้ำกับการเลี้ยงปลา. วารสารการประมง 32(4):415-419
- วรวณะ นนทนาพันธ์. 2529. อิทธิพลของคุณสมบัติของน้ำต่อการเป็นโรคติดเชื้อ *Aeromonas*  
*hydrophila* และการรักษาโรคในปลาอุกค้ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- วิทย์ ชารชลาณกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์ศักดิ์, ประวิทย์ สุรนันทน์, และอุทัยรัตน์ ณ นคร. 2524.  
การเลี้ยงปลาอุกค้ำในบ่อคอนกรีตกลม ระบบน้ำหมุนเวียน. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 15 น.
- วิทย์ ชารชลาณกิจ และประวิทย์ สุรนันทน์. 2513. ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาอุกค้ำ  
*Clarias macrocephalus* Gunther ที่เลี้ยงด้วยปลาหมอเทศบด. คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 2 น.
- สุพจน์ ทองเทพ. 2523. ปริมาณการใช้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำของปลา น้ำจืดบางชนิดที่ระดับ  
อุณหภูมิต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

- สุภาพ มงคลประดิษฐ์, สืบสิน สนธิรัตน์ และประจักษ์ วงศ์รัตน์. 2529. คู่มือประกอบการเรียนวิชาอนุกรมวิธานของปลา. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
น. 120-121
- สมศักดิ์ สิงหลกะ. 2509. ความสัมพันธ์ของความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในบ่อกับความเหมาะสมในการเลี้ยงปลา. วารสารประมง. 16(4) : น. 541-546
- โสภ อาริรัตน์. 2513. พันธุ์ปลาดุกที่พบในประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 9, กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, กรมประมง, กรุงเทพฯ. 18 น.
- ศักดิ์ชัย ชูโชติ. 2530. การเลี้ยงปลาน้ำจืด. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 223 น.
- ระบิล รัตนพานิช และจิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์. 2527. พยาธิวิทยาของโรคหลังคคในปลาดุกคาน เวชชสารสัตว์แพทย์ 14(2) : 135-146
- อุปลักษณ์ ภานุทานนท์. 2508. การเลี้ยงปลาดุกในเขตพระนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- นิรนาม. 2527. มารูจักปลาดุกอุยกันหน่อย. วารสารโลกเกษตร. 4(19) : 21
- Bardch, E. Jhon, Ryther, H. Jhon and Mc Larney, O. William. 1972. Culther of Catfishes Native to Australaria and Europe, pp. 210-213 In Aquaculture the Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organisms. United States of Armerica.
- Brown, E.M. 1957. The Physiology of fishes. Vol. II. Academic Press Inc., New York. 424 pp.
- Hara, S.L. and P.U. Pilly. 1955. Handbook on fish Culture in Indo-Pacific region. Rome : FAO, UN. 22 pp.
- Pincher, C., 1948. A study of fish. Duell, Sloan and Peare Inc., New York. 128 pp.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Smith, H.M. 1945. The freshwater fishes of Siam or Thailand. Washington, D.C.: United Government Printing Office. p. 346-351.

Swingle, H.S. 1969. Methods of Analysis For Water, Organic Matter, and Pond Botton Soils Used in Fisheries Reseach. Auburn University. 119 pp.

Tucker. C.S. 1985. pp. 86-103, 512-532 In Channel Catfish Culture. Univ. Mississippi State. USA.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาคุยกุยกี้เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ ลมม.)	สัปดาห์	น้ำหนัก				
		อาทิตย์ 1 (กรัม)	อาทิตย์ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	
300	0	4.79	4.79	4.79	0	
	2	7.00	7.17	7.08	2.29	
	4	15.00	15.83	15.41	8.33	
	6	27.17	31.00	29.08	13.67	
	8	42.17	41.83	42.00	12.91	
	10	59.67	59.33	59.5	17.49	
	12	63.33	75.00	69.16	6.67	
	14	76.67	73.33	75.00	5.83	
	16	79.83	74.67	77.25	2.25	
	18	91.33	88.33	89.83	12.58	
	20	94.33	89.67	92.00	2.17	
	400	0	4.79	4.79	4.79	0
		2	7.67	8.67	8.17	3.38
		4	17.33	16.33	16.83	8.67
		6	31.33	34.00	32.66	15.82
		8	46.83	43.33	45.08	12.43
		10	57.66	65.00	61.33	16.5
		12	83.33	90.00	86.65	25.33
		14	72.00	88.33	80.16	-6.5
		16	70.67	87.33	79.00	-1.16
18		97.00	104.00	100.5	21.5	
20		85.67	106.67	96.17	-4.3	
500		0	4.79	4.79	0	0
	2	8.00	9.33	8.66	3.87	
	4	15.17	14.67	14.29	6.25	
	6	29.17	30.67	29.92	15.00	
	8	45.33	42.67	44.00	14.08	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาตุ๋นที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์ (ต่อ)

ระดับการปล่อย	สัปดาห์ที่	น้ำหนัก			
		อาทิตย์ 1 (กรัม)	อาทิตย์ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
500	10	60.30	59.00	59.65	15.65
	12	87.70	78.67	83.18	23.53
	14	75.00	75.67	75.33	-7.85
	16	77.33	87.67	82.5	7.16
	18	93.67	88.33	91.0	8.5
	20	108.33	109.33	108.83	17.83
	0	4.79	4.79	4.79	0
	2	7.83	6.00	6.91	2.12
	4	16.00	14.50	15.25	8.33
	6	32.83	31.67	32.25	16.98
600	8	42.50	32.67	37.58	5.33
	10	51.30	56.67	53.98	16.39
	12	78.67	72.67	75.67	21.68
	14	72.33	62.33	67.33	-8.33
	16	80.50	68.33	74.14	7.08
	18	84.33	75.67	80.0	5.58
	20	104.0	86.67	95.33	15.33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 2 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ของปลาชุกกอยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์  
กลาส ที่ระคัมการปลดอยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระคัมการปลดอย (ตัว/ลณม.)	สัปดาห์ที่	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น			อัตราการเจริญเติบโต		
		ซำที่ 1 (กรัม)	ซำที่ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)	ซำที่ 1 (กรัม)	ซำที่ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)
300	2	2.21	2.38	2.30	0.1579	0.17	0.16395
	4	8.00	8.67	8.34	0.5714	0.6193	0.5954
	6	12.17	15.17	13.67	0.8693	1.0836	0.9765
	8	15.00	10.83	12.92	1.0714	0.7736	0.9225
	10	17.49	17.50	17.50	1.2493	1.25	1.2497
	12	3.67	15.67	9.67	0.2621	1.1193	0.6907
	14	13.34	-1.67	5.84	0.8214	-0.1193	0.3511
	16	3.16	1.34	2.25	0.9529	0.0957	0.5243
	18	11.50	15.66	13.58	0.8214	1.0757	0.8986
	20	3.00	1.34	2.17	0.2143	0.0957	0.155
400	2	2.88	3.88	3.38	0.2057	0.2771	0.2414
	4	9.67	7.67	8.67	0.6907	0.5479	0.6193
	6	14.00	17.67	15.82	1.000	1.2621	1.1311
	8	15.50	9.33	12.43	1.1071	0.6664	0.8868
	10	10.83	21.67	16.5	0.7736	1.5479	1.1608
	12	25.67	25.00	25.34	1.8336	1.7857	1.8097
	14	-11.33	-1.67	-6.5	-0.8093	-0.1193	-0.4643
	16	-1.33	-1.0	-1.17	-0.095	-0.0714	-0.0832
	18	26.33	16.67	21.5	1.8807	1.1907	1.5357
	20	-11.33	2.67	-4.33	-0.8093	0.1907	-0.3093
500	2	3.21	4.54	3.88	0.2293	0.3243	0.2768
	4	7.17	5.33	6.25	0.5121	0.3807	0.4464
	6	14.00	16.01	15.01	1.000	1.1436	1.0718
	8	16.16	12.00	14.08	1.1543	0.8571	1.0057

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 2 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์ (ต่อ)

ระดับการปล่อย (ตัว/ลณม.)	สัปดาห์ที่	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น			อัตราการเจริญเติบโต		
		อาทิตย์ 1 (กรัม)	อาทิตย์ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)	อาทิตย์ 1 (กรัม)	อาทิตย์ 2 (กรัม)	เฉลี่ย (กรัม)
500	10	14.97	16.33	15.65	1.0693	1.1164	1.0929
	12	27.40	19.67	23.54	1.9571	1.4050	1.6811
	14	-12.70	-3.00	-7.85	-0.9071	-0.2143	-0.5607
	16	2.33	12.00	7.17	0.1664	0.8571	0.5118
	18	16.34	0.66	8.5	1.1671	0.0471	0.6071
	20	14.66	21.00	17.83	1.0471	1.5000	1.2736
	2	3.04	1.21	2.13	0.2171	0.0864	0.1518
	4	8.17	8.50	8.34	0.5836	0.6071	0.5954
	6	16.80	17.17	16.99	1.2000	1.2284	1.2132
	8	9.67	1.00	5.34	0.6907	0.0714	0.3811
600	10	8.80	23.99	16.40	0.6286	1.7136	1.1711
	12	27.37	16.00	21.69	1.955	1.1429	1.5490
	14	-6.34	-10.33	-8.34	-0.4529	-0.7379	-0.5954
	16	8.17	6.00	7.09	0.5836	0.4286	0.5061
	18	3.83	7.34	5.59	0.2736	0.0957	0.1847
	20	19.67	11.00	15.34	1.4050	0.7857	1.0954

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางภาคผนวกที่ 3 อัตรารอดตาย (%) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์**

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมน.)	จำนวนที่ ปล่อย	ซ้ำที่	จำนวน (ตัว)	เฉลี่ย (ตัว)	เปอร์เซ็นต์ (%)	เฉลี่ย (%)
300	600	1	475	447.5	79.15	74.58
	600	2	420		70.0	
400	800	1	629	609	78.62	76.12
	800	2	589		73.62	
500	1000	1	514	625	51.4	62.5
	1000	2	736		73.6	
600	1200	1	830	825	69.16	68.75
	1200	2	820		68.33	

**ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลผลิตทั้งหมด (กก.) ของปลาอุกอุยที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์**

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมน.)	ซ้ำที่	ผลผลิตทั้งหมด (กก.)	น้ำหนักเริ่มต้น (กก.)	ผลผลิต (กก.)	เฉลี่ย (กก.)
300	1	43.64	2.87	40.77	37.27
	2	36.64	2.87	33.77	
400	1	44.88	3.83	41.05	51.68
	2	66.13	3.83	62.3	
500	1	60.87	4.79	56.08	58.11
	2	60.87	4.79	56.08	
600	1	73.72	5.75	67.97	68.45
	2	74.67	5.75	68.92	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลผลิตขนาดต่าง ๆ (กก.) ของปลาอุกอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลบม.)	ซ้ำที่	ขนาด 70-99 กรัม					ขนาด 100 กรัมขึ้นไป				
		จำนวนตัว	นน. เริ่มต้น (กก.)	นน. ปล่อย (กก.)	ผลผลิต (กก.)		จำนวนตัว	นน. เริ่มต้น	นน. ปล่อย	ผลผลิต (กก.)	
					/บ่อ	เฉลี่ย				/บ่อ	เฉลี่ย
300	1	167	0.81	9.54	8.73	11.95	308	1.48	34.08	32.61	26.03
	2	248	1.89	16.36	15.17		172	0.83	20.28	19.45	
400	1	451	2.61	23.22	21.06	21.68	178	1.93	22.83	20.90	30.00
	2	263	1.26	23.56	22.3		326	1.56	40.66	39.10	
500	1	55	0.22	7.2	6.98	9.19	459	2.19	54.67	52.48	51.24
	2	271	1.30	12.69	11.39		465	2.22	52.22	50.00	
600	1	396	1.90	30.06	28.16	33.34	434	2.10	45.88	43.78	35.11
	2	562	2.70	41.24	38.54		258	1.20	27.63	26.43	

ตารางภาคผนวกที่ 6 อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำนมกึ่ง ของปลาคุกกุอยู่ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์  
กลาส ที่ระกบการปล่อยทางกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระกบการปล่อย (ตัว/ลอมม.)	ซ้ำที่	ปริมาณอาหาร ที่ไซ้ทั้งหมด (กก.)	น้ำนมกึ่งที่ เพิ่มขึ้น (กก.)	อัตราแลกเปลี่ยน อาหารเป็นน้ำนมกึ่ง	เฉลี่ย
300	1	108.99	40.77	2.67	2.85
	2	102.48	33.77	3.03	
400	1	157.61	41.05	3.84	
	2	163.94	62.3	2.63	
500	1	187.46	56.08	3.34	3.27
	2	192.42	60.13	3.20	
600	1	219.69	67.97	3.23	3.06
	2	198.69	68.92	2.88	
รวม		1331.28	430.99		3.10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 7 ปริมาณอาหาร (กก.) ที่ใช้เลี้ยงปลาตู้กในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลบม.)	ซ้ำที่	ปริมาณอาหารที่ใช้ (กก.)										รวม	เฉลี่ย
		สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 6	สัปดาห์ที่ 8	สัปดาห์ที่ 10	สัปดาห์ที่ 12	สัปดาห์ที่ 14	สัปดาห์ที่ 16	สัปดาห์ที่ 18	สัปดาห์ที่ 20		
300	1	5.00	7.10	8.37	11.55	12.93	14.04	8.67	14.80	14.44	12.08	108.99	105.8
	2	4.80	7.10	8.39	12.92	11.29	12.09	9.71	13.54	12.54	10.21	102.48	
400	1	6.02	10.88	13.13	17.74	18.39	18.04	16.69	20.71	18.62	17.39	157.61	160.78
	2	6.30	9.96	13.75	18.71	17.28	19.00	16.32	24.45	22.42	15.75	163.94	
500	1	7.65	13.47	13.00	20.42	22.17	24.96	19.38	24.03	21.28	21.10	187.46	189.94
	2	7.65	14.97	14.50	22.73	22.41	23.25	17.25	26.37	23.94	19.35	192.42	
600	1	10.00	16.84	18.96	28.09	25.86	30.02	14.31	29.46	25.46	20.69	219.69	209.19
	2	10.55	14.75	20.73	27.72	26.97	27.12	14.05	24.35	15.9	17.45	198.69	
											1331.28	665.71	

ตารางภาคผนวกที่ 8 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (ppm) ในเนื้อเลี้ยงปลาอุกอุย ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลบม.)	ซ้ำที่	สัปดาห์ที่										
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	เฉลี่ย
300	1	4.13	4.13	1.72	1.46	1.09	2.13	2.15	2.4	2.31	4	2.55
	2	4.15	4.78	2.11	1.56	1.84	1.59	1.6	2.34	2.43	3.7	2.61
400	1	4.51	4.65	1.88	1.69	1.53	1.4	2.13	1.25	2.11	2.58	2.37
	2	4.15	3.78	1.60	1.86	1.3	0.86	2.02	1.69	2.1	2.33	2.17
500	1	3.65	3.85	1.88	1.73	2.85	1.41	1.6	1.16	1.95	2.18	2.23
	2	3.45	3.85	1.82	2.25	2.09	1.2	1.63	1.2	1.98	2.08	2.16
600	1	3.89	3.78	1.51	1.18	1.19	1.41	1.76	1.3	1.73	2.88	2.06
	2	3.48	3.88	1.25	1.05	1.24	1.23	1.79	1.33	1.85	2.38	1.95
เฉลี่ย		3.93	4.09	1.72	1.60	1.64	1.4	1.84	1.58	2.1	2.77	

+

ตารางภาคผนวกที่ 9 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำ (ppm) ในบ่อเลี้ยงปลาอุก ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (กั/ลบม.)	ซ้ำที่	สัปดาห์ที่										เฉลี่ย
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
300	1	1.4	1.4	1.85	2.5	2	3	2.85	2.75	2.75	2.2	2.35
	2	1.6	1.65	1.85	2.25	2	3.4	2.9	2.9	2.9	2.25	2.44
400	1	1.55	1.65	1.9	2.35	1.9	2.9	2.9	2.6	3.1	2.4	2.33
	2	1.45	1.6	2.7	2.95	1.85	3.1	3.1	2.9	2.75	2.4	2.48
500	1	1.8	1.5	2.4	2.5	2.1	2.65	3.2	3	2.95	2.7	2.48
	2	1.95	1.75	2.5	2.5	1.85	3.3	3.4	2.9	2.85	3.1	2.61
600	1	1.55	1.75	2.15	2.55	2.15	2.9	3.35	3.5	3.3	2.9	2.61
	2	1.1	1.85	2.4	3.25	2.0	2.65	3.15	3	3.35	2.8	2.56
เฉลี่ย		1.55	1.64	2.22	2.61	1.98	2.96	3.19	2.93	2.99	2.59	

ตารางภาคผนวกที่ 10 อุณหภูมิ ( °c ) ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกจุด ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (ตัว/ลมน.)	ซ้ำที่	สัปดาห์ที่										
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	เฉลี่ย
300	1	29.2	28.9	31.2	28.2	27.9	28.5	28.4	29.9	29	29	29
	2	29.2	28.9	31.2	28.2	27.9	28.5	28.3	29.8	29.2	29	29
400	1	29.2	28.9	31.2	28.2	27.9	28.5	28.3	30	29.1	28.9	29
	2	29.2	28.9	31.2	28.1	28	28.5	28.4	29.9	29	29.1	29
500	1	29.2	28.9	31.1	28.1	28	28.5	28.3	29.9	29	28.9	29
	2	29.2	28.9	31.2	28.1	27.9	28.5	28.4	29.8	29.2	29	29
600	1	29.2	28.9	31.4	28.2	28	28.5	28.3	29.9	29	28.9	29
	2	29.2	28.9	31.2	28.2	27.9	28.5	28.4	29.7	29	29	29
เฉลี่ย		29.2	28.9	31.2	28.2	27.9	28.5	28.4	29.9	29	29	

5  
6  
10

ตารางความยาวที่ 11 ความกระด้าง (Hardness) ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกจุดเฉลี่ย (ppm) ทุก 5 วัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับความกระด้าง	วันที่	พ.ร.ช.																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	เฉลี่ย
300 กก./ลบ.บ.	1	166	216	196	210	205	150	206	238	148	160	165	218	200	204	151	200	174	140	122	107	104	89	98	112	79	100	95	92	155.18
	2	150	242	218	214	196	149	192	222	170	170	164	220	198	203	149	210	166	155	120	112	130	92	96	108	85	96	87	89	156.18
400 กก./ลบ.บ.	1	158	220	198	208	194	136	200	218	156	176	168	226	180	204	148	184	177	148	110	108	96	90	88	106	89	86	93	92	152.04
	2	172	208	198	190	195	158	199	208	168	150	185	210	202	210	155	196	185	150	116	103	122	80	92	114	81	90	99	95	154.68
500 กก./ลบ.บ.	1	158	230	206	202	206	121	186	214	168	188	172	207	190	217	154	189	186	180	122	98	96	89	82	99	89	98	97	95	154.89
	2	156	208	192	209	198	148	212	220	174	199	187	206	200	229	145	210	204	160	120	112	100	98	94	110	83	88	96	94	158.65
600 กก./ลบ.บ.	1	150	218	198	198	214	138	204	224	172	174	161	203	188	208	146	190	199	168	136	102	99	94	84	96	78	110	95	96	155.11
	2	172	214	192	200	210	152	201	230	164	170	195	219	210	214	165	192	183	175	146	104	101	95	80	110	77	121	94	90	159.85
เฉลี่ย		160.3	219.5	199.8	202.3	202.3	144	200	221.8	165.0	176.9	174.6	213.6	196	211.1	151.6	196.4	184.3	159.5	124.0	105.8	99.8	90.9	89.3	106.9	82.6	98.6	94.5	92.9	155.82

ตารางภาคผนวกที่ 12 ความเบี่ยง (Total alkalinity) ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกจุดเฉลี่ย (ppm) ทุก 5 วัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

ระดับการปล่อย (กั./ลบม.)	ซ้ำที่	ครั้งที่																												เฉลี่ย
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
300 กั./ลบม.	1	40	46	29.5	31	29	29	40	40	30	31	31.5	36	48	27	18	27	23.5	32	45.5	40	40	42	43.5	46	50.5	43	54	50	37.07
	2	36	41	31	30	31.5	22	37	40	33.5	31.5	33	38	34.5	25	20	26	22.5	34	51	41.5	43	41	45.5	44	51	40.5	44	4	36.11
400 กั./ลบม.	1	37	36	30	29.5	30.5	30	40	40	35	30	34	34.5	35.5	24	19	27	24.5	36	47	40	41	42	43.5	46	47	40	46	45	36.07
	2	38.5	33	31.5	30.5	31	31	37	39	35.5	33	31	24.5	28	27	22	24	24.5	34	44.5	45	44	43.5	44	45	44.5	41	43.5	43	35.47
500 กั./ลบม.	1	38	36	29	31	32	28.5	37	40	33.5	33	32.5	35	33	30	20	24.5	23	36	43	42.5	41	42.5	43	42.5	43	43	42	41	35.55
	2	37.5	37	31	30	32	28	37	39	38.5	32.5	33.5	42	39	28.5	20.5	25.5	21.5	32	45.5	41.5	42	43	44.5	46	45.5	48	43	42	36.57
600 กั./ลบม.	1	40	40	29	30.5	30	26.5	40	38	34	30.5	32	37	34	28.5	19	25	25	33	53	45.5	45	46	44	45	53	40.5	42	41	36.60
	2	41	42	33	32	30	29	40	40	36	28	31.5	37.5	31	27	21.5	28	22.5	30	49	47	45	45.5	44.5	47	49	44.5	43.5	43	37.07
เฉลี่ย		38.5	38.9	30.5	30.5	30.9	28	38.5	39.5	34.5	31.2	32.4	35.6	35.4	26.6	20	25.9	23.4	33.4	47.3	42.9	42.6	43.2	44.1	45.1	43	42.6	44.8	43	

ตารางภาคผนวกที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (varance) ของอัตราการเจริญเติบโตของปลาชุกชุมที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

Source of Variation	df	SS	MS	F-ratio		
				calculate	table 5%	table 1%
treatment	3	0.0810776	0.0270	0.0694335 <sup>NS</sup>	2.87	4.38
Error	36	14.0124	0.3892			
total	39	14.0935				

หมายเหตุ NS = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางภาคผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Varance) ของอัตราการรอดตายของปลาชุกชุม ที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

Source of Variation	df	SS	MS	F-ratio		
				calculation	table 5%	table 1%
treatment	3	258.81	86.27	1.1456 <sup>NS</sup>	6.59	16.69
Error	4	301.216	75.304			
total	7	560.026				

หมายเหตุ NS = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางภาคผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Varance) ของผลผลิตทั้งหมดของปลาที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกันในระยะเวลา 20 สัปดาห์


Source of Variation	df	SS	MS	F-ration		
				calculation	table 5%	table 1%
treatment	3	1021.48	340.492	5.25972 <sup>NS</sup>	6.59	16.69
Error	4	258.943	64.7358			
total	7	1280.42				

หมายเหตุ NS = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางภาคผนวกที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Varance) ของอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักของปลาที่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์กลาส ที่ระดับการปล่อยต่างกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห์

Source of Variation	df	SS	MS	F-ration		
				calculation	table 5%	table 1%
treatment	3	0.20842	0.0694733	0.316098 <sup>NS</sup>	6.59	16.69
Error	4	0.879135	0.219734			
total	7	1.08756				

หมายเหตุ NS = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ



บอ 2, 7 ปล่อย 300 ทัว/ลูบาศก์เมตร  
 บอ 3, 8 ปล่อย 400 ทัว/ลูบาศก์เมตร  
 บอ 4, 5 ปล่อย 500 ทัว/ลูบาศก์เมตร  
 บอ 1, 6 ปล่อย 600 ทัว/ลูบาศก์เมตร

ภาพผนวกที่ 1 แผนผังการจัดบ่อทดลองเลี้ยงปลาอุกอุย