

การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกไม้หลวง
(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ชนิดดอกไม้พันธุ์สัตตบงกช

STUDY ON PACKING METHODS FOR EXPORT OF LOTUS
(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) CUT FLOWERS VAR. SATTABONGKOT



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพืชสวน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

ISBN 974-15-2354-8

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การศึกษาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง
(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช

STUDY ON PACKING METHODS FOR EXPORT OF LOTUS
(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) CUT FLOWERS VAR. SATTABONGKOT



.b.....
.i.....

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 61697
วัน,เดือน,ปี...1.9.0.ค. 2549

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
พ.ศ.2549

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
ISBN 974-15-2354-8

STUDY ON PACKING METHODS FOR EXPORT OF LOTUS
(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) CUT FLOWERS VAR. SATTABONGKOT



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HORTICULTURE**

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
2006

ISBN 974-15-2354-8



เอกสารนี้สงวนลิขสิทธิ์ 2006 นี้ไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่า SCHOOL OF GRADUATE STUDIES ใดๆ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาวิธีการบรรจุมลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออก
ดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอก
พันธุ์สัตตบงกช

นักศึกษา

นางสาวมณฑิรา บุญวาที

รหัสประจำตัว

46062610

ปริญญา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชา

พืชสวน

พ.ศ.

2549

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

รศ.ช.ณิฏฐ์ศิริ สุขสุวรรณ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม

ผศ.ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา

บทคัดย่อ

จากการศึกษาวิธีการบรรจุมลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกชโดยการใช้ความเย็น เพื่อลดการผลิตเอทิลีนหลังการเก็บเกี่ยว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การทดลองหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับช่วยกำจัดน้ำยางที่รอยตัดปลายก้านดอก การทดลองที่ 2 และ 3 ทดลองหาอุณหภูมิต่ำที่เหมาะสมโดยใช้ความเย็นจากน้ำแข็งเกล็ดให้กับดอกบัวที่ไม่พักสลิป และพักสลิปตามลำดับในกล่องกระดาษลูกฟูก ผลปรากฏว่า

การทดลองที่ 1 ควรจุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 วินาที ก่อนปักแจกันช่วยให้ดอกไม่มีแนวโน้มคุดน้ำได้ดีขึ้น เมื่อปักแจกันไป 5 วัน มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนน้อยลง เฉลี่ย 53.14 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีการควบคุมที่ผลิตเอทิลีนเฉลี่ย 65.01 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 4.67 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมมีอายุการปักแจกันน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.67 วัน

การทดลองที่ 2 ควรบรรจุดอกบัวตัดดอกที่ไม่พักสลิปในกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยการให้ความเย็นกับดอกบัวด้วยน้ำแข็งเกล็ด อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3 ช่วยให้ดอกไม้อ่อนออกจากกล่องมีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 60.17 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการควบคุมที่มีการผลิตเอทิลีนสูงที่สุด เฉลี่ย 93.26 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และอายุการปักแจกันมีแนวโน้มมากที่สุดเฉลี่ย 4.83 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมเฉลี่ย 3.17 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทดลองที่ 3 ควบคุมการรดน้ำดอกบัวตัดดอกที่พับกลับแล้วลงในกล่องกระดาษสุกฟู ด้วยการให้ความเย็นกับดอกบัวด้วยน้ำแข็งเกล็ดในอัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:2 ช่วยให้ดอกบัวไม่มีการผลิตเอทิลีนเมื่อออกจากกล่องน้อยที่สุด เฉลี่ย 46.90 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการควบคุมที่มีการผลิตเอทิลีนสูงถึง 81.83 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่เมื่อปักแจกันต่อไปจนครบ 4 วัน อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1 มีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุด เฉลี่ย 54.74 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีการควบคุมที่ผลิตเอทิลีนเฉลี่ย 59.77 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 3.83 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมมีอายุการปักแจกันน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.67 วัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title	Study on Packing Methods for Export of Lotus (<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) Cut Flowers var. Sattabongkot
Student	Miss.Monthira Bunwathi
Student ID	46062610
Degree	Master of Science
Programme	Horticulture
Year	2006
Thesis Advisor	Assoc.Prof. Chornitsiri Suisuwan
Thesis Co-Advisor	Assist.Prof.Dr.Chamroon Laosinwattana

ABSTRACT

Study on packing method of lotus (*nelumbo nucifera* Gaertn.) cut flowers var. Sattabongkot was done to optimize cooling practice in order to decrease ethylene production during the postharvest period. The experiments were carried out in three sets. The first experiment was conducted to find out the suitable hot water treatment before holding in the vase. The second and the third experiments were conducted to find out the suitable cooling practice for packing unfolbed petals and folded petals of lotus flowers in corrugated fiber board box, respectively.

In experiment I, the result showed that 60°C hot water treatment was the best treatment for lotus prior to holding in the vase. It increased water uptake, decreased ethylene production (53.14 $\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ compared with 65.01 $\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ of the control) and prolonged vase life (4.67 days compared with 3.67 days of the control)

In experiment II, the result showed that the cooling condition with the weight ratio 2:3 of fresh flowers and ice crack was the best treatment for unfolded petals. After transportation, it showed the lowest ethylene production (60.17 $\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ significantly less than 93.26 $\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ of the control) and the longest vase life (4.83 days compared with 3.17 days of the control).

In experiment III, the result showed that the cooling condition with the weight ratio 1:2 of fresh flowers and ice crack was the best treatment for folded petals. After

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

transportation, it showed the lowest ethylene production ($46.90\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ significantly less than $81.83\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ of the control). However, on the fourth day of vase life, the ratio 2:1 gave the best result. It showed the lowest ethylene production ($54.74\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ compared with $59.77\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$ of the control) and the longest vase life (3.83 days compared with 3.67 days of the control).



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์
ช.ณิฏฐิติรี สุธยสุวรรณ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรุญ เล้าสินวัฒนา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม ตลอดจนท่านอาจารย์ กรรมการทุกท่าน ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษา
แนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ และตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุเม อธิญานารถ และ รศ.ภัญชณา มีแก้วกฤษกร กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำตลอดจนข้อชี้แนะจนในที่สุดทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้

ขอขอบคุณภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาวิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในการดำเนินงานวิจัย และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือต่างๆ

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ พี่ๆ และครอบครัวที่เป็นกำลังใจ และคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนทางด้านต่างๆ ในการศึกษาด้วยดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณ คุณสมชาย ไคละทัต เจ้าของนาบัว ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหา
ดอกบัวและความสะดวกในการเก็บเกี่ยวดอกบัวที่ใช้ในการวิจัย

ขอขอบคุณ พี่นัยนันท์ อาบสุวรรณ ที่คอยช่วยเหลือในระหว่างการทำวิจัย ให้คำปรึกษา
แนะนำเทคนิค และวิธีการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ นักศึกษาที่ช่วยเหลือ และให้กำลังใจในการทำวิจัย

สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

มณฑิรา บุญวาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	V
สารบัญ.....	VI
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญภาพ.....	X
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา.....	2
1.4 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย.....	3
1.5 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.6 ขั้นตอนของการศึกษา.....	3
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 การจำแนกชนิดพันธุ์ของดอกบัวหลวง.....	4
2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดอกบัวหลวงพันธุ์สดตบงกช.....	5
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของดอกไม้ตัดดอก.....	6
2.4 ลักษณะการสูญเสียของไม้ตัดดอก.....	9
2.5 แอนโทไซยานิน (Anthocyanin).....	10
2.6 วิธีการบรรจุดอกไม้และการทำความเย็นภายในหีบห่อ.....	12
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	15
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	15
3.2 สถานที่ดำเนินการ.....	16
3.3 ระยะเวลาที่ทำการทดลอง.....	16

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.4 วิธีดำเนินงาน.....	16
3.5 การบันทึกข้อมูล.....	20
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	23
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	24
4.1 การทดลองที่ 1.....	24
4.2 การทดลองที่ 2.....	36
4.3 การทดลองที่ 3.....	47
บทที่ 5 วิจัยรณผลการทดลอง.....	58
5.1 การทดลองที่ 1.....	58
5.2 การทดลองที่ 2.....	60
5.3 การทดลองที่ 3.....	61
5.4 การเปรียบเทียบคุณภุมิภายในกล่องระหว่างการเลียนแบบการขนส่งของการทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3.....	63
บทที่ 6 สรุปผลการทดลอง.....	65
บรรณานุกรม.....	66
ประวัติผู้เขียน.....	69

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.8	เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 2.....	40
4.9	เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 2.....	42
4.10	ข้อมูลลักษณะของดอกบัวก่อนการทดลอง และก่อนการปักแจกัน(หลังจากผ่านการจำลองอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่ง) ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3.....	48
4.11	การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ในระหว่างการปักแจกันของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3.....	49
4.12	เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3.....	51
4.13	เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 4 วัน ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3....	52
4.14	อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระหว่างการทดลองที่ 1, 2 และ 3.....	57

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช.....	5
2.2 ส่วนต่างๆ ของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช.....	6
2.3 ขั้นตอนการสังเคราะห์เอทิลีน.....	8
2.4 โครงสร้างหลักของสารประกอบพวงพลาโวนอยด์.....	10
2.5 โครงสร้างแอนโทไซยานินที่พบบ่อยในธรรมชาติ.....	11
3.1 ดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกชที่ใช้ในการทดลอง.....	15
3.2 แหล่งผลิตบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกชที่ใช้ในการทดลอง...	16
3.3 วิธีการบรรจุดอกบัวที่ไม่พับกลับในกล่องกระดาษลูกฟูก (T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2-T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ.....	18
3.4 วิธีการบรรจุดอกบัวที่พับกลับในกล่องกระดาษลูกฟูก (T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2-T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติกในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ.....	19
3.5 ตำแหน่งที่ใช้เทียบสีของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช...	21
4.1 คุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช เมื่อเริ่มต้นการทดลองในทุกวิธีการ จากการทดลองที่ 1 (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.2 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 1 โดย T4 และ T5 มีคุณภาพดีที่สุด คือยังไม่เกิดพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ).....	34
4.3 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 1 โดย T4 มีคุณภาพดีที่สุด คือเกิดพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 9.59 ตารางเซนติเมตร (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ) ..	35
4.4 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 2 (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 - T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	44
4.5 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 2 โดย T4 มีคุณภาพดีที่สุด คือเกิดพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.48 ตารางเซนติเมตร และมีอายุการปักแจกันมากที่สุด เฉลี่ย 4.83 วัน (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 - T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	45
4.6 ลักษณะพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode ของดอกบัวหลวง (<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 2 โดย T4 มีความเสียหายน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.48 ตารางเซนติเมตร (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 - T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	46

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.7 คุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช เมื่อเริ่มต้นการทดลองในวิธีการต่างๆ จากการทดลองที่ 3 (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	54
4.8 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 3 โดย T2 มีคุณภาพดีที่สุด คือ มีพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 0.02 ตารางเซนติเมตร (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	55
4.9 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 3 โดย T2 มีคุณภาพดีที่สุด คือมีพื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 3.92 ตารางเซนติเมตรและมีอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 3.88 วัน (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	56
5.1 อายุการปักแจกัน(ก) ปริมาณการดูดน้ำ 5 วัน(ข) เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง(ค) และความเข้มข้นของเอทิลีนเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน และ 5 วัน(ง) ของดอกบัวหลวง (<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1 (control = ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 –T7 = จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ).....	59
5.2 ความเข้มข้นของเอทิลีนหลังนำออกจากกล่อง และเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน(ก) และอายุการปักแจกัน(ข) ของดอกบัวหลวง (<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช (ไม่พับกลีบ) หลังนำออกจากกล่องและเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 2 (control = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 –T5 = มีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติกในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	61

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ว่าครณาใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
5.3 ความเข้มข้นของเอทิลีนหลังนำออกจากกล่อง และเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน(ก) และอายุการปักแจกัน(ข) ของดอกบัวหลวง (<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช (พับกลีบ) จากการทดลองที่ 2 (control = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 -T5 = มีน้ำแข็งเกล็ด บรรจุถุงพลาสติกในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ).....	62
5.4 อุณหภูมิภายในกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง (ก) อุณหภูมิในกล่องกระดาษลูกฟูกที่ 7 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง (ข) และอุณหภูมิในกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง (ค) ของการทดลองที่ 2 และ การทดลองที่ 3.....	63

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บัวหลวงเป็นพรรณไม้ตัดดอกที่มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนามาช้านาน เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป นิยมนำมาบูชาพระรัตนตรัย ใช้ในการตกแต่งสถานที่ จัดแจกัน มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนและอบอุ่น พบได้ตามแหล่งน้ำทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกบัวประมาณ 5,000 ไร่ (อรรพรรณ วิชัยลักษณ์ และ ภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ. ม.ป.ป.) กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น พิจิตร พะเยา นครสวรรค์ พิษณุโลก พัทลุง เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรและผู้สนใจจำนวนมากปลูกบัวเพื่อเป็นอาชีพ เนื่องจากบัวนั้นมีความหลากหลายในการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกเพื่อตัดดอก เก็บไหล เก็บฝัก เก็บเมล็ดจำหน่าย เป็นต้น และตลาดในประเทศที่จำหน่ายดอกบัวที่สำคัญคือ ตลาดปากคลอง ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทย ส่วนตลาดในต่างประเทศที่สำคัญก็คือ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อเมริกา เป็นต้น

ปัจจุบันแนวโน้มการส่งออกดอกบัวตัดดอกในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสิงคโปร์ และฮ่องกงมีความต้องการดอกบัวหลวงมาก แต่ดอกบัวที่ส่งออกมีปัญหาเรื่องคุณภาพของดอก ได้แก่ กลีบดอกเป็นจุดดำ กลีบดอกเป็นจุดดำได้ง่าย เป็นผลทำให้ลดคุณค่าตั้งแต่การซื้อการขาย สาเหตุอาจมาจากดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีน้ำยาง เมื่อเกิดบาดแผลหรือรอยขีดที่กลีบดอก ทำให้น้ำยางซึมออกมา น้ำยางทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (oxidation) ทำให้กลายเป็นจุดสีน้ำตาลและสีดำบนกลีบดอก อุณหภูมิสูงและการสูญเสียน้ำทำให้เกิดสีดำขึ้นกับเนื้อเยื่อพืชด้วย (Suisuwan and Pichayanon. 2002)

นอกจากนี้ดอกบัวหลวงยังมีอายุการใช้ประโยชน์สั้น เนื่องจากจากสีกลีบดอกชั้นนอกจางเร็วหรือปลายกลีบดอกกลายเป็นสีน้ำตาล และต่อมากลีบดอกจะร่วง สาเหตุอาจมาจากดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ก้านดอกมีน้ำยางมาก รอยตัดที่ปลายก้านทำให้น้ำยางไหลออกมาอุดตันท่อน้ำ มีผลทำให้ดอกไม้ขาดน้ำ เมื่อดอกไม้ขาดน้ำมีผลทำให้ดอกไม้ผลิตเอทิลีน (ethylene) ออกมา เอทิลีนนี้มีผลทำให้กลีบดอกสีซีดจางลง (fading) สำหรับการเปลี่ยนสีของปลายกลีบดอกเป็นสีน้ำตาล อาจมาจากการขาดอาหารที่ใช้สำหรับกระบวนการหายใจ เช่น คาร์โบไฮเดรต ทำให้ต้องใช้โปรตีนเป็นอาหารสำหรับการหายใจ จึงทำให้เกิดการสะสมแอมโมเนียขึ้น สภาพภายในเซลล์ของดอกจึง

เอกสารนี้เป็นต่าง การ ความเป็นต่างนี้ทำให้แอนโรไซยานินซึ่งเป็นสีแดงของดอกไม้กลายเป็นสีน้ำตาลเงินเกิดการ รก้า
ไม่ว่ากรณีสูญเสียคุณภาพ (ช. ณีฐศิริ สุธสุวรรณ. 2545) อย่างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้นดอกบัวที่จะขนส่งระยะทางไกลหรือส่งออก จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยการหาวิธีการที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ดอกบัวในกล่องสำหรับการส่งออก วิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น เช่น การจุ่มปลายก้านดอกไม้ที่มีน้ำยางในน้ำร้อนก่อนการปักแจกัน (ช.ณัฐศิริ สุธยสุวรรณ. 2545) เพื่อจะลดน้ำยางที่มาอุดตันท่อน้ำ การหุ้มดอกด้วยโฟมตาข่ายเพื่อป้องกันการช้ำ การหุ้มปลายก้านดอกด้วยสำลีที่อิมมิดด้วยน้ำ เพื่อป้องกันการขาดน้ำระหว่างการขนส่ง การให้ความเย็นกับผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งระยะไกลด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ลดอัตราการหายใจ และลดอัตราการผลิตเอทิลีน(ชุมพล มากทอง. 2547) ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้นำวิธีการดังกล่าวมาทดลองใช้ เพื่อจะได้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับรักษาคุณภาพของดอกบัวสำหรับส่งออก

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 ทดลองหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสม สำหรับช่วยกำจัดน้ำยางที่รอยตัดปลายก้านดอกบัวเพื่อให้ดอกบัวดูดีน้ำและสารละลายส่งเสริมคุณภาพได้ดีที่สุด

1.2.2 ทดลองหาปริมาณน้ำแข็งเกล็ดที่เหมาะสมสำหรับให้ความเย็นกับดอกบัวที่ไม่พลิกกลับในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อลดการผลิตเอทิลีนของดอกบัว และรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง

1.2.3 ทดลองหาปริมาณน้ำแข็งเกล็ดที่เหมาะสมสำหรับให้ความเย็นกับดอกบัวที่พลิกกลับในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อลดการผลิตเอทิลีนของดอกบัว และรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา

1.3.1 ดอกบัวที่นำมาปักแจกันสูญเสียคุณภาพเร็ว เนื่องจากมีน้ำยางซึมออกมาบริเวณรอยตัดปลายก้านดอกมาอุดตันท่อน้ำ ทำให้ขัดขวางการดูดีน้ำและสารละลายส่งเสริมคุณภาพของก้านดอกบัว ซึ่งการจุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อน น่าจะช่วยละลายน้ำยางที่รอยตัดปลายก้านดอกออก ทำให้ก้านดอกดูดีน้ำและสารละลายได้ดีขึ้น

1.3.2 ดอกบัวหลังเก็บเกี่ยวมีการผลิตเอทิลีนปริมาณสูง ยิ่งบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษลูกฟูกทำให้มีการผลิตเอทิลีนในปริมาณที่สูงเป็นผลเสียกับดอกบัว ดังนั้นการให้ความเย็นกับ

ดอกบัวด้วยน้ำแข็งเกล็ด น่าจะช่วยให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีนลง ส่งผลให้คุณภาพหลังการขนส่งดีขึ้น

1.4 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

1.4.1 ทดลองหาวิธีการลดน้ำยาที่มาจากต้นบริเวณรอยตัดปลายก้านดอก ด้วยการหาอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมมาละลายน้ำยาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ก้านดอกดูดน้ำและสารละลายได้ดีขึ้น

1.4.2 ทดลองหาวิธีการลดการผลิตเอทิลีนของดอกบัวในระหว่างการขนส่ง ด้วยการใช้น้ำแข็งเกล็ดให้ความเย็นกับดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีนลง ส่งผลให้คุณภาพดอกบัวหลังการขนส่งดีขึ้น

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช โดยศึกษาหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับช่วยกำจัดน้ำยาที่รอยตัดปลายก้านดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวดูดน้ำในระหว่างการขนส่งได้ดีที่สุดและดูดสารละลายส่งเสริมคุณภาพในระหว่างการปักแจกันได้ดีที่สุด นอกจากนี้ ทดลองบรรจุน้ำแข็งเกล็ดในกล่องบรรจุหีบห่อเพื่อให้ความเย็นกับดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวผลิตเอทิลีนลดลง ส่งผลให้อายุการปักแจกันดีขึ้น

1.6 ขั้นตอนของการศึกษา

ขั้นตอนที่ทำการศึกษามี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.6.1 หาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสม สำหรับช่วยกำจัดน้ำยาที่รอยตัดปลายก้านดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวดูดน้ำและสารละลายส่งเสริมคุณภาพได้ดีที่สุด

1.6.2 ทดลองหาปริมาณน้ำแข็งเกล็ดที่ให้อุณหภูมิต่ำที่เหมาะสมกับดอกบัวที่ไม่พักหลับ ในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อลดการผลิตเอทิลีนและรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง

1.6.3 ทดลองหาปริมาณน้ำแข็งเกล็ดที่ให้อุณหภูมิต่ำที่เหมาะสมกับดอกบัวที่พักหลับ ในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อลดการผลิตเอทิลีนและรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บัวหลวงเป็นพรรณไม้ที่ผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จะถือว่าดอกบัวเป็นของสูง ที่พุทธศาสนิกชนใช้บูชาพระ ตลอดจนพิธีการต่างๆ ทางศาสนาในปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจจำนวนมากปลูกบัวเพื่อเป็นอาชีพมากขึ้น เนื่องจากบัวมีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกเพื่อตัดดอก เก็บไหล เก็บเมล็ด เก็บฝักจำหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละท้องถิ่น

ปัจจุบันบัวหลวงเป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับนำมาใช้ในงานพิธีการประดับตกแต่งตามอาคารสถานที่ต่างๆ ตลอดจนส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมากขึ้น แต่บัวที่ส่งออกมักมีปัญหาในเรื่องการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้อายุการให้ประโยชน์สั้นลง

2.1 การจำแนกชนิดพันธุ์ของดอกบัวหลวง

บัวหลวง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด (species) คือ

2.1.1 *Nelumbo lutea* หรือชื่อสามัญเรียกว่า American Lotus มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ลักษณะคล้ายดอกทิวลิป

2.1.2 *Nelumbo nucifera* มีหลายพันธุ์ (variety) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย (เสริมลาก วสุวัต. 2537)

Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นชนิดเดียวที่มีในประเทศไทยเรียกว่า บัวหลวง หรือปทุมชาติ แต่มีหลายพันธุ์และหลายชื่อ (ปริมลาก วสุวัต และเสริมลาก วสุวัต. 2547) ตามลักษณะรูปร่างและสีของดอกดังนี้

พันธุ์ที่ 1 บัวหลวง 'ฉัตรขาว' ดอกตูมทรงดอกซ้อนข้างป้อม ตรงกลางกว้าง โคนและปลายเรียว โคนสีเขียวอ่อนปลายสีขาว ทรงกลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว สีขาวนวล มีชื่อไทยว่า ฉัตรขาว ป้อมขาว สัตตบุษย์

พันธุ์ที่ 2 บัวหลวง 'แหลมขาว' ดอกตูมทรงดอกโคนกว้าง ปลายเรียว สีเขียวอ่อน ทรงกลีบดอกโคนและปลายเรียว ตรงกลางกว้าง สีขาว มีชื่อไทยว่า แหลมขาว บุนทริก บุนทริก

พันธุ์ที่ 3 บัวหลวง 'ฉัตรแดง' ดอกตูมทรงดอกซ้อนป้อม โคนสีเขียวอ่อน ปลายสีเหลืองปนชมพู ทรงกลีบเรียวยาว สีชมพูแก่ เกสรตัวผู้มีสีและรูปร่างคล้ายกลีบในมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า มีชื่อไทยว่า ฉัตรแดง ป้อมแดง สัตตบงกช

พันธุ์ที่ 4 บัวหลวง 'แหลมแดง' ดอกตูมทรงดอกปลายกว้างโคนเรียว สีเขียวอ่อน ทรงกลีบดอกโคนและปลายเรียว ตรงกลางกว้าง สีชมพู มีชื่อไทยว่า แหลมแดง ปทุม

พันธุ์ที่ 5 บัวหลวง 'บัวหลวงพระราชินี' ดอกตูมทรงดอกกว้างปลายเรียว ช่วงแรกดอกสีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่จะก่อนดอกจะเริ่มบาน สีกลีบด้านนอกจะเริ่มอ่อนลงเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาว ปลายกลีบสีชมพูจะเด่นขึ้น ทรงกลีบดอกโคนและปลายเรียว ตรงกลางกว้าง สีกลีบดอก โคนกลีบสีขาวเหลือบสีเขียวอ่อน ปลายกลีบสีชมพูเข้ม มีชื่อไทยว่า บัวหลวงพระราชินี

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช

บัวหลวงพันธุ์สัตตบงกชมีชื่อสามัญที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า lotus จัดอยู่ในสกุล *Nelumbo* ในวงศ์ *Nelumbonaceae* (สุปราณี วนิชานนท์. 2540) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Nelumbo Nucifera* Gaertn. (ปริมลาง วสุวัต และเสริมลาง วสุวัต. 2547) และมีชื่อสามัญภาษาละตินว่า *Roseum Plenum* เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีน้ำยางขาวเหมือนน้ำมัน (กลิน สุวตะพันธ์. 2500) จัดเป็นพรรณไม้น้ำเนื้ออ่อน อยู่ในเขตแถบร้อนและเขตอบอุ่น

ดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ มีกลีบดอกสีชมพู ขณะตูมมีรูปร่างแบบรูปไข่ทรงป้อม(ภาพที่ 2.1)




ภาพที่ 2.1 ดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช

ดอกเป็นดอกเดี่ยวเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก 9.00 - 12.00 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ก้านดอกมีลักษณะสีเหมือนก้านใบ มีหนามเล็กๆ ก้านดอกยาวประมาณ 85.50-177.50 เซนติเมตร มีลำต้นชนิดเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน ต้องการแสงแดดอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ดอกค่อนข้างดก บานประมาณ 4 วัน เริ่มโรยช่วงบ่ายหรือค่ำของวันที่สีไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนแต่มีศัตรูชนิดต่างๆ ทำลาย เช่น บึ้ง ไโรแดง เพลี้ย และหนอน เจาะตุตัน้ำเลี้ยง หรือกัดกินใบทำให้เข้าใจว่ามีการพักตัวในฤดูหนาว ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อน

หรือไหล เจริญได้ดีในแหล่งน้ำที่มีความลึก 75 - 100 เซนติเมตร สภาพของน้ำนิ่งแต่มีการไหลถ่ายเทได้ น้ำมี pH 7.5 งดองามดีเมื่อไม่มีวัชพืชน้ำปะปน

นอกจากนี้จารีย์ หอยทอง (2519) ยังได้รายงานการศึกษาส่วนของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกชที่สำคัญไว้ดังนี้คือ ดอกบัวมีกลีบเลี้ยง 4-7 กลีบ รูปรี ขนาดเล็กเรียงตัวเป็นชั้น 2-3 ชั้น สลับหว่างกัน กลีบเลี้ยงนี้เห็นเส้นบนกลีบจำนวนมากแต่ไม่นูนเด่นชัด เหี่ยวและร่วงง่าย กลีบดอกมีประมาณ 12-16 กลีบ เรียงตัวเป็นชั้นรอบฐานรองดอก แต่ละชั้นมีขนาดของกลีบไม่เท่ากัน กลีบดอกชั้นนอกและชั้นในจะมีขนาดเล็กกว่าชั้นกลาง เกสรตัวผู้ชั้นนอกๆ เป็นหมัน โดยมีก้านชูเกสรตัวผู้ที่แบนบางและสีคล้ายกลีบในแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีอับเรณูแต่ตอนปลายมีส่วนยื่นออกมาซึ่งมีฐานเรียวเล็กปลายพองใหญ่สีขาวนวลเกสรตัวผู้ชั้นนอกนี้ เรียกว่า petaloid staminode เกสรตัวผู้ชั้นในไม่เป็นหมัน เกสรตัวเมียมีรังไข่และ carpel 16-18 อัน ก้านชูเกสรสั้น ยอดเกสรตัวเมียเป็นแผ่นกลมสีเหลืองเป็นมันแข็ง ภายในรังไข่มีไข่สีขาวนวล 1 อัน (ภาพที่ 2.2)



ภาพที่ 2.2 ส่วนต่างๆ ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช

2.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของดอกไม้ตัดดอก

การเสื่อมคุณภาพของไม้ตัดดอกขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การที่ไม้ตัดดอกจะมีคุณภาพที่ดี และมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ยาวนานนั้น ต้องมีการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องกับชนิดของดอกไม้อีกด้วย (นิธิยา รัตนานนท์ และคณะ บุนนยะเกียรติ. 2537) สาเหตุการสูญเสียคุณภาพดอกไม้ มีหลายสาเหตุเช่น

1. การหายใจ การหายใจเป็นกระบวนการสลายอินทรีย์วัตถุที่สะสมของพืชในรูปคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยก๊าซออกซิเจนเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และพลังงาน จัดว่าเป็นกระบวนการทำลายอาหารสะสมไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืช (จิรา ณหนองคาย. 2531) เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาจากต้นแล้วอาหารสะสมจะมีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ และถ้าอาหารถูกใช้หมดไปความมีชีวิตก็จะจบสิ้นลง (จริงแท้ ศิริพานิช. 2544) ดังนั้น อัตราการหายใจของดอกไม้สามารถใช้เป็นตัวแสดงอายุการใช้งานของดอกไม้ ดอกไม้ที่มีอัตราการหายใจสูง อายุการใช้งานของดอกไม้ก็จะสั้นกว่าดอกไม้ที่มีอัตราการหายใจต่ำ (สายชล เกตุษา. 2531) การหายใจของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว จึงมีผลต่อคุณภาพของดอกไม้มากเพราะทำให้ดอกไม้เสื่อมคุณภาพเร็ว เช่น การเปลี่ยนสีของกลีบดอกในทางเสื่อมลง การเหี่ยวของดอกไม้ เป็นต้น (ช.ณิฏฐศิริ สุษสุวรรณ. 2545)

2. ภาวะสมดุลของน้ำ ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในก้านดอกภายหลังการตัดออกจากต้น จะใช้ไปเพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้และบางส่วนของน้ำจะระเหยออกทางรูใบ ทำให้ปริมาณน้ำลดน้อยลง ถ้าอากาศแห้งหรือร้อนจัด หรือมีลมพัดแรงจะยิ่งทำให้น้ำระเหยออกไปได้เร็วขึ้น ดอกไม้ที่ไม่ได้รับน้ำทดแทนจากภายนอกจะเหี่ยว และมีอายุการใช้งานสั้นลง จึงจำเป็นต้องควบคุมอัตราการคายน้ำของดอกไม้ให้สูญเสียให้น้อยที่สุด (นิธิยา รัตนานนท์ และดนัย บุญเกียรติ. 2537)

เช่น การนำโคนก้านดอกไม้แช่น้ำเพื่อจะได้ดูดน้ำเข้าไปทดแทนน้ำที่สูญเสียไปเนื่องจากการคายน้ำ

3. การสูญเสียน้ำของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิ และปัจจัยภายในดอกไม้เอง (นิธิยา รัตนานนท์ และดนัย บุญเกียรติ. 2537) เพื่อลดการสูญเสียน้ำของดอกไม้ จึงมีการสร้างบรรยากาศรอบๆ ดอกไม้ให้มีความชื้นสูง หรือการลดอุณหภูมิของดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว (ช.ณิฏฐศิริ สุษสุวรรณ. 2545)

4. เอทิลีน เป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่มีสถานะเป็นก๊าซ มีสูตรโมเลกุลเป็น C_2H_4 มีน้ำหนักโมเลกุล 28 เอทิลีนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของพืช (Mattoo and Suttle, 1991; Bartz and Brecht, 2003) เอทิลีนมีการเพิ่มขึ้นในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการหายใจของผลไม้ การงอกของเมล็ด การชราภาพและการหลุดร่วงของใบและดอก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์เอทิลีนหรือการทำงานของเอทิลีนนั้นได้แก่ ออกซิเจน อุณหภูมิ อายุและสภาพของพืช (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548) ซึ่งดอกไม้จะมีการสังเคราะห์เอทิลีนสูงขึ้นมากในระหว่างการชราภาพ และดอกไม้แต่ละชนิดจะตอบสนองต่อเอทิลีนในระดับความไวที่ต่างกัน ดอกไม้ที่มีอายุเข้าสู่ระยะร่วงโรยจะมีความไวต่อการตอบสนองเอทิลีนเพิ่มมากขึ้น และจะสร้างเอทิลีนมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูง (นิธิยา รัตนานนท์ และดนัย บุญเกียรติ. 2548) แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะยับยั้งการสร้างเอทิลีน และถ้าอุณหภูมิต่ำการสร้างเอทิลีนก็จะน้อยลง ซึ่งอุณหภูมิไม่เพียงแต่มีผลต่อการสร้างเอทิลีนเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการ

2.4 ลักษณะการสูญเสียของไม้ตัดดอก

สำหรับดอกบัวนั้นมีลักษณะการสูญเสียคุณภาพที่ทำให้การใช้ประโยชน์ได้น้อยวัน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. กลีบดอกเป็นจุดดำ มีผลทำให้ลดคุณค่าตั้งแต่การซื้อการขาย สาเหตุเนื่องจากดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มียาง โดยเฉพาะเห็นชัดที่ก้านดอกบริเวณรอยตัด เมื่อส่วนที่มีน้ำยางเกิดรอยขีดหรือบาดแผล น้ำยางไหลออกมาถูกกับอากาศจะมีสีคล้ำและเหนียวติดกันเป็นสายเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ขบวนการส่งเสริมการเปลี่ยนสีนี้คือ การเกิดบาดแผล ความร้อน ความมืด และการขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้การขีดของดอกยังเป็นต้นเหตุให้เกิดการผลิตเอทิลินเร่งให้ดอกเหี่ยวเร็วยิ่งขึ้น (ช.ณิฏฐ์ศิริ สุษสุวรรณ. 2545)

2. การเปลี่ยนสีของดอก ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในขณะที่ยังเป็นดอกตูม ดังนั้นความสดใสของสีกลีบดอกชั้นนอกจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะที่ดอกบัวมีลักษณะตามธรรมชาติหลังการเก็บเกี่ยวแล้วสีกลีบดอกชั้นนอกจะจางเร็วมากโดยเฉพาะสีเขียว ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้น ถ้าต้องการให้ปักแจกันได้ต่อไป จำเป็นต้องเด็ดกลีบดอกที่เสื่อมคุณภาพนั้นออกไปเรื่อยๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกเป็นปัญหาในระหว่างการใช้ประโยชน์และการเก็บรักษา ดอกไม้ที่มีสีแดงและสีม่วงหรือสีน้ำเงิน จะมีปัญหามากที่สุดเพราะสีแดงและสีม่วงหรือสีน้ำเงินนี้เกิดขึ้นจากรงควัตถุพวกแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเปลี่ยนแปลงสีได้ตาม pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) ภายในเซลล์ของกลีบดอก (Wrolstad, 2000) ถ้า pH ต่ำกว่า 3.00 แอนโทไซยานินจะเป็นสีแดง ถ้า pH สูงกว่า 7.0 แอนโทไซยานินจะเป็นสีน้ำเงินหรือม่วง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง pH นี้ บางรายกล่าวว่าเนื่องจากการขาดน้ำทำให้การสังเคราะห์โปรตีนผิดไป เกิดการสะสมแอมโมเนียสภาพภายในเซลล์เกิดเป็นด่าง บางรายกล่าวว่า เมื่อคาร์โบไฮเดรตในกลีบดอกหมดไปจำเป็นต้องใช้โปรตีนเป็นอาหารสำหรับการหายใจ จึงทำให้เกิดการสะสมแอมโมเนีย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแอมโมเนียเป็นสาเหตุให้ pH ภายในเซลล์เพิ่มขึ้น ทำให้รงควัตถุเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน (ช.ณิฏฐ์ศิริ สุษสุวรรณ. 2545)

3. การเหี่ยวของกลีบดอก โดยเฉพาะกลีบดอกชั้นนอกของดอกบัว สังเกตเห็นได้พร้อมๆ กับการจางของสีดอก การเหี่ยวของดอกบัวมีหลายสาเหตุ เช่น

3.1 ก้านดอกดูน้ำได้น้อย ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มียาง ดังนั้นก้านดอกเมื่อโดนหักออกจากต้นทำให้น้ำยางไหลออกมาอุดตันท่อน้ำของก้านดอกบัวได้ อีกทั้งการตัดโคนก้านดอกทำให้เกิดรอยแผล อาหารจากท่ออาหารไหลออกมาได้ง่าย และกลายเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ ยิ่งถ้าโคนก้านดอกขาดจากการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง จะทำให้ก้านดอกเน่าได้ (ช.ณิฏฐ์ศิริ สุษสุวรรณ. 2545)


3.2 การขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากผู้ปลูกดอกบัวไม่มีการให้น้ำดอกบัวเลย หลังจากหักก้านดอกออกจากต้น ดังนั้นกว่าจะถึงผู้ขายปลีก ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง อาจเกิด

ฟองอากาศขึ้นภายในท่อน้ำ แม้จะมีการตัดก้านดอกออกไปบ้างก่อนแช่ก้านดอกบัวในน้ำ แต่ฟองอากาศนั้นอาจมีระยะทางมากจนตัดทิ้งไม่หมด จึงทำให้โมเลกุลของน้ำในภาชนะที่แช่ก้านดอกและโมเลกุลของน้ำในท่อน้ำของก้านดอกไม่สามารถดึงดูดถึงกันได้ น้ำที่ไหลไปจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ ดอกไม้จึงขาดน้ำ นอกจากเซลล์จะเหี่ยวเนื่องจากขาดน้ำแล้ว การขาดน้ำเป็นสาเหตุให้พืชผลิตเอธิลีนเพิ่มขึ้นด้วย (ช.ณิฏฐศิริ สุขสุวรรณ และคณินิจ พิชญานนท์. 2544)

4. การร่วงของกลีบดอก กลีบดอกของดอกบัวหลุดร่วงได้ง่ายมาก โดยเฉพาะกลีบชั้นนอก ซึ่งการร่วงอาจมีสาเหตุจากการขาดน้ำ ซึ่งชักนำให้เกิดการผลิตเอธิลีน และเอธิลีนมีผลทำให้กลีบดอกร่วง แต่ยังไม่มียางงานยืนยันเรื่องการร่วงของส่วนของพืชไว้ชัดเจน (ช.ณิฏฐศิริ สุขสุวรรณ. 2545)

2.5 แอนโทไซยานิน (Anthocyanin)

แอนโทไซยานิน หมายถึง สารสีที่ให้สีน้ำเงินของดอกไม้ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก anthos แปลว่า ดอกไม้ และ kyanos แปลว่า สีน้ำเงิน พบได้ในส่วนต่างๆ ของพืชทั้งดอก ใบ ผล และราก ส่วนใหญ่แอนโทไซยานินอยู่ในพืชร่วมกับสารอื่นๆ(จริงแท้ ศิริพานิช. 2549) แอนโทไซยานินเป็นสารสีที่มีบทบาทอย่างมากในพืช ซึ่งให้สีชมพู, แดงสด, แดง, ม่วงคราม, ม่วง และสีน้ำเงิน(Fosket. 1944; Harborne. 1973) เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) มีโครงสร้างหลักประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน 2 วง เชื่อมต่อกันด้วยคาร์บอน(carbon) 3 อะตอม(Lea and Leegood. 1993) เรียกว่า flavan ดังภาพที่ 2.4 (Gross. 1987)




ภาพที่ 2.4 โครงสร้างหลักของสารประกอบพวกฟลาโวนอยด์

ที่มา : Gross. 1987

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น **ฟลาโวนอยด์เป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีอยู่ภายในแวคิวโอล(vacuole) ของเซลล์พืช (Buchanan et.al. 2000) ปรากฏในพืชในลักษณะของไกลโคไซด์(glycoside) คือน้ำตาลมาเกาะ**

อยู่ด้วยที่กลุ่ม hydroxyl กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่า ฟลาโวนอยด์ที่ไม่มีน้ำตาลมาเกาะอยู่บนโมเลกุล เรียกว่า aglycone ส่วนแอนโทไซยานินที่ไม่มีน้ำตาลมาเกาะเรียกว่า แอนโทไซยานิดิน (anthocyanidin) โดยปกติแอนโทไซยานิดินจะไม่พบเป็นอิสระในเนื้อเยื่อของพืช และแอนโทไซยานิดินแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามจำนวนหมู่ไฮดรอกซี (hydroxyl group) และจำนวนเมทอกซี (methyl group) ดังนั้นการแบ่งชนิดของแอนโทไซยานิดิน จึงพิจารณาจากตำแหน่ง และจำนวนของหมู่ไฮดรอกซี และหมู่เมทอกซีในโมเลกุล ซึ่งจากการศึกษาแล้วในปัจจุบันพบว่ามียอยู่ 18 ชนิด แต่ที่มักพบเป็น aglycone ของแอนโทไซยานินจะมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ pelargonidin cyanidin delphinidin peonidin delphinidin petunidin และ malvidin ดังรูปที่ 2.5 (Gross. 1987)



ภาพที่ 2.5 โครงสร้างแอนโทไซยานิดินที่พบบ่อยในธรรมชาติ

ที่มา : Gross. 1987

แอนโทไซยานินมักมีโมเลกุลของน้ำตาลเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 3 น้ำตาลที่จับกับแอนโทไซยานิดิน อาจเป็น monosaccharide ได้แก่ glucose rhamnose galactose xylose ดังนั้นจึงเรียกแอนโทไซยานิดินเหล่านี้ว่าโมโนเมอร์ แอนโทไซยานิน (Herbertson and Adams. 2004)

สำหรับการดูดกลืนแสงในช่วงที่มองเห็นได้ของ pelargonidin, cyanidin และ delphinidin (ใน 0.01% HCL ของ methanol) ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 520, 535 และ 546 นาโนเมตร โดย pelargonidin จะแสดงค่าสีส้ม, สีชมพู และสีแดงสด cyanidin จะแสดงค่าสีแดงเลือด

นาก, สีม่วงแดง และสีแดงเข้ม และ delphindin จะแสดงค่าสีน้ำเงิน, สีม่วงอมน้ำเงิน และสีน้ำเงิน (Gross. 1987: Buchanan *et.al.* 2000:) แอนโทไซยานินในเซลล์พืชไม่ค่อยเสถียรจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ แสง ออกซิเจน ความร้อน สภาพความเป็นกรดต่าง เอนไซม์ เปอร์ออกไซด์ ไรตอกซิน ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไอออนของโลหะ โมเลกุลของน้ำตาล เช่นในสภาพที่เป็นกรดนั้น แอนโทไซยานินจะมีสีค่อนข้างแดง แต่เมื่อความเป็นกรदन้อยลงจนถึงระดับที่เป็นกลางจะมีสีน้ำเงิน (จิรา ณ หนองคาย. 2531) ซึ่งในการเก็บรักษาหรือการใช้ประโยชน์ดอกไม้ที่มีสีแดงและสีม่วงหรือสีน้ำเงินจะมีปัญหามากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอก ซึ่งสีของดอกนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตาม pH ภายในเซลล์ของกลีบดอก ถ้า pH ต่ำกว่า 3.0 แอนโทไซยานินจะเป็นสีแดง ถ้า pH สูงกว่า 7.0 แอนโทไซยานินจะเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงิน เช่น ดอกกุหลาบสีแดง เมื่อเริ่มโรยกลีบดอกจะเป็นสีน้ำเงินหรือม่วง

2.6 วิธีการบรรจุดอกไม้และการทำความเย็นภายในหีบห่อ

ในปัจจุบันกล่องบรรจุดอกไม้เป็นกระดาษแข็งทั้งหมด มีลักษณะเป็นกล่องที่มีฝาสวมเข้าด้วยกันและแยกออกจากกันได้เพราะมีความแข็งแรงและทนทานต่อการขนส่งได้ดี ขนาดของกล่องมีความสัมพันธ์กับความยาวก้านดอกของดอกไม้ละชนิด ดังนั้นกล่องจึงมักจะมีขนาดมาตรฐานสำหรับดอกไม้แต่ละชนิด และภายในกล่องควรรองพื้นด้วยพลาสติกใส (จิรา ณ หนองคาย. 2531)

2.6.1 วิธีการบรรจุดอกไม้ในหีบห่อ มีหลายวิธี (ช.ณิฏฐ์ศิริ สุษยสุวรรณ. 2545) เช่น

2.6.1.1 การบรรจุแบบเปียก ดอกไม้เมืองร้อนมีโอกาสที่จะเสียหายได้จากความเย็นได้ ดังนั้นการขนส่งควรบรรจุแบบเปียกคือ การหุ้มรอยตัดที่ปลายก้านดอกด้วยสำลีชุบน้ำแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติกมัดด้วยเชือกหรือยางรัด จากนั้นบรรจุดอกไม้ในแนวตั้ง

2.6.1.2 วิธีการบรรจุดอกไม้เพื่อป้องกันอันตรายให้กับดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ที่บอบบางทั้งดอกตูมและดอกเดี่ยว ควรหุ้มด้วยกระดาษที่อ่อนนุ่มหรือตาข่ายพลาสติก

2.6.1.3 วิธีการบรรจุดอกไม้ที่ยอดโค้งได้ง่าย ต้องออกแบบกล่องให้สามารถบรรจุดอกไม้ในแนวตั้ง

2.6.1.4 วิธีการบรรจุดอกไม้เนื้ออ่อน ควรบรรจุในกล่องเคลือบไซหรือกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีถาดเคลือบไซหรือใช้ polyethylene foil

2.6.1.5 วิธีการบรรจุพวกกิ่งปักชำ ควรปักไว้ใน humid sphagnum moss, peatmoss เพื่อป้องกันรากแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6.2 การทำความเย็นภายในห้อง (pre-cooling)

การทำความเย็นภายในห้อง โดยการลดอุณหภูมิของบรรยากาศภายในห้อง เพื่อให้ดอกไม้เหล่านั้นมีคุณภาพดี ช่วยให้ดอกไม้สามารถลดอัตราการหายใจ ลดการคายน้ำ และลดการผลิตเอทิลีนลง นิยมทำได้หลายวิธี เช่น

2.6.2.1 การใช้น้ำแข็งแห้งหรือขวดพลาสติกบรรจุของเหลว (สารเคมีที่มีจุดเยือกแข็งสูง) แช่ให้เป็นน้ำแข็งแล้วบรรจุลงในกล่องดอกไม้ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิภายในกล่องไม่ให้สูงเกินไป ทำให้ดอกไม้เสื่อมคุณภาพช้าลง (จิรา ณ หนองคาย, 2531)

2.6.2.2 การใช้กระแสลมเย็น (forced air cooling) ลดอุณหภูมิ ในต่างประเทศ หลังจากการบรรจุดอกไม้ลงในกล่องเรียบร้อยแล้ว จะมีวิธีการทำให้ดอกไม้ภายในกล่องเย็นลง ซึ่งในอดีตเคยนำกล่องดอกไม้เหล่านั้นเข้าเก็บไว้ในห้องเย็น (cold store) ก่อนทำการขนส่ง ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน 12 - 24 ชั่วโมง ดอกไม้ภายในกล่องจึงจะเย็นได้ที่ คือ อุณหภูมิลดลงตามที่กำหนดสำหรับดอกไม้แต่ละชนิด ทำให้เสียเวลาและยุ่งยากมาก แต่ในปัจจุบัน ได้พัฒนาวิธีการขึ้นมาใหม่ โดยการอัดไอเย็นที่มีความดันสูงเข้าไปในกล่อง วิธีการนี้เรียกว่า การใช้กระแสลมเย็น (forced air cooling) ลดอุณหภูมิ ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดต้องการความเย็นแตกต่างกัน จึงต้องติดตั้งเครื่องปิดเปิดอัตโนมัติ สำหรับควบคุมเวลาอัดไอเย็นสำหรับดอกไม้แต่ละชนิดไว้ สวิตช์จะปิดทันทีที่อุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดไว้ ซึ่งเครื่องอัดไยเย็นดังกล่าวราคาค่อนข้างแพงแต่คุ้มค่า จึงเป็นที่นิยมในต่างประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน (สมเพียร เกษมทรัพย์, 2532)

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการสูญเสียคุณภาพของดอกบัวในลักษณะต่างๆ ได้มีรายงานการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมคุณภาพเร็วของดอกบัวหลวงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อพัฒนาวิธีการและการรักษาคุณภาพของดอกบัวภายหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ดังนี้

ผกานันท์ กัลดภาณี และสุธารัตน์ ประภารัตน์ (2539) ทดลองใช้เทคนิคพิเศษลดน้ำยางที่ก้านดอกบัวหลวงพันธุ์บุณฑริก ได้แก่ ให้ก้านดอกจุ่มในแอลกอฮอล์นาน 30 วินาที ผ่านเปลวไฟนาน 30 วินาที จุ่มในน้ำร้อนนาน 30 วินาที และอังไอน้ำร้อนนาน 30 วินาที ก่อนปักแจกัน ผลปรากฏว่า การจุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนทำให้คุณภาพดีที่สุด

ช. นิภูริศิริ สุษสุวรรณ และคณินิจ พิทยานนท์ (2544) ทดลองหาวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช โดยเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวดอกบัวในระยะที่โผล่พ้นน้ำ 10 - 12 วัน ปรากฏว่า 10 วัน มีอายุการปักแจกันดีที่สุดและมี การผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 65.27 นาโนลิตรต่อกรัมต่อชั่วโมง และทำการปรับปรุงคุณภาพหลัง

การเก็บเกี่ยวโดยไม่ให้ดอกบัวขาดน้ำและไม่ให้ดอกช้ำตั้งแต่เก็บเกี่ยว มีผลทำให้มีอายุการปักแจกันดีกว่าวิธีการอื่นๆ เฉลี่ย 5 วัน และผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 46.52 นาโนลิตรต่อกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่วิธีการควบคุมมีอายุการปักแจกันเฉลี่ย 3.22 วัน และผลิตเอทิลีนมากที่สุดเฉลี่ย 106.62 นาโนลิตรต่อกรัมต่อชั่วโมง

เสกสรร วรรณกรี (2546) ได้ทดลองศึกษาหาสูตรละลายเคมีที่เหมาะสมสำหรับเป็นสารส่งเสริมคุณภาพในระหว่างการใช้ประโยชน์ของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช เพื่อให้มีอายุการปักแจกันได้นานขึ้น ผลปรากฏว่าสูตรละลายเคมีที่ให้ผลดีที่สุดในการปักแจกันคือ citric acid 150 ppm + น้ำตาลทรายขาว 2 % มีผลให้ดอกบัวมีอายุการปักแจกันเฉลี่ย 8.26 วัน

ชุมพล มากทอง (2547) ได้ทดลองหาวิธีการบรรจุดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช ในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อลดการผลิตเอทิลีน ผลปรากฏว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือ การบรรจุดอกบัวในกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องละ 30 ดอก และให้ความเย็นกับดอกบัวด้วยน้ำแข็งเกล็ดจำนวน 4 ถุงๆ ละ 300 กรัม (อัตราส่วนน้ำแข็ง : น้ำหนักดอก 1:1) มีผลทำให้หลังการขนส่งดอกบัวมีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 74.10 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 4.43 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมผลิตเอทิลีนเฉลี่ย 111.81 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันเฉลี่ย 2.87 วัน

เสกสรร วรรณกรี (2547) ได้ทำการทดลองเช่นเดียวกับชุมพล (2547) แต่ใช้ดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ผลปรากฏว่า วิธีการที่เหมาะสมในการบรรจุดอกบัวในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งระยะไกล คือการบรรจุดอกบัวในกล่องที่มีน้ำแข็งเกล็ดจำนวน 1,200 กรัม (บรรจุน้ำแข็งเกล็ดลงในถุงพลาสติก 4 ถุง ถุงละ 300 กรัม) ลงในกล่องกระดาษลูกฟูกที่รองพื้นด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกไม่เจาะรู มีผลทำให้ดอกบัวดูดน้ำเพิ่มขึ้นมากที่สุดเฉลี่ย 13.23 มิลลิตร และผลิตเอทิลีนต่ำที่สุดเฉลี่ย 84.99 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีผลทำให้อายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 6.96 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมดอกบัวดูดน้ำได้น้อยที่สุดเฉลี่ย 10.41 มิลลิตร ผลิตเอทิลีนเฉลี่ย 108.27 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.06 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 ดอกบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช(ภาพที่ 3.1)

3.1.2 อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการเก็บเกี่ยว ได้แก่ มีด น้ำกรอง ถังพลาสติก โฟม ตาข่าย และกล่องโฟม

3.1.3 อุปกรณ์สำหรับปักแจกัน(ลอยดอกบัว) ได้แก่ อ่างน้ำพลาสติก และสารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 % (เสกสรร วรรณกริ. 2546)

3.1.4 อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการบรรจุหีบห่อ ได้แก่ แผ่นกระดาษลูกฟูก กรรไกร สติกเกอร์ใส ถุงพลาสติก หนังกา ยาง เทปใส และอื่นๆ

3.1.5 อุปกรณ์สำหรับเก็บแก๊สเอทิลีน ได้แก่ หลอดพลาสติกสูญญากาศ บีกเกอร์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร สำลี อะลูมิเนียมฟอยด์ และอื่นๆ

3.1.6 อุปกรณ์สำหรับบันทึกการดูดน้ำ ได้แก่ หลอดพลาสติกบอกปริมาตร และ Rack ตัวตั้งหลอดพลาสติก

3.1.7 อุปกรณ์สำหรับการบันทึกผล ได้แก่ แผ่นเทียบสี (R.H.S. Colour Chart) เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า เครื่อง spectrophotometer (Shimadzu UV - 1601) เครื่องปั่นแยกสารละลาย (Centrifuge DSC156) และเครื่อง Rotary Evapulator (Buchi R-200/205)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับเอาไว้ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ภาพที่ 3.1 ดอกบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 สถานที่ดำเนินงาน

3.2.1 นาบัวคุณสมชาย โคละทัด เลขที่ 1/6 ม.11 แขวงและเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (ภาพที่ 3.2)

3.2.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกไม้ตัดใบ ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ



ภาพที่ 3.2 แหล่งผลิตบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ตัดตบงกชที่ใช้ในการทดลอง

3.3 ระยะเวลาที่ทำการทดลอง

ทำการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม 2548 – เดือนกรกฎาคม 2548

3.4 วิธีดำเนินงาน

ทำการทดลองกับดอกบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ตัดตบงกช โดยแบ่งเป็น 3 การทดลองดังนี้

3.4.1 การทดลองที่ 1 การทดลองหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับช่วยกำจัดน้ำยางที่รอยตัดปลายก้านดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวดูดน้ำและสารละลายส่งเสริมคุณภาพได้ดีที่สุด สำหรับระยะเวลาของการจุ่มก้านดอกในน้ำร้อน ใช้ระยะเวลา 3 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่แนะนำโดย Nowak and Rudnicki (1990) และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 7 วิธีการวิธีการละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 16 ดอก ดังนี้

เก็บเกี่ยวดอกบัวด้วยการหุ้มดอกด้วยโฟมตาข่าย ตัดด้วยมีดที่คมและสะอาด แช่ก้านดอกในภาชนะที่บรรจุน้ำ ตัดก้านให้ยาว 12 นิ้ว หุ้มด้วยสำลีที่อิมด้วยน้ำกรอง ห่อด้วยใบบัวบรรจุแนวตั้งในกล่องโฟมปิดฝา ขนส่งไปห้องปฏิบัติการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการพับกลีบดอก แล้วตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำที่มีสารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 % (เสกสรร วรรณกรี. 2546) บรรจุอยู่

วิธีการที่ 1 นำดอกบัวปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำที่มีสารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %

วิธีการที่ 2-7 เหมือนวิธีการที่ 1 แต่ก่อนลอยในอ่างน้ำจุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

3.4.2 การทดลองที่ 2 การทดลองหาวิธีการบรรจุดอกบัวตัดดอกส่งออก โดยมีการให้ความเย็นกับดอกบัวด้วยน้ำแข็งเกล็ดในกล่อง เพื่อลดเอทิลินที่ดอกบัวผลิตหลังการเก็บเกี่ยวในระหว่างการขนส่ง โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 วิธีการ วิธีการละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 16 ดอก ดังนี้

เก็บเกี่ยวดอกบัวเหมือนการทดลองที่ 1 เมื่อถึงห้องปฏิบัติการ ทำการตัดก้านดอกบัวให้เหลือยาว 1 ½ นิ้ว จุ่มปลายก้านในน้ำร้อนที่อุณหภูมิเหมาะสมจากวิธีการที่ดีที่สุดของการทดลองที่ 1 หุ้มปลายก้านด้วยสำลีที่อิมด้วยน้ำ หุ้มสำลีด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ ดังนี้

วิธีการที่ 1 บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกโดยมีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องไว้สำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอก ปิดกล่องให้สนิท

วิธีการที่ 2-5 เหมือนวิธีการที่ 1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส และมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติกในอัตราส่วนน้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ (ภาพที่ 3.3)

ทุกวิธีการเก็บรักษาไว้ 9 ชั่วโมง (เลียนแบบระยะเวลาขนส่งจากแหล่งปลูกถึงผู้ขายปลีกที่ฮ่องกง) คือ ที่ 25 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง (ระยะเวลาขนส่งจากนาบัวไปท่าอากาศยาน) ที่ 7 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง (ระยะเวลาขนส่งจากท่าอากาศยานถึงฮ่องกง) และที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง (เก็บรักษาไว้รอตลาด) จากนั้นนำดอกบัวออกมาพับกลีบปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำที่มีสารละลายเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารทสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.3 วิธีการบรรจุดอกบัวที่ไม่พับกลับในกล่องกระดาษลูกฟูก (T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

3.4.3 การทดลองที่ 3 การทดลองหาวิธีการบรรจุดอกบัวที่พับกลับเพื่อส่งออก

ใช้ประโยชน์ปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำไซโรไว้ตามห้องรับรองของสถานที่ต่างๆ โดยวางแผนการทดลองและวิธีการเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2 แต่พับกลับดอกบัวแล้วหุ้มด้วยโฟมตาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเหตุผลเบื้องหน้าและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ ข่ายก่อนบรรจุหีบห่อ(ภาพที่ 3.4)



ภาพที่ 3.4 วิธีการบรรจุดอกบัวที่ปักกลีบในกล่องกระดาษลูกฟูก (T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

3.5 การบันทึกข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสาร 3.5.1 การทดลองที่ 1 งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง 3.5.1.1 บันทึกข้อมูลเริ่มต้น ได้แก่ น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก ความ
สูงดอก เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode และเส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก

3.5.1.2 บันทึกสีของกลีบดอก และสี petaloid staminode ก่อนการปักแจกัน ด้วยการลอยน้ำ และทุกวันในขณะการปักแจกัน

3.5.1.3 บันทึกความสามารถในการดูดน้ำ และสารละลายส่งเสริมคุณภาพของดอกในขณะการปักแจกัน

3.5.1.4 บันทึกอายุการปักแจกัน เมื่อมีพื้นที่เสียหายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

3.5.1.5 บันทึกปริมาณการผลิตเอทิลีนเป็นส่วนต่อล้านส่วน (ppm) และแปลงหน่วยเป็นไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ($\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$) เมื่อเริ่มต้นการทดลอง เมื่อดอกหนึ่งดอกใดเสียหาย และเมื่อวันที่ดอกหนึ่งดอกใดหมดอายุ

3.5.1.6 บันทึกปริมาณของแอนโทไซยานินด้วย spectrophotometer โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณโมโนเมอร์แอนโทไซยานิน (monomeric anthocyanin) ทั้งหมดโดยวิธี pH - differential เมื่อเริ่มต้นการทดลอง เมื่อดอกหนึ่งดอกใดเสียหาย และเมื่อดอกหนึ่งดอกใดหมดอายุ

3.5.1.7 บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อม ในขณะที่ทำการทดลอง

3.5.2 การทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3

3.5.2.1 บันทึกข้อมูลเริ่มต้น ได้แก่ น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก ความสูงดอก เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode และเส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก

3.5.2.2 บันทึกน้ำหนักดอกบัวตั้งแต่เริ่มต้นการทดลอง และเมื่อดอกบัวหมดอายุการปักแจกัน

3.5.2.3 บันทึกสีของกลีบดอก และสี petaloid staminode หลังจากการปักกลีบและทุกวันในขณะปักแจกันด้วยการลอยดอกในอ่างน้ำ

3.5.2.4 บันทึกปริมาณการผลิตเอทิลีนเป็นส่วนต่อล้านส่วน (ppm) และแปลงหน่วยเป็นไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ($\mu\text{l.kg}^{-1}.\text{hr}^{-1}$) เมื่อเริ่มต้นการทดลอง หลังการจำลองอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่ง เมื่อดอกหนึ่งดอกใดเสียหายในระหว่างการปักแจกัน และเมื่อดอกหนึ่งดอกใดหมดอายุ

3.5.2.5 บันทึกปริมาณของแอนโทไซยานินด้วย spectrophotometer โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณโมโนเมอร์แอนโทไซยานิน (monomeric anthocyanin) ทั้งหมดโดยวิธี pH - differential เมื่อเริ่มต้นการทดลอง เมื่อดอกหนึ่งดอกใดเสียหาย และเมื่อดอกหนึ่งดอกใดหมดอายุ

3.5.2.6 บันทึกอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในกล่องบรรจุดอกไม้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในขณะที่ทำการทดลอง


3.5.4 การศึกษาข้อมูล

3.5.4.1 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด (เปอร์เซ็นต์) = $\frac{\text{น้ำหนักเริ่มต้น} - \text{น้ำหนักหลังลอยดอก}}{\text{น้ำหนักเริ่มต้น}} \times 100$

3.5.4.2 ลักษณะสีกลีบดอก

ทำการเทียบลักษณะสีผิวโดยใช้แผ่นเทียบสี R.H.S. Colour Chart หลังจากการพับกลีบดอกแล้ว โดยเทียบสีบริเวณกึ่งกลางของกลีบดอก ชั้นกลางและบริเวณกึ่งกลางของ petaloid staminode (ภาพที่ 3.5) จากนั้นนำค่าที่ได้ไปแปลงค่าจากสมุดแปลงค่าสีในระบบ Yxy colour space อ่านค่าเป็น co - ordinates ของ x y และ z สำหรับค่า z หาได้จาก 1-x-y และนำค่าที่ได้เปลี่ยนเป็นระบบ L a b colour space (เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. มปป.)



ภาพที่ 3.5 ตำแหน่งที่ใช้เทียบสีของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สดตบงกช

$L = 10\sqrt{Y}$ [L คือ ความสว่าง มีค่า 0 (สีดำ) - 100 (สีขาว)]

$a = \frac{17.5(1.02x - y)}{\sqrt{y}}$ [a คือ ค่าสีในตำแหน่งที่อยู่บนแกน x ค่า a (+) = สีแดง a (-) = สีเขียว]

$b = \frac{7.0(y - 0.847z)}{\sqrt{y}}$ [b คือ ค่าสีในตำแหน่งที่อยู่บนแกน y ค่า b (+) = สีเหลือง b (-) = สีนํ้าเงิน]

3.5.4.3 บันทึกปริมาณการผลิตเอทิลีน

ทำการวัดเอทิลีน โดยนำดอกบัวแต่ละช่อ (ช่อละ 2 ดอก) มาหุ้มโคนก้านดอกด้วยลวดลึบน้ำสะอาด และหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์อีกชั้นหนึ่ง จากนั้นบรรจุลงในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 2 ดอก แล้วปิดปากขวดแก้วไม่ให้แก๊สออก แล้วนำขวดแก้วที่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์อีกชั้นหนึ่งและยึดติดด้วยเทปใสเมื่อครบ 1 ชั่วโมง ดูดอากาศจากโหลแก้วมา 6 มิลลิลิตร โดยฉีดใส่หลอดสูญญากาศ (Vacutainer) แล้วสุ่มตัวอย่างก๊าซ มา 1 มิลลิลิตร ด้วยเข็มฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร แล้วฉีดเข้า

เครื่อง gas chromatograph (shimadzu รุ่น GC 8A) ติดตั้งด้วย flame ionization detector (FID) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และใช้คอลัมน์เป็นท่อแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 มิลลิเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5 มิลลิเมตร ยาว 1.93 เมตร ภายในบรรจุด้วย porapak Q mesh 80/100 อุณหภูมิคอลัมน์ 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ injector และ detector เท่ากับ 110 องศาเซลเซียส ค่าที่วัดได้มีหน่วยเป็นส่วนต่อล้านส่วน (ppm) เทียบกับเอทิลีนมาตรฐาน แล้วนำค่าที่อ่านได้จากเครื่องไปคำนวณ ค่าอัตราการผลิตเอทิลีน ที่ได้จะมีหน่วยเป็นไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ($\mu\text{L}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{hr}^{-1}$)

3.5.4.4 บันทึกปริมาณของแอนโรไซยานินด้วย spectrophotometer โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณโมโนเมอร์แอนโรไซยานินทั้งหมดโดยวิธี pH-differential ตามวิธีการของ Giusti and Wrolstad. (2000)

ขั้นตอนที่ 1 การสกัดแอนโรไซยานินด้วยเมธานอล

1. นำดอกบัวของแต่ละวิธีการมาเด็ดกลีบดอกออก หั่นให้ละเอียด จากนั้นนำมาชั่งจำนวน 15 กรัม แล้วเติมเมธานอล (0.01% HCl methanol) เป็นจำนวน 4 เท่าโดยปริมาตร ทำการสกัด 3 ครั้ง แต่ละครั้งตั้งทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง
2. กรองด้วยผ้าขาวบาง และกรองอีกครั้งด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1
3. นำสารสกัดที่ได้ใส่ใน boiling flask แล้วนำไประเหยเมธานอลใน rotary aporator ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ภายใต้สุญญากาศ
4. นำสารจากข้อ 3 มาละลายด้วยเมธานอลให้ครบ 10 มิลลิลิตร

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการหาปริมาณโมโนเมอร์แอนโรไซยานินในสารสกัดจากขั้นตอนที่ 1 โดยเตรียมสารละลายเคมี 2 ชุด

ชุดที่ 1 0.025 M (KCL 1.86 กรัม ละลายด้วยน้ำกลั่น 960 มิลลิลิตร) potassium chloride buffer pH 1.0 ด้วย HCL เข้มข้น 37 %

ชุดที่ 2 0.4 M ($\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 54.43 กรัม ละลายด้วยน้ำกลั่น 960 มิลลิลิตร) sodium acetate buffer pH 4.5 ด้วย HCl เข้มข้น 37 %

1. เจือจางสารละลายตัวอย่างด้วยสารละลายเคมีชุดที่ 1 เพื่อหาค่า DF ที่เหมาะสมสำหรับนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร เช่น $\text{DF } 10 = 10/10 = 1$ คือใช้สารตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร เติมน้ำละลายเคมีชุดที่ 1 ลงไปให้ครบ 10 มิลลิลิตร

2. นำสารจากข้อ 1. มาปั่น (centrifuge) ให้ตกตะกอน เอาสารส่วนที่ใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ถ้าค่าการดูดกลืนแสงยังไม่ใกล้เคียง 1 คือ ยังไม่เป็นเส้นตรงให้หาค่า DF ใหม่ จนได้ใกล้เคียง 1

3. เมื่อได้ DF ที่มีค่าดูดกลืนแสงใกล้เคียง 1 จะได้ความยาวคลื่นแสงที่ดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างออกมา

4. นำสารตัวอย่างจาก DF ที่ได้ มาวัดค่าดูดกลืนแสงจากความยาวคลื่นแสงที่วัดได้ และที่ 700 นาโนเมตร

5. นำสารตัวอย่างมาละลายด้วยสารละลายเคมีชุดที่ 2 แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงจาก DF ที่หาได้จากข้างต้น และที่ 700 นาโนเมตร

6. คำนวณค่าการดูดกลืนแสง(absorbance) ดังนี้

$$A = (A_{\lambda_{\text{vis-max}}} - A_{700})_{\text{pH 1.0}} - (A_{\lambda_{\text{vis-max}}} - A_{700})_{\text{pH 4.5}}$$

7. คำนวณความเข้มข้นของโมโนเมอร์แอนโทไซยานิน ได้ดังนี้

$$\text{ปริมาณ monomeric anthocyanin pigment (mg/liter)} = (A \times \text{MW} \times \text{DF} \times 1000) / (\epsilon \times l)$$

MW = น้ำหนักโมเลกุล 449.2 (cyanidin-3-glucoside)

DF = dilution factor (สำหรับตัวอย่าง เช่นตัวอย่าง 0.2 มิลลิลิตร เจือจางได้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร, DF = 15)

ϵ = molar absorptivity (26,900)

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Duncan's new Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การทดลองที่ 1

จากการทดลองหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับช่วยกำจัดน้ำยางที่รอยตัดปลายก้านของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช ผลปรากฏว่า

4.1.1 ข้อมูลก่อนการปักแจกัน

จากการบันทึกข้อมูลก่อนการปักแจกันได้แก่ น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode สีกลีบดอก สี petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโทไซยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีนที่บัวผลิติดอกมา ปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.1) และมีคุณภาพของดอกเมื่อเริ่มต้นการทดลองในทุกวิธีการเหมือนกัน (ภาพที่ 4.1)

4.1.2 ปริมาณการดูดน้ำในแต่ละวันและปริมาณการดูดน้ำรวม 5 วันของดอกบัวในระหว่างการปักแจกัน

4.1.2.1 ปริมาณการดูดน้ำของดอกบัวเมื่อครบ 1 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำของดอกบัว ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) โดยวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำมากที่สุดเฉลี่ย 9.75 มิลลิลิตร

4.1.2.2 ปริมาณการดูดน้ำของดอกบัวเมื่อครบ 2 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำของดอกบัว ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีปริมาณการดูดน้ำมากที่สุดเฉลี่ย 5.25 มิลลิลิตร (ตารางที่ 4.2) โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติในระดับนัยสำคัญกับวิธีการที่ 2, 6 และ 7 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40, 80 และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการอื่นๆ

4.1.2.3 ปริมาณการดูดน้ำของดอกบัวเมื่อครบ 3 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำของดอกบัว ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) ซึ่งวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำมากที่สุดเฉลี่ย 2.75 มิลลิลิตร

4.1.2.4 ปริมาณการดูดน้ำของดอกบัวเมื่อครบ 4 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำของดอกบัว ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) แต่วิธีการที่ 2 และ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับ) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำมากที่สุดเฉลี่ย 1.83 มิลลิลิตร

ตารางที่ 4.1 น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode สีของกลีบดอก สีของ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คเอนโรไซยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อเริ่มการทดลองของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1

วิธีการ ¹⁾	ข้อมูลของดอกบัวก่อนการปักแจกัน							
	น้ำหนัก ดอก	เส้นผ่าศูนย์กลาง วง petaloid staminode	สีของกลีบดอก		สีของ petaloid staminode		ปริมาณโม โนเมอร์ค เอนโรไซ ยานิน	ความเข้มข้น ของเอทิลีน (ไมโครลิตร/ กก./ชม.)
			ความ สว่าง	สีแดง a(+)	ความ สว่าง	สีแดง a(+)		
	(ก.)	(ชม.)	(L)	a(+)	(L)	a(+)	(มก./ล.)	กก./ชม.)
T1	42.47	4.93	77.37	1.37	81.22	1.00	100.39	38.39
T2	40.44	4.88	76.67	1.42	81.42	0.97	98.16	36.80
T3	39.31	4.88	78.08	1.37	81.42	0.97	102.20	46.42
T4	39.84	4.82	76.67	1.42	81.42	0.97	98.36	43.12
T5	39.11	4.75	78.78	1.25	81.42	0.97	101.28	44.39
T6	42.06	5.13	79.49	1.20	81.42	0.97	100.25	34.48
T7	40.13	4.92	78.78	1.25	81.42	0.97	99.02	37.97
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
CV(%)	5.09	3.53	1.78	7.40	0.16	2.02	7.82	15.36

¹⁾ = T1 = วิธีการควบคุม คือ ทำการปักกลีบดอก ตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ลอยในอ่างน้ำที่มี สารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %, T2 - T7 เหมือน T1 แต่ก่อนปักแจกันด้วยการลอย ในอ่างน้ำ จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

4.1.2.5 ปริมาณการดูดน้ำของดอกบัวเมื่อครบ 5 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำของดอกบัว ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) ซึ่งวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำมากที่สุดเฉลี่ย 1.83 มิลลิลิตร และวิธีการที่ 7 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.42 มิลลิลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 ปริมาณการดูดน้ำในแต่ละวันและปริมาณการดูดน้ำรวม 5 วัน ของการปักแจกัน ดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1

วิธีการ ^{1/}	ปริมาณการดูดน้ำในแต่ละวันและปริมาณการดูดน้ำรวม 5 วันของการปักแจกัน					ปริมาณการดูดน้ำรวม (มล.)
	ครบ 1 วัน	ครบ 2 วัน	ครบ 3 วัน	ครบ 4 วัน	ครบ 5 วัน	
	(มล.)	(มล.)	(มล.)	(มล.)	(มล.)	
T1	8.00	5.08ab ^{2/}	2.58	1.58	1.00	18.24
T2	7.00	2.75d	2.42	1.83	1.33	15.33
T3	7.17	4.67abc	2.67	1.50	1.50	17.51
T4	9.75	5.25a	2.75	1.83	1.83	21.41
T5	8.83	4.00abcd	1.42	0.83	0.92	16.00
T6	6.75	3.42cd	2.25	1.25	0.75	14.42
T7	6.83	3.67bcd	2.17	1.33	0.42	14.42
F-test	ns	*	ns	ns	ns	ns
CV(%)	19.36	18.96	29.54	32.96	38.49	15.40

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ ทำการปักสลิปดอก ตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ลอยในอ่างน้ำที่มี สารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %, T2 - T7 เหมือน T1 แต่ก่อนปักแจกันด้วยการลอย ในอ่างน้ำ จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.1.2.6 ปริมาณการดูดน้ำรวม 5 วันของการปักแจกัน

จากการบันทึกปริมาณการดูดน้ำรวม 5 วันของการปักแจกันพบว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มปริมาณการดูดน้ำรวมมากที่สุดเฉลี่ย 21.41 มิลลิลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.3 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช

4.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอก

จากการบันทึกสีกลีบดอกด้วยการเทียบสีด้วยกระดาษเทียบสี

R.S.H.colour chart แล้วนำค่าที่อ่านได้จากแผ่นเทียบสีมาตรฐานไปแปลค่าจากสมุดแปลค่าสีในระบบ Yxy colour space แล้วนำค่าที่ได้ไปเข้าระบบ L a b colour space ผลปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกเมื่อปักแจกันครบ 1-5 วัน ค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.3) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มสีกลีบดอกสดใสมากที่สุดวัดค่า L (ความสว่าง) ในวันที่ 1-5 ของการปักแจกันได้เฉลี่ย 76.67, 76.67, 78.08, 80.10 และ 80.10 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุดเฉลี่ย 1.42, 1.42, 1.31, 1.12 และ 1.12 ในขณะที่วิธีการที่ 7 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มสีสดใสที่น้อยที่สุดวัดค่า L (ความสว่าง) ได้มากที่สุดและมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) น้อยที่สุด

4.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ในระหว่างการปักแจกัน

จากการบันทึกสี petaloid staminode ของดอกบัว เมื่อปักแจกันครบ 1-5 วัน ผลปรากฏว่า ค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.3) ซึ่งในวันที่ 1 และ 2 วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มค่า L (ความสว่าง) น้อยที่สุดเฉลี่ย 81.22 และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุดเฉลี่ย 1.00 ส่วนวันที่ 3, 4 และ 5 วิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มค่า L (ความสว่าง) น้อยที่สุดเฉลี่ย 81.42, 82.21 และ 82.21 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุดเฉลี่ย 0.97, 0.86 และ 0.86 ตามลำดับ

4.1.4 ข้อมูลของดอกเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน

4.1.4.1 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 2.69 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4.4) ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3 และ 5 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 50 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลำดับ) แต่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaliod staminode ในระหว่างการพัฒนา (Nelumbo nucifera Gaertn.)
พันธุ์ดีตบงกช จากการศึกษาครั้งที่ 1

วิธีการ ¹⁾	การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกในระหว่างการพัฒนา										การเปลี่ยนแปลงสี petaliod staminode ในระหว่างการพัฒนา									
	ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน		ครบ 5 วัน		ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน		ครบ 5 วัน	
	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)
T1	78.08	1.31	78.08	1.31	79.49	1.20	80.40	1.11	81.01	1.06	81.22	1.00	81.22	1.00	81.88	0.86	82.47	0.82	82.74	0.79
T2	77.37	1.37	77.37	1.37	79.69	1.17	80.60	1.09	80.81	1.03	81.42	0.97	81.42	0.97	81.68	0.93	82.21	0.86	82.21	0.86
T3	78.08	1.31	78.08	1.31	79.46	1.16	80.31	1.09	81.01	1.03	81.42	0.97	81.42	0.97	81.68	0.93	82.21	0.86	82.74	0.79
T4	76.67	1.42	76.67	1.42	78.08	1.31	80.10	1.12	80.10	1.12	81.42	0.97	81.42	0.97	81.42	0.97	82.21	0.86	82.21	0.86
T5	79.49	1.20	79.49	1.20	79.49	1.20	80.31	1.09	80.31	1.09	81.42	0.97	81.42	0.97	81.68	0.93	82.21	0.86	82.74	0.79
T6	79.49	1.20	79.49	1.20	80.31	1.08	81.01	1.03	81.22	1.00	81.42	0.97	81.42	0.97	81.68	0.90	82.74	0.82	83.00	0.75
T7	79.49	1.20	79.49	1.20	80.61	1.09	81.01	1.03	81.22	1.00	81.42	0.97	81.42	0.97	81.95	0.90	82.47	0.82	82.74	0.79
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
CV (%)	1.95	9.57	1.95	9.57	2.03	12.67	1.20	8.67	0.98	7.68	0.16	2.02	0.16	2.02	0.54	5.85	0.63	9.85	0.55	7.92

¹⁾ = T1 = วิธีการควบคุม คือ ทำการพับกลีบดอก ตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ลอยในอ่างน้ำที่มีสารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %, T2 - T7 เหมือน T1 แต่ก่อนปักแจกันด้วย การลอยในอ่างน้ำ จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

ตารางที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน			
	เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ซม.)
	T1	0.70b ^{2/}	0.74	70.02bc ^{2/}
T2	0.33b	0.03	91.95a	59.56
T3	1.74ab	0.02	54.88c	63.88
T4	2.69a	0.00	84.88ab	48.39
T5	2.03ab	0.00	67.49c	49.49
T6	0.63b	0.08	69.24bc	59.34
T7	0.70b	0.13	55.45c	54.49
F-test	*	ns	*	ns
CV (%)	21.35	15.60	12.77	17.89

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ ทำการพับกลีบดอก ตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ลอยในอ่างน้ำที่มีสารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %, T2 - T7 เหมือน T1 แต่ก่อนปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำ จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.1.4.2 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.4) ซึ่งวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 0.74 ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 4 และ 5 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 และ 70 องศาเซลเซียสตามลำดับ) ยังไม่เกิดพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (ภาพที่ 4.2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครู ใช้งานเพื่อการศึกษายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม หากมีเหตุใดเบบบงเนื้อที่ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรณีไปใช้

4.1.4.3 ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานินเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 2 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40 องศาเซลเซียส) มีปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานินมากที่สุดเฉลี่ย 91.95 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.4) และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีการอื่นๆ

4.1.4.4 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.4) โดยวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 48.39 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่วิธีการควบคุมเฉลี่ย 54.02 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง

4.1.5. ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน

4.1.5.1 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลงในระหว่างการทดลองเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.5) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ย 4.93 เปอร์เซ็นต์

4.1.5.2 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.5) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 3.02 เปอร์เซ็นต์

4.1.5.3 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.5) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 17.61 ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 9.59

ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 4.3) การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์ค แอนโธไซยานิน ความเข้มข้นของเอทิลีน และอายุการปักแจกันเมื่อปักแจกันครบ 5 วันของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน					
	เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก ดอกที่ ลดลง	เปอร์เซ็นต์การ ขยายตัวเพิ่ม ของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยดำหนีสีดำ ที่บริเวณ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโน เมอร์คแอนโธไซยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้น ของเอทิลีน (ไมโครลิตร/ กก./ซม.)	อายุการ ปักแจกัน (วัน)
T1	7.56	2.73	17.61	125.13c ^{2/}	65.01	3.67
T2	5.22	1.05	16.25	154.07b	55.49	4.50
T3	5.47	1.09	15.33	194.60a	59.97	4.50
T4	4.93	3.02	9.59	208.20a	53.14	4.67
T5	6.35	2.00	10.33	197.49a	59.69	4.50
T6	6.20	0.95	16.50	141.11bc	58.91	4.00
T7	5.91	2.36	16.75	160.86b	55.76	4.33
F-test	ns	ns	ns	*	ns	ns
CV (%)	22.64	43.51	33.76	7.70	33.91	8.77

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ ทำการพับกลีบดอก ตัดปลายก้านให้ยาว 1 ½ นิ้ว ลอยในอ่างน้ำที่มี สารละลาย citric acid 150 ppm + sucrose 2 %, T2 - T7 เหมือน T1 แต่ก่อนปักแจกันด้วยการลอย ในอ่างน้ำ จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 วินาที

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.1.5.4 ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโธไซยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอร์คแอนโธไซยานินเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีปริมาณโมโนเมอร์คแอนโธไซยานินมากที่สุดเฉลี่ย 208.20 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.5) โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการที่ 1, 2, 6 และ 7 (วิธีการควบคุม, จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40, 80


และ 90 องศาเซลเซียสตามลำดับ) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3 และ 5 (จุ่มปลายก้าน
ในน้ำร้อน 50 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

4.1.5.5 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.5) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่ม
ปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 53.14 ไมโครลิตร
ต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และวิธีควบคุมมีแนวโน้มผลิตเอทิลีนมากที่สุดเฉลี่ย 65.01 ไมโครลิตรต่อ
กิโลกรัมต่อชั่วโมง

4.1.5.6 อายุการปักแจกัน

จากการบันทึกอายุการปักแจกัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.5) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศา
เซลเซียส) มีแนวโน้มอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 4.67 วัน ในขณะที่วิธีการที่ 1 (วิธีการ
ควบคุม) มีแนวโน้มอายุการปักแจกันน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.67 วัน




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.1 คุณภาพของดอกบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช เมื่อเริ่มต้นการทดลองในทุกวิธีการ จากการทดลองที่ 1 (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายนก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายนก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 1 โดย T4 และ T5 มีคุณภาพดีที่สุด คือยังไม่เกิดพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อน อุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

เอกสารนี้ **หมายเหตุ** ที่ \longrightarrow ชีบบริเวณ petaloid staminode ที่เกิดรอยตำหนิสีดำ ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.3 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 1 โดย T4 มีคุณภาพดีที่สุด คือเกิดพื้นที่รอยดำบนบริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 9.59 ตารางเซนติเมตร (T1 = วิธีการควบคุม คือ ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 - T7 จุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

เอกสารนี้ **หมายเหตุ** ที่ส่งมอบไปให้ ชีวบริเวณ petaloid staminode ที่เกิดรอยดำบนสีด้า ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 การทดลองที่ 2

จากการทดลองศึกษาวิธีการบรรจุมลพิษสำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช เพื่อลดการผลิตเอทิลีนของดอกบัว และรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจุด้วยน้ำแข็งเกล็ดในอัตราส่วนต่างๆ เปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม โดยทุกวิธีการทำการเก็บเกี่ยวและตัดปลายก้านจุ่มน้ำร้อนด้วยวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 ผลปรากฏว่า

4.2.1 ข้อมูลเมื่อเริ่มต้นการทดลอง

4.2.1.1 ลักษณะของดอกเมื่อเริ่มต้นการทดลอง

จากการบันทึกลักษณะดอกเมื่อเริ่มการทดลอง ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกได้แก่ น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก ความสูงของดอก เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก ปริมาณโมโนเมอริคแอนโธไซยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และมีคุณภาพของดอกในทุกวิธีการใกล้เคียงกัน

4.2.2 ข้อมูลของดอกบัวเมื่อพับกลับแล้วก่อนปักแจกัน (หลังจากบรรจุหีบห่อและจำลองการขนส่ง)

4.2.2.1 เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode

พบว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.6)

4.2.2.2 สีของกลีบดอก [ค่า L และ ค่าสีแดง a (+)] ก่อนปักแจกัน

จากการบันทึกค่า L (ความสว่าง) ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) กลีบดอกมีแนวโน้มสีจางมากที่สุดวัดค่า L ได้เฉลี่ย 80.19 (ตารางที่ 4.6) โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:1) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการที่ 2, 4 และ 5 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1, 2:3 และ 1:2 ตามลำดับ) ซึ่งวิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มสีสดใสมากที่สุดวัดค่า L ได้เฉลี่ย 75.46

สำหรับค่าสีแดง a (+) พบว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.6)

4.2.2.3 สีของ petaloid staminode ก่อนการปักแจกัน

จากการบันทึกค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) พบว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลลักษณะของดอกบัวก่อนการทดลองและข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักกลีบแล้วก่อนปักแจกัน(หลังจากผ่านการจำลองอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่ง) ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการผลิตครั้งที่ 2

วิธีการ ^{1/}	ลักษณะของดอกบัวก่อนการทดลอง					ลักษณะของดอกเมื่อปักกลีบแล้วก่อนการปักแจกัน						
	น้ำหนักดอก	เส้นผ่าศูนย์กลางดอก	ความสูงของดอก	เส้นผ่าศูนย์กลางดอก	ปริมาณโมโนแมริคแอนโดไซกานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ชม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง petaloid staminode (ชม.)	สีของ petaloid staminode		ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ชม.)		
								ความยาว	สีแดง			
T1	45.97	5.65	7.00	0.68	44.92	48.53	5.18	(L)	a(+)	81.42	0.97	93.26a ^{2/}
T2	46.30	5.58	7.23	0.68	45.98	49.82	5.17	76.67b	1.42	81.42	0.97	64.27b
T3	46.96	5.52	7.22	0.72	46.59	49.28	5.05	77.37ab	1.37	81.42	0.97	66.14b
T4	46.55	5.55	7.27	0.68	46.25	49.00	5.12	75.46b	1.58	79.70	1.10	60.17b
T5	46.50	5.48	7.20	0.68	46.34	48.71	5.23	76.67b	1.42	81.42	0.97	67.23b
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	ns	ns	ns	*
CV (%)	6.16	2.70	3.71	7.71	4.04	24.69	2.58	2.08	12.17	1.64	10.36	8.48

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษสุกทุกที่มีแผ่นกระดาษสุกปูกระเบื้องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 - T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษสุกปูกระเบื้องด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งกลีบบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนัkdอก : น้ำหนักน้ำแข็งกลีบ 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติโดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.2.2.4 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีการผลิตเอทิลีนมากที่สุดเฉลี่ย 93.26 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง (ตารางที่ 4.6) โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกวิธีการ โดยวิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 60.17 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง

4.2.3 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในระหว่างปักแจกัน

4.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกในระหว่างการปักแจกัน

จากการบันทึกสีกลีบดอกด้วยการเทียบสีด้วยกระดาษเทียบสี R.S.H.colour chart แล้วนำค่าที่อ่านได้จากแผ่นเทียบสีมาตรฐานไปแปลค่าจากสมุดแปลค่าสีในระบบ Yxy colour space แล้วนำค่าที่ได้ไปเข้าระบบ L a b colour space ผลปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกเมื่อปักแจกันครบ 1-5 วัน ค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.7) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มสีกลีบดอกจางมากที่สุดวัดค่า L (ความสว่าง) ในวันที่ 1-5 ของการปักแจกันได้เฉลี่ย 79.49, 80.81, 80.81, 81.01 และ 82.07 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.20, 1.06, 1.06, 1.03 และ 0.88 ตามลำดับ ในขณะที่วิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มสีสดใสมากที่สุดวัดค่า L (ความสว่าง) ได้น้อยที่สุดและมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุด

4.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ในระหว่างการปักแจกัน

จากการบันทึกสี petaloid staminode ของดอกบัว เมื่อปักแจกันครบ 1-5 วัน ผลปรากฏว่า วันที่ 1, 2, 3 และ 5 ทั้งค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.7) ยกเว้นวันที่ปักแจกันครบ 4 วัน ค่า L (ความสว่าง) ของการทดลอง วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) สีจางมากที่สุดเฉลี่ย 83.00 (ตารางที่ 4.7) แตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการอื่นๆ สำหรับค่าสีแดง a (+) วิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีสีสดใสมากที่สุด วัดค่าสีแดง a (+) ได้เฉลี่ย 0.93 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ 5 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:2) แต่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการอื่นๆ โดยวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีค่าสี

เอกสารสีแดง a (+) เฉลี่ย 0.75 สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.7 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaliod staminode ในระหว่างการปักแจกัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.)
พันธุ์ดีตบงข จากการผลิตครั้งที่ 2

วิธีการ ^{1/}	การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกในระหว่างการปักแจกัน										การเปลี่ยนแปลงสี petaliod staminode ในระหว่างการปักแจกัน									
	ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน		ครบ 5 วัน		ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน		ครบ 5 วัน	
	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)	ความ สว่าง (L)	สีแดง a(+)
T1	79.49	1.20	80.81	1.06	80.81	1.06	81.01	1.03	82.07	0.88	81.42	0.97	81.42	0.97	81.42	0.97	83.00a ^{2/}	0.75b ^{2/}	83.00	0.75
T2	76.67	1.42	78.78	1.25	79.69	1.17	80.60	1.09	81.60	0.95	81.42	0.97	81.42	0.97	81.42	0.97	83.00a	0.75b	83.00	0.75
T3	77.13	1.36	78.08	1.31	80.40	1.11	80.81	1.06	81.60	0.95	81.42	0.97	81.42	0.97	81.42	0.97	82.74a	0.79b	83.00	0.75
T4	75.46	1.58	77.13	1.36	79.69	1.17	79.69	1.17	80.49	1.09	80.37	1.10	80.37	1.10	80.37	1.10	81.68b	0.93a	82.74	0.79
T5	77.37	1.37	78.78	1.31	80.60	1.09	79.19	1.20	80.86	1.05	81.42	0.97	81.42	0.97	81.42	0.97	82.74a	0.86ab	83.00	0.75
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	*	ns	ns
CV (%)	2.39	13.91	1.96	12.21	1.21	8.39	1.21	8.53	1.06	11.51	1.00	10.36	1.00	10.36	1.00	10.36	0.43	7.78	0.25	3.75

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแฉงตั้งในกล่องกระดาษสุกฟูกที่มีแผ่นกระดาษสุกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 - T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษสุกฟูกเคลือบด้วยสติติกเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนัkdอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติโดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.2.4 ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน

4.2.4.1 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4,8) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 2 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 3.42 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วิธีการที่ 3 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด1:1) มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.24 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 4.8 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 2

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน			
	เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยดำหนิสดำที่บริเวณ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ซม.)
T1	3.03	0.017	72.14bc ^{2/}	63.77
T2	3.42	0.000	68.80c	62.35
T3	1.24	0.008	78.99ab	67.67
T4	2.53	0.005	85.91a	70.55
T5	1.52	0.003	49.26d	68.42
F-test	ns	ns	*	ns
CV (%)	28.25	0.61	6.14	12.73

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจูดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

^{2/} ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ นำไป โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % สารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.4.2 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.8) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 0.017 ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) ยังไม่เกิดพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (ภาพที่ 4.4)

4.2.4.3 ปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานินเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานินมากที่สุดเฉลี่ย 85.91 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.8) โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 1, 2 และ 5 (วิธีการควบคุม, น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1 และ 1:2) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ 3 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:1)

4.2.4.4 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.8)

4.2.5. ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน

4.2.5.1 เปอร์เซ็นต์น้ำหมักดอกที่ลดลง

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์น้ำหมักดอกที่ลดลงเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.9) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มน้ำหมักดอกที่ลดลงมากที่สุดเฉลี่ย 18.86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มน้ำหมักดอกที่ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ย 11.03 เปอร์เซ็นต์

4.2.5.2 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 4.9) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่ม ของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 8.46 เปอร์เซ็นต์ และวิธีการที่ 3 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:1) มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 5.64

เอกสารนี้เป็อร์เซ็นต์ ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.5.3 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.9) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 5 (น้ำหนักรดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:2) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 3.02 ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 4 (น้ำหนักรดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.48 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 4.5 และ 4.6)

ตารางที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน ความเข้มข้นของเอทิลีน และอายุการปักแจกันเมื่อปักแจกันครบ 5 วันของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 2

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน					
	เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก ดอกที่ลดลง	เปอร์เซ็นต์ การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ล.)	อายุการปักแจกัน (วัน)
T1	18.86	6.18	3.04	86.72b ^{2/}	71.33	3.17 b ^{2/}
T2	12.03	6.79	0.53	95.29b	68.28	4.67a
T3	11.51	5.64	3.02	105.65a	67.07	4.67a
T4	11.03	8.46	0.48	109.32a	58.53	4.83a
T5	11.78	6.03	3.20	36.52c	86.03	4.67a
F-test	ns	ns	ns	*	ns	*
CV (%)	33.46	43.48	50.00	6.14	18.14	6.56

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ นั้น ไม่นอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.2.5.4 ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรโซยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรโซยานินเมื่อปฏิกิริยาครบ 5 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรโซยานินมากที่สุดเฉลี่ย 109.32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.9) โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 1, 2 และ 5 (วิธีการควบคุม, น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1 และ 1:2) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 3 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:1)

4.2.5.5 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปฏิกิริยาครบ 5 วัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.9) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 58.53 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่วิธีการควบคุมมีการผลิตเอทิลีน 71.33 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง

4.2.5.6 อายุการปักแจกัน

จากการบันทึกอายุการปักแจกัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 4 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 4.83 วัน (ตารางที่ 4.9) ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 2, 3 และ 5 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1, 1:1 และ 1:2) แต่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 2 (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ สัตตบงกชในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน จากการทดลองที่ 3 โดย T4 มี คุณภาพดีที่สุด คือ มีพื้นที่รอยดำหนีสดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 0.48 ตารางเซนติเมตร และมีอายุการปักแจกันมากที่สุด เฉลี่ย 4.83 วัน (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักรดอก:น้ำหนักรน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

4.3 การทดลองที่ 3

จากการทดลองศึกษาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกชเมื่อพักกลีบดอกแล้ว เพื่อลดการผลิตเอทิลีนของดอกบัว และรักษาคุณภาพดอกบัวระหว่างการขนส่ง โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจุด้วยน้ำแข็งเกล็ดในอัตราส่วนต่างๆ เปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม โดยทุกวิธีการทำการเก็บเกี่ยวและตัดปลายก้านจุ่มน้ำร้อนด้วยวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 ผลปรากฏว่า

4.3.1 ข้อมูลเมื่อเริ่มต้นการทดลอง

4.3.1.1 ลักษณะของดอกเมื่อเริ่มต้นการทดลอง

จากการบันทึกลักษณะดอกเมื่อเริ่มการทดลอง ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกได้แก่ น้ำหนักดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก ความสูงของดอก เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก ปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.10) และมีคุณภาพของดอกในทุกวิธีการใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 4.7)

4.3.2 ข้อมูลของดอกบัวเมื่อพักกลีบแล้วก่อนปักแจกัน (หลังจากบรรจุหีบห่อและจำลองการขนส่ง)

จากการบันทึกลักษณะดอกเมื่อพักกลีบแล้วก่อนปักแจกัน ผลปรากฏว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลางวง petaloid staminode ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.10) สีของกลีบดอกและสีของ petaloid staminode ทุกวิธีการมีสีเดียวกัน (ตารางที่ 4.10) ส่วนความเข้มข้นของเอทิลีน วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีการผลิตเอทิลีนมากที่สุดเฉลี่ย 81.83 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ 2 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) แต่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการอื่นๆ

4.3.3 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช ในระหว่างปักแจกัน

4.3.3.1 การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกในระหว่างการปักแจกัน

จากการบันทึกสีกลีบดอกด้วยการเทียบสีด้วยกระดาษเทียบสี R.S.H.colour chart แล้วนำค่าที่อ่านได้จากแผ่นเทียบสีมาตรฐานไปแปลค่าจากสมุดแปลค่าสีในระบบ Yxy colour space แล้วนำค่าที่ได้ไปเข้าระบบ L a b colour space ผลปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกเมื่อปักแจกันครบ 1-4 วัน ค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.11) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) สีกลีบดอกมีแนวโน้มสีจางลงมากที่สุดวัดค่า L (ความสว่าง) ในวันที่ 1-4 ของการปักแจกันได้เฉลี่ย 77.37, 80.81, 81.22 และ 81.22 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.37,

ตารางที่ 4.10 ข้อมูลลักษณะของดอกบัวก่อนการทดลอง และก่อนการปักแจกัน (หลังจากผ่านการจำลองอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่ง) ของดอกบัวหลวง

(*Nelumbo nucifera Gaertn.*) พันธุ์สัตตบงกช จากการผลิตครั้งที่ 3

วิธีการ ¹⁾	ลักษณะของดอกก่อนการทดลอง						ลักษณะของดอกก่อนการปักแจกัน (หลังจากผ่านการจำลองอุณหภูมิและระยะเวลาการขนส่ง)						
	น้ำหนักดอก	เส้นผ่าศูนย์กลางดอก	ความสูงของดอก	เส้นผ่าศูนย์กลางก้านดอก	ปริมาณโมโนเมธิลคเอนโธไซยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก.ขม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง staminode	สีของกลีบดอก	petaliod staminode	สีของกลีบดอก	ความยาวของกลีบดอก	สีของกลีบดอก	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก.ขม.)
	(ก.)	(ซม.)	(ซม.)	(ซม.)	(มก./ล.)	(ไมโครลิตร/กก.ขม.)	(ซม.)	สีแดง	ความยาว (L)	สีแดง	ความยาว (L)	a(+)	a(+)
T1	47.33	5.67	7.03	0.60	97.98	51.88	5.10	1.48	80.19	1.48	80.19	1.1355	81.83a ²⁾
T2	47.76	5.63	7.02	0.65	98.47	40.14	5.05	1.48	80.19	1.48	80.19	1.1355	77.26a
T3	47.00	5.73	7.03	0.62	96.91	45.67	5.02	1.48	80.19	1.48	80.19	1.1355	54.28b
T4	47.37	5.63	6.95	0.68	99.08	46.97	5.13	1.48	80.19	1.48	80.19	1.1355	57.09b
T5	48.20	5.60	6.92	0.63	98.30	45.29	5.18	1.48	80.19	1.48	80.19	1.1355	46.90b
F-test	Ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	-	-	-	-	*
CV (%)	2.92	3.10	2.92	9.93	5.76	15.71	1.52	-	-	-	-	-	13.74

¹⁾ = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษสุกทุกที่มีแผ่นกระดาษสุกทุกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 - T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษสุกทุกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกิดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกิด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.11 การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกและการเปลี่ยนแปลงสีของ petaliod staminode ในระหว่างการปักแจกัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ตัดตบงกช จากการศึกษาทดลองที่ 3

วิธีการ ^{1/}	การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกในระหว่างการปักแจกัน								การเปลี่ยนแปลงสี petaliod staminode ในระหว่างการปักแจกัน							
	ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน		ครบ 1 วัน		ครบ 2 วัน		ครบ 3 วัน		ครบ 4 วัน	
	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)	สีแดง a(+)	สีเหลือง a(+)
T1	77.37	1.37	80.81	1.06	81.22	1.00	81.22	1.00	80.19	1.1355	81.22	1.00	81.95	0.90	83.00	0.75
T2	76.67	1.42	78.78	1.25	80.60	1.09	80.60	1.09	80.19	1.1355	81.42	0.97	82.21	0.86	82.21	0.86
T3	76.67	1.42	77.13	1.36	80.87	1.05	81.07	1.02	80.19	1.1355	81.42	0.97	82.47	0.82	82.47	0.82
T4	77.13	1.36	78.55	1.25	81.27	0.99	81.27	0.99	80.19	1.1355	81.42	0.97	82.47	0.82	82.47	0.82
T5	77.37	1.37	78.78	1.25	80.81	1.06	80.81	1.06	80.19	1.1355	81.42	0.97	82.74	0.79	83.00	0.75
F-test	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns
CV (%)	1.85	9.21	2.24	13.70	0.74	7.93	0.68	7.35	-	-	0.19	2.38	0.78	10.72	0.35	5.01

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแหว่ตั้งในกล่องกระดาษสุกทุกที่มีแผ่นกระดาษสุกทุกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกบัว ปิดกล่องให้สนิท, T2 - T5 เหมือน T1 แต่กล่องกระดาษสุกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเม็ดเล็ก 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

1.06, 1.00, และ 1.00 ตามลำดับ ในขณะที่วิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มสีสดใสมากที่สุดเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน วัดค่า L (ความสว่าง) ได้น้อยที่สุดและมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุด(ตารางที่ 4.11)

4.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงสี petaloid staminode ในระหว่างการปักแจกัน

จากการบันทึกสี petaloid staminode ของดอกบัว เมื่อปักแจกันครบ 1-4 วัน ผลปรากฏว่า ค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.11) อย่างไรก็ตามเมื่อปักแจกันครบ 1 วันทั้งค่า L (ความสว่าง) และค่าสีแดง a (+) ของทุกวิธีการยังมีสีเดียวกัน และเมื่อปักแจกันครบ 2-4 วันวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มค่า L (ความสว่าง) น้อยที่สุดเฉลี่ย 81.42, 82.21 และ 82.21 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) มากที่สุดเฉลี่ย 0.97, 0.86 และ 0.86 ตามลำดับ ส่วนวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มค่า L (ความสว่าง) มากที่สุดเฉลี่ย 81.22, 81.95 และ 83.00 ตามลำดับ และมีแนวโน้มค่าสีแดง a (+) น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.00, 0.90 และ 0.75 ตามลำดับ

4.3.4 ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน

4.3.4.1 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.12) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 3 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:1) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 2.75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการที่ 5 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:2) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.93 เปอร์เซ็นต์

4.3.4.2 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.02 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 4.12) ในขณะที่วิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 0.17 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 4.8)

4.3.4.3 ปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานินเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่าวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานินมากที่สุดเฉลี่ย 102.28 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.12) และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการอื่นๆ ทุกวิธีการ

ตารางที่ 4.12 เปรอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน และความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumb nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 1 วัน				
	เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้นของเอทิลีน (ไมโครลิตร/กก./ซม.)	
	T1	1.32	0.17	71.05c ^{2/}	61.45
	T2	2.66	0.02	102.28a	57.81
T3	2.75	0.12	90.17b	55.63	
T4	1.98	0.05	91.26b	56.53	
T5	0.93	0.21	69.38c	60.59	
F-test	ns	ns	*	ns	
CV (%)	20.61	14.12	6.29	12.05	

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่องสำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 1 แต่กล่องกระดาษลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

4.3.4.4 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 4.12) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 1(วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนมากที่สุดเฉลี่ย 61.45 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.5. ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน

4.3.5.1 เปอร์เซ็นต้นน้ำหนักดอกที่ลดลง

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลงเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.13) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 2 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ย 7.70 เปอร์เซ็น ในขณะที่วิธีการควบคุมมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง เฉลี่ย 9.02 เปอร์เซ็น

ตารางที่ 4.13 เปอร์เซ็นต้นน้ำหนักสดที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่ petaloid staminode ปริมาณโมโนเมอร์ค แอนโทไซยานิน ความเข้มข้นของเอทิลีน และอายุการปักแจกันเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 3

วิธีการ ^{1/}	ข้อมูลของดอกบัวเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน					
	เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักดอก ที่ลดลง	เปอร์เซ็นต์) การขยายตัว เพิ่มของวง petaloid staminode	พื้นที่รอยตำหนิ สีดำที่ petaloid staminode (ตร.ซม.)	ปริมาณโมโน เมอร์คแอนโท ไซยานิน (มก./ล.)	ความเข้มข้น ของเอทิลีน (ไมโครลิตร/ กก./ซม.)	อายุการ ปักแจกัน (วัน)
T1	9.02	2.98	4.35	87.17b ^{2/}	59.77	3.67
T2	7.70	5.64	3.92	115.00a	54.74	3.83
T3	7.88	5.32	4.34	87.84b	57.20	3.33
T4	9.43	5.22	4.46	79.82b	62.84	3.33
T5	9.68	4.81	4.58	96.63b	61.55	3.50
F-test	ns	ns	ns	*	ns	ns
CV (%)	22.54	31.54	48.75	10.80	12.62	11.55

^{1/} = T1 = วิธีการควบคุม คือ บรรจุดอกบัวแนวตั้งในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีแผ่นกระดาษลูกฟูกเจาะช่อง สำหรับสอดก้านดอกบัวและรองรับดอกไว้ ปิดกล่องให้สนิท, T2 – T5 เหมือน T1 1 แต่กล่องกระดาษ ลูกฟูกเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสและมีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนัก น้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ

^{2/} = ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแบบ เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้ในวงวิชาการเท่านั้น ไม่ควรนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
Duncan's new multiple range test ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตีพิมพ์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3.5.2 เปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode

จากการบันทึกเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 4 วัน ปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 4.13) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 5.64 เปอร์เซ็นต์ และวิธีการที่ 1 (วิธีการควบคุม) มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเพิ่มของวง petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 2.98 เปอร์เซ็นต์

4.3.5.3 พื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode

จากการบันทึกพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เมื่อปักแจกันครบ 4 วัน ผลปรากฏว่า ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.13) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 5 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 1:2) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มากที่สุดเฉลี่ย 4.58 ตารางเซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุดเฉลี่ย 3.92 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 4.9)

4.3.5.4 ปริมาณโมโนเมอร์คแอนโทไซยานิน

จากการบันทึกปริมาณโมโนเมอร์คแอนโทไซยานินวันที่ 4 ของการปักแจกัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มปริมาณโมโนเมอร์คแอนโทไซยานินมากที่สุดเฉลี่ย 115.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.13) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการอื่นๆ ทุกวิธีการ


4.3.5.5 ปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน

จากการบันทึกปริมาณความเข้มข้นของเอทิลีน ในวันที่ 4 ของการปักแจกัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.13) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 54.74 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่วิธีการควบคุมมีการผลิตเอทิลีน 59.77 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง

4.3.5.6 อายุการปักแจกัน


จากการบันทึกอายุการปักแจกัน ผลปรากฏว่าทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.13) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 2 (น้ำหมักดอก:น้ำหมักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีแนวโน้มอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 3.83 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมมีอายุการปัก

แจกันเฉลี่ย 3.67 วัน สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะฉีดยาทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.7 คุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช เมื่อเริ่มต้นการทดลองในวิธีการต่างๆ จากการทดลองที่ 3 (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ สัตตบงกชในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 1 วัน จากการทดลองที่ 3 โดย T2 มี คุณภาพดีที่สุด คือ มีพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 0.02 ตารางเซนติเมตร (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนัก ดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 หมายเหตุ → ขั้วบริเวณ petaloid staminode ที่เกิดรอยตำหนิสีดำ
 ไม่ว่าจะฉมิใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.9 เปรียบเทียบคุณภาพของดอกบัวหลวง(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์ สัตตบงกชในวิธีการต่างๆ เมื่อปักแจกันครบ 4 วัน จากการทดลองที่ 3 โดย T2 มี คุณภาพดีที่สุด คือ มีพื้นที่รอยดำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 3.92 ตารางเซนติเมตร และมีอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 3.83 วัน (T1 = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 – T5 ใช้อัตราส่วนน้ำหนัkdอก:น้ำหนัkn้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

หมายเหตุ → ชีบบริเวณ petaloid staminode ที่เกิดรอยดำหนิสีดำ

ตารางที่ 4.14 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระหว่างการทดลองที่ 1, 2 และ 3

	การทดลองที่ 1	การทดลองที่ 2	การทดลองที่ 3
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน ห้องปฏิบัติการ	22°C 68%	24°C 62%	24°C 65%
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน กล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษา ที่ 25 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง		วิธีการที่ 1 27°C 62% วิธีการที่ 2 26°C 63% วิธีการที่ 3 25°C 62% วิธีการที่ 4 24°C 62% วิธีการที่ 5 24°C 64%	วิธีการที่ 1 24°C 57% วิธีการที่ 2 23°C 53% วิธีการที่ 3 21°C 52% วิธีการที่ 4 21°C 48% วิธีการที่ 5 21°C 50%
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน กล่องกระดาษลูกฟูกที่ 7 องศา เซลเซียส 1 ชั่วโมง		วิธีการที่ 1 10°C 51% วิธีการที่ 2 8°C 50% วิธีการที่ 3 7°C 51% วิธีการที่ 4 5°C 55% วิธีการที่ 5 5°C 62%	วิธีการที่ 1 13°C 49% วิธีการที่ 2 12°C 52% วิธีการที่ 3 10°C 55% วิธีการที่ 4 9°C 52% วิธีการที่ 5 7°C 58%
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน กล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษา ที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง		วิธีการที่ 1 23°C 55% วิธีการที่ 2 22°C 58% วิธีการที่ 3 20°C 60% วิธีการที่ 4 18°C 60% วิธีการที่ 5 18°C 65%	วิธีการที่ 1 24°C 51% วิธีการที่ 2 22°C 55% วิธีการที่ 3 21°C 56% วิธีการที่ 4 19°C 58% วิธีการที่ 5 17°C 65%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5


วิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษาวิธีการบรรจุมลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช แต่ละการทดลองมีผลดังนี้

5.1 การทดลองที่ 1

จากปัญหาน้ำยางที่ซึมออกมาตามรอยตัดของปลายก้านดอกแล้วมีผลมาอุดตันท่อน้ำ ทำให้ก้านดอกดูดน้ำได้น้อย ดังนั้นการทดลองนี้จึงหาอุณหภูมิน้ำร้อนที่เหมาะสม สำหรับช่วย กำจัดยางที่เกิดขึ้นเพื่อให้ก้านดอกดูดน้ำ และสารละลายได้ดีขึ้นของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช ผลปรากฏว่า อายุการปักแจกันของทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามวิธีการที่ 4 จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ก่อนการปักแจกัน มีแนวโน้มอายุการปักแจกันมากที่สุด (ภาพที่ 5.1ก) เฉลี่ย 4.67 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมอายุการปักแจกันมีแนวโน้มน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.67 วัน การที่มีแนวโน้มคุณภาพการปักแจกันดีกว่าวิธีการควบคุมและวิธีการอื่นๆ คงเนื่องมาจากมีแนวโน้มในการดูดน้ำมากที่สุด (ภาพที่ 5.1ข) เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน ดูดน้ำได้รวม 21.41 มิลลิลิตร ขณะที่วิธีการควบคุมดูดน้ำได้รวม 18.24 มิลลิลิตร การดูดน้ำได้ดีส่งผลให้น้ำหนักมีแนวโน้มลดลงน้อยที่สุด (ภาพที่ 5.1ค) เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน น้ำหนักลดลงเฉลี่ย 4.93 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วิธีการควบคุมน้ำหนักลดลง มีแนวโน้มมากที่สุดเฉลี่ย 7.56 เปอร์เซ็นต์ การดูดน้ำได้มากและมีน้ำหนักลดลงน้อยของวิธีการนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า วิธีการนี้เมื่อปักแจกันไปครบ 1 วันและ 5 วัน มีผลทำให้มีแนวโน้มผลิตเอทิลีนได้น้อยที่สุด (ภาพที่ 5.1ง) เฉลี่ย 48.39 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และ 53.14 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลำดับ ในขณะที่วิธีการควบคุมเฉลี่ย 54.02 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และ 65.01 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งตรงกับรายงานการทดลองของ Suisuwan and Pichayanon (2002) ที่ได้รายงานว่าดอกบัวที่ไม่ขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวมีการผลิตเอทิลีนน้อยกว่าดอกบัวที่ไม่มีการให้น้ำหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้การไม่ขาดน้ำและการผลิตเอทิลีนน้อยแล้ว ยังทำให้หวง petaloid staminode มีการขยายตัวได้มากที่สุด (ตารางที่ 4.5) และสีของดอกเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน มีแนวโน้มให้สีชมพูสดใสมากที่สุด ให้ค่า L เฉลี่ย 80.10 และค่า a (+) เฉลี่ย 1.12 (ตารางที่ 4.3) ส่วนสีของ petaloid staminode ของวิธีการนี้เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน สียังคงมีแนวโน้มสดใสมากกว่าวิธีการอื่นๆ โดยให้ค่า L เฉลี่ย 82.21 และ ค่า a(+) เฉลี่ย 0.86 (ตารางที่ 4.3) การที่มีสดใสมากที่สุดสอดคล้องกับการวัดปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน เมื่อปักแจกันครบ 5 วัน พบว่ามีปริมาณโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน เฉลี่ย

208.20 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.5) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการควบคุม ซึ่งให้ค่าเฉลี่ย 125.13 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตรงกับที่ Jobling(2004) รายงานไว้ว่าเอทิลีนมีผลต่ออาการจางของสีดอกไม้ เมื่อพืชมีการผลิตเอทิลีนสูง มีผลทำให้เกิดการสลายตัวของรงควัตถุมากกว่าการผลิตเอทิลีนน้อย นอกจากนี้ในระหว่างการปักแจกันดอกบัวสังเกตเห็นว่าปลายกลีบ petaloid staminode จะค่อยๆ แห้งเป็นสีน้ำตาลและเปลี่ยนเป็นสีดำ และจากการวัดพื้นที่รอยดำบนสีด้าที่บริเวณ petaloid staminode พบว่า วิธีการที่ 4 มีพื้นที่รอยดำบนสีด้าที่บริเวณ petaloid staminode น้อยที่สุด เฉลี่ย 9.59 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 4.5) ในขณะที่วิธีการควบคุมเฉลี่ย 17.61 ตารางเซนติเมตร ซึ่งอาการนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการขาดน้ำ และกระตุ้นให้เกิดการผลิตเอทิลีน เอทิลีนจะทำให้ดอกเหี่ยวเฉา (Nowak and Rudnicki. 1990) ซึ่งวิธีการที่ 4 ดูน้ำได้มาก จึงทำให้เกิดการสูญเสียน้ำน้อย และผลิตเอทิลีนน้อยที่สุด



ภาพที่ 5.1 อายุการปักแจกัน(ก) ปริมาณการดูน้ำรวม 5 วัน(ข) เปอร์เซ็นต์น้ำหนักดอกที่ลดลง(ค) และความเข้มข้นของเอทิลีนเมื่อปักแจกันครบ 1 วันและ 5 วัน(ง) ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช จากการทดลองที่ 1 (control = ไม่จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน, T2 –T7 = จุ่มปลายก้านในน้ำร้อน 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่บนสื่อทางออนไลน์และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


5.2 การทดลองที่ 2

จากการทดลองหาวิธีการบรรจุดอกบัวตัดดอกที่ไม่พับกลีบลงในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจุด้วยน้ำแข็งเกล็ดอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีนและนำวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 คือการตัดปลายก้านจุ่มในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ก่อนการบรรจุหีบห่อมาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้ก้านดอกดูดน้ำได้ดี ผลปรากฏว่าวิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนเมื่อออกจากกล่องน้อยที่สุดเฉลี่ย 60.17 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง (ภาพที่ 5.2ก) ในขณะที่วิธีการควบคุมมีการผลิตเอทิลีนสูงถึง 93.26 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลจากการผลิตเอทิลีนมีแนวโน้มน้อยที่สุด น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 4.83 วัน (ภาพที่ 5.2ข) ดังที่ Nowak and Rudnicki (1990) รายงานว่า ดอกไม้จะตอบสนองต่อเอทิลีน โดยเอทิลีนมาจากสภาพแวดล้อมและมาจากการผลิตของดอกไม้เอง นอกจากนี้ปริมาณการผลิตเอทิลีนยังมีผลต่อการสูญเสียคุณภาพของดอกไม้ ปริมาณเอทิลีนยิ่งสูงจะสูญเสียคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิธีการที่ 4 เมื่อปักแจกันครบ 5 วันไปแล้ว ยังมีการสูญเสียน้ำหนักดอกน้อยกว่าวิธีการอื่นๆ (ตารางที่ 4.9) เฉลี่ย 11.03 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่ทำให้น้ำหนักดอกลดลงน้อยที่สุดและผลิตเอทิลีนได้ต่ำสุด น่าจะมาจากบรรจุน้ำแข็งเกล็ดไว้ในกล่องบรรจุดอกบัวในอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้เกิดความเย็นที่เหมาะสมช่วยรักษาคุณภาพของดอกบัวได้ดีที่สุด ลดการผลิตเอทิลีนได้ดีที่สุด แล้วยังให้ความชื้นที่สูงกว่าวิธีการควบคุม (ตารางที่ 4.14) ทำให้ดอกไม้เกิดการคายน้ำได้น้อยลงกว่าวิธีการควบคุม (จริงแท้ ศิริพานิช. 2544) ส่งผลให้อายุการปักแจกันดีกว่าวิธีการอื่นๆ ซึ่งการตัดสินใจอายุการปักแจกันส่วนหนึ่งมาจากการเกิดพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ซึ่งวิธีการที่ 4 นี้ เมื่อปักแจกันไปครบ 5 วัน ปรากฏพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มีแนวโน้มน้อยที่สุด (ตารางที่ 4.9) เพียง 0.48 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่วิธีการควบคุมปรากฏพื้นที่รอยตำหนิสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ถึง 3.04 ตารางเซนติเมตร

จากการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ยังพบอีกว่าวิธีการที่ 4 (น้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3) นี้มีแนวโน้มรักษาสีของกลีบดอก และสีของ petaloid staminode (ตารางที่ 4.7) ได้ดีกว่าวิธีการควบคุม และมีการขยายตัวของวง petaloid staminode มากที่สุด (ตารางที่ 4.9) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวัดปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานินเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน พบว่ามีปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานินเฉลี่ย 109.32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.9) ซึ่งมากกว่าวิธีการควบคุมที่มีปริมาณโมโนเมอร์คแอนโรไฮยานินเฉลี่ย 86.72 มิลลิกรัมต่อลิตร

มีข้อสังเกตว่า การใช้ความเย็นให้กับดอกบัวที่ไม่พับกลีบด้วยน้ำแข็งเกล็ดในกล่องบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ช่วยลดการผลิตเอทิลีนและช่วยให้อายุการปักแจกันดีขึ้น แต่ดอกไม้เมื่อเอาออกจากกล่อง กลีบดอกจะ

สดแข็ง ดังนั้น ถ้าจะใช้ประโยชน์โดยการปักกลีบควรปักดอกทิ้งไว้ให้หายเย็นก่อนพับ มิฉะนั้นกลีบจะฉ่ำและร่วงง่ายขณะพับกลีบ



ภาพที่ 5.2 ความเข้มของเอทิลีนหลังนำออกจากร่อง และเมื่อปักแจกันครบ 5 วัน(ก) และอายุการปักแจกัน(ข) ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สัตตบงกช (ไม่พับกลีบ) จากการทดลองที่ 2 (control = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 –T5 = มีน้ำแข็งเกล็ดบรรจุถุงพลาสติกในอัตราส่วนน้ำหนัkdอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1, 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)


5.3 การทดลองที่ 3

จากการทดลองหาวิธีการบรรจุดอกบัวตัดดอกที่พับกลีบแล้วลงในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจุด้วยน้ำแข็งเกล็ดอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีนและนำวิธีการที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 คือการตัดปลายก้านจุ่มในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ก่อนการบรรจุหีบห่อมาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้ก้านดอกดูดี ผลปรากฏว่าวิธีการที่ 5 (น้ำหนัkdอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:2) มีการผลิตเอทิลีนเมื่อออกจากกล่องน้อยที่สุดเฉลี่ย 46.90 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง (ภาพที่ 5.3ก) แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการควบคุมที่มีการผลิตเอทิลีนสูงถึง 81.83 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่เมื่อปักแจกันต่อไปจนครบ 4 วัน ผลปรากฏว่า วิธีการที่ 2 (น้ำหนัkdอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) มีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุด เฉลี่ย 54.74 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลจากการผลิตเอทิลีนมีแนวโน้มน้อยที่สุด น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการปักแจกันมีแนวโน้มดีที่สุดเฉลี่ย 3.83 วัน (ภาพที่ 5.3ข) เหมือนดังที่ Nowak and Rudnicki (1990) รายงานว่า ดอกไม้จะตอบสนองต่อเอทิลีน โดยเอทิลีนมาจากสภาพแวดล้อมและมาจากการผลิตของดอกไม้เอง โดยปริมาณการผลิตเอทิลีนมีผลต่อการสูญเสียคุณภาพของดอกไม้เร็วหรือช้า ถ้าปริมาณเอทิลีนสูงจะสูญเสียคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้า

ผลิตปริมาณน้อยคุณภาพการใช้ประโยชน์จะนานขึ้น นอกจากนี้วิธีการที่ 2 เมื่อปักแจกันครบ 4 วันไปแล้ว ยังมีการสูญเสียน้ำหนักดอกน้อยกว่าวิธีการอื่นๆ เฉลี่ย 7.70 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4.13) ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ดอกไม้ผลิตเอทิลีนน้อยกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะถ้าพืชไม่ขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวจะผลิตเอทิลีนน้อยลง (Suisuwan Pichayanon. 2002) ที่ส่งผลให้อายุการปักแจกันดีกว่าวิธีการอื่นๆ

จากการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ยังพบอีกว่าวิธีการที่ 2 (น้ำหนักดอก: น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:1) นี้มีแนวโน้มรักษาสีของกลีบดอก และสีของ petaloid staminode (ตารางที่ 4.11) ได้ดีกว่าวิธีการควบคุมและมีเปอร์เซ็นต์การขยายตัวของวง petaloid staminode มากที่สุด (ตารางที่ 4.13) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวัดปริมาณโมโนเอทิลีนแอนโรไฮยานินเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน พบว่ามีปริมาณโมโนเอทิลีนแอนโรไฮยานินเฉลี่ย 115.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4.13) ซึ่งมากกว่าวิธีการควบคุมที่มีปริมาณโมโนเอทิลีนแอนโรไฮยานินเฉลี่ย 87.17 มิลลิกรัมต่อลิตร และพื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode ของวิธีการที่ 2 นี้ เมื่อปักแจกันไปครบ 4 วัน ปรากฏว่าพื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode มีแนวโน้มน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.92 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 4.13) ในขณะที่วิธีการควบคุมมีพื้นที่รอยดำหนีสีดำที่บริเวณ petaloid staminode เฉลี่ย 4.35 ตารางเซนติเมตร


มีข้อสังเกตว่า การใช้ความเย็นให้กับดอกบัวที่ปักกลีบด้วยน้ำแข็งเกล็ดในกล่องบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ช่วยให้ดอกไม้มีคุณภาพดีขึ้น แต่พบว่าทุกวิธีการมีสีม่วงเกิดขึ้นที่ขอบกลีบของก้านชูละของเกสรตัวผู้ และสีม่วงนั้นจะหายไปเมื่อเอาไปปักแจกันด้วยการลอยในอ่างน้ำ



ภาพที่ 5.3 ความเข้มของเอทิลีนหลังนำออกจากกล่อง และเมื่อปักแจกันครบ 4 วัน(ก) และอายุการปักแจกัน(ข) ของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) พันธุ์สดตบงกช (ปักกลีบ) จากการทดลองที่ 3 (control = ไม่ใช้น้ำแข็งเกล็ด, T2 –T5 = มีน้ำแข็งเกล็ด) เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับเผยแพร่ในวงจำกัดเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
บรรจจุณพลาสติก ในอัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 , 1 : 1, 2 : 3 และ 1 : 2 ตามลำดับ)

5.4 การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องระหว่างเลียนแบบการขนส่งของการทดลองที่ 2 และการทดลองที่ 3

เมื่อได้วัดอุณหภูมิภายในกล่องบรรจุหีบห่อระหว่างการเลียนแบบการขนส่งช่วงจากนาบัวไปสนามบิน (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง) ปรากฏว่า อุณหภูมิภายในกล่องของการทดลองที่ 2 มีแนวโน้มสูงกว่าการทดลองที่ 3 (ภาพที่ 5.4ก) สาเหตุอาจมาจากการทดลองที่ 2 เมื่อถึงห้องปฏิบัติการได้ทำการบรรจุหีบห่อทันที อาจมีความร้อนยังคงติดมาจากนาบัว ทำให้อุณหภูมิภายในกล่องสูงกว่าการทดลองที่ 3 ซึ่งดอกไม้มารอการพับกลีบ และใช้เวลาในการพับกลีบในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นห้องปรับอากาศอุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ทำให้ดอกไม้ก่อนการบรรจุลงกล่องมีความเย็นมากกว่าการทดลองที่ 2 และผลจากอุณหภูมิดังกล่าวจึงทำให้ปริมาณเอทิลีนของดอกบัวในการทดลองที่ 2 สูงกว่าการทดลองที่ 3 สอดคล้องกับการที่มีรายงานว่าอุณหภูมิสูงมีผลกระตุ้นให้ผลิตเอทิลีนมากขึ้น (จริงแท้ ศิริพานิช, 2544)



ภาพที่ 5.4 อุณหภูมิภายในกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ (ก) อุณหภูมิในกล่องกระดาษลูกฟูกที่ 7 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง (ข) และการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีก อุณหภูมิในกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง (ค)
ของการทดลองที่ 2 และ การทดลองที่ 3

ต่อมาเมื่อให้กล่องบรรจุหีบห่อดอกบัวอยู่ในอุณหภูมิที่เลียนแบบการขนส่งจากสนามบินไปฮ่องกง (7 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง) ปรากฏว่า อุณหภูมิของการทดลองที่ 2 มีแนวโน้มต่ำกว่าการทดลองที่ 3 (ภาพที่ 5.4ข) สาเหตุน่าจะเป็นผลมาจากดอกบัวที่พับกลีบในการทดลองที่ 3 มีรอยชำจากการพับและกลีบดอกทุกชั้นสัมผัสกับความเย็นมากกว่าการทดลองที่ 2 ที่ไม่มีรอยชำจากการพับกลีบ การชำเป็นผลให้พืชผลิตเอทิลีน และเอทิลีนกระตุ้นให้มีอัตราการหายใจสูงขึ้น (จริงแท้ ศิริพานิช, 2544) เมื่อมีปริมาณอัตราการหายใจสูง อุณหภูมิของพืชก็จะสูงขึ้น และคายความร้อนออกมาทำให้บรรยากาศภายในกล่องสูงขึ้นมีผลทำให้อุณหภูมิภายในกล่องสูงขึ้นกว่าการทดลองที่ 2 ที่ไม่มีรอยชำของกลีบดอก

ส่วนอุณหภูมิที่เลียนแบบการขนส่งช่วงสุดท้าย คือ ระหว่างรองส่งผู้ขายปลีก (25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง) ก็เป็นผลในทำนองเดียวกันกับการเลียนแบบช่วงที่ 2 (ภาพที่ 5.4ค)ข้างต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษาวิธีการบรรจุมลพิษภัณฑ์สำหรับการส่งออกดอกบัวหลวง

(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช เพื่อการขนส่งระยะทางไกล สรุปได้ว่า

1. การทดลองหาอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสมสำหรับช่วยกำจัดน้ำยาง ที่รอยตัดปลายก้านดอกที่มาอุดต้นท่อน้ำ เพื่อให้ก้านดอกดูดน้ำและสารละลายได้ดีขึ้นของดอกบัวหลวง (*Nelumbo nucifera* Gaertn.) ตัดดอกพันธุ์สัตตบงกช ผลปรากฏว่า ก่อนการบรรจุหีบห่อและก่อนการปักแจกัน ควรจุ่มปลายก้านดอกในน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 วินาที จะช่วยให้ดอกไม้ดูดน้ำได้ดี เมื่อปักแจกันไป 5 วัน มีแนวโน้มการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 53.14 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 4.67 วัน ขณะที่วิธีการควบคุมการผลิตเอทิลีน เฉลี่ย 65.01 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.67 วัน

2. การทดลองหาวิธีการบรรจูดอกบัวตัดดอกที่ไม่พับกลับ ลงในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจด้วยน้ำแข็งเกล็ดอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีน สรุปได้ว่า วิธีการที่ 4 อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2:3 จะช่วยทำให้ดอกไม้เมื่อออกจากกล่องมีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดเฉลี่ย 60.17 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับวิธีการควบคุมที่มีการผลิตเอทิลีนสูงที่สุด เฉลี่ย 93.26 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และวิธีการที่ 4 นี้ มีอายุการปักแจกันมีแนวโน้มมากที่สุดเฉลี่ย 4.83 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุม เฉลี่ย 3.17 วัน

3. การทดลองหาวิธีการบรรจูดอกบัวตัดดอกที่พับกลับแล้ว ลงในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยให้ความเย็นกับดอกบัวในกล่องบรรจด้วยน้ำแข็งเกล็ดอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ดอกบัวลดการผลิตเอทิลีน สรุปได้ว่า วิธีการที่ 5 อัตราส่วนน้ำหนักดอก:น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 1:2 มีการผลิตเอทิลีนเมื่อออกจากกล่องน้อยที่สุด เฉลี่ย 46.90 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แตกต่างทางสถิติกับวิธีการควบคุมที่มีการผลิตเอทิลีนสูงถึง 81.83 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่เมื่อปักแจกันต่อไปจนครบ 4 วัน วิธีการที่ 2 อัตราส่วนน้ำหนักดอก : น้ำหนักน้ำแข็งเกล็ด 2 : 1 มีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุด เฉลี่ย 54.74 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันดีที่สุดเฉลี่ย 3.83 วัน ในขณะที่วิธีการควบคุมมีการผลิตเอทิลีน เฉลี่ย 59.77 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีอายุการปักแจกันน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.17 วัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ค้นแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- กสิน สุวตะพันธ์. 2500. บัณานาพันธุ์. น. 40-49. ในจารีย์ หอยทอง. "การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวงบางชนิดในประเทศ". วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จารีย์ หอยทอง. 2519. "การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวบางชนิดในประเทศไทย". วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จิ่งแท้ ศิริพานิช. 2544. **สรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
- . 2549. **ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวางของพืช**. นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ.
- จิรา ณ หนองคาย. 2531. **เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้**. กรุงเทพฯ: แมส พับลิชชิง.
- ช.นิญฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. 2545. **เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก**. กรุงเทพฯ: ประดิพัทธ์.
- ช.นิญฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และคณิงนิจ พิชญานนท์. 2544. "การทดลองหาวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช (*Nelumbo nucifera* Gaertn.)". น. 167. ในรายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร.
- ชุมพล มากทอง. 2547. "การพัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช (*Nelumbo nucifera* Gaertn.)". วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- นิธิยา รัตนานนท์ และदनัย บุญเกียรติ. 2537. **การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้**. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์.
- นิธิยา รัตนานนท์ และदनัย บุญเกียรติ. 2548. **การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้**. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
- ปริมลาก วสุวัต และเสริมลาก วสุวัต. 2547. **บัวประดับในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.
- ผกานันท์ กลัดภาณี และสุธารัตน์ ประภารัตน์. 2539. "การใช้เทคนิคพิเศษลดน้ำค้างที่ก้านดอกบัวหลวงพันธุ์บุณชริก (*Nelumbo nucifera* Gaertn.)". ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง. มปป. บทปฏิบัติการที่ 5 ดัชนีการปฏิรูปและองค์ประกอบทางเคมี. หน่วยปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

สายชล เกตุษา. 2531. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุปราณี วณิชชานนท์. 2540. ไม้ตัดดอก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เพื่อนเกษตร.

เสกสรร วรรณกรี. 2546. "การใช้สารละลายเคมียืดอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวง พันธุ์สัตตบงกช (*Nelumbo nucifera* Gaertn.)". ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

_____. 2547. "การทดลองหาวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบงกช (*Nelumbo nucifera* 'Album Plenum') วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เสริมลาภ วสุวัต. 2537. บัว : ไม้ดอกไม้ประดับ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พรินติ้ง แอนพับลิชชิง.

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548. สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.

สมเพียร เกษมทรัพย์. 2532. เทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจไม้ตัดดอก. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

อรรวรรณ วิชัยลักษณ์ และภุริพันธ์ สุวรรณเมฆ. ม.ป.ป. บัวหลวง. [Online]. Available :

<http://www.doae.go.th/library/html/detail/sacreslotus/index.htm>

Abeles, F.B., Morgan, P.W. and Staltveit.M.E. 1992. Ethylene in Plant Biology, Second Edition, California : Academic Press.

Bartz, J.A. and Brecht., J.K. 2003. Postharvest Physiology Pathology of Vegetables. New York: Marcel Dekker.

Buchanan, B. B., Gruissem, W. and Jones, R.L. 2000. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. Rockville : Courier Companies.

Bennett, A. B. and O'Neill, S.D., editor. 1990. Horticultural Biotechnology. New York : Wiley Liss, Inc.

เอกสารนี้ Fosket, D.E. 1944. Plant Growth and Development, A Molecular, Approach. California : การค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนี้ Academic Press. แปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

นางสาวมณฑิรา บุญวาที เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ที่จังหวัดตราด

ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2542 – 2545 ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

- ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน ศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

มณฑิรา บุญวาที และ ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. 2548. ผลของสเปรย์เคลือบผสมชนิดต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมแอนนา (*Dendrobium Anna*) อบแห้ง. น. 91 ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 26 – 29 เมษายน 2548 ณ โรงแรมเวลด์มจอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี : ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้