



**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

**ปัญหาพิเศษปริญญาตรี**

**เรื่อง**

**การสลายตัวของเมทริลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บรักษาในตู้เย็น**

**The Degradation of Methyl parathion in**

**Chinese kale which Stored in Refrigerator**



T098988

โดย

**นายทวีศักดิ์ จรัสทรัพย์**



๒๕๑๑  
๗๐๕๕๑๗  
๕๕๑๑

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน.....**98988**

วัน,เดือน,ปี.....**๒๕๑๑**

**ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต**

**สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช**

**ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**พ.ศ. 2542**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ใบรับรองปัญหาพิเศษ  
 ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
 ปริญญา  
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)


เรื่อง

การสลายตัวของเมทธิลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บรักษาในตู้เย็น  
**The Degradation of Methyl parathion in Chinese kale  
 which Stored in Refrigerator**

โดย

นายทวีศักดิ์ จรัสทรัพย์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

  
 .....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา อมรสิน)

ว/พ  
 ก ๒๒๘ ก  
 ๒๕๔๒

อาจารย์ที่ปรึกษา

18709  
 11 ก.ค. 2543


ภาควิชารับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรสาร)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง : การสลายตัวของเมทิลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บรักษาในตู้เย็น  
 โดย : นายทวีศักดิ์ จรัสทรัพย์  
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
 อาจารย์ที่ปรึกษา: .....  ..... 8 / 53 / 2563  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถักขณา อมรสิน)

### บทคัดย่อ

การศึกษาการสลายตัวของเมทิลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บรักษาในตู้เย็น ได้ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 การทดลอง คือ ไม่ฉีดพ่นสาร (กลุ่มควบคุม) ฉีดพ่นสารในอัตราตามคำแนะนำบนฉลาก (10 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร) และในอัตราสองเท่าของคำแนะนำบนฉลาก (20 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร) ตรวจสอบวิเคราะห์สารในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ผักคะน้าที่ฉีดพ่นในอัตราแนะนำและในอัตราสองเท่าจะมีปริมาณการตกค้างสูงกว่าค่าปลอดภัย ในวันที่ 0, 1, 3, 5, และ 7 ในวันที่ 0 ผักที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีปริมาณการตกค้างสูงกว่าค่าปลอดภัย และ สูงกว่าวันอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มที่ฉีดพ่นในอัตราแนะนำ การตกค้างในวันที่ 0 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 1 แต่มีความแตกต่างกับวันที่ 3, 5, และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การตกค้างในวันที่ 1 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 5 และ 7 และการตกค้างในวันที่ 3 ก็ต่างจากวันที่ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน การตกค้างในวันที่ 5 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 3 และ 7 กลุ่มที่ฉีดพ่นในอัตราสองเท่าของคำแนะนำมีปริมาณตกค้างวันที่ 0 สูงกว่าวันที่ 1, 3, 5, และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วันที่ 1 สูงกว่าวันที่ 3, 5, และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วันที่ 3 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 5 แต่ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 7.

Title : The Degradation of Methyl parathion in  
Chinese kale which Stored in Refrigerator

By : Taweesak Charunsup

Degree : Bachelor of Science in Agriculture

Major Field : Pest Management Technology

Advisor : ..... Luckkamon Amonsin ..... 8 / March / 2000 .....  
(Asst. Professor. Luckana Amonsin)

### Abstract

The study of methyl parathion degradation in Chinese kale which stored in refrigerator is conducted on October, 1999 to February, 2000. The experiment is designed as completely randomized designed (CRD), having 3 treatments, as no application (control), sprayed as recommended dose (10 ml./20 l. H<sub>2</sub>O) and double dose (20 ml./20 l. H<sub>2</sub>O). The analysis is done on 0, 1, 3, 5 and 7 days after keep in refrigerator by gas chromatography method. The results are found that methyl parathion residues in Chinese kale which sprayed as recommended dose and double dose are higher than the maximum residues limit (MRL) on 0, 1, 3, 5 and 7 days. On 0 days Chinese kale in control group are found that methyl parathion residues are higher than the MRL and have significant difference from the other days. In recommended dose group, methyl parathion residues on 0 day are higher and not significant different from 1 day. Methyl parathion residues on 1 day have significant difference from 5 and 7 days. Methyl parathion residues on 3 days have significant difference from 5 and 7 days. The residues on 5 days have no significant difference from 3, 7 days. Methyl parathion residues in Chinese kale of double dose group on 0 day are higher than that on 1, 3, 5 and 7 days, and have significant difference. Methyl parathion residues on 1 days are higher and have significant difference from 3, 5, and 7 days. Methyl parathion residues on 3 days have not significant difference from 5 days but are significant different from 7 days.

## คำนิยม

ในการจัดทำและรวบรวมปัญหาพิเศษฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ  
กรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา อมรสิน ประธานกรรมการที่ปรึกษาที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ  
และตรวจแก้ไขปัญหาพิเศษฉบับนี้ ทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่ให้ความอนุเคราะห์ ด้านเครื่องมือและ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ภัฏชานา มีแก้วกูญชร ที่กรุณาอนุเคราะห์ป้อนยูเรียและปุ๋ย  
คอก ในการเพาะปลูกผักคะน้า

ขอขอบคุณ คุณจรงค์ศักดิ์ พุ่มนวน นักวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
ที่กรุณาช่วยเหลือให้คำแนะนำในการใช้เครื่องวิเคราะห์ Gas Chromatography และ เครื่องมืออื่น ๆ  
รวมทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยเหลือให้กำลังใจตลอดมา

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์  
ในการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา

นายทวีศักดิ์ จรัสทรัพย์

20 กุมภาพันธ์ 2543

## สารบัญ

## หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
คำนิยม	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	V
สารบัญภาพ	V
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	2
ตรวจสอบเอกสาร	3
อุปกรณ์และวิธีการ	14
ผลการทดลอง	19
วิจารณ์ผลการทดลอง	22
สรุป	23
ข้อเสนอแนะ	24
เอกสารอ้างอิง	25
ภาคผนวก	27

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่	หน้า
1. ปริมาณการตกค้างของเมทิลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น	20

รูปที่	สารบัญญภาพ	หน้า
1. แสดงสูตรโครงสร้างของเมทิลพาราไรออน		7
2. แสดงส่วนประกอบพื้นฐานการทำงานของเครื่อง gas chromatography		13
3. แสดงปริมาณการตกค้างของเมทิลพาราไรออนในผักคะน้า หลังการเก็บรักษาในตู้เย็นวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น		21

ตารางผนวกที่	หน้า
1. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทิลพาราไรออนที่สลายตัวในผักคะน้า ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากฉีดพ่นครั้งสุดท้าย	28
2. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทิลพาราไรออนที่สลายตัวในผักคะน้า ที่ฉีดพ่นตามอัตราแนะนำบนฉลากในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากฉีดพ่นครั้งสุดท้าย	30
3. แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทิลพาราไรออนที่สลายตัวในผักคะน้า ที่ฉีดพ่นตามอัตรา 2 เท่าของคำแนะนำบนฉลากในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากฉีดพ่นครั้งสุดท้าย	32

## คำนำ

ผักคะน้า (*Brassica alborglabra*) เป็นผักที่รู้จักกันดีและนิยมใช้บริโภคกันอย่างกว้างขวาง โดยจะรับประทานส่วนของใบและลำต้น คะน้ามีการเพาะปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกได้ง่ายและทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกต้องประสบอยู่เสมอๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน คือ การเข้าทำลายของแมลงศัตรูผัก เช่น เพลี้ยอ่อน คีบขี้หนวด หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม และแมลงศัตรูพืชอีกหลายชนิดอย่างรุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหายโดยแมลงดังกล่าวจะกัดกินใบเป็นรูพรุน ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบผักทำให้ใบผักเสียหาย ส่วนตัวหนอนจะเจาะเข้าทำลายลำต้นทำให้ต้นคะน้าเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด ผลจากการเข้าทำลายของแมลงศัตรูผักดังกล่าว ทำให้ลักษณะของผักคะน้าลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกจึงต้องหาวิธีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ วิธีการที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ก็คือ การใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปที่ผัก ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงเป็นอย่างดี

จากการสำรวจแหล่งที่ปลูกผักคะน้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกและการใช้สารพ่นผักคะน้าพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้านิยมใช้เมทริลพาราไรออน ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักคะน้า และเนื่องจากเกษตรกรทำการฉีดพ่นสารเคมีในปริมาณมาก รวมทั้งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดที่สารเคมีจะสลายตัว จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาพิษตกค้างในผักคะน้า ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงศึกษาหาระยะเวลาการสลายตัวของเมทริลพาราไรออนในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการสลายตัวของ เมทริลพาราไรออนในฝักคะน้า ที่เก็บรักษาในตู้เย็น
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการตกค้างของเมทริลพาราไรออนในฝักคะน้าในวันที่ 0,1,3,5 และ 7 หลังจากเก็บไว้ในตู้เย็น
3. เพื่อหาแนวทางในการบริโภคฝักคะน้าที่ฉีดพ่นด้วย เมทริลพาราไรออนอย่างปลอดภัย



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### ตรวจเอกสาร

ผักคะน้าเป็นผักที่นิยมบริโภคกันมาก โดยบริโภคส่วนของใบและลำต้น ผักคะน้ามีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย และปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ส่องกง ใต้หวัน มาเลเซีย จีนและไทย (อุคม, 2529) ผักคะน้าอยู่ในตระกูล Cruciferae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Brassica alboglabra* ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผักอายุ 2 ปี แต่มักนิยมปลูกเป็นผักปีเดียว สามารถขึ้นได้ในสภาพดินเกือบทุกชนิดที่มีความสมบูรณ์ มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน ปลูกได้ทุกฤดู แต่ช่วงเวลาที่ปลูกผักคะน้าได้ผลดีที่สุด คือ ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน (ทศพร, 2531) เนื่องจากผักคะน้าเป็นผักที่สามารถปลูกได้ตลอดปี จึงทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน ค้างคาว ผัก และแมลงอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องมีการป้องกันกำจัด เพื่อให้ผลผลิตไม่ถูกทำลาย หรือถูกทำลายน้อยที่สุด และการใช้สารพิษทางการเกษตรในการฉีดพ่นผัก ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรเลือกใช้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว การใช้สารพิษทางการเกษตรในปัจจุบัน มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และก็มีบ่อยครั้งที่สารพิษทางการเกษตร ก็ให้ผลกระทบมากกว่าที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ประเภทออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโนคลอรีน และคาร์บาเมต เป็นต้น

เนื่องจากการปลูกผักตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช รวมทั้งแมลงคือขา จึงต้องใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชเกินกว่าที่กำหนด การใช้บ่อยครั้งเกินความจำเป็น การที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของฉลาก และเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่สารพิษจะสลายตัวไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีสารพิษตกค้างในพืชผัก (อุคมลักษณะ, 2535)

### ความเป็นไปของวัตถุพิษในดิน

วัตถุพิษในดินจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากขบวนการต่างๆ ได้แก่ การถูกดูดซับโดยวัตถุพิษโดยอนุภาคดิน การเคลื่อนย้ายแพร่กระจายและการย่อยสลาย ซึ่งขบวนการต่างๆ พอดีสรุปได้ดังนี้

## 1. การดูดซับโดยอนุภาคดิน

การดูดซับ (adsorption) วัสดุที่มีพิษโดยอนุภาคดิน มีบทบาทสำคัญต่อสถานภาพและพฤติกรรมของวัสดุที่มีพิษ โดยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายและแพร่กระจาย การระเหยกลายเป็นไอและการสลายตัวของวัสดุที่มีพิษในดินซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโดยอนุภาคดิน ได้แก่ คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุที่มีพิษ ปริมาณอนุภาคดินเหนียว (Clay) อินทรีย์วัตถุในดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ขนาดของอนุภาคดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของดิน (CEC) และอุณหภูมิ

คุณสมบัติที่มีบทบาทสำคัญต่อการถูกดูดซับ คือ ปริมาณอนุภาคดินเหนียวและปริมาณอินทรีย์วัตถุพบว่า ถ้าปริมาณสารอินทรีย์ที่ระดับ 6 % ทั้งอนุภาคดินเหนียว อินทรีย์วัตถุจะมีบทบาทในการดูดซับ หากปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูงๆ การดูดซับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ผิวของอินทรีย์วัตถุ สำหรับด้านวัสดุที่มีพิษนั้นคุณสมบัติที่มีบทบาทต่อการดูดซับ คือ ลักษณะโครงสร้างขนาดของโมเลกุล ความเป็นกรดเป็นด่าง การละลายน้ำและความมีขั้วของสาร

## 2. การเคลื่อนย้ายของวัสดุที่มีพิษในดิน

วัสดุที่มีพิษอาจมีการเคลื่อนย้ายโดยระเหยกลายเป็นไอหรือการเคลื่อนย้ายไปโดยมีน้ำเป็นตัวพาทำให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุที่มีพิษในดิน รวมทั้งแพร่กระจายไปยังสิ่งแวดล้อมอื่นได้ ซึ่งลักษณะของการเคลื่อนย้ายมีดังนี้

### 2.1 การระเหยกลายเป็นไอ

การระเหยกลายเป็นไอขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำในดิน การเคลื่อนที่ของอากาศ คุณสมบัติของวัสดุที่มีพิษ และคุณสมบัติของดิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ปริมาณอนุภาคดินเหนียวและ pH ของดิน ได้มีการศึกษามากมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการระเหยของวัสดุที่มีพิษในดินกับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินว่ามีทิศทางในการกลับกัน คือ เมื่ออินทรีย์วัตถุในดินสูงการระเหยจะน้อยลง เนื่องจากเกิดการดูดซึม (absorption) วัสดุที่มีพิษโดยอินทรีย์วัตถุ

## 2.2 การชะล้างโดยน้ำ

เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุมีพิษโดยการไหลไปกับน้ำโดยการไหลบ่าหน้าดิน (run off) หรือการเคลื่อนที่ในดินในแนวดิ่ง (leaching) ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการชะล้างของวัตถุมีพิษในดิน ได้แก่ คุณสมบัติการละลายน้ำของวัตถุมีพิษ ปริมาณน้ำฝน การดูดซับวัตถุมีพิษกับดิน ลักษณะของเนื้อดิน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ (เช่นการป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน จะส่งผลต่อการลดการเคลื่อนย้ายของวัตถุมีพิษจากการไหลบ่าหน้าดิน) Wauchope (1978) กล่าวว่าวัตถุมีพิษที่ละลายน้ำได้มากกว่า 10 ppm ส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายได้โดยการละลายน้ำ สำหรับวัตถุมีพิษที่ละลายได้น้อยกว่า ส่วนใหญ่จะดูดซับกับอนุภาคดินจึงถูกเคลื่อนย้ายไปโดยวิธีการไหลบ่าหน้าดินพร้อมกับการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน (erosion) แต่การศึกษาที่เกี่ยวข้องพบว่า การเคลื่อนย้ายของวัตถุมีพิษโดยน้ำไหลบ่าหน้าดิน มีความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัตถุมีพิษส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายในปริมาณน้อยกว่า 0.5 % ของวัตถุมีพิษที่ใช้ไป จากการศึกษาพบว่า สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนย้ายน้อยมาก เนื่องจากดูดซับอยู่กับอนุภาคดิน

## 3. การสลายตัวของวัตถุมีพิษ

วัตถุมีพิษในดินจะมีการสลายตัวโดยขบวนการต่างๆ ทำให้การตกค้างของวัตถุมีพิษลดลง ซึ่งขบวนการสลายตัวสามารถสรุปได้ดังนี้

### 3.1 การสลายตัวโดยแสง

แสงแดดที่มีความยาวคลื่น 290-450 nm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) มีพลังงานเพียงพอที่ทำให้วัตถุมีพิษส่วนมากเกิดการสลายตัว (photodecomposition) ที่บริเวณผิวน้ำดินมากๆ Herbert และ Miller (1990) พบว่าการสลายตัวโดยแสงของวัตถุมีพิษจำกัดอยู่ที่ผิวน้ำดินลึกลงไปเพียง 1 หรือ 2 มิลลิเมตรเท่านั้น การเกิดปฏิกิริยาสลายตัวด้วยแสงขึ้นกับระยะเวลาที่ได้รับแสง ความเข้มและความยาวคลื่นแสง คุณสมบัติของวัตถุมีพิษ คุณสมบัติตัวกลางที่วัตถุมีพิษยึดเกาะ ตัวทำละลายของวัตถุมีพิษ คุณสมบัติความเป็นกรดเป็นด่างของตัวทำละลาย รวมทั้งตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา เช่น สารอินทรีย์ในดิน มักดูดซับแสงในช่วงคลื่น UV ได้ดีจะกระตุ้นให้วัตถุมีพิษเกิดการสลายตัวโดยแสงมากขึ้น

## คุณสมบัติทางเคมี

เมทริลพาราไรออน เป็นของเหลวสีน้ำตาล มีกลิ่นคล้ายกระเทียม สามารถละลายได้ดีใน alcohol ketone และ aromatic hydrocarbons ไม่ละลายน้ำ มีจุดหลอมเหลวที่ 35-36 °C จะสลายตัวได้เร็วเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 140 °C หรือผสมกับด่าง

## คุณลักษณะของฤทธิ์ยา

เมทริลพาราไรออนเป็นสารที่คงสภาพอยู่ในดินในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การสลายตัวเกิดจากปฏิกิริยา oxidation, demethylation และ hydrolysis ได้กรด phosphoric และ 4-nitrophenol สารเมทริลพาราไรออนเคลื่อนที่ในดินได้น้อยมาก และไม่มีแนวโน้มที่จะซึมลงไปในน้ำใต้ดิน แต่อย่างไรก็ตามสารเมทริลพาราไรออนสามารถคงอยู่ในน้ำที่เป็นกลาง แต่จะสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในน้ำที่เป็นด่าง (พนิตา, 2538)

สำหรับอัตราการใช้ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไป ตามชนิดของแมลงศัตรูพืชและตามชนิดของผัก พืชผักโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 10-20 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นให้ทั่วทั้งต้นพืชที่พบแมลงระบาดอยู่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ใช้ในอัตรา 40-55 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 4-5 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชที่พบแมลงระบาดอยู่ (พิสิฐ, 2535)

## ความเป็นพิษของเมทริลพาราไรออน

พิษเฉียบพลัน เมทริลพาราไรออนมีค่าLD<sub>50</sub> ทางปาก(หนู) เท่ากับ 9-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทางผิวหนัง (กระต่าย) เท่ากับ 300-400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สิริวิวัฒน์, 2523) มีความเป็นพิษต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แมลงศัตรูพืช เช่น มีพิษสูงมากต่อผึ้ง นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นพิษต่อปลา ไล่เคื่อน เมื่อสัตว์เหล่านี้ได้รับสารเมทริลพาราไรออน ก็จะถ่ายออกมาสู่มนุษย์ (รัตนา, 2539)

เมทริลพาราไรออนสลายตัวได้ง่าย แต่มีพิษสูง เป็นพิษต่อพืชบางชนิด เช่น ฝ้าย ข้าวฟ่าง ไม้ดอกไม้ประดับ พืชตระกูลแตง แต่อาการพิษที่เกิดกับพืชเหล่านี้มักไม่มีความสำคัญ (มาโนช, 2532) ทั้งนี้หากใช้ตามคำแนะนำจะไม่มีมีผลเสียเกิดขึ้น พืชที่ผ่านการฉีดพ่นสารเมทริลพาราไรออน ควรทิ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 14 วัน (ศวัน, 2534) ระยะเวลาที่ควรทิ้งไว้ก่อนเก็บเกี่ยว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปเพิ่มขึ้น หรือวัตถุมีพิษบางชนิดอาจไปยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายวัตถุมีพิษ ทำให้การย่อยสลายเป็นไปได้ช้า ทำให้วัตถุมีพิษตกค้างอยู่ได้นาน (พนิดา, 2538)

### เมทริลพาราไรออน (Methyl parathion)


จากการค้นพบสารพาราไรออนของ Dr. Schrader นักเคมีผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมัน สารพาราไรออนได้ถูกจำหน่ายในท้องตลาด ภายใต้สารพิษที่ชื่อว่า “โฟลิดอล ดี 605 ” และด้วยเหตุที่มีประสิทธิภาพในการทำลายแมลงศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ทำให้โฟลิดอล ดี 605 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ คือเมทริลพาราไรออน โดยบริษัทผู้ผลิตเมทริลพาราไรออนออกจำหน่ายมีอยู่หลายบริษัท โดยจะใช้ชื่อแตกต่างกันไป แต่ชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ Folidol M (ปรีชา, 2530)เมทริลพาราไรออนที่ผลิตในท้องตลาด มีทั้งชนิดน้ำมัน ความเข้มข้นสูง(2 ปอนด์ / แกลลอน) ชนิดผงละลายน้ำได้และชนิดผงใช้พ่น

ชื่อทางเคมี O,O – Dimethyl – O – 4 – nitrophenyl phosphorothioate

ชื่อสามัญ เมทริล พาราไรออน (methyl parathion) พาราไรออน เมทริล (parathion methyl) เมทค้ำฟอส (metaphos)

ชื่อทางการค้า คาล์ฟ (Dalf) โฟลิดอล เอ็ม (Folidol M) ในตรอกซ์ 80 และเทคไวซา (Tekwaisa) (วิเชียร, 2535)

มีสูตรโครงสร้างทางเคมีแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงสูตร โครงสร้างของเมทริลพาราไรออน

ที่มา : จันทรทิพย์ ธำรงศรีสกุล. 2531. วัตถุมีพิษทางการเกษตร. วัตถุมีพิษ.15(3) : 128-131.

### คุณสมบัติทางเคมี

เมทิลพาราไรออน เป็นของเหลวสีน้ำตาล มีกลิ่นคล้ายกระเทียม สามารถละลายได้ดีใน alcohol ketone และ aromatic hydrocarbons ไม่ละลายน้ำ มีจุดหลอมเหลวที่ 35-36 °C จะสลายตัวได้เร็วเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 140 °C หรือผสมกับด่าง

### คุณลักษณะของฤทธิ์ยา

เมทิลพาราไรออนเป็นสารที่คงสภาพอยู่ในดินในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การสลายตัวเกิดจากปฏิกิริยา oxidation, demethylation และ hydrolysis ได้กรด phosphoric และ 4-nitrophenol สารเมทิลพาราไรออนเคลื่อนที่ในดินได้น้อยมาก และไม่มีแนวโน้มที่จะซึมลงไปในน้ำใต้ดิน แต่อย่างไรก็ตามสารเมทิลพาราไรออนสามารถคงอยู่ในน้ำที่เป็นกลาง แต่จะสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในน้ำที่เป็นด่าง (พนิดา, 2538)

สำหรับอัตราการใช้ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไป ตามชนิดของแมลงศัตรูพืชและตามชนิดของผัก พืชผักโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 10-20 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นให้ทั่วทั้งต้นพืชที่พบแมลงระบาดอยู่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ใช้ในอัตรา 40-55 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 4-5 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชที่พบแมลงระบาดอยู่ (พิสิฐ, 2535)

### ความเป็นพิษของเมทิลพาราไรออน

พิษเฉียบพลัน เมทิลพาราไรออนมีค่าLD<sub>50</sub> ทางปาก(หนู) เท่ากับ 9-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทางผิวหนัง (กระต่าย) เท่ากับ 300-400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สิริวัฒน์, 2523) มีความเป็นพิษต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แมลงศัตรูพืช เช่น มีพิษสูงมากต่อผึ้ง นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นพิษต่อปลา ไล่เดือน เมื่อสัตว์เหล่านี้ได้รับสารเมทิลพาราไรออน ก็จะถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ (รัตนา, 2539)

เมทิลพาราไรออนสลายตัวได้ง่าย แต่มีพิษสูง เป็นพิษต่อพืชบางชนิด เช่น ฝ้าย ข้าวฟ่าง ไม้ดอกไม้ประดับ พืชตระกูลแตง แต่อาการพิษที่เกิดกับพืชเหล่านี้มักไม่มีความสำคัญ (มาโนช, 2532) ทั้งนี้หากใช้ตามคำแนะนำจะไม่มีผลเสียเกิดขึ้น พืชที่ผ่านการฉีดพ่นสารเมทิลพาราไรออน ควรทิ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 14 วัน (ค้วน, 2534) ระยะเวลาที่ควรทิ้งไว้ก่อนเก็บเกี่ยว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากฉีดสารฆ่าแมลงครั้งสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดีควรได้ค้ำนึ่งให้มากที่สุด เพื่อทิ้งระยะเวลาให้สารฆ่าแมลงได้สลายตัวก่อน สารฆ่าแมลงสามารถสลายตัวได้เร็วที่สุดในพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากน้ำย่อยและปฏิกิริยาทางเคมีในพืช (ขวัญชัย, 2527)

การเป็นพิษเนื่องจากเมทธิลพาราไรออนมีสาเหตุ 3 ประการ คือ

1. เกิดจากการปฏิบัติงานขณะฉีดพ่น
2. เกิดจากการกินผัก ผลไม้และอาหารที่มีการปนเปื้อนของเมทธิลพาราไรออน
3. เกิดจากการกินเพื่อฆ่าตัวตาย

เมทธิลพาราไรออนเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางปาก ทางผิวหนัง และทางหายใจ การปฏิบัติงานในบริเวณที่อับลม และอุณหภูมิสูงจะส่งเสริมให้มีอันตรายมากขึ้น (จันทร์ทิพย์, 2535) เมทธิลพาราไรออน จัดเป็นสารพิษระดับที่ได้รับเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ (ประยูร, 2535) ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจะมีอาการพิษเกิดขึ้นภายใน 1-4 ชั่วโมงหลังจากได้รับสารพิษจากเมทธิลพาราไรออน

ผู้ป่วยที่ได้รับสารเมทธิลพาราไรออน จะรู้สึกแน่นหน้าอก มีเหงื่อ ม่านตาหด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งในช่องท้อง ท้องเดิน กล้ามเนื้อกระตุก น้ำลายไหลยืด (ปกรณ, 2526)

อาการพิษเนื่องจากการสะสมของอะเซทิลโคลีน ในระบบประสาทแบ่งเป็น 3 ลักษณะอาการ คือ

1. อาการพิษแบบมัสคารินิก (muscarinic effects)
2. อาการพิษแบบนิโคตินิก (nicotinic effects)
3. อาการพิษที่ระบบประสาทส่วนกลาง

### อาการพิษแบบมัสคารินิก (muscarinic effects)

มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ำตาไหล หัวใจเต้นเร็ว ม่านตาหด มีเสมหะและเหงื่อออกมาก หลอดลมบีบตัว ทำให้เกิดอาการไอ

### อาการพิษแบบนิโคตินิก (nicotinic effects)

มีอาการสั่น ต่อมมีมีอาการอ่อนเพลีย และเป็นอัมพาต

### อาการพิษที่ระบบประสาทส่วนกลาง

ระยะแรกระบบประสาทส่วนกลางจะถูกกระตุ้น แต่ระยะหลังถูกกดทำให้เกิดอาการชัก สับสน กระวนกระวาย และหมดสติ ถ้าอาการรุนแรงอาจถึงตายได้ เนื่องจากระบบประสาทล้มเหลว (พาลาก, 2537)

สารเมทิลพาราไรออนจะถูกสังเคราะห์ให้มี Functional group ใกล้เคียงกับอะเซทิลโคลีน ซึ่งเป็นสารที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด หรือเป็นสื่อในการส่งข้อมูลถ่ายทอดไปยังเซลล์ประสาทต่างๆ ดังนั้นเมทิลพาราไรออน จึงสามารถมีปฏิกิริยาทางชีวเคมี โดยตรงกับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส มีผลในการยับยั้งการทำงานของระบบประสาท ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือแมลง (สุปราณี, 2536)

### การแก้พิษและการรักษา

- สารพิษถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด
- สารพิษเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
- สารพิษเข้าปาก ต้องทำให้อาเจียนโดยเร็ว โดยการล้วงคอ หรือให้ดื่มน้ำเกลือ

(เกลือ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำอุ่น 1 แก้ว) รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมด้วยภาชนะบรรจุสารพิษนั้น ให้อาหารกับผู้ป่วยที่หมดสติ หากมีอาการตามัว ปวดเกร็งในช่องท้อง และแน่นหน้าอก ควรรีบให้ atropine 1/100 เกรน 2 เม็ดทันที (จันทร์ทิพย์, 2531)

### คำแนะนำสำหรับแพทย์

สำหรับผู้ป่วยฉีด atropine ขนาด 2-4 mg. IV และฉีดซ้ำในขนาด 2 mg. ทุก 10-15 นาที จนอาการพิษลดลง อาจให้ 2-PAM ขนาด 1 mg. / 20cc. IV ฉีดเข้าเส้นร่วมด้วย ห้ามใช้ morphine theophylline หรือ aminophylline แก่ผู้ป่วย (ประยูร, 2535)

### Gas Chromatography

เป็นเครื่องมือที่ใช้แยก และวิเคราะห์สารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เทคนิคของ Gas Chromatography คือแยกของผสมให้เป็น gas phase ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ แล้วผ่านไปยังคอลัมน์ที่บรรจุด้วยเฟสคงที่ (stationary phase) มาสัมผัสกับตัวกลางที่อยู่กับที่นั้น ซึ่งสารแต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการแยกตัว (partition) ต่างกัน ทำให้เมื่อ mobile phase พาสารเคลื่อนที่ผ่านไปตาม stationary phase ในช่วงเวลาหนึ่งๆ สารแต่ละตัวจะถูกแยกจากกันได้ในเวลาที่แตกต่างกัน

Gas Chromatography แบ่งตาม stationary phase เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

#### 1. Gas – Solid Chromatography (GSC.)

ใช้ stationary phase ที่เป็นของแข็ง เป็นตัว adsorption สารที่เป็นแก๊ส และไม่มีสารอื่นเคลือบอยู่ และเป็น โมเลกุลเล็กๆ เพราะฉะนั้นในคอลัมน์ที่บรรจุด้วย active solids เป็น โมเลกุล sieves หรือ porous polymers, Silica gel, alumina, activated carbon เป็นต้น

#### 2. Gas – Liquid Chromatography (GLC.)

สารที่อยู่ด้วยกันจะสามารถแยกออกจากกันได้ ด้วยการกระจายตัวที่ต่างกันของแก๊สระหว่าง stationary phase { ที่มีของเหลว (Liquid phase) ฉาบอยู่บนของแข็ง (Solid support) ในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ} กับ mobile phase หรือมีค่า partition : coefficient ต่างกัน Gas Chromatography ชนิดที่มีของเหลวเป็น stationary phase มีความสำคัญมากกว่าทั้งนี้นับตั้งแต่ Martin และ James ได้เสนอรายงานแนะนำ Gas – Liquid Chromatography เป็นครั้งแรก ใน ค.ศ. 1952 ก็ได้พัฒนามาพร้อมกับให้มีการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ เช่น เคมี ชีววิทยา ตลอดจนงานทางด้านวิศวกรรม


## ส่วนประกอบของเครื่อง Gas Chromatography

เครื่อง Gas Chromatography โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญดังรูปที่ 2 ทั้งนี้เครื่องจะทำงานโดย carrier gas ที่ทำหน้าที่เป็น mobile phase ซึ่งจะถูกทำให้ไหลเข้าไปในคอลัมน์ เมื่อสารผสมที่จะถูกวิเคราะห์ถูกฉีด (inject) เข้าที่ส่วนที่ใช้ฉีดสาร (injection part) สารนั้นจะถูกพาเข้าไปในคอลัมน์ ซึ่งต่อกับเครื่องตรวจวัด (detector) เครื่องตรวจวัดจะทำหน้าที่ให้สัญญาณเมื่อได้รับสารที่ออกจากคอลัมน์ และส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องบันทึกข้อมูล (recorder) ซึ่งจะบันทึกข้อมูลออกมาเพื่อนำไปแปลผล ส่วนประกอบที่สำคัญของ Gas Chromatography จะมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

**Carrier Gas** : ทำหน้าที่นำสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ผ่านเข้าไปในคอลัมน์ไปยังเครื่องตรวจวัด แก๊สที่ใช้เป็น carrier gas ต้องมีคุณสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย มีมวลโมเลกุลต่ำ และมีค่าความจุความร้อนสูง carrier gas ที่นิยมใช้คือ ไนโตรเจน ( $N_2$ ) และฮีเลียม (He) การใช้แก๊สเป็น mobile phase นี้ทำให้ความสมดุลระหว่างสองตัวกลางเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ Gas Chromatography เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง

**Column** : ถือเป็นหัวใจของเครื่อง Gas Chromatography ทั้งนี้เพราะกระบวนการแยกสารจะเกิดขึ้นที่คอลัมน์ ลักษณะทั่วไปของคอลัมน์จะประกอบด้วยสองส่วนคือ หลอดหรือท่อ (tubing) และ stationary phase ที่บรรจุอยู่ภายใน ในกรณีที่คอลัมน์มีลักษณะเป็นหลอดแก้วหรือโลหะ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 – 3.5 มม. และ stationary phase มีลักษณะเป็นของเหลวที่เคลือบอยู่บน solid support ที่มีลักษณะเป็นเม็ดๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.15 – 0.25 มม. เรียกคอลัมน์ชนิดนี้ว่า packed column

**Injection part** : เป็นส่วนที่ใช้ฉีดสารเข้าสู่คอลัมน์ ในกรณี packed column ซึ่งสามารถรับปริมาณสารตัวอย่างได้มาก ระบบจะไม่ยุ่งยาก สามารถฉีดสารเข้าสู่คอลัมน์ได้ โดยใช้เข็ม (micro syringe) ฉีดสารตัวอย่างเข้าไปใน injector part การตั้งอุณหภูมิที่ injector part ต้องตั้งให้สูงกว่าจุดเดือดของสารตัวอย่าง



รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบพื้นฐานการทำงานของเครื่อง gas chromatography

### ประโยชน์

1. สามารถหาค่าคงที่ทางเคมี ทางกายภาพ เช่น isotherms
2. ให้ผลการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
3. ใช้ตัวอย่างน้อย
4. เชื่อถือได้
5. อ่านผลได้ง่าย
6. อายุการใช้งานนาน

### การประยุกต์ใช้

1. สามารถแยกสารผสมได้หลายชนิด รวมทั้งสารที่คล้ายคลึงกันและสารที่มีส่วนประกอบเหมือนกันได้
2. วิธีการใช้ จะใช้ได้กับตัวอย่างหลายชนิด
3. มีความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ทางปริมาณและคุณภาพสูง แม่นยำ
4. ใช้ศึกษาโครงสร้างของสารเคมีตามปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
5. ใช้ในการเตรียมการทดลองตลอดจนการวิเคราะห์สารในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช และสารพิษต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม เช่น สารมลภาวะในอากาศ แหล่งน้ำ และดิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## อุปกรณ์และวิธีการ

### อุปกรณ์และสารเคมี

#### 1. อุปกรณ์ในการปลูกผัก

- ดิน
- แปลงปลูกขนาด 1.5 x 4.5 เมตร
- ปุ๋ยสูตร 16-16-16
- ปุ๋ยยูเรีย
- ปุ๋ยคอก
- เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า( คะน้าใบ )
- สารฆ่าแมลงเมทธิลพาราไรออน 50% w/v(EC) ของบริษัท เทพสยาม จำกัด
- ขวดฉีดพ่นสาร

#### 2. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

##### 2.1 เครื่องแก้วและอุปกรณ์อื่นๆ

- ตู้อบ (hot air oven)
- เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง (balance)
- เครื่องปั่น (blender)
- เครื่องลดปริมาตรอุณหภูมิต่ำ (flash evaporator)
- ตู้เย็น
- เครื่อง Gas Liquid Chromatography (GLC,GC) ยี่ห้อ shimadzu รุ่น 14 A
- แท่งแก้ว (stirring rod)
- กรวยแก้ว (funnel)
- บีกเกอร์ (beaker)
- ภาชนะแก้ว (glass wool)
- หลอดหยด (dropper)
- ขวดก้นกลม (evaporating flask and receiving flask)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กระจกบอกดวง (cylinder)
- ขวดใส่สาร (vial)
- ขาค้าง (stand)
- ปิเปต (pipette) ขนาด 0.2 และ 1.0 ml.
- ออโตปิเปต(outopipette)ขนาด 200-1000 $\mu$ l

## 2.2 สารเคมี

- ethyl acetate (A.R. grade, FLUKA)
- sodium sulfate ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) (A.R. grade, MERCK)
- standard methyl parathion เข้มข้น 0.72206 ppm.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการทดลอง

### 1. การปลูกผัก

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 3 วิธีการ ดังนี้ คือ

วิธีที่ 1 ผักที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารเมทธิลพาราไรออน (Control)

วิธีที่ 2 ผักที่ฉีดพ่นสารเมทธิลพาราไรออนในอัตราคำแนะนำบนฉลาก (Recommended Dose) คือ 10 mL/น้ำ 20 L

วิธีที่ 3 ผักที่ฉีดพ่นสารเมทธิลพาราไรออนในอัตราสองเท่าของคำแนะนำบนฉลาก (Double Dose) คือ 20 mL/น้ำ 20 L

สถานที่ทำการทดลองคือบริเวณโรงเรียนเพาะชำของภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ปลูกผักทดลองจำนวน 3 แปลง ปลูกผักโดยการบรรจุดินใส่ในแปลงทดลองขนาด 1.5 x 4.5 เมตร ให้เกือบเต็มหลังจากนั้นทำการข่อยดินให้ละเอียดแล้วผสมปุ๋ยคอก หยอดเมล็ดกลงแปลงโดยใช้ระยะระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวห่าง 40 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด กลบดินหนา 0.5 เซนติเมตร

ปลูกคะน้าวันที่ 24 ตุลาคม 2542 เมื่อต้นกล้าอายุได้ 17 วัน (10 พ.ย.) แยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

#### การปฏิบัติและบำรุงรักษา

1. รดน้ำวันละ 1 ครั้ง
2. พรวนดินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ทุกๆ 15 วันโดยการหว่านให้ทั่วแปลง
4. ใส่ปุ๋ยยูเรียทุกๆ 5 วัน ในขนาดเข้มข้น 5 %
5. กำจัดวัชพืชโดยการถอนทิ้ง

ใส่ปุ๋ยครั้งแรก เมื่อผักคะน้าอายุ 5 วันหลังจากแยกปลูก และเมื่ออายุ 23 วันหลังแยกปลูก

(2 ธันวาคม 2542) ทำการฉีดพ่นเมทริลพาราไรออนครั้งแรกในอัตราความเข้มข้น 10 ml./น้ำ 20 l. (Recommended Dose) และ Double Dose ใช้ความเข้มข้น 20 ml./ น้ำ 20 l. หลังจากนั้นจะฉีดพ่นสารทุกๆ 7 วัน และฉีดพ่นครั้งสุดท้ายเมื่อผักอายุ 45 วัน (23 ธันวาคม 2542)

## 2. การเก็บตัวอย่างผัก

สุ่มเก็บตัวอย่างผักคะน้า ในวันที่ 0 หลังจากฉีดพ่นเมทริลพาราไรออนครั้งสุดท้าย นำตัวอย่างผักคะน้าที่ได้นำมาทำการเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้ในการสกัดแยกสารในวันที่ 1, 3, 5 และ 7 โดยในวันที่ 0 เก็บผักมาสกัดแยกสารหลังฉีดพ่นสารทันที

## 3. วิธีการสกัดสารจากตัวอย่างผัก

หั่นตัวอย่างผักให้ละเอียดชั่งให้ได้  $50 \pm 0.5$  กรัม ใส่ในโถปั่น เติม ethyl acetate 100 ml และ Sodium sulfate 50 กรัม (sodium sulfate ก่อนนำมาใช้ต้องอบใน hot air oven ที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}\text{C}$  นาน 90 นาที ก่อน เพื่อกำจัดความชื้น) ปั่นนาน 3 นาที แล้วนำไปกรองผ่าน sodium sulfate เก็บสารละลายที่กรองได้เป็นส่วนที่ 1 จากนั้นเติม ethyl acetate 50 ml. และ sodium sulfate 25 กรัม ลงในส่วนที่เหลือจากการกรอง ปั่นนาน 3 นาที นำไปกรองผ่าน sodium sulfate เก็บสารละลายที่กรองได้เป็นส่วนที่ 2 เติม ethyl acetate 50 ml และ sodium sulfate 25 กรัม ลงในส่วนที่เหลือจากการกรอง ปั่นอีก 3 นาที นำมากรองผ่าน sodium sulfate เก็บสารละลายที่กรองได้เป็นส่วนที่ 3 นำสารละลายที่กรองได้ทั้ง 3 ส่วนมารวมกัน แล้วนำไปลดปริมาตรด้วยเครื่องลดปริมาตรอุณหภูมิต่ำ (Flash evaporator) ที่อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  ให้เหลือปริมาตร 2-7 ml. ใส่ใน vial แล้วเก็บที่อุณหภูมิ  $4^{\circ}\text{C}$

## 4. การตรวจวิเคราะห์หาเมทริลพาราไรออนโดยใช้เครื่อง Gas Chromatography

### 4.1 ข้อกำหนดของเครื่อง GC เพื่อการตรวจวิเคราะห์

เครื่องตรวจวัด (detector) : ชนิด Flame Photometric Detector (FPD)

Column : ใช้ packing column ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร ยาว 2.1 เมตร บรรจุด้วย 3 % OV-1 on 80/100 support silicon supelcoport

Temperature : column  $210^{\circ}\text{C}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	injector	250°C
	detector	260°C
Carrier gas	:	N <sub>2</sub> 50 ml/min
		H <sub>2</sub> 35 ml/min
		Air 100 ml/min

#### 4.2 การนิตสารเพื่อตรวจวิเคราะห์

Calibrate peak ของ standard จนกว่าค่า Retention time และความเข้มข้นคงที่และเท่ากับ ความเข้มข้นของ standard แล้วจึงนิตสารสกัดจากตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์และหาปริมาณ

- หมายเหตุ
- ต้อง calibrate standard ทุกวันก่อนทำการนิตสารสกัดจากตัวอย่างผัก
  - ถ้า peak ที่ได้ มีลักษณะห่วยตัด จะต้องทำการเจือจาง (dilution) สารสกัดตัวอย่างลงอีก

#### 5. การคำนวณปริมาณทั้งหมดของเมทริลพาราไรออน จากการสกัดตัวอย่าง

นำค่าความเข้มข้นของเมทริลพาราไรออน ที่ได้จากเครื่องมาทำการคำนวณหาปริมาณการตกค้างดังนี้ ปริมาณการตกค้างของเมทริลพาราไรออน =  $(A \times V) / W$

A = ค่าปริมาณการตกค้างที่คำนวณจากเครื่อง (ppm)

V = ปริมาตรที่ปรับจากสารสกัดตัวอย่าง (adjust volumn, 2 ml.)

W = น้ำหนักของตัวอย่างผักที่ใช้สกัด (g.)

### ผลการทดลอง

ปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออนที่ตรวจพบ ในผักคะน้าที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 พบว่าผักที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (control) มีปริมาณการตกค้างดังนี้ 2.528087, 0.15508, 0.085856, 0.08168, 0.0 พีพีเอ็ม ตามลำดับซึ่งปริมาณการตกค้างของ methyl parathion ในวันที่ 0 มีปริมาณสูงกว่าในวันที่ 1, 3, 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสูงเกินค่าปลอดภัย ส่วนปริมาณการตกค้างในผักคะน้าที่ฉีดพ่นในอัตราตามคำแนะนำบนฉลาก (recommended dose) คือ 6.487667, 5.371947, 4.379734, 3.162767, 2.525953 พีพีเอ็ม ตามลำดับซึ่งปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออน ในวันที่ 0 มีความแตกต่างกับวันที่ 1 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 3, 5 และ 7 การตกค้างในวันที่ 1 แตกต่างจากวันที่ 3 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ต่างจากวันที่ 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การตกค้างในวันที่ 3 แตกต่างจากวันที่ 5 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่แตกต่างจากวันที่ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ความแตกต่างในวันที่ 5 และ 7 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยที่ปริมาณการตกค้างตั้งแต่วันที่ 0-7 เกินค่าปลอดภัย ในอัตราสองเท่าของคำแนะนำบนฉลาก (double dose) ปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออน คือ 67.95033, 35.2936, 25.18135, 19.02496 11.74931 พีพีเอ็ม ซึ่งปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออน ในวันที่ 0 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับวันที่ 1, 3, 5 และ 7 การตกค้างในวันที่ 1 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 3, 5 และ 7 การตกค้างในวันที่ 3 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 5 แต่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 7 และการตกค้างในวันที่ 5 ก็แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับวันที่ 7 โดยที่ปริมาณการตกค้างตั้งแต่วันที่ 0-7 เกินค่าปลอดภัย ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออนในผักคะน้าที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น

วันที่เก็บเกี่ยว	ปริมาณการตกค้าง ppm <sup>1/</sup>		
	ไม่ฉีดพ่นสาร	อัตราแนะนำ	อัตรา 2 เท่า
0	2.528087 *A	6.487667 * A	67.95004 * A
1	0.15508 B	5.371947 * AB	35.2936 * B
3	0.085856 B	4.379734 * BC	25.18135 * C
5	0.08168 B	3.162767 * CD	19.02496 * C
7	0.0 B	2.525953 * D	11.74931 * D


<sup>1/</sup> ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ำ

\* หมายถึงปริมาณสารพิษที่ตรวจพบเกินค่ากำหนด MRL

ตัวเลขกำกับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญ กำกับด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น 95 %

โดย DMRT



รูปที่ 3 แสดงปริมาณการตกค้างของเมทิลีนบลูในผักคะน้าที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังจากเก็บไว้ในตู้เย็น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### วิจารณ์ผลการทดลอง

การตรวจวิเคราะห์พบปริมาณการตกค้างของเมทธิลพาราไรออนในผักคะน้าที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (control) อาจเป็นผลจากการปนเปื้อนละอองของสารจากการฉีดพ่นเมทธิลพาราไรออนในแปลงที่ฉีดพ่นในอัตราคำแนะนำ และ 2 เท่าของคำแนะนำเนื่องจาก แปลงทดลองทั้ง 3 อยู่ใกล้กัน รวมทั้งอาจเกิดจากละอองสารที่อยู่บนต้นคะน้าถูกพัดพาไปปนเปื้อนโดยลม ทั้งนี้ในวันที่ 0 ปริมาณการตกค้างจะสูงมากอาจเนื่องจากเก็บผักหลังจากการฉีดพ่นเพียง 1 ชั่วโมงซึ่งยังคงมีการตกค้างของเมทธิลพาราไรออนเกาะตามผิวใบและลำต้นของคะน้า ซึ่งในวันต่อมาสลายตัวลดลงได้อย่างรวดเร็วอาจเนื่องจากเอนไซม์ต่าง ๆ ที่อยู่ในผักยังมีอยู่มากและยังคงสภาพการทำงานได้ดีทำให้เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของสารได้เร็ว แต่หลังจากนั้นในวันที่ 3, 5 และ 7 เอนไซม์ และเซลล์ต่าง ๆ เสื่อมสลายไปทำให้การสลายตัวของสารลดลงหรือน้อยลงปริมาณการตกค้างในแต่ละวันจึงไม่ต่างกันมากเหมือนวันที่ 0 กับวันที่ 1

## สรุป

ผักคะน้าที่ฉีดพ่นด้วย methyl parathion ในอัตราแนะนำและอัตราสองเท่าของคำแนะนำ และนำไปเก็บรักษาในตู้เย็นมีปริมาณการตกค้างของ methyl parathion สูงกว่าปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 0 – 7 และจากการวิเคราะห์ผักคะน้าที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารพบว่าในวันที่ 1, 3, 5 และ 7 มีสารตกค้างต่ำกว่าค่าปลอดภัย ส่วนวันที่ 0 สารตกค้างอยู่ในระดับสูงกว่าค่าปลอดภัย ดังนั้นผักคะน้าที่ฉีดพ่นด้วย methyl parathion ทั้งในอัตราคำแนะนำบนฉลากและอัตรา 2 เท่าของคำแนะนำบนฉลาก เมื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นผ่านไปแล้วถึง 7 วัน ปริมาณการตกค้างก็ยังคงสูงกว่าค่าปลอดภัยจึงไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค



### ข้อเสนอแนะ

การเก็บรักษาผักไว้ในตู้เย็นซึ่งนิยมทำกันในปัจจุบันจะช่วยให้ผักยังคงสดถึงแม้ว่าจะผ่านไปเป็นเวลาหลายวัน แต่จากการทดลองครั้งนี้พบว่าผักคะน้าที่ฉีดพ่นในอัตราแนะนำบนฉลากและอัตรา 2 เท่าของคำแนะนำแล้วนำมาเก็บไว้ในตู้เย็น ปริมาณการตกค้างของmethyl parathionในผักคะน้ายังคงอยู่ในระดับที่เกินค่าปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคถึงแม้ว่าจะเก็บผักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 7 วัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภคควรนำผักคะน้าเหล่านี้มาทำการลดปริมาณสารพิษตกค้างด้วยวิธีต่างๆ ก่อนเช่นการแช่น้ำสะอาดจำนวนมาก การแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู การแช่น้ำโซดา หรือการล้างด้วยน้ำที่ไหลผ่านที่มีความแรงพอประมาณ เป็นต้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### เอกสารอ้างอิง

- ขวัญชัย สมบัติ. 2527. ยางฆ่าแมลง.ภาควิชากีฏวิทยา.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.275หน้า.
- ค้วน ขาวหนู. 2537. โภชนศาสตร์. พิมพ์ดี กรุงเทพฯ. 510 หน้า.
- จันทร์ทิพย์ ชำรงศรีสกุล. 2531. วัตถุประสงค์ทางการเกษตร. ข่าวสารวัตถุประสงค์. 15(3) : 128-131.
- จันทร์ทิพย์ ชำรงศรีสกุล. 2535. ปัญหาและการลดอันตรายจากสารพิษทางการเกษตร. ข่าวสาร  
วัตถุประสงค์. 19(2) : 74-77.
- ดวงภา บานชื่น และ ชนินันท์ พรสุริยา. 2541. การลดปริมาณเมทธิลพาราไรออนในผักคะน้าโดย  
การล้างในน้ำก๊อก แช่น้ำ ด่างน้ำโดยใช้มีถู และการแช่ในสารละลายโซเดียมโบ  
คาร์บอเนต. รายงานปัญหาพิเศษ. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะ  
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 24 หน้า.
- ทศพร แจ่งจรัส. 2531. ผักกูดหนาวและผักตระกูลกระหล่ำ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 155 หน้า.
- นิตยา วีระกุล. 2539. วัตถุประสงค์ทางการเกษตรกับสิ่งแวดล้อม. ข่าวสารวัตถุประสงค์. 23(3) : 139.
- ปกรณ์ สุเมธานุรักษ์กุล. 2526. สารฆ่าแมลงกับพิษภัยต่อสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์.  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 26 หน้า.
- ประยูร ดีมา. 2522. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเกษตรกับสาธารณสุข. กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์. 523 หน้า.
- ประยูร ดีมา. 2535. เอกสารวิชาการยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศัตรูมนุษย์และสัตว์. กรมวิชาการ  
เกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 325 หน้า.
- ปรีชา พุทธิปรีชาพงษ์. 2530. ยางฆ่าแมลง. สหมิตรออฟเซทกรุงเทพฯ. 150 หน้า.
- พนิดา ไชยยันต์บุรณ์. 2538. ความเป็นไปและพฤติกรรมของวัตถุประสงค์ที่ดิน. ข่าวสารวัตถุประสงค์. 22  
(4) : 191-195.
- พาลาก สิงหนณี. 2537. พิษของยางฆ่าแมลงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย. หน้า 51-53.
- พิสิฐ วงษ์วัฒน์. 2535. คู่มือการใช้สารพิษทางการเกษตรและในบ้านเรือน. เรือนแก้วการพิมพ์  
กรุงเทพฯ. 145 หน้า.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- มาโนช ทองเจียม. 2522. หลักการนำไปปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวพืชผัก. เทคโนโลยี. 10(31) : 8-12
- รัตนา สิตะยัง. 2539. วัตตุมิพิษ. นสพ. กสิกร. 69(1) : 8-12
- ลักขณา อมรสิน. 2541. คู่มือประกอบการปฏิบัติการวิชาพืชวิทยาสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 37-41.
- วิเชียร ฉัฐวัฒนานนท์. 2525. ชื่อสามัญและชื่อทางการค้าของวัตตุมิพิษทางการเกษตร. ชุมชนการเกษตร. 5(44) : 1-13.
- สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ. 2523. ขาน่าแมลง. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ. 164 หน้า.
- สุกัญญา มหาธีรานนท์. 2534. แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : Gas-Liquid Chromatograph. ข่าวศูนย์ฯ. 4(3) : 20-22.
- สุปราณี อิมพิทักษ์. 2536. การวิเคราะห์พืชตกค้างในผักโคขิววิธีชีวเคมี. ข่าวสารวัตตุมิพิษ. 20(3) : 119-123.
- สุพัตรา ศรีมุกข์, สุภาวดี มีนาภา. 2540. การสลายตัวของเมวินฟอสในผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม ผักบั้งจีน หลังการฉีดพ่นในขนาดตามคำแนะนำบนฉลากและขนาดสองเท่าของคำแนะนำบนฉลาก. ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 40 หน้า.
- อุดม โกสยสุก. 2539. การปลูกผักกินใบ. อักษรบัณฑิตกรุงเทพฯ. 34 หน้า.
- อุดมลักษณ์ อุพจิตติวรรณนะ. 2535. สารพิษ. ข่าวสารวัตตุมิพิษ. 19(1) : 46-47.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ตารางภาคผนวกที่ 1** แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทธิลพาราไรออนที่  
 สลายตัวในผักคะน้าที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังการ  
 ฉีดพ่นครั้งสุดท้ายแล้วนำไปเก็บในตู้เย็น

Analysis of Variance						
Source	df	ss	ms	f	f.05	f.01
Treatment	4	14.412	3.603	35.563**	3.45	5.99
Ex.Error	8	0.810	0.101			
Total	14	15.495	0.107			
GRAND MEAN	=	.5701408				
CV	=	55.83 %				
LSD.05	=	0.5993007				
LSD.01	=	0.8719229				
DUNCAN'S MULTIPL-RANGE TEST						
NUMBER OF MEANS	=	5				
ERROR DEGREE OF FREEDOM	=	8				
ERROR MEAN SQUARE	=	0.10131233				
STANDARD ERROR OF MEAN	=	0.18376827				
NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01			
	C01	2.528087	A			
	C11	0.15508	B			
	C31	0.085856	B			
	C51	0.08168133	EB			
	C71	0.0	B			

**MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY DUNCAN'S  
 MULTIPLE RANGE TEST.**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05
C01		2.528087	A
C11		0.15508	B
C31		0.085856	B
C51		0.08168133E	B
C71		0.0	B

MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST.

\*\* จากการวิเคราะห์ค่า F ที่ได้จากการคำนวณ พบว่ามีค่ามากกว่าค่า F ในตารางที่ระดับความ เป็นไปได้ .05 และ .01



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทธิลพาราไธออนที่  
สลายตัวในผักคะน้าที่ฉีดพ่นสารตามอัตราแนะนำบนฉลากในวันที่ 0, 1,  
3, 5 และ 7 หลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น

Analysis of Variances						
Source	df	ss	ms	f	£05	£01
Treatment	4	31.036	7.759	10.393**	3.48	5.99
Ex.Error	10	7.466	0.747			
Total	14	38.501	2.750			
GRAND MEAN				=	4.38561333333333	
CV				=	19.70 %	
LSD.05				=	1.571808	
LSD.01				=	2.235664	
DUNCAN'S MULTIPL-RANGE TEST						
NUMBER OF MEANS				=	5	
ERROR DEGREE OF FREEDOM				=	10	
ERROR MEAN SQUARE				=	0.74655175	
STANDARD ERROR OF MEAN				=	0.49884927	
NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01			
R01		6.487667	A			
R11		5.371947	AB			
R31		4.379734	ABC			
R51		3.162767	BC			
R71		2.525953	C			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY  
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST.

NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05
R01		6.487667	A
R 11		5.371947	AB
R 31		4.379734	BC
R 51		3.162767	CD
R 71		2.525953	D

MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY  
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST

\*\* จากการวิเคราะห์ค่า F ที่ได้จากการคำนวณ พบว่ามีค่ามากกว่าค่า F ในตารางที่ระดับความ  
เป็นไปได้ .05 และ .01

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการตกค้างของเมทิลลพาราไรออนที่สลายตัวในผักคะน้าที่ฉีดพ่นสารอัตรา 2 เท่าของคำแนะนำบนฉลากในวันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 หลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น

Analysis of Variances						
Source	df	ss	ms	f	f.05	f.01
Treatment	4	5784.182	1446.045	103.105**	3.48	5.99
Ex.Error	10	140.250	14.025			
Total	14	5924.432	423.174			
GRAND MEAN				=	31.83985066666667	
CV				=	11.76 %	
LSD.05				=	6.81273	
LSD.01				=	9.6901	
DUNCAN'S MULTIPL-RANGE TEST						
NUMBER OF MEANS				=	5	
ERROR DEGREE OF FREEDOM				=	10	
ERROR MEAN SQUARE				=	14.02501390	
STANDARD ERROR OF MEAN				=	2.16217590	
NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01			
D01		67.95033	A			
D 11		35.2936	B			
D 31		25.18135	C			
D 51		19.02496	CD			
D 71		11.74931	D			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY  
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST.

NAME	ID	MEAN	RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05
D 01		67.95033	A
D 11		35.2936	B
D 31		25.18135	C
D 51		19.02496	C
D 71		11.74931	D

MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY BY  
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST.

\*\* จากการวิเคราะห์ค่า F ที่ได้จากการคำนวณ พบว่ามีค่ามากกว่าค่า F ในตารางที่ระดับความ  
ถี่ไปได้ .05 และ .01