

# สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์



โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2539

มพ.

ณ 361 ๗

เลขหมึ..... ๕๓๙

เลขทะเบียน..... 28143

วัน, เดือน, ปี 17 ก.ค. 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Efficiency of Mould Growth Inhibitor  
in Feeds and Feed Ingredients**

**Mr. Nuttawuth Keegard**

**A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement  
for the Degree of Bachelor of Science**

**Department of Applied Biology**

**Faculty of Science**

**King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang**

**1996**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



หัวข้อโครงการพิเศษ   ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์  
 โดย                            นายณัฐวุฒิ กีกาศ  
 ภาควิชา                      ชีววิทยาประยุกต์  
 อาจารย์ที่ปรึกษา         ผศ. เนาวัฒน์ ปานแย้ม  
 ปีการศึกษา                 2539

### บทคัดย่อ

การทดลองหาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ( โมลด์การ์ด ) และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมลงในอาหารสัตว์ ได้ผลการทดลองดังนี้คือ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมลด์การ์ดกับกรดโพรฟิโอนิกซึ่งออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราโดยตรง พบว่า โมลด์การ์ดจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากรดโพรฟิโอนิกในด้านการออกฤทธิ์ควบคุมการเจริญ และการแพร่ขยายของเชื้อราในอาหารสัตว์โดยใช้อัตราส่วนอย่างละ 1 เปอร์เซ็นต์ผสมลงในอาหารสัตว์ และเก็บผลโดยการนับสปอร์ ในการทดลองหาอัตราการใช้ที่เหมาะสมของโมลด์การ์ดในอาหารสัตว์ ซึ่งปรับให้มีความชื้นประมาณ 16.82 เปอร์เซ็นต์ และเติมโมลด์การ์ดในปริมาณ 0 , 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 และ 2.5 กิโลกรัมต่อตัน เก็บผลโดยการนับสปอร์ ซึ่งพบว่าปริมาณการใช้โมลด์การ์ดที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 1.0 - 1.5 กิโลกรัมต่อตัน และสามารถสรุปอัตราการใช้โมลด์การ์ดได้ว่า ถ้าอาหารสัตว์มีความชื้นน้อยกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ จะใช้โมลด์การ์ด 1.0 กิโลกรัมต่อตัน แต่ถ้าอาหารสัตว์มีความชื้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ จะใช้โมลด์การ์ด 1.5 กิโลกรัมต่อตัน



## กิตติกรรมประกาศ

โครงการานพิเศษนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น เพราะได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. เนาวรัตน์ ปานแย้ม ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการานพิเศษซึ่งได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านต่างๆ รวมทั้งได้กรุณาตรวจทานแก้ไขทางด้านภาษา ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. ดุษณี ธนะบริพัฒน์ และ ผศ. นवलพรรณ ฌ ระนอง กรรมการพิจารณาโครงการานพิเศษ และได้กรุณาตรวจทานแก้ไขทางด้านภาษาด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลอุปกรณ์ และสารเคมีต่างๆ สำหรับการทดลองขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งท่านผู้มีอุปการะคุณที่มีโอกาสส่วนามได้ครบถ้วน ณ ที่นี้ ที่ได้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และเป็นกำลังใจตลอดมา และที่สำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ซึ่งให้กำเนิดและให้การสนับสนุนในด้านการศึกษามาโดยตลอด

ผู้จัดทำ

มีนาคม 2540


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย -----	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -----	ข
กิตติกรรมประกาศ -----	ค
สารบัญตาราง -----	ง
สารบัญภาพ -----	ช
บทที่ 1 บทนำ -----	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง -----	2
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน -----	8
3.1 อาหารสัตว์ที่ใช้ในโครงการพิเศษ -----	8
3.2 อุปกรณ์และสารเคมี -----	8
3.2.1 อุปกรณ์ -----	8
3.2.1 สารเคมี -----	8
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานทดลอง -----	9
3.3.1 การทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ -----	9
3.3.2 การทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งปรับความชื้น ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา -----	9
3.3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของ โมลด์การ์ด โดยเปรียบเทียบกับ กรดโพรพิโอนิก -----	10
3.3.4 การทดสอบหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของ โมลด์การ์ด ในอาหารสัตว์ที่มีความชื้นที่เหมาะสมกับการ เจริญเติบโตของเชื้อรา -----	10
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ -----	11
4.1 ผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ -----	11
4.2 ผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งปรับความชื้น ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา -----	12
4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ โมลด์การ์ด โดยเปรียบเทียบกับ กรดโพรพิโอนิก -----	14

## สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4.4 ผลการทดสอบหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของโมลด์การ์ด ในอาหารสัตว์ที่มีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญ เติบโตของเชื้อรา -----	16
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -----	18
ภาคผนวก -----	19
เอกสารอ้างอิง -----	38



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 แสดงผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ -----	11
2 แสดงผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งปรับความชื้น ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา-----	13
3 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโต โตของเชื้อราในอาหารสัตว์ระหว่าง โมลด์การ์ดกับ โพรพิ โอนิกใน แต่ละช่วงเวลาของการทดสอบ -----	15
4 แสดงประสิทธิภาพของ โมลด์การ์ดที่ความเข้มข้นต่างๆซึ่งมีผล ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์ -----	17



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. ชุดกรอง -----	26
2. ลักษณะของกระตังที่ใส่อาหารสัตว์ -----	27
3. ลักษณะของอาหารสัตว์ซึ่งผสมกับน้ำก่อนจะนำมากรอง -----	28
4. ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้ว -----	29
5. ลักษณะของการบรรจุอาหารสัตว์ใส่ถุง -----	30
6. ลักษณะของโมลต์การ์ด -----	31



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 1

### บทนำ

ในปัจจุบัน ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือผู้ผลิตอาหารใช้เลี้ยงสัตว์ได้เอง ต้องประสบปัญหาอย่างมากในการซื้อวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลน ราคาแพง ตลอดจนคุณภาพไม่ดีพอ ในการเลือกซื้อข้าวโพดก็เช่นเดียวกันมักประสบปัญหาเชื้อรา สารพิษจากเชื้อรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุให้คุณค่าของอาหารลดต่ำลง การกินอาหารของสัตว์ลดลง เกิดความผิดปกติขึ้นกับสัตว์ บางครั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราอาจนำพามาสู่คนหรือผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ได้

ดังนั้น ในขบวนการผลิตอาหารสัตว์เราจึงมีความจำเป็นที่จะใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราผสมลงไปในการอาหารสัตว์ เพื่อถนอมคุณค่าของอาหารให้คงอยู่ยาวนาน และได้ประโยชน์กับการเลี้ยงสัตว์สูงสุด

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์
2. เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์

#### ขอบเขตของโครงการพิเศษ

ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสารยับยั้งชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์ และเลือกเอาตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมาทำการศึกษาค่า เพื่อให้ได้ปริมาณสารยับยั้งที่เหมาะสม คือใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในปริมาณน้อยที่สุด แต่ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสูงที่สุด

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพิเศษ

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์
2. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์โดยที่ต้องใช้ปริมาณของสารยับยั้งในปริมาณที่น้อยที่สุด แต่ให้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสูงที่สุด
3. เมื่อทราบปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้ว ก็จะทำให้ลดต้นทุนในด้านการจัดซื้อสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์ลงได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

สารพิษของเชื้อราที่มีการศึกษาค้นคว้ากันมากที่สุดคืออะฟลาทอกซิน ( Aflatoxin ) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่ทำให้เกิดพิษอย่างเฉียบพลัน ( acute toxicity ) และยังทำให้เกิดมะเร็งที่ตับอีกด้วย ซึ่งอะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเชื้อราบางชนิด พบครั้งแรกจากเชื้อ *Aspergillus flavus* ( Sargeant และ คณะ, 1961 a: 1291, 1961 b: 1096-1097 ) จากการตรวจหาสารอะฟลาทอกซินในผลผลิตทางเกษตรชนิดต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการแปรรูป สามารถตรวจสอบพบสารอะฟลาทอกซินในผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวสาร หอม กระเทียม พริกแห้ง งาม ถั่วเหลือง และถั่วอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบในผัก ผลไม้ และอาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง และเนื้อมะพร้าวเป็นต้น ( ปริศนา สิริอาษา, 2534: 7 )

เชื้อราในกลุ่มที่สำคัญที่สามารถสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินได้แก่ เชื้อราในกลุ่ม *Aspergillus* ได้แก่ *Aspergillus parasiticus*, *Aspergillus nomis*, *Aspergillus flavus* เชื้อรา *Aspergillus flavus* เป็นเชื้อราพวก storage mold การเจริญและการสร้างสารพิษเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศของเขตร้อน ลักษณะรูปร่างของ *Aspergillus flavus* นั้นเป็นเส้นใยที่มีผนังกัน ขนาดของโคโลนีใน Czapek's solution agar มีอายุ 10 วัน บ่มที่ 24-26 องศาเซลเซียส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร สปอร์จะงอกจากเส้นใยโดยตรง สปอร์ที่อายุยังน้อยจะมีสีเหลืองหรือค่อนข้างเหลืองเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและ สุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มที่เรียกว่า deep grape green ก้านชูสปอร์เป็นพวงหนาไม่มีสี ผิวหยาบ ความยาวปกติประมาณ 1 มิลลิเมตร แต่บางสายพันธุ์อาจมีความยาวถึง 2.2 เซนติเมตร vesicle uniserate หรือ biserate สปอร์มีลักษณะกลมหรือข้างกลมขนาด 3.0-6.0 ไมครอน ซึ่งจะถูกสร้างบนปลาย sterigma

อะฟลาทอกซินมีผลทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งมีผลทำให้เกิดอาการได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง กรณีของการเกิดพิษอย่างเฉียบพลันนั้นพบว่า จะทำให้เกิดการตายของเซลล์ (necrosis) ในตับเป็นส่วนใหญ่ นอกจากอะฟลาทอกซินจะทำให้เกิดมะเร็งของตับแล้ว ยังทำให้เกิดมะเร็งของปอดอีกด้วย ( ไมตรี สุทธจิตต์, 2531: 76-84 )

Friedman และ Wogan (1967:358) รายงานว่าอะฟลาทอกซินเมื่อถูกดูดซึมที่ตับจะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสารตัวกลางชนิด 2,3-epoxide ก่อน ซึ่งสารนี้มีความว่องไวมาก สามารถจับตัวอย่างถาวรกับสารชีวโมเลกุลต่างๆ รวมทั้งกรดนิวคลีอิกได้เป็นโมเลกุลที่ผิดไปจากธรรมชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และมักจับกับเบสกวานีนของ DNA สารพิษอะฟลาทอกซินจึงเป็นอันตรายต่อยีน โดยขัดขวางหน้าที่ทางชีวภาพของ DNA และทำให้เอนไซม์ DNA และ RNA Polymerase ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้การสร้าง RNA และ DNA ลดน้อยลง

Feigelson และ Greengard (1962:1908) รายงานว่าอะฟลาทอกซินเป็นตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ tryptophan pyrrolase ทำให้มีผลยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนบางชนิดที่เซลล์ของดัมมาลีนิ ลิมโกคา (2523: 40) กล่าวว่าอะฟลาทอกซินออกฤทธิ์โดยไปขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์ m-RNA และ กระบวนการสร้าง DNA การขัดขวางการสร้าง m-RNA เกิดในส่วนของนิวเคลียส โดยไปยับยั้งสารตั้งต้น (precursor) ที่จำเป็นต่อการสร้าง m-RNA และขัดขวางเอนไซม์ DNA-dependent RNA polymerase เมื่อการสร้าง RNA ถูกขัดขวางจะทำให้การสร้างโปรตีนถูกขัดขวางไปด้วย

#### สารพิษจากเชื้อราที่มีผลต่อสัตว์

เชื้อราและสารพิษที่เชื้อราผลิตขึ้นมีผลต่อคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเมื่อสัตว์กินอาหารที่มีเชื้อรา และสารพิษเข้าไปจะทำให้ความสมบูรณ์ลดลงและสุขภาพเสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่น ในข้าวโพดที่ถูกเชื้อราทำลายจะทำให้พลังงานในเมล็ดข้าวโพดสูญเสียไปในระหว่าง 5-25 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและชนิดของเชื้อราที่เข้าทำลาย ในบรรดาคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในเมล็ดธัญพืช พบว่าไขมันจะถูกทำลายเป็นอันดับแรกเมื่อเชื้อราเริ่มเจริญเติบโต ต่อจากนั้นก็จะเป็นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต การเจริญเติบโตของเชื้อรายังมีผลต่อการทำลายกรดอะมิโนทุกชนิด โดยเฉพาะไลซีนและอาร์จินิน ระดับวิตามินในอาหาร ไขมันและวิตามินที่ละลายได้ในลำไส้ นอกจากนี้ในอาหารสัตว์ที่มีเชื้อราเจริญอยู่ จะทำให้ลดความน่ากินลงทำให้สัตว์กินอาหารได้น้อยลง และสารพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้อราจะสร้างปัญหาให้กับสัตว์อีกด้วย ( ลิพัฒนาอาหารสัตว์, 2538:10-17 )

สุกัญญา จิตตพรพจน์ ( 2530: 42-47 ) กล่าวว่าอะฟลาทอกซินทำให้เกิดความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยความเป็นพิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด อายุ เพศ อาหารที่ได้รับ ปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารพิษในปริมาณมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่มีอายุน้อยจะตายอย่างรวดเร็ว ส่วนอาการเรื้อรังของสัตว์ที่ได้รับสารพิษโดยทั่วไปคืออัตราการเจริญเติบโตลดลง ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง สัตว์ให้ผลผลิตลดลง และยังทำให้ความต้านทานต่อโรคและพยาธิลดลงด้วย นอกจากนี้ในสัตว์ที่มีอายุน้อยและสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโต จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์ที่มีอายุมากหรือสัตว์ที่เจริญเต็มที่แล้ว

สารพิษจากเชื้อราที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของสัตว์ คือ

1. ถ้าระดับสารพิษอะฟลาทอกซินในเลือดสูงจะมีผลทำให้ระบบของสารโปรทอมบิน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวมีระดับต่ำกว่าปกติมาก อาจลดลงเหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของระดับปกติ

2. ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียมลดลง และมีผลทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้วิตามินดีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงพบปัญหาเรื่องขาและกระดูกไม่แข็งแรง สัตว์จะแสดงอาการกระดูกอ่อนหรือกระดูกเปราะแตกหักง่าย

3. ทำให้การนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ลดลง ทำให้ต้องเพิ่มระดับโปรตีนในอาหารให้สูงกว่าระดับปกติ มิฉะนั้นจะทำให้ระดับการเจริญเติบโตลดลง ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ำลง รวมไปถึงสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ลดลงด้วย

4. มีผลทำให้ความเข้มข้นของเกลือในน้ำดีลดลง ทำให้การดูดซึมและการย่อยไขมันลดลง

5. ลดความเข้มข้นของน้ำย่อยไขมันจากตับอ่อน ทำให้การย่อยไขมันต่ำลง

6. ลดน้ำย่อยโปรตีนจากตับอ่อนทำให้สัตว์ย่อยสลายโปรตีนได้ต่ำลง

7. ลดน้ำย่อยแป้ง ทำให้สัตว์ย่อยสลายแป้งได้น้อยลง

8. ทำให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง ทำให้สัตว์ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคในระดับปกติได้ ส่งผลให้สัตว์ติดเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อ *Salmonella* ทั้งยังลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ให้แก่สัตว์ด้วย

9. ทำให้ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะในซีรัมลดลง ดังนั้นการให้ยาในระดับปกติจึงไม่ได้ผล

10. ทำให้การดูดซึมสารสีในสัตว์ปีกลดลง ผลคือทำให้ไข่แดงมีสีซีด

11. อะฟลาทอกซินจะไปลดหรือหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งสามารถพบปรากฏการณ์นี้ ในสัตว์สี่กระเพาะและ เป็ด ไก่ นอกจากนี้ยังพบว่า อะฟลาทอกซินจะลดปริมาณแบคทีเรียส่วนปลายของลำไส้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์อีกด้วย

12. อะฟลาทอกซินจะไปทำลายผนังของลำไส้ และจะทำให้ผนังของลำไส้ไม่สามารถขับน้ำย่อย หรือ ดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายได้

13. เมื่ออะฟลาทอกซินถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเข้าสู่กระแสเลือด ก็จะเข้าไปทำลายตับ ไก่กระดูก สมอง และอวัยวะอื่นๆ

14. อะฟลาทอกซินจะทำให้การทำงานของเนื้อเยื่อในร่างกายตามส่วนต่างๆ ผิดปกติไป เช่น กระบวนการเมแทบอลิซึม การสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนผิดปกติไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารพิษอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์เลี้ยง จากรายงานของ ทิม พรรณศิริ (2532: 9-15) ที่สำคัญคือ

1. ทำให้เบื่ออาหารและการกินอาหารน้อยลง
2. การเจริญเติบโตลดลง
3. การให้นมและไข่ลดลง
4. การผสมพันธุ์ไม่ค่อยติดและมีการแท้งลูกมากขึ้น
5. จะก่อให้เกิดความผิดปกติของการย่อยอาหาร โดยสัตว์เลี้ยงจะมีอาการท้องร่วง ถ้าใส่ อักเสบ และการผิดปกติของอวัยวะภายใน ทางพยาธิวิทยาของตับ ไต และถุงน้ำดี
6. สัตว์จะมีอาการขนร่วง ผิวหนังหยาบกร้าน
7. สัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคเต้านมอักเสบ และโรคต่างๆมากขึ้น
8. ถ้าสัตว์ได้รับในปริมาณมาก จะทำให้สัตว์เสียชีวิตได้

สารพิษอะฟลาทอกซินที่ปนมาในอาหารสัตว์นอกจากจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ แล้วยังส่งผลกระทบต่อถึงอาหารของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสัตว์ส่วนใหญ่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสารพิษ ที่ได้รับเข้าไปอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ก็ยังมีสะสมอยู่บ้างในส่วนของเนื้อเยื่อและน้ำนม ( ทิม พรรณศิริ, 2532: 9-15 )

ความชื้นมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา (ธีรยุทธ เวชรัตน์พิมล, 2529:65-69) ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงก็จะทำให้ความชื้นในอากาศสูงด้วย ระดับความชื้นสูงสุดในเมล็ดพืชบางชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ที่ไม่ทำให้เกิดเชื้อราคือ 12.5 -13.5 เปอร์เซ็นต์ ถั่วลิสง 8 เปอร์เซ็นต์ ข้าวฟ่าง 13.6-14.5 เปอร์เซ็นต์ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับถั่วลิสงที่ระดับความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์ อาจพบ *Aspergillus flavus* ได้ ทั้งนี้เพราะถั่วลิสงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับ *Aspergillus flavus* นรสีห์ ตระกูลช่าง ( 2520:269 ) กล่าวว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราคือความชื้นสัมพัทธ์ 80-100 เปอร์เซ็นต์ Ceigler และคณะ(1971:165) รายงานว่าเชื้อรา *Aspergillus flavus* เจริญได้ดีในข้าวโพดซึ่งเก็บไว้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่า และการเจริญเติบโตของเชื้อรานี้ จะเจริญเติบโตได้ดีในเมล็ดพืชที่มีความชื้น 16.2-24.4 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการเก็บเมล็ดธัญพืชควรทำให้ความชื้นลดต่ำลงเหลือเพียง 13 เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่านี้ เชื้อราโดยทั่วไปจะเจริญได้ดีในอาหารที่มีความชื้นระหว่าง 14-30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เชื้อรายังเจริญเติบโตได้ดีในอาหารที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตั้งแต่ 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ความชื้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราที่สร้างอะฟลาทอกซินคือ ถ้ามีปริมาณความชื้นในอาหารและในอากาศต่ำก็จะทำให้การสร้างอะฟลาทอกซินลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้นการลดปริมาณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความชื้นของอาหาร จึงเป็นวิธีป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อราในอาหารได้ โดยปกติเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง 24-32 องศาเซลเซียส ( นรสีห์ ตระกูลช่าง, 2520: 269 )

Vandegrift และคณะ ( 1975:79-84 ) รายงานว่ากรดโพรพิโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญของเชื้อรา และการผลิตสารพิษเชื้อราพวก *Aspergillus flavus*, *Aspergillus ochraceus* และ *Penicillium veridicatu* ในข้าวโพดที่มีเชื้อราเหล่านี้อยู่ และนำมาเก็บไว้เป็นเวลา 29 สัปดาห์ ในขณะที่ *Aspergillus parasiticus* และ *Aspergillus flavus* จะเจริญเติบโตได้ดีมากในข้าวโพดที่ไม่ได้ใส่สารเคมีนี้ไว้ การเจริญเติบโตของ *Aspergillus parasiticus* และ *Aspergillus flavus* จะถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์เมื่อมี โซเดียมโพรพิโอเนต ความเข้มข้น 1,000 หรือ 8,000 พีพีเอ็ม ที่พีเอช 3 ในขณะที่พีเอช 5 และ 7 จะสามารถยับยั้งได้เพียงบางส่วน

Buchanan และ Ayres ( 1976: 128-132 ) รายงานว่ากรดโพรพิโอนิก 0.1 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินโดย *Aspergillus parasiticus* ได้เพียงบางส่วน ในขณะที่ความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต และสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินได้อย่างสมบูรณ์ Gosh และ Haggiblom ( 1985:323-330 ) สังเกตว่าระดับความเข้มข้นของกรดโพรพิโอนิกที่ระดับต่ำๆ นั้น จะไม่มีผลกระตุ้นการสร้างอะฟลาทอกซิน โดยพบว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ของกรดโพรพิโอนิก จะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการเจริญเติบโตของ *Aspergillus flavus* แต่ปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินที่สร้างได้จะลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร chemical defined liquid medium และเมื่อใช้กรดโพรพิโอนิกร่วมกับกรดอะซิติกจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราได้สูงขึ้น เนื่องจากสารเคมีทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างคือ กรดโพรพิโอนิกมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราได้เร็วกว่ากรดอะซิติกแต่มีอัตราการระเหยเป็นไอได้เร็วกว่าถึง 2 เท่า ซึ่งควบคุมเชื้อราได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นการรวมเอาสารเคมี 2 ชนิดที่มีคุณสมบัติต่างกันเข้าด้วยกันจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากการทดลองพบว่าการใช้สารเคมีทั้ง 2 ตัวผสมกันในอัตราส่วน 0.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเมล็ดจะใช้ได้ผลดี และทำให้ข้าวโพดมีกลิ่นน้อย ( ประวัติ ดันบุญเอก, 2528: 391-394 ) สำหรับกรดโพรพิโอนิกนี้ใช้ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้เพราะว่ากรดโพรพิโอนิกสามารถแตกตัวให้ free carboxyl group ที่มีผลในการยับยั้งและฆ่าเชื้อรา

Thanaboripat และคณะ ( 1992: 24-29 ) พบว่าที่ความเข้มข้นของกรดโพรพิโอนิกที่ต่ำจะกระตุ้นการสร้างอะฟลาทอกซิน ในขณะที่ความเข้มข้นสูงจะยับยั้งการสร้างอะฟลาทอกซิน Chatteree ( 1989: 25-28 ) รายงานว่าการใช้กรดโพรพิโอนิกในระดับความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสมจะเพิ่มการสร้างอะฟลาทอกซินของ *Aspergillus flavus* Vandegrift และคณะ ( 1975 : 79-84 ) พบว่าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ หรือกรดโพรพิโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์จะสามารถ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลดการเจริญของเชื้อราและการสร้างอะฟลาทอกซินได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อใส่ในข้าวโพด  
ก่อนถ่ายเชื่อนาน 17 และ 29 สัปดาห์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### ขั้นตอนการทำงาน

#### 3.1 อาหารสัตว์ที่ใช้ในโครงการพิเศษ

อาหารสัตว์ที่ใช้ในการดำเนินงานทดลอง เป็นสูตรอาหารสำหรับหมูใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70 - 100 กิโลกรัม

#### 3.2 อุปกรณ์และสารเคมี

##### 3.2.1 อุปกรณ์

1. หลอดทดลอง
2. ปีกเกอร์
3. ฟลasks
4. บีเปดต์
5. แท่งแก้วคนสาร
6. ซ้อนตักสาร
7. ฮีมาไซโตมิเตอร์ ( haemocytometer )
8. ก້ອງจุลทรรศน์
9. เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
10. โถอบแห้ง ( desiccator )
11. เครื่องอบความร้อน ( hot air oven )
12. บั้มสุญญากาศ ( vacuum pump )
13. เครื่องเขย่า ( shaker )

##### 3.2.2 สารเคมี

1. กรดโพรพโอนิก ( propionic acid )
2. โมลด์การ์ด ( mouldgard )
3. ทวิน 80 ( tween 80 0.1 % )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 ขั้นตอนในการดำเนินงานทดลอง

#### 3.3.1 การทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์

1. อบกระทงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นใน โถอบแห้ง ( desiccator )
  2. นำกระทงมาชั่งหาน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง บันทึกค่าที่ชั่งได้
  3. ใส่อาหารสัตว์ลงไปในกระทงพอประมาณ นำไปชั่งหาน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง บันทึกค่าที่ชั่งได้
  4. นำกระทงที่ใส่อาหารสัตว์ไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นในโถอบแห้ง
  5. นำมาชั่งหาน้ำหนักอีกครั้งโดยใช้เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
  6. วิเคราะห์หาความชื้นในอาหารสัตว์ได้จากสูตรคำนวณ ดังนี้
- เปอร์เซ็นต์ความชื้นในอาหารสัตว์
- $$= \frac{(\text{น้ำหนักของกระทงและอาหารสัตว์ก่อนอบ} - \text{น้ำหนักของกระทงและอาหารสัตว์หลังอบ}) \times 100}{(\text{น้ำหนักของกระทงและอาหารสัตว์ก่อนอบ} - \text{น้ำหนักของกระทง})}$$

#### 3.3.2 การทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ ซึ่งปรับความชื้นให้เหมาะสมต่อกาเจริญเติบโตของเชื้อรา

1. อบกระทงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นใน โถอบแห้ง
2. นำกระทงมาชั่งหาน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง บันทึกค่าที่ชั่งได้
3. ชั่งอาหารสัตว์มา 50 กรัม แล้วเติมน้ำกลั่นลงไป 4 กรัม คลุกเคล้าให้ผสมกันให้ทั่ว
4. นำอาหารสัตว์จากข้อ 3. ใส่ลงในกระทงที่อบแล้ว โดยใส่พอประมาณ แล้วนำไปหาน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง บันทึกค่าที่ชั่งได้
5. นำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นใน โถอบแห้ง
6. นำมาชั่งหาน้ำหนักอีกครั้งโดยใช้เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง
7. วิเคราะห์หาความชื้นในอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.3.1

### 8.3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของโมลด์การ์ดโดยเปรียบเทียบกับกรดโพรฟิโอนิก

1. เตรียมอาหารสัตว์บรรจุถุง ๆ ละ 50 กรัม จำนวน 18 ถุง
2. เติมกรดโพรฟิโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 6 ถุง  
โมลด์การ์ด 1 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 6 ถุง  
ทำถุงควบคุมโดยไม่เติมสารยับยั้ง จำนวน 6 ถุง
3. นำแต่ละถุงบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง
4. เก็บผลวันที่ 32 และ 65 โดยการนับสปอร์ ซึ่งทำได้โดยเติมน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ลงในอาหารแต่ละถุง หยดหิวิน 80 2-3 หยด คนให้อาหารละลายให้ทั่ว ทิ้งไว้สักพัก แล้วนำไปกรองโดยใช้เครื่องกรองสุญญากาศ และใช้สำลีแทนกระดาษกรอง
5. นำของเหลวที่กรองได้ไปนับจำนวนสปอร์โดยใช้ไมโครโตมิเตอร์

### 8.3.4 การทดสอบหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของโมลด์การ์ดในอาหารสัตว์ที่มีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา

1. เตรียมอาหารสัตว์บรรจุถุง ๆ ละ 50 กรัม
2. เติมโมลด์การ์ดลงไปเป็นปริมาณ 0 , 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 และ 2.5 กิโลกรัมต่อตัน โดยแต่ละความเข้มข้นจะทำ 3 ซ้ำ
3. เติมน้ำกลั่นลงไปถุงละ 4 กรัม เพื่อเพิ่มความชื้นในปริมาณที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราคือความชื้นประมาณ 14 -18 เปอร์เซ็นต์
4. นำแต่ละถุงบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง
5. เก็บผลวันที่ 12 โดยการนับสปอร์เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.3.3

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์

#### 4.1 ผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์

จากการศึกษาทดสอบหาปริมาณความชื้นในอาหารสัตว์ ซึ่งจะอบกระทั่งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และอบอาหารสัตว์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และจะชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง ซึ่งได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์

จำนวน กระทง	น้ำหนัก ของกระทง ( กรัม )	น้ำหนัก ของกระทง และอาหาร สัตว์ก่อนอบ ( กรัม )	น้ำหนัก ของ อาหารสัตว์ ( กรัม )	น้ำหนัก ของกระทง และอาหาร สัตว์หลังอบ ( กรัม )	เปอร์เซ็นต์ ความชื้นใน อาหารสัตว์ (เปอร์เซ็นต์ )
1	0.4468	6.4101	5.9633	5.8299	9.73
2	0.4614	4.6351	4.1737	4.2268	9.78
3	0.4638	4.2486	3.7848	3.8766	9.83
4	0.4274	5.3775	4.9501	4.8960	9.73
5	0.3290	2.5961	2.2671	2.4025	8.54
6	0.4913	6.4736	5.9823	5.8444	10.52
7	0.3237	2.8083	2.4846	2.5778	9.28
8	0.3134	2.8555	2.5421	2.6174	9.37
9	0.3169	3.3507	3.0338	3.0681	9.32
10	0.5074	2.4200	1.9126	2.2374	9.55

หมายเหตุ น้ำหนักของอาหารสัตว์ = ( น้ำหนักของกระทงและอาหารสัตว์ก่อนอบ ) - ( น้ำหนัก  
ของกระทง )

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลการทดลองในตารางที่ 1 สามารถหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นในอาหารสัตว์โดยเฉลี่ยได้  
โดยการคำนวณดังต่อไปนี้

เปอร์เซ็นต์ความชื้น โดยเฉลี่ย

$$= ( 9.73 + 9.78 + 9.83 + 9.73 + 8.54 + 10.52 + 9.28 + 9.37 + 9.32 + 9.55 ) \text{ เปอร์เซ็นต์}$$

10

$$= 9.57 \text{ เปอร์เซ็นต์}$$

เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความชื้นในอาหารสัตว์โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 9.57 เปอร์เซ็นต์

#### 4.2 ผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งปรับความชื้นให้เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโตของเชื้อรา

จากการศึกษาทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งมีการเติมน้ำกลั่นลงไปเพื่อปรับความชื้น  
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งจะเติมน้ำกลั่น 4 กรัม ลงไปในอาหารสัตว์ 50 กรัม  
และนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง  
ละเอียด 4 ตำแหน่ง ซึ่งได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาความชื้นในอาหารสัตว์ซึ่งปรับความชื้นให้เหมาะสม  
ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา

จำนวน กระทง	น้ำหนัก ของกระทง ( กรัม )	น้ำหนัก ของกระทง และอาหาร สัตว์ก่อนอบ ( กรัม )	น้ำหนักของ อาหารสัตว์ ( กรัม )	น้ำหนัก ของกระทง และอาหาร สัตว์หลังอบ ( กรัม )	เปอร์เซ็นต์ ความชื้นใน อาหารสัตว์ (เปอร์เซ็นต์ )
1	0.2338	2.4443	2.2105	2.0693	16.96
2	0.2551	2.3466	2.0915	1.9945	16.83
3	0.2486	2.2255	1.9769	1.9011	16.41
4	0.2522	3.0059	2.7537	2.5435	16.79
5	0.2835	2.2984	2.0149	1.9616	16.72
6	0.2741	2.6788	2.4047	2.2676	17.10
7	0.2882	2.6102	2.3220	2.2195	16.83
8	0.2476	2.7919	2.5443	2.3651	16.77
9	0.2344	2.4247	2.1903	2.0572	16.78
10	0.2472	2.4253	2.1781	2.0556	16.97

จากผลการทดลองในตารางที่ 2 สามารถหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นในอาหารสัตว์โดยเฉลี่ยได้  
โดยการคำนวณดังต่อไปนี้

เปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยเฉลี่ย

$$= ( 16.96+16.83+16.41+16.79+16.72+17.10+16.83+16.77+16.78+16.97 ) \text{ เปอร์เซ็นต์}$$

10

$$= 16.82 \text{ เปอร์เซ็นต์}$$

เพราะฉะนั้นความชื้นในอาหารสัตว์โดยเฉลี่ยเมื่อเติมน้ำกลั่นลงไป 4 กรัม มีค่าเท่ากับ 16.82

เปอร์เซ็นต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมลด์การ์ดโดยเปรียบเทียบกับกรดโพพโอนิก

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมลด์การ์ดกับกรดโพพโอนิก ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์มีความชื้น 9.57 เปอร์เซ็นต์ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และเก็บผลวันที่ 32 และ 65 ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้

วันที่ 32 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใส่สารยับยั้ง

$$\text{ถุงที่ 1} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 450 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 2} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 500 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 3} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 425 \times 10^7$$

$$\text{เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้} \quad 458.33 \times 10^7$$

อาหารสัตว์ใส่กรดโพพโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์

$$\text{ถุงที่ 1} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 175 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 2} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 150 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 3} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 225 \times 10^7$$

$$\text{เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้} \quad 183.33 \times 10^7$$

อาหารสัตว์ใส่โมลด์การ์ด 1 เปอร์เซ็นต์

$$\text{ถุงที่ 1} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 75 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 2} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 50 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 3} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 50 \times 10^7$$

$$\text{เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้} \quad 58.33 \times 10^7$$

วันที่ 65 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใส่สารยับยั้ง

$$\text{ถุงที่ 1} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 1,650 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 2} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 1,575 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 3} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 1,625 \times 10^7$$

$$\text{เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้} \quad 1,616.67 \times 10^7$$

อาหารสัตว์ใส่กรดโพพโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์

$$\text{ถุงที่ 1} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 625 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 2} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 500 \times 10^7$$

$$\text{ถุงที่ 3} \quad \text{นับจำนวนสปอร์ได้} \quad 475 \times 10^7$$

$$\text{เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้} \quad 533.33 \times 10^7$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อาหารสัตว์ใส่โมลด์การ์ด 1 เปอร์เซ็นต์

ถุงที่ 1	นับจำนวนสปอร์ได้	$250 \times 10^7$
ถุงที่ 2	นับจำนวนสปอร์ได้	$175 \times 10^7$
ถุงที่ 3	นับจำนวนสปอร์ได้	$200 \times 10^7$
	เฉลี่ยแล้วนับจำนวนสปอร์ได้	$208.33 \times 10^7$

สารยับยั้งแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออาหารสัตว์ระหว่าง โมลด์การ์ดกับกรดโพรพโอนิกในแต่ละช่วงเวลาของการทดสอบ

เวลา ( วัน )	ค่าเฉลี่ยที่นับได้ของจำนวนสปอร์ของเชื้อรา $\times 10^7$ ( สปอร์ต่อมิลลิลิตร )		
	ไม่ได้ใส่สารยับยั้ง	ใส่กรดโพรพโอนิก 1 เปอร์เซ็นต์	ใส่โมลด์การ์ด 1 เปอร์เซ็นต์
32	458.33	183.33	58.33
65	1,616.67	533.33	208.33

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่า อาหารสัตว์ทั้งที่ใส่และไม่ใส่สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ก็จะมีการเจริญและแพร่ขยายของราเช่นกัน แต่ในอาหารสัตว์ที่ใส่สารยับยั้งจะมีการแพร่ขยายต่ำกว่าอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใส่สารยับยั้งมาก และพบว่า โมลด์การ์ดมีประสิทธิภาพดีกว่ากรดโพรพโอนิก ( ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อราพื้นฐาน) ในด้านการออกฤทธิ์ควบคุมการแพร่ขยายและฆ่าเชื้อราในอาหารสัตว์ โมลด์การ์ดมีศักยภาพในการใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 - 5 สัปดาห์ ซึ่งยาวนานพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับกรดโพรพโอนิก

#### 4.4 ผลการทดสอบหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของโมลด์การ์ดในอาหารสัตว์ที่มีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา

จากการศึกษาหาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของโมลด์การ์ดที่ใส่ในอาหารสัตว์ ที่มีความชื้น 16.82 เปอร์เซ็นต์ และเก็บผลวันที่ 12 ได้ผลการทดลองดังนี้

##### ไม่ได้ใส่โมลด์การ์ด

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$4,000 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$4,225 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$5,150 \times 10^7$
เฉลี่ยแล้ว	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$4,458.33 \times 10^7$

##### ใส่โมลด์การ์ด 0.5 กิโลกรัมต่อตัน

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$4,025 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$3,100 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$3,475 \times 10^7$
เฉลี่ยแล้ว	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$3,533.33 \times 10^7$

##### ใส่โมลด์การ์ด 1.0 กิโลกรัมต่อตัน

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,850 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,775 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$3,100 \times 10^7$
เฉลี่ยแล้ว	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,908.33 \times 10^7$

##### ใส่โมลด์การ์ด 1.5 กิโลกรัมต่อตัน

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,300 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,800 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,825 \times 10^7$
เฉลี่ยแล้ว	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,641.67 \times 10^7$

##### ใส่โมลด์การ์ด 2.0 กิโลกรัมต่อตัน

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,325 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,425 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,700 \times 10^7$
เฉลี่ยแล้ว	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,483.33 \times 10^7$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ใส่โมลต์การ์ด 2.5 กิโลกรัมต่อตัน

ถุงที่ 1	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,550 \times 10^7$
ถุงที่ 2	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,075 \times 10^7$
ถุงที่ 3	น้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,450 \times 10^7$
	เฉลี่ยแล้วน้ำหนักจำนวนสปอร์ได้	$2,358.33 \times 10^7$

ซึ่งโมลต์การ์ดในแต่ละความเข้มข้นจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์ได้แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของโมลต์การ์ดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชอรราในอาหารสัตว์

ปริมาณ โมลต์การ์ดที่ใส่ ( กิโลกรัมต่อตัน )	ค่าเฉลี่ยที่นับได้ของจำนวนสปอร์ ของเชอรรา $\times 10^7$ ( สปอร์ต่อมิลลิลิตร )
0.0	4,458.33
0.5	3,533.33
1.0	2,908.33
1.5	2,641.67
2.0	2,483.33
2.5	2,358.33

จากผลการทดลองในตารางที่ 4 จะพบว่าโมลต์การ์ดสามารถลดการเจริญและแพร่ขยายของเชื้อราลงได้ในทุกความเข้มข้น และจะยิ่งลดการเจริญและแพร่ขยายของเชื้อราลงได้มากในความเข้มข้นที่สูงขึ้น แต่ปริมาณการใช้โมลต์การ์ดที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 1.0 - 1.5 กิโลกรัมต่อตัน คือถ้ามีความชื้นในอาหารสัตว์น้อยกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ควรใส่โมลต์การ์ด 1.0 กิโลกรัมต่อตัน แต่ถ้ามีความชื้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ควรใส่โมลต์การ์ด 1.5 กิโลกรัมต่อตัน

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. อาหารสัตว์ที่ใช้ในการทดลองมีความชื้น 9.57 เปอร์เซ็นต์
2. อาหารสัตว์ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการเจริญ และแพร่ขยายของเชื้อราในการทดลองนี้ มีความชื้น 16.82 เปอร์เซ็นต์.
3. อาหารสัตว์ที่ได้สารยับยั้งจะมีการเจริญ และแพร่ขยายของเชื้อราต่ำกว่าอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใส่สารยับยั้งมาก
4. ระหว่างสารยับยั้งเชื้อรา 2 ชนิด คือโมลด์การ์ดและกรดโพรพโอนิก จะพบว่าโมลด์การ์ดมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ควบคุมการแพร่ขยาย และฆ่าเชื้อราในอาหารสัตว์ได้สูงกว่ากรดโพรพโอนิก
5. ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ควบคุมการแพร่ขยาย และฆ่าเชื้อราในอาหารสัตว์ของโมลด์การ์ด จะยาวนานกว่ากรดโพรพโอนิกประมาณ 4-5 สัปดาห์
6. ปริมาณการใช้โมลด์การ์ดที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 1.0 - 1.5 กิโลกรัมต่อตัน และสรุปอัตราการใช้โมลด์การ์ดได้ดังนี้  
 อาหารสัตว์ที่มีความชื้นน้อยกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ใช้โมลด์การ์ด 1.0 กิโลกรัมต่อตัน  
 อาหารสัตว์ที่มีความชื้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ใช้โมลด์การ์ด 1.5 กิโลกรัมต่อตัน
7. ควรมีการทดลองใช้อาหารสัตว์หลาย ๆ ชนิด ยกตัวอย่างเช่น อาหารสำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ อาหารสำหรับโคเนื้อหรือโคนม เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงอัตราการใช้ที่เหมาะสม และครอบคลุมในอาหารสัตว์หลาย ๆ ชนิด
8. ควรมีการศึกษาทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้โมลด์การ์ดและปริมาณความชื้นในอาหารสัตว์ที่ระดับความชื้นต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการใช้โมลด์การ์ดที่เหมาะสมที่ระดับความชื้นนั้น ๆ




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

## ส่วนประกอบของอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ที่ใช้ในการดำเนินงานทดลองเป็นอาหารสำหรับหมูใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70-100 กิโลกรัม ซึ่งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1. ปลาช้ำ	60	เปอร์เซ็นต์
2. รำละเอียด	18	เปอร์เซ็นต์
3. กากถั่วเหลือง ( 44 เปอร์เซ็นต์ )	16	เปอร์เซ็นต์
4. ปลาป่น ( 53 เปอร์เซ็นต์ )	4	เปอร์เซ็นต์
5. ไคแคลเซียม	2	เปอร์เซ็นต์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข

## กรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนต

กรดโพรพิโอนิกเป็นกรดอะลิฟาติกโมโนคาร์บอกไซคลิกมีสูตรโมเลกุล  $C_3H_6O_2$  และน้ำหนักโมเลกุล 74 มีลักษณะเป็นของเหลวละลายน้ำได้ดี ตัวอย่างของกรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนต ได้แก่



กรดโพรพิโอนิกพบตามธรรมชาติ ในอาหารประเภทหมักดองและในเนยแข็ง (sweet cheese) จุลินทรีย์จะเปลี่ยนกรดแลคติกหรือแล็กแตตให้เป็นโพรพิโอนิก ก๊าซที่เกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะทำให้เกิดโพรงในเนยแข็ง กรดที่เกิดขึ้นนี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันการเจริญของเชื้อราและทำให้รสชาติดีขึ้น โมเลกุลที่ไม่แยกสลายของกรดนี้จะไวต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ การใช้ในอาหารนั้นนิยมใช้ในรูปแบบของเกลือมากกว่า และเกลือโซเดียมจะละลายได้ดีกว่าแคลเซียม สำหรับประสิทธิภาพของกรดชนิดนี้จะสูงที่สุดที่พีเอชต่ำกว่า 5 และเมื่อพีเอชของอาหารสูงขึ้นประสิทธิภาพของกรดโพรพิโอนิกก็จะลดลง เช่นเดียวกับเกลือเบนโซเอตและเกลือซอร์เบต และพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและราได้ดี แต่จะไม่มีผลต่อยีสต์เลย ฉะนั้นจึงเป็นสารกันเสียที่นิยมใช้ในขนมอบที่ใช้ยีสต์ สำหรับวิธีการที่ใช้สารกันเสียชนิดนี้ในอาหารนั้น นอกจากจะใช้วิธีใส่ลงในอาหารโดยตรงแล้ว ยังอาจใช้เคลือบภาชนะที่บรรจุหรือฟันทึผิวของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับเกลือซอร์เบตด้วย ส่วนอันตรายที่จะได้รับจากสารกันเสียชนิดนี้นั้น จากการทดลองพบว่าโพรพิโอเนตจะถูกย่อยและใช้ได้เช่นเดียวกับกรดไขมันอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะบริโภคเข้าไปในปริมาณมาก ก็ไม่พบว่ามีอาการถ่ายอุจจาระทางปัสสาวะเลย สำหรับปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 นั้น อนุญาตให้ใช้กรดโพรพิโอนิก หรือแคลเซียมโพรพิโอเนต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หรือโซเดียมโพรฟิโอนต หรือโพแทสเซียมโพรฟิโอนต ในผลิตภัณฑ์เนยแข็งได้ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และในอาหารอื่นๆ ยกเว้นเนื้อสัตว์ได้ในปริมาณสูงสุด 2,000 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

## ส่วนประกอบของโมลด์การ์ด

โมลด์การ์ด ( mouldgard ) เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

กรดโพรพิโอนิก	25.0	เปอร์เซ็นต์
แอมโมเนียมโพรพิโอเนต	5.0	เปอร์เซ็นต์
กรดอะซิติก	5.0	เปอร์เซ็นต์
กรดซอร์บิก	0.5	เปอร์เซ็นต์
ไฮเดรต แคลเซียม แมกนีเซียม อลูมิโนซิลิเกต	64.5	เปอร์เซ็นต์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง

### การทำตัวอย่างให้เจือจาง

นำตัวอย่างที่ต้องการตรวจนับจำนวนสปอร์มา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้ำกลั่น 9 มิลลิลิตร ซึ่งจะได้ตัวอย่างที่มีความเจือจาง  $1:10$  หรือ  $10^{-1}$  หลังจากเขย่าตัวอย่างให้เข้ากันดีแล้ว บีบเปิดตัวอย่างจากหลอดทดลองที่เจือจาง  $10^{-1}$  มาจำนวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้ำกลั่น 9 มิลลิลิตร เพื่อให้ตัวอย่างเจือจางลงเป็น  $10^{-2}$  บีบเปิดตัวอย่างจากหลอดนี้ มาจำนวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้ำกลั่น 9 มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างที่เจือจางเป็น  $10^{-3}$  ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ความเจือจางที่ต้องการ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง

### การตรวจนับสปอร์โดยใช้ฮีมาไซโตมิเตอร์

ฮีมาไซโตมิเตอร์ ( haemocytometer ) เป็นเครื่องมือซึ่งโดยพื้นฐานแล้วใช้สำหรับการนับเม็ดเลือด แต่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการนับจำนวนจุลินทรีย์และสปอร์ของเชื้อรา เครื่องมือนี้เป็นสไลด์ซึ่งมีสเกลแบ่งช่องไว้แน่นอน และมีขอบยกสูงจากสเกล เมื่อปิดทับด้วย cover slip ขอบนี้จะรองรับ cover slip ไว้ทำให้เกิดระยะห่างระหว่าง cover slip จากบริเวณที่มีสเกลเกิดเป็นความลึกได้ 0.1 หรือ 0.2 มิลลิเมตร แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต สเกลที่กำหนดไว้ประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ 25 ช่อง แต่ละช่องมีขนาด  $0.2 \times 0.2$  ตารางมิลลิเมตร แต่ละช่องใหญ่นี้มีขีดแบ่งเป็นช่องเล็กอีก 16 ช่อง แต่ละช่องมีเนื้อที่  $0.05 \times 0.05$  ตารางมิลลิเมตร ดังนั้นของเหลวที่บรรจุอยู่ในแต่ละช่องเล็กจะมีปริมาตร 0.00025 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (  $0.05 \times 0.05 \times 0.1$  )

#### วิธีการตรวจนับ

1. ล้างเครื่องมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
2. ปิดทับบริเวณสี่เหลี่ยมซึ่งมีช่องแบ่งด้วย cover slip
3. ใช้ปิเปตต์ดูดตัวอย่างที่ต้องการจะนับสปอร์ และปลายปิเปตต์ให้ตัวอย่างซึมเข้าไปในบริเวณซึ่งเป็นสเกล
4. ตรวจนับจำนวนสปอร์โดยใช้กำลังขยาย 40 เท่า
5. นับจำนวนสปอร์ในแต่ละช่องใหญ่

#### การคำนวณปริมาณสปอร์

รวมจำนวนสปอร์ที่นับได้จากแต่ละช่องใหญ่หารด้วยจำนวนช่อง ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของจำนวนสปอร์ต่อหนึ่งช่องใหญ่ เช่น ได้ A สปอร์ต่อช่องใหญ่ และช่องใหญ่มีปริมาตร 0.004 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (  $0.2 \times 0.2 \times 0.1$  ) คำนวณจำนวนสปอร์ต่อตัวอย่าง 1 มิลลิเมตร ได้ดังนี้


$$\text{ตัวอย่าง } 0.004 \text{ ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีจำนวนสปอร์} = A \text{ สปอร์}$$

$$\text{ถ้าตัวอย่าง } 1 \text{ ลูกบาศก์มิลลิเมตร จะมีจำนวนสปอร์} = \frac{A \times 1 \times 10^3}{0.004} \text{ สปอร์ต่อมิลลิเมตร}$$

$$= 25 \times 10^4 \times A \text{ สปอร์ต่อมิลลิเมตร}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ฉ




ภาพที่ 1 ชุดกรอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2 ลักษณะของกระทงที่ใส่อาหารสัตว์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3 ลักษณะของอาหารสัตว์ซึ่งผสมกับน้ำก่อนจะนำมากรอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4 ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 5 ลักษณะของการบรรจุน้ำสัตว์ไว้สูง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 6 ลักษณะของโมลด์การ์ด์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

- ทิม พรรณศิริ. "ข้าวโพดและข้าวโพดอาหารสัตว์". ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 (2532): 9-15.
- ธีรยุทธ เวชรัตน์พิมล. "อาหารสัตว์และAflatoxin". ธุรกิจอาหารสัตว์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (2529): 65-69.
- ประวัติ ต้นบุญเอก. "การศึกษาสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดสารพิษอะฟลาทอกซิน". กสิกร ปีที่ 58 ฉบับที่ 5 (2528): 391-394.
- ปริศนา สิริอาษา. การตรวจสอบอะฟลาทอกซินอย่างรวดเร็ว. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร, 2534.
- มาลินี ลิ้มโกคา. พิษวิทยาและปัญหาที่พบในสัตว์. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์, 2527.
- ไมตรี สุทธจิตต์. สารพิษรอบตัวเรา. เชียงใหม่: ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
- ลีพัฒนาอาหารสัตว์. "เชื้อราในอาหารสัตว์". Veterinary news ฉบับที่ 12 (2538) : 10-17.
- สุกัญญา จัตตุพรพวงษ์. วัตถุดิบอาหารสัตว์: การใช้และการตรวจสอบคุณภาพ. นครปฐม: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ, 2530.
- Buchanan,R.L. and J.C. Ayres."Effect of Sodium Acetate on Growth and Aflatoxin Production by *Aspergillus parasiticus* NRRL 2999". J.Food Sci. vol.41 (1976) PP.128-132.
- Feigelson,P. and O.Greengard."Regulation of Liver Tryptophan Pyrrolase Activity." L.Biol.Chem. Vol.237 (1962) PP.1908.
- Friedman,M.A. and G.N.Wogan."Effect of Aflatoxin B1 on RNA Polymerase Activity and Incorporation of Cytidine into RNA of Rat Nuclei." Fed.Proc. Vol.26 (1967) PP.358.
- Gosh,J.and P. Haggblom." Effect of Sublethal Concentrations of Propionic or Butyric Acid on Growth and Aflatoxin Production by *Aspergillus flavus*." Int.J.Food Microbiol. Vol.2 (1985) PP.323-330.
- Sargeant, K. and other."The Assay of a Toxin Principle in Certain Groundnut Meal." Vet.Rec. Vol.73 (1961a) PP.1291.
- Sargeant,K. and other."Toxicity Associated with Certain Samples of Groundnut." Nature.Vol192 (1961a) PP.1096-1097.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Thanaboripat,D.and other.** “effect of Sodium Chloride, Propionic Acid and Ammonium Hydroxide on Growth of *Aspergillus flavus* on Corn and Aflatoxin Production.” ASEAN Food J. Vol. 7 no.1 (1992) PP.24-29.

**Vandegraft,E.,Hesseltine,c.w. and Shotwell,O.L.”** Grain Preservatives:Effect on Aflatoxin Production and Ochratoxin Production.” Cereal Chem. Vol.52 (1975) PP.79-84.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้